

П-30





б. м. XV. 5. 9.


Библіотека Н. Н. МИХАЙЛОВСКАГО

шкафъ XV полка 5 № 9



+








# РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ.








17-30

# РАСТИТЕЛЬНОСТЬ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ

## ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ОПРЕДѢЛЕНІЮ РАСТЕНІЙ,

дикорастущихъ и разводимыхъ въ предѣлахъ Московской губерніи.

Составилъ А. Петуниковъ.



МОСКВА 1890.

Книжный магазинъ Н. И. Мамонтова:

Москва, Кузнецкій мостъ, домъ Фирсановой.

1491/8.4.

5921

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
Предисловіе . . . . .	I
Введеніе . . . . .	IX
Группировка растений . . . . .	IX
Опредѣленіе растений . . . . .	XIII
Собіраніе и сохраненіе растений . . . . .	XVI
I. Опредѣлитель семействъ . . . . .	1
II. Опредѣлитель родовъ . . . . .	33
III. Опредѣлитель видовъ . . . . .	129
Алфавитный перечень русскихъ названій растений . . . .	311
Систематическій обзоръ растений Московской губерніи . .	331
Алфавитный списокъ сокращенныхъ именъ авторовъ . . .	347



## ПРЕДИСЛОВІЕ.

---

Намѣреніе составить руководство къ опредѣленію растений Московской губерніи зародилось во мнѣ уже давно, вскорѣ послѣ того, какъ не стало автора „Московской флоры“, профессора и моего учителя Н. Н. Кауфмана, сошедшаго въ могилу черезъ нѣсколько лѣтъ по выходѣ въ свѣтъ его сочиненія. Уже въ то время, въ моемъ распоряженіи былъ богатый матеріалъ, оставленный покойнымъ Кауфманомъ, а также собранный и мною, въ сотрудничествѣ съ другимъ покойнымъ профессоромъ московскаго университета И. Д. Чистяковымъ, и нѣкоторыми другими лицами. Къ сожалѣнію, иная дѣятельность отвлекла меня далеко и надолго отъ начатой тогда обработки матеріала по московской флорѣ; но когда обстоятельства позволили мнѣ снова за нее приняться, моимъ первымъ занятіемъ былъ тщательный пересмотръ сочиненія Кауфмана, все изданіе котораго въ то время почти уже разошлось и становилось библиографическою рѣдкостью. Я предполагалъ тогда, отказавшись отъ составленія самостоятельнаго руководства, дополнить и переработать „Московскую флору“ и, кореннымъ образомъ измѣнивъ таблицы для опредѣленія и ихъ расположеніе, вновь выпустить это сочиненіе вторымъ изданіемъ, и тѣмъ надолго связать съ „Московскою флорою“ имя Н. Н. Кауфмана. Этому намѣренію не суждено однако было осуществиться въ свое время по причинамъ, о которыхъ не мѣсто здѣсь распространяться, и я

долженъ былъ вернуться къ осуществленію первоначальнаго моего предположенія—приняться за исполнѣ самостоятельную работу.

Результатомъ этой работы является предлагаемое руководство къ опредѣленію растений, какъ первая и совершенно обособленная часть обширнаго предпринятаго мною труда, подъ общимъ заголовкомъ „Растительность Московской губерніи“, въ составъ котораго должно войти давно уже готовящееся мною подробное систематическое описаніе всѣхъ видовъ и разновидностей московскихъ растений и распредѣленіе растительности по губерніи, на основаніи тщательно собираемаго мною матеріала, хотя далеко еще не полнаго.

Позволю себѣ указать на особенности предлагаемаго труда.

Ознакомившись со множествомъ руководствъ къ опредѣленію растений, составленныхъ въ видѣ дихотомическихъ таблицъ, я нашелъ, что всѣ они страдаютъ однимъ и тѣмъ же недостаткомъ—слишкомъ короткими и общими діагнозами, по которымъ можетъ опредѣлять безошибочно только тотъ, кто уже достаточно знакомъ съ систематикою растений. При составленіи моихъ таблицъ, я имѣлъ въ виду незнающаго систематики, и потому старался представить возможно полные и точные діагнозы и вести опредѣленіе путемъ сопоставленія цѣлаго ряда признаковъ, безъ чего опредѣленіе зачастую становится невозможнымъ.

Важнымъ подспорьемъ для безошибочнаго опредѣленія служатъ рисунки: ими дополняется не рѣдко цѣлый рядъ мелкихъ признаковъ, которые трудно и, въ особенности, долго описывать. Поэтому, въ предлагаемомъ руководствѣ, рисунки нашли широкое примѣненіе: всѣ семейства и, за весьма немногими исключеніями, всѣ роды, да и не малая доля видовъ, обставлены полнотипажами, заимствованными изъ лучшихъ иллюстрированныхъ сочиненій \*).

---

\*) Reichenbach. *Icones Florae germanicae et helveticae*.

Id. *Iconographia botanica, seu Plantae criticae*.

Sturm. *Deutschlands Flora*.

Schnitzlein. *Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis*.

Berg & Schmidt. *Darstellung und Beschreibung... officineller Gewächse*.



Я не избѣжалъ общепринятаго порядка въ опредѣленіи растений, въ три приѣма: сначала семейства, потомъ рода и, наконецъ, вида, соотвѣтственно чему и составлено три опредѣлителя: семействъ, родовъ и видовъ. Введены однако нѣкоторые упрощенія. Такъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда семейство представлено въ Московской губерніи однимъ родомъ, онъ прямо указанъ въ опредѣлителѣ семействъ, какъ единственный его представитель. Тогда, послѣ приисканія семейства, видъ или виды этого рода отыскиваются прямо по III опредѣлителю видовъ, минуя II опредѣлитель родовъ.

Преслѣдуя одну только практическую цѣль—дать „простой и легкій способъ“ опредѣленія растений, я расположилъ таблицы родовъ и видовъ въ алфавитномъ порядкѣ, въ противность общепринятому порядку расположенія ихъ, по той или другой ботанической системѣ. Я нахожу совершенно излишнимъ ученый декорумъ въ такого рода сочиненіи, которое равносильно толковому словарю по спеціальному предмету. Приисканіе родовъ и видовъ при алфавитномъ порядкѣ значительно облегчается и упрощается. Для желающихъ же ознакомиться съ размѣщеніемъ растений Московской губерніи въ системѣ, приложенъ въ концѣ книги „Систематическій обзоръ“, въ которомъ высшія группы и семейства расположены по системѣ Ханштейна \*).

---

Lantzius-Beninga. Die unterscheidenden Merkmale der deutschen Pflanzen-Familien. 1866.

Nees ab Eisenbeck. Genera plantarum Florae germanicae. 1833—1860.

Willkomm. Führer in's Reich der deutschen Pflanzen, 2 Aufl.

Id. Forstliche Flora von Deutschland & Oesterreich.

Cosson et Germain. Atlas de la flore des environs de Paris.

Thomé's. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 1885—1888.

Hartig. Vollständige Naturgeschichte der forstlichen Culturpflanzen Deutschlands. 1852.

Krebs. Vollständige Beschreibung und Abbildung der sämtlichen Holzarten von Deutschland. 1826.

Guimpel. Abbildung der fremden in Deutschland ausdauernden Holzarten. — Hef. 1—24, 1819—27, и многія другія.

\*) Hanstein. Uebersicht des natürlichen Pflanzensystems.

Въ таблицахъ для опредѣленія видовъ приведены не только всѣ доселѣ извѣстные виды дикорастущихъ, явнобрачныхъ и выспшихъ тайнобрачныхъ растеній, но и всѣ болѣе или менѣе извѣстныя разводимыя растенія—полевыя, огородныя и древесныя \*). Культурныя растенія, не менѣе дикорастущихъ, характеризуютъ растительность данной мѣстности, и потому описаніе тѣхъ и другихъ въ мѣстныхъ флорахъ одинаково важно.

Въ нашихъ таблицахъ возможно тщательно отмѣнены дикорастущія отъ одичалыхъ, занесенныхъ и воздѣлываемыхъ растеній. Всѣ не дикорастущія отмѣнены особыми знаками: одичалыя и занесенныя—звѣздочкою \*, воздѣлываемыя—крестикомъ †; оба знака, поставленные рядомъ, указываютъ на то, что отмѣченные ими воздѣлываемые виды встрѣчаются и въ одичаломъ состояніи.

Наконецъ, въ отношеніи объема родовъ, видовъ и большей части семействъ, а также названій ихъ и именъ авторовъ, я держался, за немногими исключеніями, классическаго по русской флорѣ, хотя и устарѣлаго сочиненія Ледебура: „Flora rossica“, и только для тѣхъ группъ или семействъ, которыя послѣ Ледебура были монографически обработаны, я отступалъ отъ автора российской флоры, слѣдуя этимъ монографіямъ\*\*), а также и въ немногихъ другихъ, второстепенныхъ случаяхъ.

\*) При составленіи списка культурныхъ растеній, я пользовался почтеннымъ трудомъ Р. И. Шредера: «Русскій огородъ, питомникъ и плодовый садъ» и сообщенными мнѣ замѣтками автора этого сочиненія, а для сельско-хозяйственныхъ растеній—спискомъ, обязательно составленнымъ по моей просьбѣ бывшимъ профессоромъ Петровской Академіи А. А. Фадѣевымъ.

\*\*) Таковы:

Milde. Die höheren Sporenpflanzen Deutschlands und der Schweiz.

Luerssen. Die Farnpflanzen oder Gefässbündelkryptogamen von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

Wimmer. Salices europaeae. Lipsiae. 1866.

Wesmael. Monographie de toutes les espèces connues du genre Populus. Mons. 1869.

Lecoq. Monographie du genre Thalictrum. Gand. 1885.

Lehmann. Revisio Potentillarum. 1856.



При діагнозированіи родовъ и видовъ я держался главнымъ образомъ Ашерзона, находя, что въ отношеніи установленія признаковъ и самого описанія, его Флора Бранденбурга не имѣетъ себѣ подобной и далеко оставляетъ за собою всѣ другія новѣйшія сочиненія по флорѣ Германіи, наиболѣе намъ близкой \*).

Для правильнаго произношенія латинскихъ названій всѣ они акцентированы по Витштейну, причемъ въ сомнительныхъ случаяхъ я свѣрялъ его обозначенія съ указаннымъ у Ашерзона произношеніемъ.

Что же касается до русскихъ названій, то я широко пользовался почтеннымъ и единственнымъ въ своемъ родѣ трудомъ

---

Maximowicz. Adnotationes de Spiraeaceis. 1879.

Nägeli & Peter. Die Hieracien Mittel-Europas. Monographische Bearbeitung der Piloselliden. 1885

\*) Настоящими книгами при составленіи таблицъ служили мнѣ, главнымъ образомъ, слѣдующія сочиненія:

Ledebour. Flora rossica. Vol. 1—4. 1842—1853.

Цингеръ. Сборникъ свѣдѣній о флорѣ Средней Россіи. Москва. 1886.

Кауфманъ. Московская флора. Москва. 1866.

Ascherson. Flora der Provinz Brandenburg etc. Berlin. 1864.

Koch. Synopsis Florae Germanicae et Helveticae. Ed. III, 1857.

Hallier. Koch's Taschenbuch der Deutschen und Schweizer Flora, 8 Aufl. Leipzig. 1881.

Garcke. Flora von Deutschland. 15 Aufl. 1885.

Willkomm. Führer in's Reich der deutschen Pflanzen. 2 Aufl. 1882.

Potonié. Illustrierte Flora von Nord-und Mittel-Deutschland. 3 Aufl. 1887.

Frank. Pflanzentabellen zur... Bestimmung der höheren Gewächse Nord-und Mittel-Deutschland. 4 Aufl. 1881.

Шредеръ. Русскій огородъ, питомникъ и плодовый садъ.

Анненковъ. Ботаническій словарь. Изданіе 1878 г.

Wittstein. Etymologisch-botanisches Handwörterbuch. 1856.

Кромѣ того, приходилось нерѣдко обращаться къ:

Cosson et Germain. Synopsis analytique de la flore des environs de Paris. 3-me édition. 1876.

Willkomm. Forstliche Flora.

Koch. Dendrologie.

Ruprecht. Flora ingrica. Vol. 1. Petropoli. 1860.

Meinshausen. Flora ingrica. St.-Petersburg. 1878.

Шмальгаузенъ. Флора югозападной Россіи. Кіевъ. 1886, и къ «Матеріаламъ къ ближайшему познанію произрастаемости Россійской Имперіи». 1844—1859.

недавно скончавшаго Н. И. Анненкова, и сожалѣю, что ранѣе не далъ себѣ труда ближе ознакомиться съ русской номенклатурой, не рѣдко очень удачной и выразительной, хотя и недостаточно разнообразной.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда русскихъ названій не хватало, приходилось прибѣгать къ переводу латинскихъ; если же они не поддавались переводу, то оставалось пользоваться давно установившимся въ садоводственной литературѣ приѣмомъ — называть растенія и по русски латинскимъ именемъ. Во всѣхъ-же тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ роды растений находили себѣ русскія наименованія, они ставились во множественномъ числѣ, а соответственные имъ виды — въ единственномъ. Различные виды одного и того-же рода передавались по-русски, въ большинстве случаевъ, возможно точнымъ переводомъ латинскихъ видовыхъ названій, причемъ видовое названіе ставилось впереди родового, какъ это и свойственно русскому языку. Если же данный родъ заключалъ въ себѣ одинъ только видъ, и если это видовое названіе переводилось по-русски прилагательнымъ, то оно ставилось въ скобкахъ, какъ излишнее въ данномъ случаѣ, при существительномъ въ единственномъ числѣ, которымъ отличалось видовое названіе отъ родового. Но если и видовое названіе выражалось существительнымъ, то при немъ родовое опускалось, въ устраненіе двойственного названія вида двумя существительными, что совершенно чуждо духу русскаго языка.

Въ оправданіе такой нотаціи я могу сослаться на покойнаго С. А. Усова, который принадлежалъ къ числу немногихъ знатоковъ и цѣнителей русскаго языка и русской рѣчи, и который когда-то \*), остановившись на критикѣ русской номенклатуры, совершенно справедливо замѣтилъ, что общепринятый способъ обозначенія животныхъ, заимствованный съ латинскаго, совершенно не свойственъ русскому языку, и указалъ выходъ изъ этого затрудненія. Я воспользовался этими указаніями въ примѣненіи къ обозначенію растений.


\*) Въ статьѣ о зубрѣ: «Замѣтка по поводу названія туръ». См. сочиненіе С. А. Усова. Томъ I. Москва. 1888 г., стр. 154—158.



Въ заключеніе еще одно замѣчаніе. Во все время обработки опредѣлителей, меня беспокоили шаткость и неустановленность ботанической терминологіи на русскомъ языкѣ. Много и упорно бился я съ нею, и, конечно, не могъ удовлетворительно справиться. Да это и не подѣ силу одному лицу. Задача подобнаго рода можетъ быть удовлетворительно рѣшена лишь совокупными усиліями многихъ. Только путемъ коллективной работы можетъ быть внесено единство и однообразіе въ терминологію. Отчего бы не взяться за такую работу одному изъ нашихъ многочисленныхъ обществъ естествоиспытателей, предоставивъ окончательное установленіе терминовъ или съѣзду естествоиспытателей, или академіи наукъ.

А. Петунниковъ.

Ноябрь 1888 года.



## ВВЕДЕНИЕ.

---

1. **Группировка растений.** Название каждого растения на научномъ языкѣ всегда обозначается двумя латинскими словами, изъ которыхъ первое—существительное, а второе—обыкновенно прилагательное, рѣдко тоже существительное. Такое обозначеніе употребляется иногда и по-русски, съ тою только разницею, что прилагательное ставятъ впереди существительнаго. Такъ, напр., говорятъ: красная смородина, черная смородина, подобно тому, какъ и по-латыни называютъ тѣ же растенія: *Ribes rubrum*, *Ribes nigrum*. Въ обоихъ случаяхъ однимъ и тѣмъ же существительнымъ указывается на сходство между тою и другою смородиною, а разными прилагательными отмѣчается различіе между ними, выраженное въ окраскѣ ягодъ. Впрочемъ это не единственное отличие красной смородины отъ черной: ихъ, какъ извѣстно, можно различить и по другимъ признакамъ; даже и тогда, когда кусты не въ плодахъ и безъ цвѣтовъ. Листья черной смородины, подобно ягодамъ, особымъ образомъ пахнутъ, благодаря точечнымъ железкамъ, покрывающимъ листья; у красной смородины нѣтъ ни такихъ железокъ, ни запаха. Во время цвѣтенія красной и черной смородины, также замѣчается разница: у послѣдней цвѣточныя кисти о немногихъ цвѣткахъ и покрыты пушкомъ, у первой—онѣ о многихъ цвѣткахъ и голыя; прицвѣтники подъ каждымъ цвѣткомъ черной смородины очень узкіе, шиловидные; у красной смородины—широкіе, овальные; да и самыя цвѣтки неодинаковы по наружному виду: у черной смородины чашечка колокольчатая, пушистая, а лепестки продолговатые; у красной смородины—чашечка плоская, блюдчатая, голая, и лепестки лопатчатые. По



этимъ и по многимъ другимъ признакамъ различаютъ два разныхъ *вида* смородины—красную и черную.

Иное дѣло, если сличить красную смородину съ бѣлой. Тутъ, кромѣ цвѣта ягодъ, никакого другого отличія не замѣчается ни въ цѣломъ кустѣ, ни въ листьяхъ, ни въ цвѣткахъ, такъ что обѣ эти *породы* смородины — красной и бѣлой, можно различить по одному такому ничтожному признаку лишь только тогда, когда ягоды начинаютъ вызрѣвать.

Но рядомъ съ этими различіями между смородинами черной и красной, замѣчается и большое сходство: оно выражается въ томъ, что это—кустарники, съ листьями одинаковаго очертанія—5-лопастными, съ цвѣтками въ повислыхъ кистяхъ; кисти ихъ съ прицвѣтниками; чашечка надъ нижнею завязью, остающаяся на ягодѣ; вѣнчикъ, приросшій къ основанію долей чашечки, и пр. и пр. Столь большое сходство въ перечисленныхъ признакахъ послужило поводомъ къ тому, чтобы, какъ по-русски, такъ и по-латыни, соединить эти различные по свойству ягодъ и по запаху кусты подъ однимъ общимъ названіемъ смородинъ—*Ribes*. Соединенныя подъ такимъ общимъ названіемъ растенія составляютъ *родъ*.

Впрочемъ тѣ же признаки, которые свойственны черной и красной смородинѣ, замѣчаются еще и на кустахъ крыжовника. Эти послѣдніе отличаются отъ смородинъ, главнымъ образомъ, тѣмъ, что они колючи, а тѣ нѣтъ; кромѣ того они разнятся очень ограниченнымъ числомъ цвѣтковъ въ кисти, большею величиною ягодъ и другими, болѣе второстепенными признаками. Но этихъ признаковъ вполне достаточно, чтобы для крыжовника установить особый видъ, названный по-латыни *Ribes spinosum*—колючая смородина, или *Ribes Grossularia*, что въ переводѣ должно значить: смородина-крыжовникъ.

Между растеніями, отнесенными къ различнымъ родамъ, замѣчается нерѣдко большое сходство, выражающееся обыкновенно въ одинаковомъ строеніи цвѣтка, подобно тому, какъ между видами одного и того же рода родовое сходство или принадлежность ихъ къ одному и тому же роду обнаруживается въ общихъ признакахъ или отличительныхъ чертахъ второстепеннаго свойства: въ формѣ и очертаніи листьевъ, въ мелкихъ особенностяхъ строенія цвѣтка, и пр.

Такъ, напр., разные виды и породы огурцовъ и тыквъ, при всемъ своемъ сходствѣ въ мясистыхъ плодахъ, въ формѣ и даже окраскѣ цвѣтковъ, въ шершавыхъ лопастныхъ листьяхъ, въ стелющихся стебляхъ съ длинными, завивающимися усиками,—отличаются однако такими

признакамъ, которые вынудили выдѣлить огурцы и тыквы въ особые роды. Первые, съ своими простыми усиками, 5-раздѣльнымъ вѣнчикомъ, въ которомъ тычинки срослись по-парно своими нитями, съ сѣменами, края которыхъ остры, составляетъ родъ *Cucumis*; а вторыя, съ усиками вѣтвистыми, съ 5-надрѣзнымъ вѣнчикомъ, въ которомъ всѣ тычинки срослись вверху нитями, и съ сѣменами, края которыхъ закруглены, составляютъ родъ *Cucurbita*. Но указанное выше сходство признаковъ повело къ тому, что оба эти рода соединили въ одну общую группу—въ *сѣмейство* тыквенныхъ растений—*Cucurbitaceae*.

Самыя сѣмейства, по ихъ еще болѣе общимъ признакамъ, соединяють въ большія группы—*порядки*; порядки въ свою очередь—въ *классы*; классы—въ *отдѣлы*, какъ наивысшія и самыя крупныя группы, охватывающія въ своей совокупности все растительное царство.

Число различныхъ растительныхъ формъ, входящихъ въ составъ той или другой группы, бываетъ очень неодинаково, въ особенности при ограниченности изслѣдуемой мѣстности. Нерѣдки случаи, что родъ представленъ однимъ только видомъ или что въ сѣмействѣ заключается одинъ только родъ въ данной мѣстности. Такъ, всѣ разнообразныя виды смородины составляютъ одинъ родъ *Ribes* и самое сѣмейство смородинныхъ растений—*Ribesiacae*, представлено въ одномъ этомъ родѣ *Ribes*. Наоборотъ, есть сѣмейства, состоящія изъ огромнаго числа родовъ, такъ же какъ есть и роды, заключающіе множество видовъ. Въ этомъ случаѣ для облегченія группировки приходится разбивать сѣмейство сначала на второстепенныя группы—подсѣмейства, колѣна и подколѣна, охватывающія нѣсколько родовъ; роды—на подро́ды, заключающіе по нѣскольку видовъ и пр., такъ что при полномъ объемѣ большой и разнообразной группы растений устанавливается столько же второстепенныхъ подраздѣленій, сколько и коренныхъ, съ прибавленіемъ частицы *подъ*.

За исключеніемъ этихъ второстепенныхъ подраздѣленій, все растительное царство распадается послѣдовательно на слѣдующія категоріи: отдѣлы, классы, отряды, порядки, сѣмейства, колѣна, роды и наконецъ, виды, состоящія изъ всѣхъ экземпляровъ одинаковыхъ растений, сходныхъ между собою во всѣхъ мелкихъ признакахъ, или изъ особей, почти тождественныхъ.

Всѣ, приведенныя въ опредѣлителяхъ, растенія Московской губерніи относятся къ обоимъ отдѣламъ:

I. Тайнобрачныхъ или безцвѣтковыхъ—*Cryptogamae*, и

II. Явнобрачныхъ или цвѣтковыхъ—*Phanerogamae*.

Изъ двухъ подотдѣловъ, на которые распадается первая группа—тайнобрачныхъ, а именно:

1. Низшихъ — *Cryptogamae cellulares*, куда относятся всѣ грибы, лишай, водоросли и мхи, и

2. Высшихъ или сосудистыхъ — *Cryptogamae vasculares*, заключающихъ: папоротники, хвощи и плауны,—въ опредѣлителяхъ помѣщены лишь одни высшія, такъ какъ приемы и способы опредѣленія низшихъ тайнобрачныхъ совершенно иные, нежели для всѣхъ остальныхъ высшихъ растений, и къ тому же по низшимъ тайнобрачнымъ Московской губерніи не собрано еще достаточно матеріала.

Отдѣлъ явнобрачныхъ или цвѣтковыхъ въ свою очередь распадается на два подотдѣла:

A. Голосѣменныхъ—*Gymnospermae*, т. е. такихъ, у которыхъ сѣмена не заключены въ плоды, и

B. Покрытосѣменныхъ или скрытосѣменныхъ—*Angiospermae*, т. е. растений съ сѣменами, заключенными въ плоды.

Между различными представителями первой группы у насъ встрѣчается лишь нѣсколько растений изъ класса Хвойныхъ—*Coniferae*.

Покрытосѣменные въ свою очередь распредѣляются на слѣдующія второстепенныя группы—классы:

I. Односѣменодольныхъ — *Monocotyledones*, проростающихъ однимъ только листомъ и несущихъ мочковатые корешки, а листья почти всегда дугонервные, т. е. съ продольными жилками.

II. Двусѣменодольныхъ—*Dicotyledones*, проростающихъ двумя листьями и несущихъ обыкновенно главный корень и листья углонервные, т. е. съ жилками, выходящими по сторонамъ срединной жилки.

Двусѣменодольныя растенія распадутся на два подкласса:

a. Безлепестныхъ—*Apetalae*, т. е. съ вполнѣ голымъ цвѣткомъ или съ невиднымъ, обыкновенно зеленоватымъ цвѣточнымъ покровомъ,

b. Лепестковыхъ—*Petalanthae*.

Послѣднія, наконецъ, распадутся на 3 отряда:

α. Чашецвѣтныхъ—*Calyciflorae*, у которыхъ тычинки прикрѣплены къ чашечкѣ или къ простому околоцвѣтнику;

β. Ложецвѣтныхъ — *Thalamiflorae*, у которыхъ тычинки сидятъ на ложѣ цвѣтка, не срастаясь ни съ чашечкою, ни съ вѣнчикомъ;

γ. Вѣнчикоцвѣтныхъ—*Corolliflorae*, у которыхъ тычинки прикрѣплены къ трубкѣ вѣнчика.



Какія семейства заключаетъ каждая изъ этихъ большихъ группъ и въ какомъ естественномъ порядкѣ слѣдуютъ они одно за другимъ, видно изъ помѣщенного въ приложеніи «Систематическаго обзора растеній Московской губерніи».

Какихъ бы размѣровъ и категорій ни были рассматриваемыя группы растеній, начиная съ видовъ и кончая отдѣлами, каждая изъ нихъ сопровождается именемъ того автора, который установилъ или впервые обозначилъ ту или другую группу. Указаніе на автора особенно важно въ названіяхъ видовъ, такъ какъ зачастую одинъ и тотъ же видъ разными ботаниками названъ различно, и, наоборотъ—бываютъ случаи, что различные виды обозначались однимъ и тѣмъ же названіемъ. Чтобы разобраться въ такихъ однозначущихъ названіяхъ растеній или *синонимахъ*, за родовымъ или видовымъ именемъ ихъ, а также и за названіями остальныхъ, высшихъ группъ растеній, ставятся начальныя буквы или сокращенныя фамиліи ботаниковъ, установившихъ эти названія. Такъ, буква L. — значить Линней — Linneus, DC. — Декадоль, Decandolle и т. д. Сокращенныя обозначенія именъ всѣхъ авторовъ, упоминаемыхъ въ опредѣлителяхъ растеній Московской губерніи, приведены въ концѣ книги въ алфавитномъ порядкѣ.

**Опредѣленіе растеній.** Опредѣленіе любого растенія, встрѣчающагося въ предѣлахъ Московской губерніи, обыкновенно дѣлается въ три пріема: сначала приписывается семейство, къ которому относится неизвѣстное растеніе, затѣмъ — родъ его и, наконецъ, видъ. Для такого опредѣленія служатъ и троякаго рода таблицы, составляющія 3 опредѣлителя: I семействъ, II родовъ и III видовъ.

Въ опредѣлителѣ семействъ, какъ и въ остальныхъ таблицахъ, при каждомъ номерѣ, обозначенномъ числами въ послѣдовательномъ порядкѣ, отъ 1 до 137, противопоставлены коренные или наиболее выдающіеся признаки одинъ другому. Начавъ съ перваго номера и внимательно сличая приведенныя тамъ обѣ параллельныя группы рѣзко противоположныхъ признаковъ, останавливаются на той изъ нихъ, которая подходитъ къ имѣющемуся передъ глазами растенію; если тутъ вслѣдъ за приведенными признаками не помѣщено съ правой стороны страницы названія семейства, а проставлена цифра номера, то переходятъ къ тому же номеру съ лѣвой стороны страницы. Здѣсь опять путемъ сопоставленія признаковъ и сличенія ихъ съ изслѣдуемымъ растеніемъ приходятъ къ выбору того или другаго проставленнаго номера, отъ котораго переходятъ къ слѣдующему, и продолжаютъ этотъ пріемъ до тѣхъ поръ,

пока не дойдутъ, наконецъ, до такой группы признаковъ, которая приводитъ къ названію семейства.

На пути такого опредѣленія попадаютъ иногда въ таблицахъ цифры, поставленныя въ скобкахъ вслѣдъ за номерами съ лѣвой стороны, напечатанными жирнымъ шрифтомъ. Онѣ указываютъ на предшествующій номеръ таблицъ, отъ котораго нужно было непосредственно перейти къ данному номеру. Такъ, на 2-й же страницѣ слѣва, послѣ номера 6 поставлено въ скобкахъ 2, что указываетъ на помѣщеніе того же номера (6) на 1-й страницѣ справа подъ № 2, гдѣ сопоставляются обѣ группы признаковъ, отсылающія къ номерамъ 3 и 6.

Отъ опредѣленія семейства, къ которому относится изслѣдуемое растение, переходятъ къ приисканію рода по II опредѣлителю родовъ, въ которомъ семейства расположены въ алфавитномъ порядкѣ и обставлены точнымъ и довольно подробнымъ описаніемъ ихъ признаковъ, съ цѣлью проверки сдѣланнаго опредѣленія семейства. Въ этихъ таблицахъ приведены, впрочемъ, не всѣ семейства, а только тѣ, въ составъ которыхъ входитъ не менѣе двухъ родовъ изъ растений Московской губерніи. Для всѣхъ же остальныхъ семействъ, имѣющихъ своими представителями въ Московской флорѣ только по одному роду, переходятъ вслѣдъ за опредѣленіемъ семейства прямо къ отысканію вида неизвѣстнаго растенія, по III опредѣлителю видовъ. Въ этихъ случаяхъ въ опредѣлителѣ семействъ прямо указано: «единственный родъ такого-то семейства такой-то». Въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда въ таблицахъ семействъ указанъ прямо и видъ или сказано: «единственный представитель такого-то семейства», обращеніе къ таблицамъ видовъ, минуя опредѣлитель родовъ, нужно только для проверки опредѣленія или для того, чтобы найти точное видовое названіе растенія.

Въ огромномъ же большинствѣ случаевъ переходятъ послѣдовательно отъ опредѣленія семейства сначала къ опредѣленію рода, а затѣмъ уже вида. Самый приемъ опредѣленія рода и вида одинаковъ съ только что указаннымъ для нахожденія семейства: и тутъ послѣдовательный переходъ отъ номера къ номеру, отъ одной группы признаковъ къ другой, приводитъ къ приисканію рода и вида.

При большомъ числѣ родовъ въ иныхъ семействахъ или при большомъ числѣ видовъ въ нѣкоторыхъ родахъ, проставлены тоже въ скобкахъ руководящія цифры, указывающія на предшествующій номеръ, отъ котораго непосредственно переходятъ къ данному номеру.

Чтобы освоиться съ приемами въ опредѣленіи растений по табли-

цамъ, рекомендуется практиковаться сначала на опредѣленіи извѣстныхъ, хотя бы по-русскимъ названіямъ, растений и при томъ такихъ, у которыхъ цвѣтки, сравнительно, крупные и видные, такъ что не требуется прибѣгать ни къ пинцетамъ для обрыванія частей цвѣтка, ни къ игламъ для его расщепленія, ни къ лупѣ для увеличенія мелкихъ частей растенія. Затѣмъ слѣдуетъ перейти къ цвѣткамъ, хотя и мелкимъ, требующимъ примѣненія пинцета, иголъ и лупы при ихъ опредѣленіи, но тоже извѣстнымъ по своему русскому названію, и уже впоследствии, приобретя достаточный навыкъ, можно приступить къ опредѣленію растений, вовсе незнакомыхъ.

Во избѣжаніе ошибокъ въ опредѣленіи совѣтуютъ также располагать нѣсколькими экземплярами одного и того же растенія, чтобы путемъ предварительнаго и внимательнаго сличенія ихъ обойти могущія случайно встрѣтиться уклоненія и уродства въ отдѣльныхъ экземплярахъ и ознакомиться съ постоянными признаками всѣхъ частей изслѣдуемаго растенія, прежде чѣмъ приняться за таблицы для его опредѣленія. Приступивъ затѣмъ къ опредѣленію по таблицамъ, слѣдуетъ непремѣнно прочитывать оба ряда противоположныхъ признаковъ, стоящихъ подъ однимъ номеромъ, и внимательно сличать ихъ между собою. Только путемъ такого сличенія можно убѣдиться, какой изъ обоихъ рядовъ признаковъ несомнѣнно подходит къ изслѣдуемому растенію, и тѣмъ избѣгать ошибокъ въ опредѣленіи. А такія ошибки сказываются всякій разъ, какъ только опредѣленіе приводитъ къ тому, что ни одинъ изъ обоихъ рядовъ признаковъ не подходит къ данному растенію. Въ этомъ случаѣ приходится начать опредѣленіе съизнова.

Большимъ подспорьемъ въ устраненіи ошибокъ служатъ руководящіе рисунки, сличеніе которыхъ съ имѣющимися въ рукахъ растеніемъ облегчаетъ опредѣленіе, въ особенности родовъ, и удерживаетъ опредѣляющаго на вѣрномъ пути.

Чтобы показать на образцѣ, какими приѣмами должно пользоваться и какому пути слѣдовать въ опредѣленіи, прослѣдимъ, какъ опредѣляется напр., садовая вишня по цвѣтущей вѣтви этого растенія.

Раскрываемъ первую страницу опредѣлителя семействъ и начинаемъ съ 1 номера. Изъ двухъ рядовъ признаковъ къ вишневой вѣтви подходит второй рядъ, отсылающій къ номеру 2. Сличеніе признаковъ этого номера ведетъ къ номеру 6, отсюда прямо къ 22. Этотъ номеръ содержитъ лишь указаніе на одинъ признакъ, котораго не замѣчается на вѣтви вишни, и отсутствіе этого признака приводитъ къ номеру 24.



Тутъ тоже за отсутствіемъ у вишни выставленнаго подъ этою цифрою признака переходить къ номеру 30, отсюда къ 31, который приводитъ наконецъ къ положительному признаку, выраженному при номерѣ 32. За 32 слѣдуетъ 33, 34, 35 и наконецъ, 36, подъ которымъ первый рядъ признаковъ вполне совпадаетъ съ признаками вишни. Эти признаки подтверждаются приложеннымъ рисункомъ (33) разрѣза цвѣтка вишни и несоотвѣтствіемъ другаго параллельнаго ряда признаковъ, подъ тѣмъ же номеромъ, съ признаками вишни. Первый же рядъ приводитъ къ семейству миндальныхъ — *Amygdaleae*. Стало быть, вишня относится къ этому семейству, коренные признаки котораго описаны въ опредѣлителѣ родовъ (на стр. 36), къ которому затѣмъ переходить.

Тутъ сопоставлены по двумъ группамъ признаковъ, подъ а и b, сливы — *Prunus*, миндалямъ — *Amygdalus*. Первая группа признаковъ подъ литерою а несомнѣнно подходитъ къ вишни. заключаемъ, что вишня относится къ роду сливъ — *Prunus*.

Какой видъ сливъ составляетъ вишня, это узнается по опредѣлителю видовъ, гдѣ на стр. 252 находимъ подъ родовымъ номеромъ 371. *Prunus* L. — сливы. И тутъ сличеніе видовыхъ признаковъ, расположенныхъ въ два ряда при первомъ номерѣ, ведетъ къ 3 номеру, 3-й къ 4-му, гдѣ, наконецъ, второй рядъ признаковъ, при сопоставленіи ихъ съ признаками перваго ряда, ближе подходитъ къ изслѣдуемой вѣтви и заканчивается латинскимъ названіемъ садовой вишни — *Prunus Cerasus* L.

**Собирание и сохраненіе растений.** Собирая дикорастущія или воздѣлываемыя растения для опредѣленія ихъ, а затѣмъ и для сохраненія опредѣленныхъ уже растений, нельзя довольствоваться тѣмъ, чтобы срывать отдѣльные листья или цвѣтки, какъ часто дѣлаютъ начинающіе: по такимъ обрывкамъ трудно, а иногда и вовсе нельзя опредѣлять растений, потому что въ опредѣленіе ихъ входятъ обыкновенно разнообразныя признаки, заимствованные отъ стебля, расположенія листьевъ и цвѣтковь, нерѣдко формы плодовъ и иногда даже сѣмянъ и корня. Поэтому, во избѣжаніе затрудненій, а иногда и полной невозможности узнать растение по отдѣльному цвѣтку или листку, слѣдуетъ собирать травы, по возможности, цѣликомъ, полными экземплярами, съ корнями и вполне распустившимися цвѣтками; съ деревьевъ же и кустовъ срывать вѣтви, съ листьями и цвѣтками. Слѣдуетъ также избѣгать обихъ крайностей, т. е. брать очень пышно и сильно разросшіеся экземпляры или слишкомъ тощіе, корявые.

Есть много растений, которыя легче и удобнѣе опредѣляются по

цвѣтущимъ экземплярамъ, какъ, напр., всѣ злаки; но для опредѣленія многихъ другихъ важно располагать экземплярами въ плодахъ, какъ, напр., при опредѣленіи осокъ, зонтичныхъ, сложноцвѣтныхъ, крестоцвѣтныхъ и пр. Такия растенія необходимо слѣдуетъ собирать тогда, когда они отцвѣтаютъ и когда вмѣстѣ съ послѣдними цвѣтками есть уже вполне сформировавшіеся плоды.

При собираніи тѣхъ древесныхъ и кустарныхъ породъ, которыя цвѣтутъ и даже отцвѣтаютъ ранѣе полного развертыванія листьевъ и для опредѣленія которыхъ важно бываетъ имѣть вполне развитые листья, какъ, напр., ивъ, тополей, ольхъ, вязовъ и пр., слѣдуетъ отмѣчать деревья или кусты, съ которыхъ срѣзаются цвѣтущія вѣтви, съ тѣмъ, чтобы позднѣе можно было отыскать эти растенія снова и срѣзать съ нихъ листоносныя вѣтви. Еще лучше захватить съ собою въ первый же разъ нѣсколько вѣтвей и поставить ихъ въ воду или посадить, чтобы впоследствии имѣть возможность провѣрить или исправить опредѣленіе по распустившимся листьямъ.

Обыкновенно совѣтуютъ начинающимъ приняться собирать растенія съ ранней весны, когда цвѣтеть ихъ еще немного и когда между ними большая часть съ крупными цвѣтками, по которымъ опредѣлять легче. На первыхъ порахъ можно обходить все древесныя и кустарныя породы, опредѣленіе которыхъ труднѣе, такъ какъ цвѣтки ихъ большею частью очень мелки и несовершенны. Позднѣе, лѣтомъ, трудно уже бываетъ разобраться въ массѣ цвѣтущихъ растеній и справиться по началу, съ непривычки, съ ихъ опредѣленіемъ и сохраненіемъ.

Для сбора растеній можно довольствоваться вначалѣ ближайшими окрестностями: любая изъ нихъ доставитъ достаточно матеріала на первое время и даже на первые годы. Знакомясь ближе съ какою-либо мѣстностью, начинающій непременно будетъ находить впоследствии все новыя и новыя формы, которыхъ онъ не встрѣчалъ прежде или, вѣрнѣе, мимо которыхъ онъ проходилъ, не замѣчая. Присматриваясь все болѣе и болѣе къ окружающей растительности, пріобрѣтается особый навыкъ съ большею легкостью и быстротою находить для себя новинки: изощряется глазъ, развивается особаго рода чутье, которое удивительнымъ образомъ помогаетъ даже близорукому.

На такия ботаническія прогулки или экскурсіи обыкновенно берутъ съ собою пачку пропускной мягкой бумаги, въ папкѣ на тесьмахъ, продѣтыхъ сквозь прорѣзы въ картонѣ папки, чтобы класть въ бумагу собираемыя растенія; вмѣсто папки съ бумагою берутъ также жестяную

коробку, такъ наз. ботаническую капсуль, въ видѣ длиннаго приплюснутаго цилиндра, съ одной или двумя дверцами на одной сторонѣ. Усердные собиратели растений берутъ не рѣдко и то, и другое, и не безъ основанія, ибо есть растенія, настолько нѣжныя, что они слипаются въ пропускной бумагѣ во время экскурсій, такъ что потомъ трудно бываетъ расправить ихъ и возстановить въ ихъ первоначальномъ, естественномъ видѣ; для собиранія такихъ растений необходимо имѣть капсуль. У другихъ же, на оборотъ, всѣ цвѣтки легко облетаютъ въ капсулѣ или сваливаются въ комокъ, и для такихъ растений нужно брать папку съ пропускною бумагою. Во всякомъ случаѣ, папкѣ слѣдуетъ отдать предпочтеніе передъ капсулю, такъ какъ послѣдняя слишкомъ громоздка и уже потому неудобна; да и помимо того, какъ бы ни смялись въ бумагѣ растенія во время экскурсій, они легко расправляются сами, если, принеся домой, выставить ихъ на холодъ—въ подвалъ или на погребъ,—или же помѣстить въ большую банку, на дно которой палито немного воды, а горло плотно прикрыто: за ночь растенія и въ томъ, и въ другомъ случаѣ вполне расправятся, и станутъ очень удобными для опредѣленія и для сохраненія.

Кромѣ папки или капсулы должно имѣть при себѣ какое-либо орудіе для выкапыванія и для срѣзки растений—лопатку и ножъ или садовые ножницы; большой садовый ножъ вполне удовлетворяетъ всѣмъ этимъ цѣлямъ: имъ можно и выкапывать, и рѣзать; еще лучше служить для того же широкое долото.

Единственный способъ сохраненія растений на долгое, почти безграничное время—это засушиваніе ихъ. Хорошо засушенные растенія подаются почти такъ же легко и удобно опредѣленію, какъ и свѣжія растенія, и возстановить для того ихъ первоначальную форму не трудно: стоитъ только размочить части ихъ въ водѣ, въ особенности въ теплой или еще лучше въ кипяткѣ. Лишь немногія, очень сочныя и мясистыя или же очень нѣжныя растенія при сушкѣ настолько измѣняются, въ особенности въ окраскѣ, что опредѣленіе ихъ по засушеннымъ экземплярамъ становится затруднительнымъ, а для нѣкоторыхъ чужезданныхъ растений, при опредѣленіи которыхъ очень важно сохраненіе окраски (*Orobanche*), совершенно невозможнымъ. Такія немногія растенія слѣдуетъ сохранять въ спирту или въ глицеринѣ.

Сушатъ растенія, перекладывая ихъ бумагою, предварительно расправивъ всѣ части такъ, чтобы однѣ, по возможности, не налегали на другія, иначе онѣ легко чернѣютъ и даже загниваютъ. Очень большіе



экземпляры, не помещающіеся на листъ бумаги, перегибаютъ вдвое и втрое, иногда даже переламываютъ или перерѣзаютъ, если при сгибаніи много листьевъ или развѣтвленій накрываютъ одни другіе, и тогда каждую часть перекладываютъ нѣсколькими листами бумаги.

Самый распространенный способъ сушки въ бумагѣ пропускной, т. е. не клееной, пачки которой со вложенными между листами растеніями (черезъ каждые 2—3 листа) кладутъ подъ прессъ, какой употребляютъ переплетчики, не сдавливая однако подъ ними растеній настолько, чтобы, напр., стебель сплюснулся и измѣнилъ свою форму. Черезъ сутки вынимаютъ пачку съ растеніями изъ подъ пресса и перекладываютъ ихъ въ сухую бумагу, и это повторяютъ нѣсколько разъ до тѣхъ поръ, пока бумага постепенно не вытянетъ всей влаги изъ засушиваемыхъ растеній, и пока они не высохнутъ вполне. Совершенно высушенные растенія узнаются по тому, что стебель и тонкія вѣтви до самой макушки не гнутся, если держать стебель за нижній конецъ. Не досушенные растенія, въ особенности сложенные вмѣстѣ, легко загниваютъ, чернѣютъ и покрываются плѣсенью.

Этотъ способъ сушки нельзя признать однако за наилучшій, кромѣ развѣ для очень сочныхъ и мясистыхъ растеній, которыя вообще приходится сушить весьма долго. Въ пропускной бумагѣ и подъ прессомъ, при отсутствіи доступа воздуха, сушка идетъ очень медленно и окраска растеній, въ особенности нѣжныхъ колеровъ—лиловаго, розоваго, голубаго—легко утрачивается.

Ближе и вѣрнѣе ведетъ къ цѣли сушка въ обыкновенной писчей, т. е. проклеенной бумагѣ, для чего годится всякая макулатура, старая исписанная бумага и т. п., а вмѣсто пресса—металлическая сѣтка. Каждое растеніе перекладывается только однимъ листомъ бумаги и только крайнія—первое и послѣднее—двумя или тремя листами. Такая пачка бумаги съ растеніями кладется между двумя проволочными сѣтками, которыя вдѣланы въ плоскую или проволочную же раму, по размѣру бумаги, и которыя плотно стягиваются ремешками или тесемками. Завязанную сѣтку помещаютъ на открытомъ воздухѣ, если нѣтъ дождя, или еще лучше такъ, чтобы солнце ударяло на нее, причемъ время отъ времени сѣтку оборачиваютъ къ солнцу то тою, то другою стороною; въ пасмурные же и дождливые дни сѣтку ставятъ ребромъ на истопленную плиту или печь, и тогда въ теченіе сутокъ, много двухъ, растенія высыхаютъ совершенно, сохраняя почти всегда природную яркость красокъ—зелени и цвѣтовъ. Лишь въ немногихъ случаяхъ окраска утра-

чивается или мѣняется при этомъ способѣ сушки; но и тутъ можно ее сохранить: стоитъ только переложить нѣжно окрашенные части слоями ваты.

При этомъ способѣ сушки, единственное опасеніе можетъ быть въ томъ, чтобъ не пересушить растеній, потому что тогда они становятся хрупкими и ломкими: листья и вѣтви ихъ легко отламываются, плоды—быстро отлетаютъ и пр. Во избѣжаніе этого, слѣдуетъ при сушкѣ въ искусственномъ теплѣ и на яркомъ солнцѣ располагать растенія въ пачкѣ такъ, чтобы въ срединѣ ея были уложены растенія болѣе тонкія и нѣжныя, а снаружи — болѣе грубыя и сочныя. Слѣдуетъ также обращать вниманіе на то, чтобы пачка не была особенно толста, ибо иначе растенія въ срединѣ ея легко загниваютъ. Не лишнее бываетъ также, если растенія по прошествіи дня не вполне высохли въ сѣткѣ, раздѣлить пачку на двое и перевернуть обѣ половинки такъ, чтобы наружныя стороны ихъ пришлись внутрь.

На большихъ и отдаленныхъ экскурсіяхъ, когда количество собранныхъ растеній бываетъ очень велико, а сушка затруднительна, можно рекомендовать довольно остроумный приборъ г. Егорова. Это тоже своего рода двойная сѣтка, въ которую помещается пачка бумаги съ растеніями, но которая стягивается въ цилиндръ болтами или винтами, продѣтыми чрезъ утолщенные края сѣтки. Такой сѣтчатый цилиндръ ставится на подставку, въ срединѣ которой устроена жаровня или помещается лампа для нагреванія внутренней стороны сѣтки. Сушка растеній въ приборѣ г. Егорова продолжается лишь нѣсколько часовъ.

При сушкѣ растеній случаются съ нѣкоторыми изъ нихъ неудачи, на которыя нельзя не обратить вниманія. Растенія мясистыя и сочныя, которыя вообще сохнутъ очень медленно, теряютъ свою окраску, бурѣютъ или чернѣютъ (въ особенности паразиты) и часто облетаютъ, тоже бываетъ и съ смолистыми растеніями, въ особенности съ хвойными, которыя теряютъ иглы. Первые обыкновенно рекомендуютъ предварительно проутюживать, т. е. положивъ къ пропускную бумагу, гладить горячимъ утюгомъ, и затѣмъ уже сушить, какъ остальные растенія; но при этомъ мясистыя и сочныя растенія обыкновенно расплющиваются и утрачиваютъ свой природный видъ. Вѣрнѣе и лучше обдать сочныя растенія кипяткомъ, а смолистыя погрузить на минуту въ спиртъ, и затѣмъ, обсушивъ ихъ въ пропускной бумагѣ, засушивать. Въ этомъ случаѣ даже такія нѣжныя растенія, какъ подѣльникъ (*Monotropa*), сохраняютъ свою природную окраску.

При сушкѣ водяныхъ растеній, между которыми есть много съ очень тонкими, пѣжными или мелкораздѣльными листьями, которые легко слипаются или спадаютъ, какъ только ихъ вынуть изъ воды, лучше всего пользоваться такимъ приѣмомъ: положить эти растенія въ воду и, когда они расправятся, подвести подъ нихъ листъ писчей бумаги; затѣмъ, ухвативъ листъ бумаги за уголь или за одинъ край, медленно поднимать его изъ воды; тогда любое водяное растеніе расправится на бумагѣ въ совершенно натуральномъ своемъ видѣ, а для того, чтобы оно не пристало или не приклеилось къ прикрывающему его другому листу бумаги, слѣдуетъ покрыть мягкой тряпкою вынутый изъ воды листъ бумаги съ растеніемъ. —

Высушенныя растенія помѣщаютъ въ чистую бумагу для составленія собранія растеній — гербарія. Для этого одни предпочитаютъ обыкновенную писчую бумагу; другіе — мягкую бумагу большого формата. Тотъ и другой форматъ, то и другое качество бумаги имѣютъ свои достоинства и недостатки. Въ обыкновенной писчей бумагѣ гербарій выходитъ компактнымъ — занимаетъ мало мѣста, легко перелистывается и вообще удобнѣе для просмотра; неудобство же такого формата оказывается всякій разъ, какъ приходится помѣщать крупныя растенія, которыя нерѣдко трудно бываетъ уложить въ листъ писчей бумаги, какъ бы ихъ ни перегибать; неудобство сказывается также и въ трудности предохранить гербарій отъ пыли, которая легче проникаетъ въ не столь плотно прилегающіе своими краями листы писчей бумаги чѣмъ въ листы мягкой пропускной или печатной бумаги. Тѣмъ не менѣе для частнаго гербарія, въ особенности при недостаткѣ помѣщенія, нельзя не отдать предпочтенія гербарію, составленному въ форматѣ писчей бумаги, по тѣмъ несомнѣннымъ удобствамъ, которыя перечислены выше.

Каждый видъ растенія помѣщается въ отдѣльный листъ. Если одинъ и тотъ же видъ имѣется въ нѣсколькихъ экземплярахъ изъ разныхъ мѣстностей или въ различныхъ видоизмѣненіяхъ (разновидностяхъ), то каждый такой экземпляръ помѣщается въ особый листъ. Совершенно одинаковые экземпляры изъ одной и той же мѣстности кладутся въ одинъ и тотъ же листъ бумаги, но въ такомъ числѣ, чтобы они другъ друга не накрывали, иначе растенія легко ломаются.

Если растенія даннаго вида умѣщаются въ одномъ листѣ бумаги, то на немъ дѣлается внизу справа надпись, а въ самый листъ вкладывается ярлычекъ — этикетка, съ обозначеніемъ названія растенія, мѣста и времени его находженія. Если бы для даннаго вида потребовалось занять

нѣсколько листовъ, то ихъ вкладываютъ въ одинъ общій, на которомъ также надписываютъ видъ.

Точно также всѣ виды одного и того же рода вкладываются въ одинъ общій листъ, но обращенный уже сплбомъ вправо, и на немъ сверху ставится названіе рода. Въ томъ случаѣ, если родъ содержать въ себѣ очень большое число видовъ, общій родовой листъ бумаги замѣняется картонною обложкою, заключающею пачку видовъ одного и того же рода. Обыкновенно же пачку составляютъ семейство или подсемейство, а иногда и нѣсколько семействъ. Каждую пачку или просто связываютъ тесемками, пропущенными чрезъ прорѣзы у краевъ картонной обложки, или укладываютъ въ папку или же наконецъ въ картонку.


Собранныя такимъ образомъ пачки засушенныхъ растений остается еще расположить въ извѣстномъ порядкѣ, чтобы составить научный гербарій. Для этого либо слѣдуютъ алфавитному порядку названій семействъ и родовъ, или придерживаются какой-нибудь ботанической системы. Въ данномъ частномъ случаѣ, въ примѣненіи къ растеніямъ, собраннымъ въ Московской губерніи, можно размѣстить гербарій либо въ томъ порядкѣ, какъ описаны виды, либо слѣдуя «Систематическому обзору растеній», помѣщенному въ концѣ книги.



# I

## ОПРЕДѢЛИТЕЛЬ СЕМЕЙСТВЪ.

1. Мелкія травки, безлистные или съ едва замѣтными зачаточными листочками, со сплюснутыми стеблями, то въ видѣ зеленыхъ чечевицеобразныхъ листочковъ — листецовъ, плавающихъ на водѣ, то въ видѣ продолговатыхъ лопастныхъ, погруженныхъ въ воду, снизу съ однимъ плавающимъ корешкомъ или съ нѣсколькими (рис. 1); цвѣтутъ очень рѣдко, и тогда 2 тычинки и 1 пестикъ, облеченные въ прозрачный пленчатый чехолъ (e), составляютъ цѣлое цвѣто-расположеніе въ складкѣ или сумочкѣ листца (d). Единственный родъ сем. рясокъ—*Lemnaceae* Link. . . . . ряски—*Lemna* L.



(Рис. 1).

Стебель, надземный или подземный, всегда несетъ развитые листья и никогда не бываетъ сплюснутъ въ видѣ листа . . . . . 2.

2. Травы, никогда не цвѣтуція и не приносяція плодовъ и сѣмянъ; размножаются спорами — мельчайшими, въ видѣ пыли, зернышками, заключенными въ особые мѣшечки—спорангіи, различнымъ образомъ расположенные (рис. 2—с, d; споровые или безцвѣтковые растенія) . . . . . 3.

Травы или кусты и деревья, цвѣтуція въ определенное время и приносяція сѣмена (цвѣтковые или сѣменные растенія) . . . . . 6.

3. Надземнаго стебля нѣтъ; одинъ листъ или цѣлый пучекъ листьевъ, черешковыхъ, выходитъ изъ подземнаго стебля—корневища . . . . . 4.




(Рис. 2).


Надземный стебель есть, покрытый чешуйчатыми или черепичатыми листьями; спорангіи обыкновенно въ пазухѣ измѣненныхъ листьевъ, расположенныхъ колосомъ . . . . . 5.

4. Молодые листья свернуты улиткою; взрослые несутъ на нижней стороне листовыхъ долекъ, иногда вдоль нижняго свернутого края ихъ, кучки очень мелкихъ спорангіевъ (рис. 2, a), сначала зеленоватыхъ, потомъ бурѣющихъ, то прикрытыя тонкою пленкою — покрываломъ (b), то голыя . . . . . папоротники—*Polypodiaceae* R. Br.

Молодые листья не свернуты улиткою; взрослый листъ 1, рѣдко 2, обыкновенно мясистый или кожистый, несетъ на длинной ножкѣ крупныя спорангии, 2-рядно расположенныя колосомъ



(Рис. 3).



(Рис. 4).

(рис. 3, а) или метелкою и вскрывающіеся 2 створками (b) . . . уховниковыя — *Ophiglossaceae* R. Br.

5. Стебель съ кольцевыми зубчатыми влагалищами, состоящими изъ мутовки сросшихся чешуйчатыхъ листьевъ (рис. 4, а), изъ подъ которой обыкновенно вырастаютъ мутовчатые же вѣтви, съ такими же листовыми влагалищами; спорангии на нижней сторонѣ чешуекъ, въ видѣ 5, 6-гранныхъ щитковъ, образующихъ на верхушкѣ стебля, иногда и вѣтвей, колосъ, въ видѣ торчащей шишки (а, b).

Единственный родъ сем. хвощей—*Equisetaceae* DC.

. . . . . хвощъ—*Equisetum* L.

Стебель усаженъ мелкими, черепичато-расположенными листочками или покрытъ 4 продольными рядами чешуекъ; спорангии въ пазухѣ верхнихъ листьевъ (рис. 5, b), часто нѣсколько измѣненныхъ и образующихъ б. ч. черепичатые колосья (а). Единственный родъ сем. плауновъ—*Lycopodiaceae* DC.

. . . . . плаунъ—*Lycopodium* L.

6 (2). Цвѣтки вполне голые или съ зачаточнымъ цвѣточнымъ покровомъ, въ видѣ волосковъ, щетинокъ, чешуекъ и пленокъ, скрытыхъ въ пазухѣ прицвѣтниковъ или въ густомъ соцветіи . . . . . 7.

Цвѣтки съ развитымъ цвѣточнымъ покровомъ, т. е. съ околоцвѣтникомъ, простымъ или двойнымъ (одноряднымъ или 2-ряднымъ), рѣдко многоряднымъ, состоящимъ изъ цвѣточныхъ листковъ, одинаковыхъ по формѣ и окраскѣ или различныхъ, и тогда представляющихъ чашечку и вѣнчикъ. . . . . 22.

7. Деревья и кустарники . . . . . 8.

Травы . . . . . 12.

8. Цвѣтки на цвѣтоножкахъ, въ пучкахъ, безъ всякихъ покрововъ—голые, частью обоеполые (рис. 6, а), частью мужскіе о 2 тычинкахъ (b), частью женскіе обѣ 1 пестикъ съ 2-раздѣльнымъ рыльцемъ. Деревья съ почками и листьями супротивными, распускающимися послѣ цвѣтковъ; 2-гнѣздная крылатка (с). Родъ ясень—*Fraxinus* L. . . . . изъ сем. маслинныхъ—*Oleaceae* Juss.



(Рис. 6).

Цвѣтки сидячіе, однополые, голые или съ зачаточнымъ околоцвѣтникомъ; мужскіе—всегда въ сережкахъ или колосьяхъ; женскіе—иногда въ шишкахъ или же одиночныя. Однодомныя или двудомныя кусты и деревья. . . . . 9.

9. Мужскіе цвѣтки—изъ однихъ пыльниковъ съ расширеннымъ связникомъ (рис. 7, а), женскіе—изъ однихъ съменопочекъ въ пазухѣ при-



(Рис. 5).

вѣтвнхъ чешуекъ (с), которые становятся деревянистыми или мясистыми и образуютъ вмѣстѣ съ сѣменами шишку, шишечку или ложную ягоду. Деревья и кусты б. ч. съ зимующими сидячими листьями, игольчатыми или чешуйчатыми . . . . . 10.

Мужскіе цвѣтки изъ тычинокъ съ нитями; женскіе — съ пестикомъ, заключающимъ сѣменопочки. Деревья и кусты съ листьями опадающими, черешковыми, листовая пластинка цѣльная: . . . . . 11.

10. Однодомныя деревья съ игольчатыми листьями, колючими, и тогда зимующими, или мягкими, и тогда опадающими, очередными или собранными пучкомъ, составляющимъ собственно укороченную вѣтвь; пыльники 2-гнѣздные (рис. 7, а), за каждою прицвѣтною чешуйкою помѣщаются 2 сѣменопочки (с), сросшіяся съ зачаточнымъ плодникомъ въ видѣ пленки; сѣмена (d) заключены въ одревенѣлой шишкѣ . . . еловыя—**Abietineae** Rich.



(Рис. 7).

Однодомныя или 2-домныя кусты, съ иглами мутовчатыми или съ супротивными чешуйками, размѣщенными въ 4 продольныхъ ряда; пыльники, въ числѣ 3—6 (рис. 8, а), подъ связникомъ, расширеннымъ въ видѣ щитка (b); простыя чешуйки, окружающія сѣменопочки (с), образуютъ съ сѣменами ложную ягоду или деревенѣющую шишечку . . . . .




(Рис. 8).

кипарисовыя—**Cupressineae** Rich.

11. И мужскіе, и женскіе цвѣтки въ сережкахъ, обыкновенно на отдѣльныхъ кустахъ или деревьяхъ—двудомныхъ; рѣдко верхушка женскихъ сережекъ съ тычиновыми цвѣтками; околоцвѣтникъ зачаточный, въ видѣ мѣдника, или блюдчатый, прикрытъ прицвѣтною чешуйкою; мужской цвѣтокъ (рис. 9, а) о 2—30 тычинкахъ; женскій—изъ пестика съ



(Рис. 9).



(Рис. 10).

2-раздѣльнымъ рыльцемъ (b); 2 (3,4)-створчатая, грушевидная коробочка (с) съ хохлатыми пушистыми сѣменами (d) . . . ивовыя—**Salicineae** Rich.

Мужскія сережки на одномъ и томъ же деревѣ или кустѣ съ женскими цвѣтками, расположенными въ маленькихъ, короткихъ, не висячихъ, а торчащихъ колосьяхъ, или въ видѣ листовой почки, всегда съ 2 нитевидными малиновыми рыльцами (рис. 10, е, f); мужскіе цвѣтки о 2, 4 тычинкахъ (а—d); завязь 2-гнѣздная; односѣменный орѣхъ или крылатка (h) . . . . .

березовыя—**Betulaceae** A. Br.

12 (7). Травы съ листьями мутовчатыми или супротивными; цвѣтки сидячіе. . . . . 13.

Травы съ листьями очередными, иногда пучковатыми, или же съ одними корневыми. . . . . 17.

13. Всѣ листья мутовчатые, цвѣтки пазушные; водныя травы. . . . . 14.

Всѣ листья супротивные, иногда кромѣ верхнихъ, собранныхъ розеткою. . . . . 16.



(Рис. 11).




(Рис. 12).

14. Листовыя мутовки о 3 листьяхъ, съ пазушными, пленчатыми, охватывающими стебель въ видѣ раструба, прилистниками; цвѣтки однополые, голые или съ зачаточнымъ пленчатымъ околоцвѣтникомъ. Тычинка 1 (рис. 11). . . . .  
Нѣкоторые роды изъ сем. рѣзак-  
выхъ—**Najadeae** Endl.

Мутовки о большомъ числѣ листьевъ, безъ прилистниковъ; цвѣтки обѣ 1 пестикъ съ остающимся нитевиднымъ столбикомъ. . . . . 15.

15. Листья цѣльные и цѣльнокрайніе (рис. 12, а); цвѣтки обоеполые, съ зачаточнымъ, едва замѣтнымъ, околоцвѣтникомъ, съ нижнею завязью и 1 тычинкою (b, c). Единственный представитель сем. Хвостниковъ—**Hippurideae** Link. . . . . Хвостникъ—**Hippuris** L.



(Рис. 13).



(Рис. 14).



(Рис. 15).

Листья вильчато-многораздѣльные, съ жесткими, роговыми зубчиками по краямъ (рис. 13, а); цвѣтки голые, окруженные многостичною оберткою, встрѣчаются рѣдко, въ мужскихъ цвѣткахъ (с) пучекъ тычинокъ (до 16); орѣшекъ съ рогатыми выростами (а). Единственный родъ сем. роголистниковъ—**Ceratophyllaceae** Gray. . . . . роголистникъ—**Ceratophyllum** L.

16 (13). Листья безъ прилистниковъ; водныя однодомныя травы; цвѣтки: въполнѣ голые или съ 2 прицвѣтниками, пазушные; мужскіе—о 2 тычинкахъ, (рис. 14, а); женскіе—рядомъ съ ними, съ 4-гнѣздною и 4-дольною завязью, о 2 столбикахъ (b, c, d). Единственный родъ сем. болотниковъ—**Callitricheae** Lk. . . . . болотникъ—**Callitriche** L.

Листья съ прилистниками; 2-домныя травы: женскіе цвѣтки съ зачаточнымъ, цѣльнымъ околоцвѣтникомъ, облекающимъ простую завязь о 2 нитевидныхъ рыльцахъ (рис. 15). . . . . сем. конопляныхъ—**Cannabineae** Blume.

17. (12). Листья влагалищные, цѣльные и цѣльнокрайніе, почти всегда линейные . . . . . 18.

Листья черешковые или сидячіе, но безъ влагалища . . . . . 21.

18. Цвѣтки, въ пазухѣ 1 или 2 пленчатыхъ прицвѣтниковъ (рис. 16, b), собраны въ пленчатые колоски, окруженные снизу также 1 или 2 сухими пленками (a) и расположенные сложнымъ колосомъ, метелкою, пучкомъ или полузонтикомъ . . . . . 19.

Цвѣтки безъ пленчатыхъ прицвѣтниковъ собраны въ частый и плотный простой колосъ или головку на толстомъ или мясистомъ цвѣтоносѣ (початокъ). Болотныя или водныя травы . . . . . 20.

19. Стебель обыкновенно узловатый, круглый, между узлами почти всегда полый — соломина; листья съ язычкомъ и б. ч. разсѣченнымъ влагалищемъ; цвѣтки о 2 внутреннихъ, цвѣточныхъ пленкахъ (рис. 16, b), рѣдко обѣ 1, собраны въ колоски, окруженные 2 наружными, чашечными пленками (a), рѣдко 1, а самые колоски расположены сложнымъ колосомъ или метелкою; тычинокъ 3, рѣдко 2; пыльники прикреплены срединю къ очень тонкой и длинной нити; рылецъ обыкновенно 2, рѣдко 1; зерновка. . . . . злаки—*Gramineae* Juss.


Стебель б. ч. 3-гранный, безъ узловъ; листья безъ язычка, съ влагалищемъ цѣльнымъ; цвѣтки обѣ 1 цвѣточной пленкѣ, собраны въ колоски (рис. 17, a, b), расположенные б. ч. сложнымъ колосомъ, пучкомъ или полузонтикомъ; тычинокъ 3; пыльники прикреплены концомъ къ нити; столбикъ о 2, 3 нитевидныхъ рыльцахъ; орѣшекъ. . . . . осоки—*Cyperaceae* Juss.

20. Цвѣтки однополые собраны въ 2 частыхъ и длинныхъ колоса или въ нѣсколько шаровидныхъ головокъ и расположены на толстомъ цвѣтоносѣ такъ, что верхнія соцвѣтія—мужскія, а нижнія—женскія; листья широко-линейныя. . . . . рогозовыя—*Typhaceae* Juss.


Цвѣтки обоеполые собраны въ 1 частый колосъ съ мясистымъ цвѣтоносомъ, окруженный большимъ прицвѣтнымъ листомъ — крыломъ или чехломъ той же формы, какъ и стеблевые листья, мечевидные или овальные. . . . . аронниковыя—*Araceae* Juss.

21 (17). Трехлопастная завязь и 10—12 тычинокъ на ножкахъ (рис. 18, b) окружены общею оберткою колокольчато-бокальчатой формы, въ видѣ чашечки (a), съ 4, 5 мѣдниками и 4, 5 зубцами въ промежуткахъ, и образуютъ цвѣточный пучекъ; такіе пучки расположены вильчатыми полузонтиками съ супротивными прицвѣтниками, а цвѣтоносы ихъ собраны зонтикомъ съ мутовчатою оберткою; столбиковъ 3, каждый съ 2-лопастнымъ рыльцемъ; плодъ 3-гнѣздный распадается на 3 орѣшка. Травы съ бѣлымъ млечнымъ сокомъ. Единственный родъ сем. *молочайныхъ*—*Euphorbiaceae* Kl. et Gke. . . . .


молочай—*Euphorbia* L.



(Рис. 16).



(Рис. 17).



(Рис. 18).




Завязь и тычинки сидячія; каждый цвѣтокъ либо въ пазухѣ простаго прицвѣтнаго листа, и тогда обоеполый, состоящій изъ 1 тычинки и 1 пестика (*Corispermum* L., рис. 19, а), либо облеченъ 2 прицвѣтниками, и тогда онъ женскій (*Atriplex* L.); сѣмянки (b, c); цвѣтки въ колосьяхъ. .

Два рода изъ сем. маревыхъ—*Chenopodiaceae* Vent.

22 (6). Листья съ раструбами (рис. 20), т. е. съ пленчатыми па-  
зушными прилистниками, охватывающими узловатый стебель, цѣльные, оче-  
редные; орѣшекъ. . . . . 23.

Раструбовъ при листьяхъ вокругъ стебля нѣтъ. . . . . 24.



(Рис. 19).



(Рис. 20).




(Рис. 21).

23. Цвѣтки о 4 пестикахъ и 4 тычинкахъ (рис. 21, а), пыльники ко-  
торыхъ приросли къ лепесткамъ (собственно — это связники, расширен-  
ные въ видѣ лепестковъ, c), расположены початкомъ; водяныя травы съ  
листьями прозрачными, погруженными въ воду, или кожистыми, плавающими.  
Родъ рдестъ—*Potamogeton* L. изъ сем. . . рѣзачковыхъ—*Najadeae* Endl.

Цвѣтки обь одномъ пестикѣ въ пучкахъ, расположенныхъ колосовидно  
или развѣсистую метелкою, съ околоцвѣтникомъ простымъ 5 (4,3)-раздѣль-  
нымъ, и тогда окрашеннымъ, о 5—8 тычинкахъ и 2,3 короткихъ столби-  
кахъ съ головчатыми рыльцами, —или же околоцвѣтникъ двойной о 2 ря-  
дахъ зеленыхъ листковъ, по 3 въ каждомъ ряду, о 6 или 9 тычинкахъ и  
о 3 (2,4) столбикахъ, съ рыльцами въ видѣ кисточки; травы (рис. 20) б. ч.  
обоеполюя, но бываютъ многобрачныя и 2 домныя. . . . . гречишныя—

*Polygonaceae* Juss.

24. Много мелкихъ цвѣтковъ, обоеполыхъ или разнополыхъ, сидячихъ  
или на очень короткихъ ножкахъ, собрано въ головку, облеченную однимъ  
или нѣсколькими вѣнцами прицвѣт-  
никовъ, составляющими обертку,  
такъ что все цвѣторасположеніе по-  
ходитъ на одинъ сложный цвѣ-  
токъ (рис. 22) . . . . . 25.



(Рис. 23).



(Рис. 22).

Цвѣтки одиночныя или скученныя,  
но не образуютъ головки, окруженной  
оберткою . . . . . 29.

25. Листья тройчато- или пери-  
сто-сложные съ прилистниками; вѣн-  
чикъ мотыльковый, неправильный,  
увядающій (рис. 23, а, c); тычи-  
нокъ 10, сросшихся нитями въ трубку  
или 1 тычинка свободная (b); завязь внутри 5-зубчатой чашечки (d); 2-створ-  
чатый бобъ. Нѣкоторыя формы изъ сем. мотыльковыхъ—*Papilionaceae* L.

Листья не сложные и безъ прилистниковъ; вѣнчикъ правильный, а если неправильный, то язычковый; тычинокъ 4, 5, свободныхъ или сросшихся пыльниками; завязь нижняя. . . . . 26.

26. Вѣнчикъ раздѣльнолепестный; 5 тычинокъ прикрѣплены къ надпестичному диску; завязь 2-гнѣздная, о 2 столбикахъ; плодъ—вислоплодникъ, распадающійся на 2 односѣменныхъ орѣшка. Нѣкоторыя формы (рис. 24) изъ сем. зонтичныхъ — **Umbelliferae** Juss.

Вѣнчикъ спайнолепестный; 4, 5 тычинокъ прикрѣплены къ трубкѣ вѣнчика; завязь обь 1 столбикъ . . . . . 27.

27. Листья мутовчатые, по 4, 6 въ мутовкѣ; цвѣтки 4-ные; вѣнчикъ ворончатый съ 4 тычинками; чашечка о 6 зубцахъ, изъ коихъ 2 меньше (рис. 25); завязь 2-гнѣздная, плодъ изъ 2 орѣшковъ . . родъ шерардія — † *Sherardia* Dillen.



(Рис. 24).



(Рис. 25).

изъ сем. маренныхъ — **Rubiaceae** Juss.

Листья очередные или супротивные, но не мутовчатые; цвѣтокъ 4-ой или 5-ой, съ чашечкою о 4 или 5 зубцахъ, чаще съ зачаточною чашечкою; плодъ—коробочка или сѣмянка, но не орѣшекъ . . . . . 28.

28. Цвѣтки съ развитою зеленою чашечкою, 5-ные, о 5 тычинкахъ; вѣнчикъ глубоко 5-раздѣльный; завязь 2-гнѣздная (рис. 26); коробочка съ остающимся, увядющимъ вѣнчикомъ. Нѣкоторыя формы изъ сем. . . . .



(Рис. 26).


. . . . . колокольчиковыхъ — **Campanulaceae** Juss.

Цвѣтки съ зачаточною чашечкою, въ видѣ волосянаго хохолка, щетинокъ, зубцовъ или пленокъ, или вовсе безъ чашечки, 4-ные или 5-ные; вѣнчикъ трубчатый; завязь простая, сѣмянки. . . . . 29.

29. Каждый цвѣтокъ о 4 свободныхъ тычинкахъ; столбикъ простой съ 1 рыльцемъ (рис. 27, а, в); чашечка двойная: снаружи въ видѣ зубцовъ или коронки образуютъ такъ наз. наружную чашечку, внутренняя изъ ряда щетинокъ (с); вѣнчикъ неправильный 4- или 5-надрѣзной; всѣ цвѣтки обоеполые; листья всегда супротивные. . . . .

ворсянковые — **Dipsacaceae** DC

Каждый цвѣтокъ о 5 тычинкахъ, почти всегда спайныхъ пыльниками; столбикъ съ 2 нитевидными рыльцами (рис. 28); вѣнчикъ либо правильный—



(Рис. 27).




(Рис. 28).

трубчатый, либо неправильный—язычковый о 5 (4) зубцахъ или же нитевидный; листья очередные, рѣдко супротивные . . . . . сложноцвѣтныя — **Compositae** Adans.

30 (24). Цвѣтки мелкіе, на болѣе или менѣе длинныхъ цвѣтоножкахъ расположены сложнымъ зонтикомъ; т. е. собраны въ простые зонтики,

которые въ свою очередь размѣнены зонтикомъ; завязь нижняя, 2-гнѣздная, о 2 столбикахъ (рис. 29, b); чашечка мало развитая, чаще въ видѣ слабого ободка или 5 короткихъ зубцовъ на завязи; свободныхъ лепестковъ и тычинокъ по 5, прикрѣпленныхъ къ надпестичному диску (a); плодъ расщепляется вдоль на 2 односѣмные дольки, которые висятъ на концахъ вилчатаго плодоноса (вислоплодники, c); листья очередные, б.ч. перисто-много-раздѣльные. . . . . **Зонтичныя—Umbelliferae Juss.**



(Рис. 29).

Цвѣтки никогда не расположены сложнымъ зонтикомъ. . . . . 31.

**31.** Въ каждомъ цвѣткѣ или тычинокъ много—болѣе чѣмъ вдвое противу числа долей вѣнчика или простаго околоцвѣтника,—или пестиковъ нѣсколько, и тогда число тычинокъ бываетъ ограничено, или же и пестиковъ, и тычинокъ много. . . . . 32.

Число тычинокъ въ каждомъ цвѣткѣ не превышаетъ двойнаго числа долей вѣнчика или простаго околоцвѣтника; пестикъ, если есть, то одинъ, хотя столбиковъ и рылецъ можетъ быть нѣсколько. . . . . 33.

**32.** Деревья и кусты. . . . . 33.

Травы, иногда полукустарники. . . . . 39.

**33.** Цвѣтки сидячіе, однополые. Однодомныя деревья съ перистосложными листьями; мужскіе цвѣтки въ очень плотныхъ, повислыхъ сережкахъ: околоцвѣтникъ 5, 6-раздѣльный, сросшійся съ прицвѣтникомъ, о 14—36 тычинокъ (рис. 30, a, b); сросшіеся прицвѣтники женскаго цвѣтка образуютъ 3—5-зубчатую обертку: околоцвѣтникъ его явственно 4-зубчатый, опадающій; рыльце 2-лопастное, мясистое (c); орѣхъ покрытъ мясистою кожницею. Единственный родъ сем. орѣшниковыхъ—*Juglandae* DC. . . . . орѣшина—\**Juglans* L.



(Рис. 30).

Цвѣтки на ножкахъ, обоеполые, полные, съ двойнымъ околоцвѣтникомъ: чашечкою и вѣнчикомъ. . . . . 34.

**34.** Цвѣтоносъ, несущій полужонтикъ, сросся съ большимъ, свѣтлозеленымъ прицвѣтнымъ листомъ — крыломъ; много тычинокъ, 5 свободныхъ чашелистиковъ и столько же лепестковъ прикрѣплено къ ложу цвѣтка



(Рис. 31).



(Рис. 32).

(рис. 31, a); завязь верхняя, 5-гнѣздная объ 1 столбикѣ съ лопастнымъ рыльцемъ (b); 1, 2-сѣменный орѣшекъ (c); деревья съ зубчатыми, оче-

редными листьями. Единственный родъ сем. липовыхъ—*Tiliaceae* Juss.  
липа—*Tilia* L.

Цвѣтоносы безъ прицвѣтнаго крыла; тычинки и лепестки прикрѣплены къ краю отгиба чашечки. . . . . 35.

35. Листья супротивные, цѣльные, 3-нервные; кусты съ 4-ными цвѣтками и нижнею, многогнѣздною завязью (рис. 32,—а, б); столбикъ 4, б. ч. сросшихся (б); 4-гнѣздная коробочка о 4 створкахъ. Единственный родъ сем. жасминныхъ—*Philadelphaceae* Don . . жасминъ \**Philadelphus* L.

Листья очередные; цвѣтки 5-ные . . . . . 36.

36. Пестикъ 1, съ вершиннымъ столбикомъ; завязь простая, не сросшаяся съ охватывающимъ ее расширеннымъ цвѣтоложемъ, бокальчатымъ или колокольчатымъ (рис. 33); чашечный 5-лопастный отгибъ опадающій; 1 съменная костянка . . . . . миндальныя—*Amygdaleae* A. Juss.



(Рис. 33).




(Рис. 36).

37. Пестики (2—5) срослись между собою и съ чашечною трубкою или съ цвѣтоложемъ (рис. 34), обращающимся въ мясистую оболочку плода—ложную костянку (яблоко) . . . . . яблонныя—*Pomaceae* Lindl.

Пестики свободные или сросшиеся только основаніемъ и никогда не срастающіеся съ цвѣтоложемъ, то вогнутымъ, облекающимъ пестики, то выпуклымъ, несущимъ ихъ на себѣ . . . . . 37.



(Рис. 34).



(Рис. 35).

38. Цвѣтки одиночные, съ большимъ числомъ пестиковъ, обращающихся въ щетинистыя сѣмянки или въ костянки, собранныя въ ложные плоды (рис. 35). Нѣкоторые роды изъ сем. розанныхъ — *Rosaceae* Juss.

Цвѣтки въ щитковидныхъ метелкахъ, обыкновенно о 5 пестикахъ, обращающихся въ 2, 3-сѣменные мѣ-

шечки (чер. 36) . . . . . спирейныя—\**Spireaeae* Maxim. . . . . 40.

39 (32). Листья мясистые, сочные, цѣльные . . . . . 41.

Листья не мясистые, а пѣжные, тонкіе или кожистые . . . . . 41.

40. Цвѣтки въ вѣтвистыхъ полузонтикахъ, 5-ные или 6-ные, съ чашечкою и вѣлчикомъ глубоко раздѣльными или свободными; пестикъ 5 или 6; тычинокъ вдвое болѣе, приросшихъ къ основанію лепестковъ (рис. 37 а, б); коробочки . . . . . толстянковыя *Crassulaceae* DC.

Цвѣтки одиночные, пазушные, сидячіе: чашечка 2-надрѣзная (рис. 38, б);

лепестковъ 5 (4, 6), иногда ихъ и нѣтъ; число тычинокъ непостоянно: чаще 12 (8—15, а); пестикъ съ короткимъ 3-раздѣльнымъ столбикомъ; ко-



(Рис. 37).



(Рис. 38).

бочка вскрывается крышечкою (d) . . . Родъ портулакъ—\**Portulaca* L.  
изъ сем. портулаковыхъ—*Portulacaceae* Juss.

41. Двудомныя травы: одни мужскіе цвѣтки—3-чатые. . . . . 42

Травы съ цвѣтками обоеполыми, иногда однополыми, и тогда онѣ однодомныя или многобрачныя. . . . . 43.



(Рис. 39).

42. Цвѣтки клубочками въ рѣдкихъ колоскахъ, съ простымъ 3-раздѣльнымъ околоцвѣтникомъ, о 9 тычинкахъ (рис. 39, а); листья супротивные. Единственный представитель сем. акалифовыхъ—*Acalyphaceae* Kl. et Gke. . . . . пролѣска—

*Mercurialis* L.

Цвѣтки на ножкахъ, пазушные, корневые, въ небольшомъ числѣ, обле-  
ченные прицвѣтниками; околоцвѣтникъ двойной, съ зеленою чашечкою и  
бѣлымъ вѣнчикомъ, о 12 тычинкахъ (рис. 40);  
листья розетками; водныя травы, съ побѣгами . . . . . 43.

. . . . . водокрасы—*Hydrocharideae* DC.

43. Листья узкіе, линейные, цѣльнокрайніе;  
цвѣтки 3-чатые, съ двойнымъ околоцвѣтникомъ,  
одноцвѣтными; болотныя травы . . . . . 44.

Листья болѣе или менѣе широкіе, лишь иногда  
узколанцетные, и тогда цвѣтки 5-ные . . . . . 45.

44. Цвѣтки въ ложномъ зонтикѣ, съ остающимся околоцвѣтникомъ, о  
9 тычинкахъ и 6 пестикахъ, сросшихся лишь при основаніи (рис. 41);  
мѣшечки; листья 3-гранные. Един-  
ственный представитель сем. суса-  
ковъ—*Butomaceae* Rich. . . . .

сусакъ—*Butomus* L.



(Рис. 41).



(Рис. 42).


Цвѣтки въ рѣдкой кисти, съ быстро  
оппадающимъ околоцвѣтникомъ, о 6  
тычинкахъ и 3 пестикахъ, сросшихся  
до половины (рис. 42, а); вздутыя  
коробочки (b); листья почти цилин-  
дрическіе. . . . . Родъ ситница—  
*Scheuchzeria* L. изъ сем. ситни-  
ковидныхъ—*Juncaginaceae* Rich.

45. Тычинки срослись нитями въ пучекъ или въ нѣсколько пучковъ;  
покрывы цвѣтка 5-ные . . . . . 46.




Тычинки свободныя, не сросшіяся . . . . . 47.

46. Тычинки срослись нитями въ 1 пучекъ; пестики тоже срослись столбиками и завязями, приросшими къ удлинённому цвѣточному столбцу (рис. 43, b); чашечка 5-раздѣльная, съ оберткою, составляющею наружную ча-



(Рис. 43).



(Рис. 44).

шечку (a); листья лопатные, дланевидно-нервные, очередные, съ свободными прилистниками . . . . . просвирняковыя—*Malvaceae* R. Br.

Тычинки срослись нитями въ 3 пучка (рис. 44, a); завязь 1 съ 3 нитевидными столбиками (b), чашечка почти 5-листная; лепестки желтые; коробочка 3-гнѣздная; листья супротивные, цѣльнокрайніе, съ точечными железами; цвѣтки въ вершинныхъ и пазушныхъ полузонтикахъ. Единственный родъ сем. звѣробоевъ—*Hypericaceae* DC . . звѣрбой—*Hypericum* L.

47. Листья, покрывающе стебель, влагалищные, вдоль складчатые, съ продольными жилками; цвѣтки въ сложныхъ метелкахъ, многобрачные, 3-чатые, съ околоцвѣтникомъ двойнымъ, опадающимъ; 6 тычинокъ и 3 пестика, сросшихся до половины; коробочки (рис. 45). Единственный родъ сем. медоцвѣтныхъ—*Melanthiaceae* R. Br. . . . . чемерица—*Veratrum* L.



(Рис. 45).

Листья стеблевые не влагалищные, не складчатые или всё листья только корневые . . . . . 48.


48. Тычинки и лепестки, если только есть, прикрѣплены къ краю отгиба остающейся чашечки; листья съ прилистниками, пальчатые или перистые . . . . .

розанныя—*Rosaceae* Juss.

Тычинки и лепестки прикрѣплены къ ложу цвѣтка . . . . . 49.

49. Цвѣтки въ мутовчатыхъ кистяхъ или мутовчатыхъ метелкахъ на голомъ цвѣтоносѣ, съ большимъ числомъ пестиковъ, обоеполые, о 6 тычинкахъ (рис. 46, a) или однополые со многостомъ тычинокъ; болотныя травы съ околоцвѣтникомъ 3-чатымъ, двойнымъ; зеленою чашечкою и розоватымъ вѣнчикомъ. . . . . частуховыя—*Alismaceae* Rich.

Цвѣтки одиночные или въ кистяхъ и метелкахъ, но не мутовчатыхъ . . . 50.



(Рис. 46).

**50.** Цвѣтки въ односторонней кисти, съ чашечкою о 5 чашелистикахъ, изъ коихъ 2 наружныхъ меньше 3 внутреннихъ; пестикъ 1, съ длиннымъ столбикомъ и головчатымъ рыльцемъ, 3-створчатая коробочка; полукустарникъ съ супротивными листьями, съ прилистниками, а цвѣты съ прицвѣтниками. Единственный представитель сем. ладонниковъ—*Cistineae* DC . . . . .

солнцецвѣтъ—*Heliānthemum* Tourn.

Цвѣтки никогда не бываютъ въ односторонней кисти; чашелистики одинаковые или ихъ вовсе нѣтъ; цвѣтки безъ прицвѣтниковъ . . . . . 51.

**51.** Чашечка о двухъ листкахъ, быстро опадающихъ (рис. 47, а); вѣнчикъ 4-лепестный; тычинокъ много (b); завязь съ звѣздчатымъ или 2-лопастнымъ рыльцемъ; коробочка (c) открывается дырочками или 2 створками; травы съ млечнымъ сокомъ. . . маковыя—

*Papaveraceae* DC.

Чашечка о 3, 4, 5 листкахъ, или ея вовсе нѣтъ, и тогда околоцвѣтникъ простой; травы безъ млечнаго сока . . . 52.

**52.** Завязь одна, многонѣздная, съ лучистымъ рыльцемъ, о столькихъ лучахъ, сколько нѣздъ (рис. 48); ягода съ твердою, толстою кожурою; цвѣтки одиночные, крупные, на очень


длинныхъ цвѣтоножкахъ, съ большимъ числомъ лепестковъ и тычинокъ (рис. 48); листья на длинныхъ черешкахъ, большіе, кожистые, плавающие, цѣльнокрайніе, глубокосердцевидные; водныя травы съ толстымъ, ползучимъ корневищемъ . . . . . БУВ-

ШИПКОВЫЯ—*Nymphaeaceae* DC.

Завязей обыкновенно много (рис. 49, b), если же одна, то простая, безъ звѣздчатаго рыльца; сѣмянки или мѣшечки, рѣдко простыя сочныя ягоды; цвѣтки правильные или неправильные, съ околоцвѣтникомъ двойнымъ или простымъ, съ большимъ или ограниченнымъ числомъ лепестковъ и тычинокъ . . . . . ЛЮТИКОВЫЯ—*Ranunculaceae* Juss.



(Рис. 49)



(Рис. 50).

**53 (31).** Тычинки срастаются между собою нитями въ 1 или 2 пучка, образуя родъ трубки или желобка (рис. 50, b) . . . . . 54.


Тычинки вполнѣ свободныя или только срослись нитями при самомъ основаніи въ короткое кольцо, или же слиплись пыльниками . . . 57.

**54.** Цвѣтки правильные, 5-ные, съ 5-раздѣльною чашечкою и ворончатымъ вѣнчикомъ (рис. 50, а); ты-

чинокъ 5: всё срослись нитями или только 4 попарно и слились пыльниками, длинными, скрученными (b). Однодомныя, вьющіяся травы, съ спиральными усиками . . . . . тыквенныя—\**Cucurbitaceae* Juss.

Цвѣтки неправильные, иногда безъ чашечки, 4-ные или 5-ные, обоопольные; вѣнчикъ изъ свободныхъ лепестковъ, иногда лишь сросшихся между собою при основаніи . . . . . 55.


55. Чашечка падучая, о 2 листьяхъ (рис. 51, c) или ея вовсе нѣтъ; лепестковъ 4: верхній со шпорцемъ (a, b); тычинокъ 6, сросшихся вверху въ 2 пучка (b, d); орѣшекъ (e) или 2-створчатый бобъ; листья перистораздѣльные. . . . . дымчичныя—*Fumariaceae* DC.



(Рис. 51).



(Рис. 52).



(Рис. 53).

Чашечка остающаяся; цвѣточные покровы 5-ные. . . . . 56.

56. Чашечка изъ 5 свободныхъ чашелистиковъ: 2 боковыхъ больше 3-хъ остальныхъ, крыловидные и окрашенные въ цвѣтъ лепестковъ (рис. 52, a); нижній лепестокъ больше прочихъ, желобчатый, на концѣ 3-лопастной и бахромчатый, сросшійся съ 2 боковыми; задніе 2 лепестка свободные и длиннѣе боковыхъ; тычинокъ 8, внизу сросшихся нитями всё вмѣстѣ, а вверху въ 2 пучка (b); коробочка сплюснутая, 2-гнездная, 2-створчатая (рис. 52); цвѣтки въ кистяхъ съ 3 прицвѣтниками; листья узкіе, цѣльнокрайніе. Единственный родъ сем. истодовъ—*Polygaleae* Juss. . . . .

истодъ—*Polygala* L.


Чашечка трубчатая (рис. 53, f); вѣнчикъ мотыльковый (a): 2 нижнихъ лепестка срослись въ лодочку (e); 2 боковыхъ, б. ч. свободные — крылушки (c, d); большій, верхній—парусъ или флагъ (b); тычинокъ 10, сросшихся нитями въ одну трубку или 1 свободная (g); завязь простая; бобъ 2-створчатый, рѣдко колышчатый, еще рѣже не растрескивающийся орѣшекъ; листья б. ч. сложные и обыкновенно съ прилистниками . . . . .

мотыльковыя—*Papilionaceae* L.

57 (53). Чашечка или простой околоцвѣтникъ о 12 листьяхъ или доляхъ, къ которымъ приросло 6, 12 (до 24) тычинокъ; цвѣтки пазушные, одиночные или скученные, сидячіе или на очень короткихъ ножкахъ; листья мутовчатые или супротивные . . . . . 58.

Чашечка или простой околоцвѣтникъ никогда не содержитъ болѣе 8 листковъ или долей . . . . . 59.

**58.** Листья мутовчатые, мелкораздѣленные на вильчатые доли (см. 15 и рис. 13): въ каждой мутовкѣ много листьевъ; цвѣтки однополые: цвѣточная обертка въ мужскомъ цвѣткѣ напоминаетъ чашечку о 12 листахъ, за которыми 12—24 тычинки; въ женскомъ цвѣткѣ пестикъ съ остающимся на орѣшкѣ столбикомъ; водныя травы. Единственный родъ сем. роголистниковъ—*Ceratophyllaceae* Gray, роголистникъ—*Ceratophyllum* L.



(Рис. 54).

Листья цѣльные, супротивные, иногда мутовчатые, не болѣе 3 листьевъ въ мутовкѣ; цвѣтки обоеполые; чашечка трубчатая, о 12 зубцахъ, изъ которыхъ 6 большихъ чередуются съ 6 мелкими, отогнутыми (рис. 54, а); 6 лепестковъ (b), иногда ихъ не бываетъ; 6 или 12 тычинокъ (b); завязь 2-гнѣздная, обѣ 1 столбикѣ съ головчатымъ рыльцемъ (а, b); 2-гнѣздная коробочка. . . . . дербенниковыя—

*Lythraceae* Juss.

**59.** Цвѣтки однопокровные, съ простымъ поряднымъ околоцвѣтникомъ, въ видѣ одной чашечки или одного вѣнчика. . 60.

Цвѣтки о 2 покрывахъ или съ двойнымъ околоцвѣтникомъ, обыкновенно въ видѣ чашечки и вѣнчика, рѣже въ видѣ 2-ряднаго вѣнчика или 2-рядной чашечки. . . . . 78.

**60.** Деревья и кустарники, съ цѣльными, очередными листьями. . 61.


Травы . . . . . 65.

**61.** Молодыя вѣтви, листья и цвѣтки снаружи покрыты серебристыми чешуйками (рис. 55, с). Кусты съ цвѣтками о 4 тычинкахъ (d) съ желтоватымъ изнутри околоцвѣтникомъ—4-раздѣльнымъ (а, b), и тогда цвѣтки обоеполые (d) съ нижнею завязью, на ножкахъ,—или съ околоцвѣтникомъ 2-раздѣльнымъ, и тогда цвѣтки однополые, сидячіе, а самые кусты 2-домные съ колючками; ложная костянка . . . . . лоховыя—

\**Eleagnaceae* R. Br.


Листья, вѣтви и цвѣтки безъ серебристыхъ чешуекъ . . . . . 62.

**62.** Цвѣтки на ножкахъ, одиночные или пучками . . . . . 63.



(Рис. 56).

(3—8)-надрѣзаннымъ и о 5 (3—8) тычинкахъ (рис. 57, а, b); завязь



(Рис. 55).

Цвѣтки сидячіе . . . . . 64.


**63.** Вьющійся кустарникъ; цвѣтки 3-чатые, съ трубчатымъ околоцвѣтникомъ и 3-лопастнымъ отгибомъ (рис. 56); 6 пыльниковъ, приросшихъ къ столбику съ 3-лопастнымъ рыльцемъ; завязь нижняя, ложно-6-гнѣздная. Родъ сифонникъ—\**Siphisia* Raf. . . . . изъ сем.

кирказоновыхъ—*Aristolochiaceae* Juss.


Деревья, на которыхъ листья развертываются послѣ цвѣтковъ; цвѣтки съ околоцвѣтникомъ 5-

верхняя, 2-гнѣздная съ 2 столбиками (с); 1 сѣменная крылатка (d). Единственный родъ сем. вязовъ—*Ulmaceae* Mirb. . . . . вязъ—*Ulmus* L.

64. Кусты съ обоеполыми цвѣтками, сидящими по нѣскольку на вѣтвяхъ до распусканія листьевъ; вѣнчикъ гвоздевидный, съ 4-раздѣльнымъ отгибомъ



(Рис. 57).



(Рис. 58).

(рис. 58, а), о 8 тычинкахъ, въ два ряда, на очень короткихъ нитяхъ (b); рыльце головчатое, почти сидячее (b); сочная ягода. Единственный представитель сем. ягодковыхъ—*Thymeleaceae* Juss. . . . .

ягодки—*Daphne* L.

Деревья съ цвѣтками однополыми: мужскіе цвѣтки въ повислыхъ сережкахъ, съ 6—8 раздѣльною чашечкою, о 6—10 тычинкахъ (рис. 59, а); женскіе въ прерывчатыхъ колосьяхъ, съ едва замѣтнымъ околоцвѣтникомъ (b); обертка женскаго цвѣтка изъ чешуйчатыхъ листочковъ (b), обращающихся въ плюску желудя; завязь 3-гнѣздная; рыльце 3-лопастное, малиновое (b). Единственный представитель сем. буковыхъ—*Fagaceae* A.Br. . . . .

дубъ—*Quercus* L.


65 (60). Листья очередные . . . . . 66.

Листья супротивные; цвѣтки на цветоножкахъ . . . . . 75.

66. Листья съ прилистниками; цвѣтки съ прицвѣтниками . . . . . 67.

Листья безъ прилистниковъ . . . . . 68.

67. Листья цѣльные; цвѣтокъ 5-ной: чашечка 5-листная съ мѣшеччатыми придатками (рис. 60, а); 5 пыльниковъ сходятся трубкою; 3-створчатая коробочка (b). Плодоносная форма нѣкоторыхъ



(Рис. 59).

фіалокъ—*Violarieae* DC. безъ вѣнчика изъ рода фіалки—*Viola* L.


Листья лопастные или перистые; цвѣтокъ 4-ой (рис. 61, а): чашечка 4-раздѣльная, съ 2, 3 прицвѣтниками

(а) или съ 4, образующими наружную чашечку; тычинокъ 4 (а); сѣмянка; цвѣтки сжаты колосомъ или щитковиднымъ полузонтикомъ . . . . .

Нѣкоторые розанныя—*Rosaceae* Juss.



(Рис. 60).




(Рис. 61).



68. Цвѣтки сидячіе, собранные въ клубочки, расположенные по цвѣтоносамъ ложнымъ или метельчатымъ колосомъ, рѣдко сложнымъ полузонтикомъ; иногда цвѣтки одиночные, пазушные . . . . . 69.

Цвѣтки на цвѣтоножкахъ . . . . . 70.

69. Цвѣтки съ 3 прицвѣтниками (рис. 62, b) и съ пленчатымъ околоцвѣтникомъ, 3—5-листнымъ, о 3 — 5 тычинкахъ (а), рылецъ 2, 3 сидячихъ; 1-сѣменный сухой плодъ, поперекъ растрескивающийся или не растрескивающийся. Единственный родъ сем. амарантовыхъ—*Amarantaceae* Juss. . . . .



(Рис. 62).

амарантъ—*Amarantus* L.



(Рис. 63).


Цвѣтки безъ прицвѣтниковъ, съ чашечкою не пленчатою, но не рѣдко мясистою, остающеюся, о 2 — 5 доляхъ, объ 1—5 тычинкахъ (рис. 63, а) съ 2—5 сидячими рыльцами (b); цвѣтки обоеполые или однополые, и тогда травы однодомныя или многобрачныя, или же 2-домныя (см. 21, рис. 19) . . . . . маревыя—*Chenopodiaceae* Vent.

70. Цвѣтки въ полузонтикахъ, окружены широкими, окрашенными прицвѣтными листьями . . . . . 71.


Цвѣтки въ кистяхъ или въ пазухахъ листьевъ, безъ окрашенныхъ прицвѣтниковъ . . . . . 72.

71. Листья, ланцетовидные или овальные, содержатъ бѣлый млечный сокъ, какъ и стебель, цвѣтки въ вильчатыхъ полузонтикахъ, съ прицвѣтными листьями иной формы, чѣмъ стеблевые (рис. 64, а); 3-дольная завязь на ножкѣ и много тычинокъ, тоже на ножкахъ, облечены въ чашевидную обертку, съ большими мѣдниками на краю (рис. 64 справа, см. 21, рис. 18). Единственный родъ сем. молочайныхъ—*Euphorbiaceae* Kl. et. Gke. . . . .


молочай—*Euphorbia* L.



(Рис. 64).



(Рис. 65).



(Рис. 66).

Листья почковидные, городковые, цвѣтки въ сжатомъ полузонтикѣ съ прицвѣтными листьями одинаковой формы со стеблевыми; чашечка 4-раздѣльная о 8 тычинкахъ и 2 столбикахъ, съ полунижнею завязью (рис. 65); коробочка 2-рогая. Родъ селезеночникъ—*Chrysosplenium* L. . . изъ сем. камнеломковыхъ—*Saxifragaceae* DC.


72. Цвѣтки на сочлененной цвѣтоножкѣ (рис. 66, а) съ 6-или 4-дольнымъ вѣнчикомъ о 6 или 4 тычинкахъ, прикрѣпленныхъ къ вѣничку (рис. 66, b), ягода 3-гнѣздная, малосѣмянная. . . . . сацсанарильныя—*Smilacaceae* R. Br.

Цвѣтки на цвѣтоножкѣ не сочлененной. . . . . 73.


73. Цвѣтки съ 4-листной чашечкою (рис. 67, а) о 2 тычинкахъ, при-  
крѣпленныхъ къ цвѣтоложу (b), 1 пестикъ внутри чашечки (a); стручечекъ  
2-створчатый (c). Уклонная форма — *Lepidium ruderale* L. . . . .  
изъ сем. крестоцвѣтныхъ — **Cruciferae** Juss.

Околоцвѣтникъ трубчатый или колокольчатый, съ нижнею завязью . . 74.


74. Листья почковидные, черешковые, б. м. кожистые, 2-рядные, цѣльно-  
крайние; цвѣтокъ 3-чатый: тычинокъ 6, и тогда онѣ срослись со столбикомъ



(Рис. 68).



(Рис. 67).




(Рис. 69).

(рис. 68, b), или 12 свободныхъ; завязь 6-гнѣздная; плодникъ съ 3, 6-ло-  
пастнымъ или звѣздчатымъ рыльцемъ (b); околоцвѣтникъ 3-надрѣзной или  
съ неправильнымъ язычковымъ отгибомъ (a) . . . . . кирказоновыя —  
**Aristolochiaceae** Juss.

Листья линейные, сидячіе; околоцвѣтникъ 5-надрѣзной (рис. 69, a), вну-  
три бородатый; столбикъ длинный съ головчатымъ рыльцемъ (b); орѣшекъ съ  
продольными ребрышками (c). Единственный представитель сем. санталов-  
выхъ — *Santalaceae* R. Br. . . . . льянки — **Thesium** L.

75 (65). Однополые цвѣтки въ сжатыхъ полузон-  
тикахъ; чашечка 5-раздѣльная, о 10 тычинкахъ (рис.  
70, b); простая завязь о 2 столбикахъ; сѣмянки;  
листья узкіе, цѣльнокрайние, сросшіеся при осно-  
вании. Единственный представитель сем. дивало-  
выхъ — *Scleranthaceae* Link . . . . . дивалы —  
**Scleranthus** L.



(Рис. 70).

Однополые цвѣтки, мужскіе или женскіе; листья съ прилистниками . . 76.

76. Цвѣтки пазушные; одни женскіе: чашечка 3-раздѣльная  
съ 2-гнѣздною завязью о 2 столбикахъ (рис. 71, b), плодъ распа-  
дается на 2 односѣменные дольки. Женскіе экземпляры 2-домныхъ  
растений изъ сем. акалифовыхъ — *Ascalyphaceae* Kl. et Gke.  
(рис. 71). (см. 42, рис. 39, а — мужской цвѣтокъ) . . . . . пролѣски —  
**Mercurialis** L.

Цвѣтки въ метелкахъ, б. ч. мужскіе; чашечка 4, 5-раздѣльная . . . 77.

77. Одни мужскіе цвѣтки съ 5-раздѣльною чашечкою и  
5 тычинками (рис. 72) въ скученныхъ или развѣсистыхъ  
метелкахъ; листья пальчатые или лопастные, иногда верхніе  
очередные. Мужскіе экземпляры 2-домныхъ растений (см.  
16, рис. 15 — женскій цвѣтокъ) . . . . . изъ сем. конопляныхъ —  
**Cannabineae** Blume.



(Рис. 72).

Цвѣтки съ 4-раздѣльною чашечкою (рис. 73, с); мужскіе о 4 тычинкахъ (а); женскіе съ простою завязью и сидячимъ рыльцемъ въ видѣ кисточки (б).



(Рис. 73).

Двудомныя или однодомныя травы со стеблемъ и листьями, покрытыми жгучими волосками. Единственный родъ сем. кропивныхъ — *Urticaceae* Endl. . . .

кропивы — *Urtica* L.

78 (59). Вѣничикъ раздѣльнолепестный — изъ свободныхъ лепестковъ; чашечка б. ч. также изъ свободныхъ чашелистиковъ . . . . . 79.

Вѣничикъ цѣльный — спайнолепестный; чашечка б. ч. также изъ спайныхъ между собою долекъ . . . . . 113.

79. Деревья и кусты . . . . . 80.

Травы . . . . . 88.

80. Цвѣтокъ 3-тый: чашечка и вѣничикъ 2-рядные, одноцвѣтные (рис. 74, а, б); тычинокъ 6, супротивныхъ лепесткамъ, съ пыльниками, вскрывающимися створками (с); ягоды; листья цѣльные, съ прилистниками въ видѣ колючекъ; кусты съ повислыми кистями желтыхъ цвѣтковъ. Единственный представитель сем. барбарисовыхъ — *Berberideae* Vent. . . . . барбарисы — \* *Berberis* L.

Покровы цвѣтка 4-ные или 5-ные; прилистниковъ въ видѣ колючекъ нѣтъ . . . . . 81.

81. Листья пальчатосложные; цвѣтки многобрачные: чашечка 4, 5-зубчатая или 4, 5-листная; вѣничикъ о 4, 5 лепесткахъ . . . . . 82.


Листья простые, цѣльнокрайніе или лопастные . . . . . 83.

82. Деревца съ супротивными листьями безъ прилистниковъ; цвѣтки на сочлененныхъ почкахъ, съ прицвѣтниками, въ большихъ пирамидкахъ: чашечка колокольчатая 4, 5-лопастная (рис. 75, б); вѣничикъ нѣсколько неправильный, тычинокъ 7 (5—9); завязь съ нитевиднымъ рыльцемъ (а); коробочка 3-створчатая, съ толстыми створками. . . . . ложнокаштановыя — \* *Hippocastaneae* DC.


Вьющіяся кустарники съ очередными листьями и съ усиками, супротивными листьямъ, съ прилистниками; цвѣтки въ развѣсистыхъ щиткахъ, тоже супротивныхъ листьямъ; чашечка 5-зубчатая, очень маленькая; вѣничикъ правильный, тычинки супротивны лепесткамъ (рис. 76), завязь 2-гнѣздная съ рыльцемъ головчатымъ, почти сидячимъ; ягода. Единственный представитель сем. виноградныхъ — *Ampelideae* Н. В. К. . . . . лозы — \* *Ampelopsis* Michaux

83. Листья лопастные или крупнозубчатые, безъ прилистниковъ; чашечка 5 (4)-раздѣльная, вѣничикъ правильный, 5 (4)-лепестный; завязь о 2 столбикахъ . . . . . 84.

Листья цѣльные и цѣльнокрайніе, рѣдко мелкозубчатые; кустарники. . . . . 85.



(Рис. 74).



(Рис. 75).



(Рис. 76).

84. Деревья или деревца съ листьями супротивными. Тычинокъ 8 (5—12); больше числа лепестковъ (рис. 77, вверху); завязь верхняя, 2-гнѣздная, 2-лопастная (рис. 77, внизу); 2-крылая сѣмянка. Единственный родъ сем. кленовыхъ—*Acerineae* DC. . . клены—*Acer* L.

Кустарники съ листьями очередными, дланевиднопервыми и вдоль складчатыми; чашечка увядающая; развитая болѣе въ чашечкѣ; тычинокъ по числу лепестковъ (рис. 78, в); завязь нижняя, (а); 1-гнѣздная ягода съ увядшею на верхушкѣ чашечкою. Единственный родъ сем. смородинныхъ—*Grossulariaceae* DC. . . . . смородины—*Ribes* L.


85. Цвѣтки въ щиткахъ, бѣлые; чашечка маленькая, зубчатая; прилистниковъ пять . . . . . 86.

Цвѣтки въ пучкахъ или короткихъ кистяхъ, зеленоватые или буроватые, чашечка надрѣзанная или лопастная; листья съ прилистниками, остающимися или опадающими . . . . . 87.

86. Мелкіе кустики съ листьями очередными, узкими, кожистыми, сидячими; цвѣтки 5-ные (рис. 79, а); тычинокъ 10; пыльники вскрываются ды-



(Рис. 77).



(Рис. 78).



(Рис. 79).



(Рис. 80).

рочками; завязь верхняя, 5-гнѣздная объ 1 столбикѣ; коробочка вскрывается 5 створками снизу вверх (b). Единственный представитель сем. родоро-выхъ—*Rhodogæae* Klotzsch . . . . . багульники—*Ledum* L.

Больше кусты съ листьями супротивными, широкими, толстыми, черешковыми; цвѣтки 4-ные (рис. 80, а); тычинокъ 4; столбикъ 1 съ головчатымъ рыльцемъ; завязь нижняя (b), 2-гнѣздная; костянка объ одной косточкѣ. Единственный родъ сем. деренныхъ—*Cornaceae* DC. . . . .

дерны — *Cornus* L.

87. Тычинки чередуются съ лепестками (рис. 81, слева), завязь съ 1 столбикомъ 4, 5-гнѣздная; коробочка 4, 5-лопастная и 4, 5-створчатая (рис. 81, спр.); сѣмена съ мясистою кожурою (81, сред.); кусты съ листьями супротивными. Единственный родъ сем. бересклетовыхъ—*Celastrineae* R. Br.

бересклеты—*Evonymus* L.

Тычинки супротивны лепесткамъ (рис. 82); завязь съ 2-раздѣльнымъ столбикомъ или съ 4 столбиками, 2, 4-гнѣздная; костянка; чашечка 4, 5-надрѣзанная отпадаетъ кольцомъ; кусты обоеполые или 2-домные, съ листьями очередными или супро-




(Рис. 81).



(Рис. 82).

тивными. Единственный родъ сем. крушинныхъ — *Rhamnaceae* R. Br.  
 . . . . . крушины *Rhamnus* L.

88 (79) Околоцвѣтникъ неправильный: между листками его одинъ часто со шпорцемъ; коробочки . . . . . 89.  
 Околоцвѣтникъ правильный, шпорца нѣтъ . . . . . 91.




(Рис. 83).

89. Листья влагалищные, цѣльные и цѣльнокрайніе; завязь нижняя; околоцвѣтникъ двойной (рис. 83, а): 3 наружные листочка его прямые или сходящіяся, и тогда образуютъ шлемъ; изъ 3 внутреннихъ—нижній особой формы, обыкновенно больше остальныхъ—нижняя губа, и нерѣдко вытянуть позади въ шпорецъ; тычинокъ 1 (2), безъ нити: пыльники приросли къ столбику (b) и содержатъ пыльцу, слипшуюся въ комочки (c); коробочка простая, 3-створчатая; цвѣтки вершинные, б. ч. въ колосьяхъ и кистяхъ. . . . .


ятрышники—*Orchideae* Juss.

Листья черешковые, б. ч. городковые; завязь верхняя; околоцвѣтникъ съ чашечкою и вѣнчикомъ; 5 тычинокъ, слипшихся своими пыльниками. . . 90.

90. Чашечка остающаяся изъ 5 зеленыхъ, почти равныхъ листковъ, съ мѣшеччатыми придатками (рис. 84, c); вѣнчикъ 5-лепестный (а, иногда его нѣтъ, см. 67, рис. 60); нижній лепестокъ съ мѣшеччатымъ шпорцемъ; оба боковые меньше обоихъ верхнихъ; 2 нижнихъ тычинки съ придатками (b); столбикъ искривленный; коробочка 3-створчатая, съ остающимся стол-



(Рис. 84)



(Рис. 85).

бикомъ (c); листья съ большими прилистниками; цветоножки съ 2 прицвѣтниками (а). Единственный родъ сем. фиалокъ—*Violaceae* DC. . . . .

фиалки—*Viola* L.

Чашечка падающая изъ 2 (4) маленькихъ зеленыхъ листковъ (рис. 85, b) и 1 крупнаго ярко окрашеннаго, вытянутаго въ шпорецъ (а); передній лепестокъ желобчатый, сердцевидный; оба боковые, большіе, спаяны при основаніи съ обоими меньшими; рылецъ 5, сросшихся; коробочка длинная (c); 5-гнѣздная, 5-створчатая; створки упруго скручиваются спиралью вверхъ (d); стебель сочный, узловатый. Единственный представитель сем. бальзамныхъ—*Balsamineae* A. Rich. . . . . педотроги—*Impatiens* L.

91 (88). Завязь вполнѣ нижняя, иногда полунижняя, т. е. на половину



сросшаяся съ чашечкою: цвѣтокъ 3-чатый, 4-ной, иногда 2-тый, но никогда не 5-пой . . . . . 92.

Завязь вполне верхняя, внутри чашечки; иногда ея нѣтъ вовсе (въ 2-дом-ныхъ травахъ) . . . . . 96.

92. Цвѣтокъ 3-чатый . . . . . 93.

Цвѣтокъ 4-ной или 2-чатый. . . . . 94.

93. Околоцвѣтникъ глубоко 6-раздѣльный, (рис. 86), ярко окрашенный; тычинокъ 3; лепестковидныхъ рыльца 3; коробочка 3-гнездная, 3-створчатая; цвѣтки большіе въ кистяхъ или колосьяхъ, съ большими прицвѣтниками; листья мечевидные . . . . . касатиковыя—Irideae Juss.




(Рис. 86).

Околоцвѣтникъ 6-листный: наружный рядъ образуетъ зеленую чашечку; внутренній—бѣлый или розоватый вѣнчикъ (рис. 87, а); тычинокъ съ пыльниками нѣтъ: одни только стаминодіи (b); рылецъ 3 или 6 (b); плодъ мясистый; цвѣтки въ пазухѣ пленчатыхъ влагалищъ. Женскіе экземпляры двудомныхъ водныхъ травъ (см. 42, рис. 40—мужской цвѣтокъ) . . . . .

водокрасы—Hydrocharideae DC.

94. Цвѣтки въ мутовчатыхъ колосьяхъ, однодомные: верхнія мутовки мужскія; нижнія — женскія: чашечка 4-раздѣльная; лепестки падучіе или нѣтъ




(Рис. 87).



(Рис. 88).

вовсе нѣтъ (въ женскихъ цвѣткахъ); тычинокъ 8 (рис. 88, c); 4 очень большихъ, сидячихъ, остающихся рыльца на 4-гнездной завязи (d); плодъ распадается на 4 сухія костянки; водныя травы съ мутовчатыми листьями, глубоко перистораздѣльными на тонкія, нитевидныя доли. Единственный родъ сем. слапоплодниковыхъ—Haloragaeae R. Br. . . . урути—Myriophyllum L.



(Рис. 89).



(Рис. 90).

Цвѣтки въ кистяхъ или одиночныя, обоеполыя . . . . . 95.

95. Чашечка опадающая; трубка ея выступаетъ надъ завязью, вполне нижнею (рис. 89, а); при 2-лепестномъ вѣнчикѣ цвѣтокъ во всѣхъ частяхъ

2-чатый и плодъ орѣшекъ; при 4 лепесткахъ—тычинокъ 8 (а) и плодъ 4-гнѣздная коробочка (b); цвѣтки въ кистяхъ; листья очередные или супротивные . . . кипрейниковыя—Onagraceae Juss.

Чашечка остающаяся; завязь полунижняя, 2-гнѣздная; цвѣтокъ 4-ой о 4 тычинкахъ (рис. 90, а); 1-сѣмешный орѣшекъ съ остающимися и деревѣющими въ видѣ колючекъ зубцами чашечки (с); листья розеткою, кожистые (d); цвѣтки пазушные. Водныя травы, единственный представитель которыхъ изъ сем. рогульниковъ—Тгарасеае Griseb. . . . . .

рогульники—Trapa L.

96 (91). Чашечка или наружный околоцвѣтникъ изъ свободныхъ чашелистиковъ или глубоко-раздѣльная, почти до самаго своего основанія. . . 97.  
Чашечка зубчатая, надрѣзная или раздѣленная на доли, но не доходящая до основанія чашечки . . . . . 108.

97. Цвѣтки 3-тые изъ 2 рядовъ одноцвѣтныхъ листковъ околоцвѣтника; тычинокъ 6; коробочка; листья цѣльнокрайніе, б. ч. влагалищные . . . 98.

Цвѣтки съ цвѣточными покровами 4-ными или 5-ными . . . . . 100.

98. Цвѣтки б.м. крупныя, ярко окрашенныя (рис. 91, а, b); столбикъ съ головчатымъ или 3-лопастнымъ рыльцемъ; коробочка 3-гнѣздная, 3-створчатая (с); травы съ луковицами . . . . .

. . . . . лилейныя—Liliaceae DC.

Цвѣтки мелкіе, невзрачныя, зеленоватые или буроватые; рылецъ 3 или 6; луковицъ не бываетъ . . . . . 99.


99. Цвѣтки пленчатые, въ верхушечныхъ или боковыхъ клубочкахъ, колосьяхъ, пучкахъ и полусонтикахъ; столбикъ о 3 нитевидныхъ рыльцахъ (рис. 92, а); коробочка 3-створчатая, 1 или 3-гнѣздная (b, c) . . . . . ситниковыя—Juncaceae DC.



(Рис. 91).



(Рис. 92).



(Рис. 93).


Цвѣтки не пленчатые, въ верхушечныхъ кистяхъ; рыльца сидячія (рис. 93, а); 3 или 6 плодниковъ, вполне сросшихся между собою; 3 или 6 коробочекъ отдѣляются отъ цвѣточнаго столба снизу вверхъ (d). Родъ триостренники—Triglochin L. изъ сем. . ситниковидныхъ—Juncagineae Rich.

100 (97). Тычинковыя нити спаяны внизу въ короткое кольцо; тычинокъ 10: всѣ съ пыльниками или только 5; а 5 другихъ въ видѣ нитей или зубцовъ . . . . . 101.


Тычинки свободные; пяти ихъ не спаяны. . . . . 103.

101. Листья сидячие, узкие, цѣльнокрайніе; цвѣтки въ полузонтикахъ; 5 тычинокъ чередуются съ 5 зубцами (рис. 94); завязь 5-гнѣздная, о 5 столбикахъ; коробочка 10-гнѣздная. Единственный родъ сем. льняныхъ—*Lineae* DC. . . . . льны—*Linum* L.

Листья черешковые, раздѣльные или сложные . . . . . 102.



(Рис. 94).



(Рис. 95).

102. Листья сложные, 3-чатые, съ листочками вдоль складчатыми; завязь 5-гнѣздная, 5-гранная, о 5 столбикахъ; коробочка 5-гнѣздная, 5-створчатая; сѣмена съ упругою кожурою (рис. 95). Единственный родъ сем. кислицъ—*Oxalideae* DC. . . . . кислицы—*Oxalis* L.

Листья пальчато или перисто-раздѣльные, супротивные; пестикъ изъ 5 вполне сросшихся завязей и столбиковъ съ 5 свободными рыльцами (рис. 96, а); плодъ распадается на 5 сѣмянокъ, отдѣляющихся отъ цвѣточного столбца снизу вверхъ, вмѣстѣ съ остающимися столбиками, которые закручиваются дугою или кольцомъ (b), или же спирально . . . . . гераневыя—*Geraniaceae* DC.



(Рис. 96).

103. Листья супротивные или мутовчатые, цѣльные и цѣльнокрайніе . . . . . 104.

Листья очередные или корневые . . . . . 105.



(Рис. 97).

104. Одна мутовка въ 4 (5) листа на простомъ стеблѣ; цвѣтокъ одиночный, верхушечный, о 8 (10) тычинкахъ (рис. 97, а), завязь и плодъ 4 (5)-гнѣздный, о 4 (5) столбикахъ (b); ягода. Уклонная форма—одноягодники—*Palis* L. . . . . изъ сем. сассанарильныхъ—*Smilacae* R. Br.

Листья супротивные; цвѣтки въ полузонтикахъ или одиночные, пазушные, о 10, 8 или 5, 4 тычинкахъ (рис. 98); завязь простая о 2, 3, 5 столбикахъ; коробочка, вскрывающаяся зубцами или створками. . . . . мокричныя—*Alsineae* DC.

105. Стебель покрытъ очередными листьями; тычинокъ болѣе 5; столбикъ 1 съ простымъ рыльцемъ. . . . . 106.

Листья корневые, черешковые, розеткою; цвѣтки 5-ные, о 5 тычинкахъ и о 3—5 рыльцахъ . . . . . 107.

**106.** Листья чешуйчатые, желтоватые или розоватые, как и все растение; цветки в кистях с верхушечным цветком 5-ным, а остальные 4-ные (рис. 99); тычинок вдвое больше числа лепестков или чашелистиков; коробочка не вполне 4, 5-гнздная, 4, 5-створчатая; паразиты. Единственный представитель сем. вертялицъ—*Monotropæe* Nutt. . . подельники—

*Hypopitys* Scop.

Листья зеленые, б. ч. раздельные; цветки в щитках или кистях; чашечка и вѣничъ 4-листные (рис. 100, справа); тычинок 6, в 4-большинствѣ 4 длиннѣ 2 остальных (рис. 100, слѣва); стручечек или стручек, дву-



(Рис. 98).



(Рис. 99).




(Рис. 100).

створчатый, рѣдко колѣнчатый—поперек растрескивающийся на колѣнца, еще рѣже не растрескивающийся орѣшек . . . крестоцвѣтныя—*Cruciferae* Juss.

**107.** Листья железисто-бахромчатые, молодые спирально скручены; цветки в кистях; чашечка глубоко 5-раздѣльная, остающаяся (рис. 101, с. слѣва); лепестки увядающіе; завязь простая о 3 (4, 5) столбикахъ, расщепленных на двое (b); коробочка 3, 5-створчатая (с, слѣва). Единственный родъ сем. росянокъ—*Droseraceae* DC. . . . . росяники—*Dròsera* L.



(Рис. 101).



(Рис. 102).

Листья цѣлюкрайніе; цвѣтокъ одиночный на стрѣлкѣ обѣ 1 листѣ; чашечка 5-листная (рис. 102, с); между вѣничкомъ и тычинками коронка изъ 5-пальчато-раздѣльных, железистыхъ пластинокъ (а, b); столбика нѣтъ; 4 сидячихъ рыльца (а); коробочка въ основаніи 4-гнздная, 4-створчатая (с). Единственный представитель сем. бѣлозоровъ—*Parnassieae* Rehb. . . . .

бѣлозоры—*Parnassia* L.

108 (96). Цвѣтки сидячіе въ пазухахъ супротивныхъ, иногда мутовчатыхъ листьевъ, съ тонкими, плечатыми, мелкими прилистниками . . . . . 109.

Цвѣтки на ножкахъ, въ полузонтникахъ, кистяхъ, иногда одиночные; плечатыхъ тонкихъ прилистниковъ нѣтъ. . . . . 110.


109. Цвѣтки въ клубочкахъ, 5-ные: лепестки нитевидные, мало замѣтные, прикрѣплены вмѣстѣ съ 5 тычинками къ 5-дольной чашечкѣ (рис. 103, а); рылецъ на завязи 2 (b); 1-сѣменный сухой плодъ (с). Единственный представитель сем. приноготковыхъ—*Ranunculaceae* St. Hill . . . . . грызники—



(Рис. 103).

*Herniaria* L.

Цвѣтки одиночные, 3-тые или 4-ные, иногда чашечка 2-дольная; тычинокъ по числу лепестковъ или вдвое болѣе (рис. 104, а); они прикрѣплены къ ложу цвѣтка; 3, 4-гнѣздная завязь со столбикомъ же сидячими рыльцами (b); коробочка. Единственный родъ сем. повоиничковъ—*Elatineae* Cambes.



(Рис. 104).


. . . . . повоинички—*Elatine* L.

110. Листья съ зелеными прилистниками, лопастные, вдоль складчатые; цвѣтки въ щитковидныхъ полузонтникахъ, 4-ные (рис. 105, b): тычинки прикрѣплены къ околоцвѣтнику и супротивны его долямъ, приросшимъ къ наружной оберткѣ, которая нерѣдко принимается за чашечку; столбикъ 1, боковой (а); сѣмянка. Родъ манжетки—*Alchemilla* L. . . . . изъ сем. розанныхъ—

*Rosaceae* Juss.


Листья безъ прилистниковъ; цвѣтки 5-ные; тычинокъ 10, плодъ—много-сѣмянная коробочка, рѣдко ягода . . . . . 111.

111. Листья супротивные; лепестки съ поготкомъ, прикрѣплены вмѣстѣ съ тычинками къ ложу цвѣтка (рис. 106, а); завязь простая, б. м. на ножкѣ



(Рис. 105).

(Рис. 106):



(Рис. 107).



(Рис. 108).

о 2, 3, 5 столбикахъ (b); коробочки вскрываются 4, 6, 8, 10 зубцами (с), рѣдко ягода; цвѣтки въ полузонтникахъ или пучкахъ . . . . .

смолевковыя—*Sileneae* DC.

Листья очередные или корневые, иногда въ ложной мутовкѣ; завязь 2, 5-гнѣздная . . . . . 112.

112. Листья черешковые, широкіе; чашечка 5-раздѣльная (рис. 107, b); лепестки и тычинки прикрѣплены къ ложу цвѣтка; пыльники вскрываются дырочками; завязь 5-гнѣздная обь 1 столбикъ (а); коробочка (с) вскрывается со середины 5-створками. . . . . сем. грушанокъ—*Pirolaceae* Lindl.

Листья сидячие, узкіе, цѣльнокрайніе; лепестки и тычинки прикрѣплены къ краю отгиба 5-надрѣзной чашечки (рис. 108); завязь 2-гнѣздная съ 2 остающимися въ видѣ рожковъ столбиками на 2-гнѣздной коробочкѣ, вскрывающейся дырочками. Родъ камнеломки—*Saxifraga* L. . . . . изъ сем. камнеломковыхъ—*Saxifragaceae* DC.

113 (78) Завязь вполнѣ верхняя, заключена въ чашечкѣ . . . . . 114.

Завязь нижняя, подъ чашечкою, рѣдко полунижняя. . . . . 131.

114. Травы съ выющимъ стеблемъ и правильными цвѣтками; столбикъ 1 съ 2-лопастнымъ рыльцемъ или ихъ 2; 2-гнѣздная, 2, 4-сѣменная коробочка. . 115.

Растенія со стеблемъ прямымъ, иногда изгибистымъ, но не завивающимся. . . . . 116.

115. Безлистные, бѣловатые нитевидные стебли, обвивающіеся вокругъ другихъ растений, съ цвѣтками скученными, сидячими или на короткихъ ножкахъ, 4-ными или 5-ными (рис. 109, с); чашечка и вѣнчикъ надрѣзанные (а, б); вѣнчикъ трубчатый или вздутый; коробочка вскрывается крышечкою (d). Единственный родъ сем. повиличныхъ—*Cuscutaeae* Link. . . . . повилики—*Cuscuta* L.



(Рис. 109).

Листья очередные, черешковые, цѣльные, стрѣловидные; цвѣтки 5-ные, одиночные, пазушные, на длинныхъ ножкахъ, съ прицвѣтниками (рис. 110, б); вѣнчикъ большой, ворончатый, съ 5-лопастнымъ отгибомъ (а); 2-створчатая коробочка. . . . . вьюшники—*Convolvulaceae* Vent.

116. Тычинокъ 8, 10—вдвое болѣе числа долей вѣнчика, колокольчатого или кубарьчатого, о 4, 5 доляхъ; пыльники 2-рогіе, вскрываются дырочками; завязь многгнѣздная; мелкіе кустики съ зимующими листьями и съ цвѣтками въ кистяхъ. . . . . 117.

Тычинокъ по числу долей вѣнчика или менѣе, отъ 2 до 7. . . . . 118.

117. Листья черепичато-скученные, 4-рядные, игольчатые, сидячіе; цвѣтки 4-ные (рис. 111, а); чашечка 4-раздѣльная, остающаяся, окрашена въ цвѣтъ вѣнчика и вдвое длиннѣе его; вѣнчикъ глубоко 4-раздѣльный; тычинокъ 8; коробочка 4-гнѣздная (с). Единственный представитель сем. вересковыхъ—*Ericaceae* Klotzsch. . . . . верески—*Calluna* Salisb.



(Рис. 111).



(Рис. 112).

Листья очередные, пластинчатые; цвѣтки 5-ные; чашечка 5-раздѣльная, короче кубарьчатого вѣнчика о 5 зубцахъ (рис. 112, а); тычинокъ 10 (b); 5-гнѣздная коробочка или ягода . . . . . толокнянковые—*Arbuteae* DC.


118. Завязь 4-дольная или 4-лопастная, съ 1 столбикомъ въ срединѣ; плодъ распадается на 4 (2) односѣменныхъ орѣшка . . . . . 119.




Завязь цѣльная или по крайней мѣрѣ не 4-дольная, обращается въ коробочку или ягоду. . . . . 120.

119. Листья супротивные, крестообразно-расположенные на 4-хъ-гранномъ стеблѣ; цвѣтки въ пазушныхъ полумутовкахъ, размѣщенныхъ колосомъ, головкою, кистью или метелкою; вѣнчикъ б. м. неправильный (рис. 113. а); тычинокъ 4 въ 2 большинства (b) или всего только 2 . . . . .  
губоцвѣтные—**Labiatae** Juss.

Листья очередные, рѣдко попарно сближенные, щетинистые или волосистые;



(Рис. 113).



(Рис. 114).

цвѣтки б. ч. въ завиткахъ и обыкновенно правильные; тычинокъ 5 (рис. 114) . . . . .  
бурачниковыя—**Borragineae** Juss.


120. Цвѣтки правильные, т. е. какъ доли чашечки между собою, такъ и доли вѣнчика одинаковой величины, формы и окраски. . . . . 121.

Цвѣтки неправильные, т. е. либо всѣ доли чашечки или вѣнчика неравны, либо только нѣкоторые не вполне одинаковы, причемъ или тычинки неравной длины или тычиновыя нити и столбики изогнуты . . . . . 128.

121. Тычинокъ 2 въ 4-номъ цвѣткѣ (рис. 115, b); чашечка 4-зубчатая; вѣнчикъ трубчатый съ 4-раздѣльнымъ отгибомъ (а, b); 2-гнѣздная и 2-створчатая коробочка. Большие кусты съ супротивными листьями; цвѣтки въ большихъ пирамидкахъ. Родъ сирени—**Syringa** L. . . . . изъ сем. маслинныхъ—**Oleaceae** Lindl.



(Рис. 115).



(Рис. 116).

Тычинокъ 4, 5 или болѣе, по числу долей вѣнчика. . . . . 122.

122. Цвѣтки съ пленчатымъ вѣнчикомъ, 4-ные, скученные на верхушкѣ головой стрѣлки въ плотный колосъ; 4 тычинки съ длинными нитями, выступающими изъ трубки вѣнчика (рис. 116, а); чашечка почти 4-листная (b); 2-гнѣзд-

ная коробочка, открывающаяся крышечкою (с); листья цѣльные, корневыя. Единственный родъ сем. подорожниковъ—*Plantagineae* Juss . . . . .

подорожники—*Plantago* L.

Цвѣтки съ вѣнчикомъ не плечатымъ и не собраны въ колосья. . . . . 123.

123. Рыльце простое: головчатое или нитевидное . . . . . 124.

Рыльце 2-лопастное или 3-раздѣльное . . . . . 127.

124. Тычинки супротивны долямъ вѣнчика, т. е. прикрѣплены къ трубкѣ противъ долей его отгиба (рис. 117); цвѣтки 5-ные, 4-ные и 7-ные; завязь простая; коробочка съ срединнымъ сѣменосомъ, вскрывающаяся зубцами или крышечкою. . . . . скоропѣлковыя—*Primulaceae* Vent.


Тычинки чередуются съ долями вѣнчика, т. е. прикрѣплены къ его трубкѣ въ промежуткѣ между долями отгиба; завязь 2-гнѣздная или двойная. . . . . 125.

125. Листья очередные; завязь 2-гнѣздная, ягода (рис. 118, б) или коробочка 2-гнѣздная или вследствие развитія ложныхъ перегородокъ 4-гнѣздная, вскрывающаяся створками или крышечкою; цвѣтки въ пучкахъ, полузонтикахъ, кистяхъ и метелкахъ. . . . . пасленовыя—*Solanaceae* Juss.

Листья супротивныя; 2 плодника, сросшіеся завязями или также и столбиками, оканчиваются расширеннымъ кожистымъ дискомъ—круглымъ или 5-ти угольнымъ; цвѣтокъ 5-ной . . . . . 126.

126. Зѣвъ вѣнчика закрытъ 5-лопастнымъ кольцомъ, состоящимъ изъ сросшихся между собою придатковъ пыльниковъ (рис. 119, с); пыльца слипшаяся въ комочки; оба плодника срослись вполнѣ, на верхушкѣ съ 5-угольнымъ дискомъ (б, с); раздвоенный мѣшечекъ; сѣмянъ много, съ пучкомъ шелковистыхъ волосковъ. Цвѣтки мелкіе въ пазушныхъ полузонтикахъ; вѣнчикъ бѣлый колесовидный (а). Единственный представитель сем. ластовниковыхъ—*Asclepiadeae* R. Br. . . . . ласточники—*Vincetoxicum* Moench

Зѣвъ вѣнчика открытый безъ придатковъ; тычиновыя нити короткія, изогнутыя (рис. 120, с); стол-




(Рис. 117).


(Рис. 118).



(Рис. 119).



(Рис. 120).



(Рис. 121).


бикъ съ круглымъ кольцомъ (а); цвѣтки большіе, одиночныя, пазушныя, на ножкахъ; вѣнчикъ ворончатый, синій. Полукустарники съ кожистыми, зиму-

ющими листьями. Единственный представитель сем. кутровыхъ—*Арсѣнеа* R. Вг. . . . . барвинки—† *Vinca* L.

127 (23). Рылецъ 3 на длинномъ столбикѣ (рис. 121, b); завязь 3-гнѣздная; тычинки при основаніи расширенныя, мохнатыя (a); вѣничикъ 5-лопастной (a); чашечка 5-раздѣльная (c), остающаяся; коробочка 3-створчатая (d); листья непарноперистые, очередные. Единственный представитель сем. синюхи—*Polemoniaceae* Vent. . . . .

синюхи—*Polemonium* L.

Рылецъ 2-лопастное (рис. 122, a), сидячее или на столбикѣ; завязь простая или только внизу 2-гнѣздная; цвѣтокъ 4-ой или 5-ой (рис. 122), съ увядающимъ вѣничкомъ; чашечка надрѣзная или раздѣльная, нерѣдко съ промежуточными зубцами; коробочка 2-створчатая или неправильно вскрывающаяся; листья супротивные, иногда корневые, и тогда очередные, 3-чатые. . . . . горечавковые—*Gentianeae* Juss.




(Рис. 122).

128 (120). Тычинокъ 3 (рис. 123 a, b); 3 почти сидячихъ рыльца (c); коробочка 3-створчатая; чашечка 2-надрѣзная (a, d); вѣничикъ ворончатый съ 5-лопастными отгибомъ, въ которомъ 3 доли меньше 2 остальныхъ (a, b); листья супротивные, цѣльнокрайніе, нѣсколько мясистые. Уклонная форма монція—*Montia* L. . . . . изъ сем. портулаковыхъ—*Portulacaceae* Juss.

Тычинокъ 2, 4,—изъ нихъ 2 больше 2 другихъ, иногда 5 неравныхъ между собою; рылецъ простое или 2-раздѣльное; коробочка 2-створчатая . . . 129.




(Рис. 123).



(Рис. 124).

129. Травы съ чешуйчатыми, бѣлыми или буроватыми листьями; цвѣтки въ кистяхъ; вѣничикъ 2-губый (рис. 124, a); тычинокъ 4 въ 2-большинствѣ (b); простая коробочка. Паразиты . . . . . заразиховыя—*Orobanchaceae* Lindl.

Травы съ зелеными, не чешуйчатыми листьями . . . . . 130.



(Рис. 125).

130. Чашечка глубоко 2-раздѣльная, почти 2-листная, остающаяся (рис. 125, a); вѣничикъ 2-губый, личиночный, со шпорцемъ (a); тычинокъ 2, сходящихся пыльниками (b); рылецъ простое, расширенное; коробочка неправильно вскрывающаяся. Водныя травы съ листьями вильчато или перисто-многораздѣльными на тонкія нитевидныя доли и съ воздушными пузырьками. Единственный родъ сем. пузырчатокъ

—*Lentibularieae* Rich . . . . . пузырчатки—*Utricularia* L.

Чашечка 4,5-дольная; коробочка, разверзающаяся 2 створками или крышечкою; листья безъ воздушныхъ пузырьковъ . . . . . 131.

**131.** Рыльце 2-лопастное; тычинокъ 4 въ двубольшинствѣ (рис. 126, b), иногда 2, а иногда и 5, но тогда всѣ онѣ или только 3, болѣе длинныя, съ мохнатыми нитями, и самыя цвѣтки съ чашечкою 5-раздѣльною; перегородка дѣлитъ завязь и затѣмъ 2-створчатую коробочку (с) на 2 гнѣзда, обращенныя вверхъ и внизъ къ цвѣтку; створки не вполне равныя. . . . . поричиковыя—

**Scrophulariaceae R. Br.**

Рыльце головчатое, тычинокъ 5, въ цвѣткѣ слегка неправильномъ, съ нитями изогнутыми, пушистыми, но не мохнатыми: изъ нихъ 3 длиннѣ остальныхъ; чашечка надрѣзная съ неравными зубцами (рис. 127, b); вѣнчикъ



(Рис. 126). . . . . (Рис. 127).

нѣсколько 2-губый съ 5 неравными лопастями (а); перегородка дѣлитъ завязь и затѣмъ коробочку на 2 гнѣзда, обращенныя вправо и влево; коробочка вскрывается крышечкою. Одинъ родъ белены—**Hyoscyamus L.** . . . . .

изъ сем. пасленовыхъ—**Solanaceae Juss.**


**132 (113).** Листья мутовчатые или супротивные . . . . . 133.

Листья очердные . . . . . 135.

**133.** Листья мутовчатые, цѣльнокрайніе; цвѣтки 4-ные (рис. 128, a, b) въ развѣсистыхъ метелкахъ или вильчатыхъ полузонтикахъ; чашечка обыкновенно мало замѣтная, 4-зубчатая; вѣнчикъ 4 (3, 5)-надрѣзной или раздѣльный о 4 тычинкахъ (b); завязь 2-гнѣздная; столбикъ 2-раздѣльный съ головчатыми рыльцами (а, b); плодъ распадается на 2 орѣшка (с). . . . .

маренныя—**Rubiaceae Juss.**

Листья супротивные . . . . . 134.



(Рис. 128). . . . . (Рис. 129).

(Рис. 130).

**134.** Тычинокъ 3 (рис. 129, a); столбикъ съ 3-раздѣльнымъ рыльцемъ (с); завязь 3-гнѣздная; 1-стѣнный орѣшекъ съ перистымъ хохолкомъ, развивающимся изъ свернутой внутрь, зачаточной чашечки (а, с); вѣнчикъ не вполне правильный съ 5-надрѣзнымъ отгибомъ (а) и бугорчатымъ выростомъ; листья непарноперистые. Единственный представитель сем. мауновыхъ—**Valeriana L.**

Тычинокъ 5, 4, иногда раздвоенныхъ до основанія; столбиковъ 1, 4, 5;

завязь 2—5-гнѣздная, иногда полунижняя; чашечка 2—5-раздѣльная или надрѣзная; вѣнчикъ 4, 5-зубчатый, неправильный (рис. 130) или правильный; многгнѣздная, мясистая или сухая ягода. . . . .

жимолостныя—*Caprifoliaceae* Juss.

135 (132). Травы вьющіяся со спиральными усиками; цвѣтки 1-полюе, 5-ные; завязь 3—6-гнѣздная, съ короткимъ столбикомъ и 3 мясистыми рыльцами (рис. 131); 3—6-гнѣздная ягода; въ мужскихъ цвѣткахъ тычинки сросшіяся въ 2, 3 пучка нитями и пыльниками (см. 54, рис. 50). . . . .


тыквенныя—*\*Cucurbitaceae* Juss.

Растенія не вьющіяся, безъ усиковъ; съ цвѣтками обоеполыми. . . . . 136.

136. Мелкіе кустики обыкновенно съ болѣе или менѣе кожистыми, цѣльными листьями; цвѣтки 4-ные или 5-ные (рис. 132); чашечка зубчатая; вѣнчикъ 0 4. 5-зубцахъ или доляхъ, опадающій; тычинокъ вдвое болѣе числа долей ча-



(Рис. 131).



(Рис. 132).



(Рис. 133).

шечки или вѣнчика, т. е. 8 или 10, сидятъ на краю городковаго надпестичнаго диска; пыльники двурогіе (с), вытянуты на концѣ въ трубочку и вскрываются дырочками; столбикъ 1 съ простымъ рыльцемъ (b); завязь и ягода 4, 5-гнѣздная

брусничныя—*Vaccinieae* DC.

Травы; цвѣтки 5-ные; тычинокъ 5 . . . . . 137.


137. Травы съ колючими листьями; цвѣтки въ шаровидной головкѣ: каждый цвѣтокъ съ обверткою изъ колючихъ пленокъ и съ чашечкою изъ щетинокъ; вѣнчикъ трубчатый; тычинки срослись пыльниками въ трубку; завязь простая; сѣмянка съ щетинистою коронкою. Уклонная форма: мордовники—*Echinos L.*, безъ общей обвертки вокругъ всей головки. . . . . изъ сем. сложноцвѣтныхъ—

*Compositae* Adans.



(Рис. 134).

Травы безъ колючихъ листьевъ; чашечка изъ 5 зеленыхъ долей (рис. 134, а, b) вѣнчикъ колокольчатый (а); тычинки свободныя, иногда спаяны лишь пыльниками; завязь 2-3-гнѣздная; коробочка (b), вскрывающаяся дырочками. . . . . колокольчиковыя—*Campanulaceae* Juss.





## II

### ОПРЕДѢЛИТЕЛЬ РОДОВЪ.

**I. Abietineae Rich.**—еловыя. Хвойныя деревья, голосѣменные, однодомныя, съ голыми цвѣтками въ шишкахъ: мужскіе—изъ однихъ пыльниковъ, женскіе—изъ голыхъ сѣменопочекъ, прикрытыхъ прицвѣтными чешуйками.

1. Иглы на вѣтвяхъ сидятъ пучками, по 2 и болѣе; зрѣлыя шишки съ деревянистыми чешуйками. . . . . 2.

Иглы на вѣтвяхъ сидятъ по одиночкѣ, не пучками; зрѣлыя шишки съ кожистыми чешуйками, къ верхушкѣ тонкими. . . . . 3.

2. Иглы колючія, зимующія, по 2—5 вмѣстѣ; мужскія шишки скучены въ большомъ числѣ; чешуйки въ зрѣлыхъ женскихъ шишкахъ къ верхушкѣ толстыя (рис. 135); сѣмена съ опадающимъ крыломъ или безъ крыла; сосны—


**Pinus L.**

Иглы мягкія, опадающія, цѣлыми пучками; (Рис. 135). (Рис. 136). мужскія шишки по одиночкѣ; чешуйки въ зрѣлыхъ женскихъ шишкахъ къ верхушкѣ тонкія (рис. 136); сѣмена съ остающимся крыломъ. . . . . лиственницы—\***Larix DuRoi.**

3. Иглы 4-гранныя, попеременно расположенныя вдоль вѣтвей; пыльники вскрываются продольною щелью (рис. 137, а); шишки повислыя; зрѣлыя



(Рис. 137).



(Рис. 138).


отваливаются цѣликомъ; чешуйки на верхушкѣ усѣченныя (b, c). . . . . ели—**Picea Lk.**

Иглы плоскія, снизу бѣлесоватыя, почти 2-рядныя; пыльники растрескиваются поперекъ; шишки торчащія; зрѣлыя чешуйки ихъ (рис. 138) осыпаются со стержня. . . . . пихты—\***Abies DC.**

**II. Alismaceae Rich.**—частуховыя. Болотныя травы, односѣменодольныя, съ листьями корневыми на длинныхъ черешкахъ, съ чашечкою и вѣнчикомъ 3-листными и многими пестиками, образующими сборный плодъ.

**а.** Цвѣтки въ мутовчатыхъ метелкахъ, обоеполые, о 6 тычинкахъ (рис. 139, а); плоды сплюснутые расположены кружкомъ на плоскомъ плодоложѣ (с); столбики опадающіе (b); листья яйцевидные . . . частухи—*Alisma* L.

**б.** Цвѣтки въ мутовчатыхъ кистяхъ, однополые (рис. 140—а, b); верхнія мутовки мужскія, нижнія—женскія; тычинокъ много; плоды крылатые, образуютъ родъ головки на выпукломъ плодоложѣ (рис. 140); столбики остающіеся; листья стрѣловидные . . . стрѣлолисты—*Sagittaria* L.



(Рис. 139).



(Рис. 140).

**III. Alsineae DC.**—мокричныя. Травы съ супротивными листьями, съ цвѣтками изъ свободныхъ лепестковъ и чашелистиковъ; тычинки прикрѣплены къ железистому кольцу на днѣ чашечки; завязь простая съ центральнымъ сѣменосомъ, о 2—5 столбикахъ; коробочка.

**1.** Листья съ пленчатыми, б. ч. бѣлыми и блестящими прилистниками, узкіе, нитевидные, нѣсколько мясистые; цвѣтокъ 5-ной; плодоножки отогнуты подъ острымъ угломъ; коробочныхъ створокъ столько же, сколько столбиковъ (3 или 5); сѣмена съ мелкими точечками или съ бородавочками; стебель вѣтвистый, лежащій или приподнимающійся . . . 2.



(Рис. 141).



(Рис. 142).



(Рис. 143).

Листья безъ прилистниковъ; цвѣтокъ 5-ой о 10 (5) тычинкахъ или 4-ой о 8 (4) тычинкахъ; столбиковъ 2—5; коробочка вскрывается створками или зубцами . . . 3.

**2.** Листья въ ложныхъ мутовкахъ—пучками на укороченныхъ вѣтвяхъ; цвѣтки бѣлые; столбиковъ и коробочныхъ створокъ 5 (рис. 141); сѣмена чечевицеобразныя, съ крылатымъ ободкомъ . . . торицы—*Spargula* L.

Листья безъ мутовчатыхъ пучковъ; цвѣтки розовые; столбиковъ и коробочныхъ створокъ 3 (рис. 142); сѣмена безъ ободка, треугольно-яйцевидныя; тычинки паружнаго ряда при основаніи нитей съ 2 железками . . . торичники—*Spergularia* Pers.

3. Лепестки цельные, иногда слегка выемчатые . . . . . 4.  
 Лепестки раздвоенные; коробочных створок вдвое больше числа столбиковъ . . . . . 7.  
 4. Пары линейных листьев сростаются при основаніи въ общее влагалище; цвѣтокъ 4-ой о 4 тычинкахъ или 5-ой о 10 тычинкахъ (рис. 143); столбиковъ и коробочныхъ створокъ 4 или 5. . . . . мшанки—*Sagina* L.  
 Пары листьев свободны при основаніи; цвѣтокъ 5-ой о 10 (5) тычинкахъ; столбиковъ 3 . . . . . 5.  
 5. Тычинковые нити наружнаго ряда при основаніи съ 2 железками; коробочныхъ створокъ 3 (рис. 144) . . . . . мокричники—*Alsine* Wahlb.



(Рис. 144).



(Рис. 145).



Рис. 146).

- Всѣ тычинковыя нити безъ железокъ; коробочки вскрываются 6 зубцами или 6 створками. . . . . 6.  
 6. Коробочки вскрываются до половины 6 закручивающимися створками (рис. 145); сѣмена гладкія, блестящія, съ придаткомъ у рубчика. . . . . мериингія—*Moehringia* L.  
 Коробочки вскрываются 6 мелкими зубцами (рис. 146); сѣмена бугорчатая, почковидныя, безъ придатка . . . . . песчанки—*Arenaria* L.



(Рис. 147).



(Рис. 148).



(Рис. 149).

- 7(3). Лепестки 2-лопастные или остро-выемчатые (рис. 147); коробочки трубчатые, нѣсколько согнутыя, вскрываются 10 зубцами; столбиковъ 5 . . . . . ясколки—*Cerastium* L.  
 Лепестки глубоко 2-раздѣльные или 2-разсѣченные (рис. 148, а) . . . . . 8.  
 8. Столбиковъ 5; коробочки расщепляются до половины на 5 створокъ, на верхушкѣ раздвоенныхъ (рис. 148, б) . . . . . мягковолосники—*Malachium* Fr.  
 Столбиковъ 3; коробочки о 6 зубцахъ или створкахъ (рис. 149) . . . . . звѣздчатки—*Stellaria* L.

IV. *Amygdàleae* A. Ju s.—миндальныя. Кусты; листья очередные, съ прилистниками; 5 лепестковъ и 20 тычинокъ прикрѣплены къ железистому диску чашечки, съ расширеннымъ цвѣтоложемъ, охватывающимъ простую завязь (рис. 150) съ срединнымъ столбикомъ; костянка:



(Рис. 150).



(Рис. 151).



а. Цвѣтоложе чашевидное (рис. 150); вѣничикъ бѣлый; костянка сочная; листья развертываются въ одно время съ цвѣтками или ранѣе . . . сливы—*Prunus* L.

б. Цвѣтоложе трубчато-колокольчатое (рис. 151), пурпуровое; вѣничикъ розовый; костянка сухая; листья развиваются послѣ цвѣтковъ . . .

миндали—\* *Amygdalus* L.


V. *Arbuteae* DC.—толокнянковые. Мелкіе кусты съ цѣльными, кожистыми, зимующими листьями; цвѣтокъ 5-ой: вѣничикъ 5-зубчатый, кувшинчатый или кубарчатый; 10 тычинокъ прикрѣплены къ краю цвѣточного диска.

1. Чашечка 5-раздѣльная, тупая; костянка, въ видѣ ягоды, о 5 косточкахъ; листья сѣтчато-нервные (рис. 152) . . . толокнянки—*Arctostaphylos* Adans.


Чашечка о 5 острыхъ зубцахъ или доляхъ (рис. 154, а); коробочка 5-гнѣздная; створки, раскрываясь, отдѣляются вмѣстѣ съ перегородками. . . . 2.



(Рис. 152).



(Рис. 153).



(Рис. 154).


2. Чашечка съ 2 прицвѣтниками при основаніи (рис. 153, а); пыльниковыя гнѣзда безъ придатковъ вытянуты въ трубчатые отростки, вскрывающіеся на верхушкѣ дырочками (b); наружная оболочка коробочки отдѣляется отъ внутренней, распадающейся на 10 створокъ. . . кассандра—*Cassandra* Don

Чашечка безъ прицвѣтниковъ (рис. 154, а); пыльниковыя гнѣзда на верхушкѣ съ шиловиднымъ согнутымъ придаткомъ (рис. 154, справа), подъ которыми они вскрываются дырочками; коробочка раскрывается 5 створками . . . . . андромеда—*Andròmeda* L.


VI. *Aristolochiàceae* Juss.—кирказоновыя. Листья широкіе, глубоко-сердцевидные, на длинныхъ черешкахъ; цвѣтки пазушные; околоцвѣтникъ простой; завязь нижняя; 6-гнѣздная коробочка. . . . . 14.

1. Стебель лежачий, съ ползучимъ корневищемъ; листья попарно-сближенные, зимующіе; околоцвѣтникъ правильный, колокольчатый, 3-лопастной, остающийся (рис. 155, а); 12 свободныхъ тычинокъ съ выступающимъ связникомъ (b); рыльце 6-лучевое (b) . . . . . гоштыени—*Asarum* L.


Стебель извилистый или вьющійся; листья очередные; околоцвѣтникъ не вполне правильный, трубчатый, опадающій; тычинокъ 6, приросшихъ пыльниками къ столбику; рыльце лопастное (рис. 156, b) . . . . . 2.



(Рис. 155).



(Рис. 156).




(Рис. 157).

2. Стебель травянистый, извилистый, простой; трубка околоцвѣтника прямая, съ язычковымъ отгибомъ (рис. 156, а); рыльце 6-лопастное (b), подъ нимъ 6-зубчатое кольцо. . . . . кирказоны—*Aristolochia* L.


Кустъ вьющійся, вѣтвистый; трубка околоцвѣтника согнутая, отгибъ правильный, 3-лопастной (рис. 157); рыльце 3-лопастное; зубчатого кольца нѣтъ. . . . . сифонники—*\*Siphisia* Rafin.

VII. *Araceae* Juss.—аронниковыя. Болотныя травы, односѣменодольныя, съ корневыми влагалищными листьями; цвѣтки въ початкѣ съ большимъ прицвѣтнымъ листомъ—крыломъ или чехломъ; завязь съ сидячимъ рыльцемъ.

а. Початокъ охваченъ широкимъ плоскимъ, сверху бѣлымъ, крыломъ; цвѣтки голые изъ простыхъ пестиковъ, отдѣленныхъ тычинками (рис. 158—а, b); красная, сочная ягода (с); листья на длинныхъ черешкахъ, яйцевидные . . . . . бѣлокрыльники—*Calla* L.



(Рис. 158).



(Рис. 159).

б. Початокъ отклоненъ вбокъ длиннымъ мечевиднымъ зеленымъ крыломъ, составляющимъ какъ бы продолженіе такого же мечевиднаго цвѣтоноса; околоцвѣтникъ изъ 6 пленокъ, съ 6 тычинками и почти 6-гранною, 3-гнѣздною завязью (рис. 159); 3-гнѣздная сухая ягода; листья мечевидные . . . . .

айры—*Acorus* L.

**VIII. Betulaceae A. Br.**—березовыя. Деревья и кусты однодомные; листья цѣльные, очередные, съ опадающими прилистниками; мужскіе цвѣтки въ частыхъ сережкахъ, состоящихъ изъ прицвѣтныхъ чешуекъ; женскіе—въ чешуйчатыхъ колосьяхъ, въ видѣ шишекъ или почекъ (рис. 160), безъ развитаго околоцвѣтника; за каждую чешуйкою по 2—3 двугнѣзныя завязи вмѣстѣ, о 2 нитевидныхъ пурпуровыхъ рыльцахъ.




(Рис. 160).


1. Женскій колосъ въ видѣ чешуйчатой почки (рис. 160); за чешуйкою по 2 цвѣтка вмѣстѣ, со свободнымъ зубчатымъ краемъ околоцвѣтника (рис. 161, d); одногнѣзменный орѣхъ заключенъ въ неправильно надрѣзанную обвертку; мужскіе цвѣтки голые, по одному въ пазухѣ прицвѣтной чешуйки, о 4 тычинкахъ (a, b), раздвоенныхъ до самаго конца нитей, такъ что ихъ кажется 8; гнѣзда пыльниковъ съ хохолкомъ на верхушкѣ (c); молодые вѣтви и листовые черешки съ железистыми волосками (рис. 160); цвѣтки развертываются ранѣ листьевъ.

лещины—*Corylus* L.

Женскій колосъ въ видѣ шишки; околоцвѣтникъ женскаго цвѣтка сросшійся съ завязью, безъ явственнаго свободного края; орѣшекъ безъ обвертки; мужской



(Рис. 161).




(Рис. 162).

цвѣтокъ съ зачаточнымъ околоцвѣтникомъ, по 3 цвѣтка за каждую прицвѣтную чешуйкою въ видѣ щитка; пыльники безъ хохолка.

2. Листовыя почки сидячія, распускаются въ одно время съ цвѣтками; женскія шишки одиночныя, по 3 цвѣтка за каждую изъ 3-лопастныхъ чешуекъ (рис. 162—e, f, g), которыя становятся кожистыми и опадаютъ вмѣстѣ съ 2-крылымъ, 2-гнѣзднымъ орѣшкомъ (h); изъ 4 листковъ мужскаго околоцвѣтника развивается только одинъ; тычинокъ 2 (3), раздвоенныхъ до основанія нитей (d), такъ что ихъ кажется 4 (6).

березы—*Betula* L.

Листовыя почки стебельчатыя, развертываются послѣ сережекъ; женскихъ шишекъ по нѣскольку вмѣстѣ; по 2 цвѣтка (рис. 163, c) за каждую изъ чешуекъ; деревенящихся (d) и остающихся даже по опаденіи некрылатыхъ орѣшковъ (e); околоцвѣтникъ мужскихъ цвѣтковъ 4-раздѣльный (b, a); тычинокъ 4, съ одними только раздвоенными пыльниками (b).



(Рис. 163)

ольхи—*Alnus* L.



**IX. Borragineae Juss.**—бурачниковыя. Травы съ очередными, б. ч. цѣльно-крайними, щетинистыми или волосистыми листьями; цвѣтокъ 5-ой: чашечка остающаяся; вѣнчикъ спайнолепестный, 5 тычинокъ; завязь 4-раздѣльная съ 1 столбикомъ; 4 орѣшка.

1. Всѣ цвѣтки въ пазухѣ стеблевыхъ, верхнихъ или прицвѣтныхъ, листьевъ . . . . . 2.

Всѣ цвѣтки или, по крайней мѣрѣ, верхніе въ голыхъ, ложныхъ кистяхъ, б. ч. однобочныхъ и вначалѣ спирально свернутыхъ—въ завиткахъ. . . . . 9.

2. Цвѣтки одиночные въ пазухѣ простыхъ стеблевыхъ листьевъ, не образующихъ завитка: . . . . . 3.

Цвѣтки въ пазухѣ прицвѣтныхъ листьевъ завитками . . . . . 4.

3. Стебель лежачій, цѣпкій, со щетинистыми листьями; доли 5-надрѣзной чашечки съ двойными промежуточными зубцами; чашечка, по отцвѣтаніи, разрастается въ 2 сложенные, выемчато-зубчатые, листочки (рис. 164); цвѣтки мелкіе, лиловые; зѣвъ закрытъ 5 полыми чешуйками; орѣшки приросли къ срединному столбцу . . . . . острѣцы—*Asperugo* L.



(Рис. 164).


Стебель прямой, шершавый, какъ и листья; чашечка 5-раздѣльная (рис. 165—a, b); вѣнчикъ бѣловатый или зеленоватый, съ открытымъ зѣвомъ и мел-



(Рис. 165).



(Рис. 166).



(Рис. 167)

кими чешуйками или складками въ немъ (с); орѣшки свободные, каменистые. . . . . воробейники—*Lithospermum* L.

4. Тычинки или, по крайней мѣрѣ, пыльники выступаютъ изъ вѣнчика; цвѣтки крупные . . . . . 5.

Тычинки съ пыльниками заключены въ трубку вѣнчика; цвѣтки мелкіе. . . . . 6.



(Рис. 168).



(Рис. 169).



(Рис. 170).

5. Вѣнчикъ неправильный, колокольчато-ворончатый, съ неравно-лопастнымъ отгибомъ, почти 2-губымъ (рис. 166) и голымъ зѣвомъ; тычинки съ длинными согнутыми неравными нитями; столбикъ длиннѣе вѣнчика съ 2-лопастнымъ рыльцемъ . . . . . синяки—*Echium* L.

Вѣнчикъ правильный, колесовидно-звѣздчатый (рис. 167, a); зѣвъ закрытъ

короткими чешуйками; пыльники сходятся конусомъ (а, b); нити ихъ вверху съ шиловиднымъ отросткомъ (с); чашечка раскрытая . . . . .

бурачники—*Borràgo* L.

6. Отгибъ вѣнчика косой, неправильный; трубка его согнута (рис. 168); зѣвъ закрытъ бородастыми чешуйками; орѣшки неравнобокіе, покрыты сѣтчатыми морщинками . . . . . кривоцвѣты—*Lycòpsis* L.

Вѣнчикъ правильный, трубка его прямая. . . . . 7.

7. Чашечка колокольчатая, 5-надрѣзная (рис. 169, а), плодоносная—вздутая (b); вѣнчикъ темно-краснобурый съ открытымъ бородастымъ зѣвомъ; орѣшки сѣтчато-морщинистые, съ сильно складчатымъ колечкомъ при основаніи . . . . .


понея—*Nönnæa* Medic.

Чашечка глубоко 5-раздѣльная, вполнѣдствіи съ растопыренными долями; вѣнчикъ свѣтлоголубой, закрытый короткими чешуйками; орѣшки приросшіе къ срединному столбцу . . . . . 8.

8. Цвѣтоножки короче чашечки, плодоносныя торчащія; орѣшки съ крючковатыми щетинками, приросшіе всѣмъ внутреннимъ краемъ къ срединному столбцу (рис. 170, b). . . . . липучки—*Echinospèrmum* Swartz

Цвѣтоножки длинныя, по отцвѣтаніи отогнутыя; орѣшки снаружи углубленные, съ перепончатымъ завороченнымъ краемъ (рис. 171), приросшіе только основаніемъ внутренней стороны къ срединному столбцу . . . . . пупочники—

*Omphalòdes* Moench



(Рис. 171).

(Рис. 172).

(Рис. 173).

9. (1). Чашечка 5-гранная, трубчатая, 5-зубчатая (рис. 172, а), вполнѣдствіи вздутая; вѣнчикъ ворончатый съ открытымъ зѣвомъ, о 5 пучкахъ волосковъ (b); рыльце 2-губое (с) . . . . . медуніцы—*Pulmonària* L.

Чашечка не 5-гранная; вѣнчикъ съ зѣвомъ, закрытымъ чешуйками; рыльце головчатое . . . . . 10.

10. Стебель и листья съ жесткими щетинками на бородавочкахъ . . . . . 11.

Стебель и листья съ мягкими волосками . . . . . 12.

11. Столбикъ выступаетъ изъ булавовиднаго грязнопурпуроваго вѣнчика (рис. 173, а); чешуйки въ зѣвѣ большія, шиловидныя, длиннозаостренныя, сходятся конусомъ (b) . . . . . окопники—*Symphytum* L.

Столбикъ заключенъ въ вѣнчикъ ворончато-колесовидномъ (рис. 174, b), краснолиловаго цвѣта; чешуйки въ зѣвѣ тупыя, бахромчатыя; орѣшки сѣтчато-морщинистые, бугорчатые, прикрѣплены къ плоскому ложу . . . . .


румянки—*Anchùsa* L.

12. Вѣнчикъ ворончатый (рис. 175, а), грязнокрасный; чешуйки въ зѣвѣ большія, выпуклыя (b); орѣшки съ крючковатыми щетинками приросли вверху къ столбцу (d) . . . . . чернокорни—*Cynoglòssum* L.

Вѣнчикъ блюдчатый (рис. 176, а), голубой, иногда красноватый; чешуйки мелкія, желтыя, образуютъ выпуклое кольцо въ зѣвѣ (а, b); орѣшки гладкіе, свободные (d) . . . . . незабудки—*Myosòtis* L.



(Рис. 174).



(Рис. 175).




(Рис. 176).

**X. Campanulaceae** Juss — колокольчиковыя. Листья очередные, цѣльные; цвѣтки полные, 5-ные: вѣнчикъ правильный, снαιοлепестный, верхній, увядающій; тычинокъ 5 на нижней завязи; столбикъ о 2, 3 нитевидныхъ рыльцахъ; коробочка 2,3-гнѣздная.

1. Цвѣтки крупныя, въ кистяхъ, рѣже въ головкахъ, вершинныхъ и пазушныхъ, но безъ обвертки; вѣнчикъ колокольчатый, 5-лопастной (рис. 177, а); тычинковыя нити расширены, рылецъ 3 (b); коробочка кубарчатая, 3-гнѣздная, вскрывающаяся тремя боковыми дырочками (d, c) . . . . .

колокольчики—*Campanula* L.

Цвѣтки мелкіе, въ верхушечныхъ головкахъ или колосьяхъ, съ многولیстною обверткою; вѣнчикъ глубоко 5-раздѣльный; доли его линейныя, слипшіяся, отдѣляющіяся снизу вверхъ; 2 рыльца; коробочка почти шаровидная, 2-гнѣздная . . . . . 2.



(Рис. 177).



(Рис. 178).



(Рис. 179).

2. Цвѣтки на короткихъ ножкахъ (рис. 178), въ головчатомъ зонтикѣ, въ видѣ корзинки; пыльники внизу слипшіяся; тычинковыя нити тонкія; коробочка вскрывается вверхъ 2 маленькими створками . . . . . букашники—*Jasione* L.

Цвѣтки вполнѣ сидячіе (рис. 179), въ колосѣ съ обверткою; пыльники свободные; тычинковыя нити внизу расширены; гнѣзда коробочки вскрываются боковыми дырочками; слипшіяся доли вѣнчика образуютъ изогнутую трубку. . . . .

фитейма—† *Phyteuma* L.

**XI. Cannabineae Blume**—конопляныя. Двудомныя травы съ прилистниками и супротивными листьями; цвѣтки неполные: мужскіе въ метелкахъ съ 5-раздѣльнымъ околоцвѣтникомъ о 5 тычинкахъ, съ прямыми нитями въ почкахъ; женскіе—въ ложныхъ колосьяхъ состоятъ изъ простой завязи о 2 рыльцахъ, прикрытой прицвѣтникомъ; орѣшекъ.

а. Стебель прямой; листья глубоко-пальчато-разсѣченные; прилистники свободные; метелка скученная; тычинки повислыя (рис. 181); женскіе цвѣтки въ



(Рис. 180).



(Рис. 181).




(Рис. 182).

ложныхъ колосьяхъ, прикрытыхъ листьями; завязь облечена въ свернутый прицвѣтникъ (рис. 180) . . . . . конопля—\* *Cannabis* L.


б. Стебель вьющійся, листья б. м. лопатные; прилистники б. ч. сросшіеся; метелка развѣсистая; тычинки торчащія; женскіе цвѣтки въ колосьяхъ, въ видѣ шишки, съ большими прицвѣтными разрастающимися чешуйками; завязь прикрыта прицвѣтникомъ, не свернутымъ (рис. 182) . . . хмѣли—*Humulus* L.

**XII. Caprifoliaceae Juss.**—жимолюстныя. Листья супротивные; цвѣтки полные; вѣтничекъ цѣльный, верхній, доли его въ почкосложеніи черепичатомъ; тычинки приросшія къ трубкѣ вѣничка; завязь нижняя или полунижняя, 2—5-гнѣздная ягода или костянка.


1. Цвѣтки въ верхушечной головкѣ; долей чашечки меньше долей вѣничка (рис. 183); верхній цвѣтокъ 4-ой (с), съ 2-лопастною чашечкою (d); осталь-



(Рис. 183).



(Рис. 184).



(Рис. 185).

ныя 5-ые, съ 3-лопастною чашечкою (b), на половину сросшиеся съ завязью (полунижнею), и съ 5 тычинками, раздвоенными до низу, такъ что ихъ кажется 10 (a); столбиковъ 5; ягода съ остающеюся разросшеюся чашечкою и со столбиками; мелкія травы съ 2 супротивными листьями . . . адокса—*Adoxa* L.

Цвѣтки въ полузонтикахъ, клубочкахъ или попарно; долей чашечки по числу долей вѣничка; тычинки не раздвоенныя; столбикъ 1 или его вовсе нѣтъ . . . 2.

2. Цвѣтки въ развѣсистыхъ полузонтикахъ, съ вѣничкомъ колесовиднымъ или чашевиднымъ, правильнымъ (рис. 184, a) и 5-зубчатою чашечкою (b), о 5 тычинкахъ (a) и о 3 почти сидячихъ рыльцахъ. . . . . 3.

Цвѣтки попарно или въ клубочкахъ, съ трубчатымъ вѣнчикомъ, б. м. неправильнымъ; чашечная трубка вполне срослась съ завязью; рыльце головчатое; ягода; листья цѣльнокрайніе. . . . . 4.


3. Листья непарноперистые; вѣнчикъ колесовидный, 5-раздѣльный (рис. 184, а); чашечка на половину срослась съ завязью (полунижнюю, b); костянка о 3 хрящеватыхъ косточкахъ . . . . . бузины—\* *Sambucus* L.

Листья простые, цѣльные или лопастные; вѣнчикъ 5-надрѣзной чашевидный (рис. 185, а) или въ краевыхъ цвѣткахъ колесовидный, лучистый (рис. 185, справа); чашечка вполне срослась съ завязью (нижнюю, —b); костянка обь 1 кожистой косточкѣ . . . . . калины—*Viburnum* L.

4. Цвѣтки, скученные клубочками, въ прерывчатыхъ колосьяхъ, чаще 4-ные; вѣнчикъ колокольчатый (рис. 186, а), съ бахромчатымъ зѣвомъ (b), довольно правильный; завязь 4-губѣзная; ягода круглая, бѣлая; мелкіе кусты . . . . .

плодокучники—\* *Symphoricarpos* Dillen.

Цвѣтки попарно на общемъ цвѣтоносѣ, съ 5-надрѣзнымъ вѣнчикомъ и 3-губѣзною завязью . . . . . 5.



(Рис. 186). . . . . (Рис. 187). . . . . (Рис. 188).

5. Большіе кусты, съ пазушными почками, сидячими попарно—одна надъ другой; цвѣтки со спаренными или спаянными завязями (рис. 187); вѣнчикъ неправильный, трубчато-ворончатый, 2-губый (рис. 188); тычинокъ 5; чашечка о 5 зубчикахъ; ягода сочная, малосѣменная. . . . . жимолости—*Lonicera* L.

Мелкій кустарникъ со стеблемъ стелющимся, нитевиднымъ и съ мелкими зимующими листочками; цвѣтки на ножкахъ попарно на длинномъ цвѣтоносѣ, съ 2 парами прицвѣтниковъ (рис. 189, а); вѣнчикъ ворончато-колокольчатый, слегка неправильный (а); нижняя лопасть больше остальныхъ (b); тычинокъ 4—въ 2-большинствѣ (b); чашечка 5-надрѣзная съ шиловидными, опадающими надрѣзами (с); сухая 1-сѣменная ягода, сросшаяся съ прицвѣтниками . . . . . линнея—*Linnaea* Gronov.



(Рис. 189).

XIII. *Chenopodiaceae* Vent.—маревыя. Цвѣтки неполные или голые; завязь простая, о 2—4 рыльцахъ; сѣмянки, заключенныя въ покровы цвѣтка или прикрытыя прицвѣтникомъ.

1. Цвѣтки обоеполые, рѣдко женскіе; все одинаковой формы . . . . . 2.


Цвѣтки однополые: мужскіе отличаются по формѣ отъ женскихъ; однодомныя или 2-домныя травы . . . . . 5.

2. Цвѣтки голые, обь 1, 2 тычинкахъ и обь 1 завязи съ 2 столбиками (рис. 190), въ пазухѣ прицвѣтниковъ, съ широкимъ пленчатымъ краемъ, расположенныхъ колосомъ; орѣшекъ почти круглый, сплюснутый, крылатый (b, c);

травы съ узкими, цѣльнокрайними, остроконечными листьями . . . . .

клопосѣмянники—*Corispérnum* L.

Цвѣтки съ простымъ околоцвѣтникомъ, 3-или 5-дольнымъ, собраны клубочками, безъ прицвѣтниковъ; сѣмянки заключены въ околоцвѣтникъ. . . . . 3.



(Рис. 190).



(Рис. 191).



(Рис. 192).

3. Околоцвѣтникъ 5-надрѣзной, внизу сросшійся съ завязью, деревенѣющій; 5 тычинокъ прикрѣплены къ мясистому кольцу, окружающему завязь (рис. 191, a); цвѣтки по 2—3 въ клубочкѣ (b), по отцвѣтаніи срастаются своими околоцвѣтниками . . . . . свеклы — *\*Béta* L.

Околоцвѣтникъ 3-или 5-раздѣльный, объ 1, 3, 5 тычинкахъ, прикрѣпленныхъ къ основанію околоцвѣтника, который не срастается со смежными въ клубочкѣ цвѣтками . . . . . 4.

4. Клубочки разсыяны по стеблю, по одному въ пазухѣ листьевъ, или образуютъ голый ложный колосъ; плодоносные, съ сочнымъ мясистымъ краснымъ околоцвѣтникомъ, б. ч. о 3 доляхъ и объ 1 тычинкѣ (рис. 192); плоды стоятъ на ребрѣ вертикально . . . . . жминды — *Blitum* L.

Клубочки скучены въ сложный или метельчатый колосъ, иногда расположены сложнымъ полузонтикомъ; плодоносные съ сухимъ околоцвѣтникомъ (рис. 193)

. . . . . марь — *Chenopodium* L.

5 (1). Однодомныя травы; женскіе цвѣтки б. ч. съ 2 травянистыми, ромбиче-



(Рис. 193).



(Рис. 194).



(Рис. 195).

скими листочками, разрастающимися по отцвѣтаніи (рис. 194, b); 2 не длинныхъ рыльца (a); мужскіе цвѣтки предпочтительно 5-ные (a); иногда женскіе цвѣтки частью схожи съ мужскими . . . . . лебеды — *Atriplex* L.

Двудомныя травы; женскіе цвѣтки назушные, съ 2, 4 зубчатымъ околоцвѣтникомъ; 2 супротивныхъ зубца его срастаются, отвердѣваютъ и облекаютъ плодъ (рис. 195, b); 4 рыльца, очень длинныхъ (a); мужскіе цвѣтки предпочтительно 4-ные, въ клубочкахъ, расположенныхъ колосомъ; листья на длинныхъ черешкахъ . . . . . шпинаты — *\*Spinacia* L.

XIV. *Compòsitae* Adans. — сложноцвѣтныя. Цвѣтки мелкіе скучены въ головку, окруженную почти всегда общею обверткою, съ нижнею завязью и зачаточною чашечкою въ видѣ пленокъ, щетинокъ, волосковъ, образующихъ на



сѣмянкѣ хохолокъ или коронку; вѣнчикъ спайнолепестный, верхній, съ приросшими къ нему 5 тычинками, почти всегда сросшимися пыльниками (въ одномъ лишь случаѣ—у *Супага*—и нитями, и только въ одномъ свободными—у *Xanthium*); столбикъ съ 2 нитевидными рыльцами; сѣмянки.

1. Однодомныя травы съ корзинками однополыми: верхними—мужскими, сученными въ клубочки (рис. 196, а), и нижними, пазушными—женскими (с); мужскія съ 1-рядною, почти шаровидною обверткою и пленчатымъ ложемъ о многихъ трубчатыхъ цвѣткахъ (а), зеленоватыхъ, о 5 свободныхъ тычинкахъ, не сросшихся пыльниками (b); женскія—съ 2-створчатою обверткою, вытянутою на верхушкѣ въ 2 рожка, о 2 цвѣткахъ (с, d); обвертка разростается, твердеетъ и заключаетъ 2 продолговатыя сѣмянки... дурнышники—*Xanthium* L.

Травы обоеполия, рѣдко многобрачныя, еще рѣже 2-домныя; пыльники спаяны между собою въ трубку, чрезъ которую въ обоеполыхъ цвѣткахъ проходитъ столбикъ съ 2-лопастнымъ рыльцемъ.

2. Всѣ цвѣтки трубчатые или только краевые язычковые, или же нитевидные.


Всѣ цвѣтки въ корзинкахъ язычковые.

3. Цвѣтки сучены въ частую шаровидную головку, не окруженную снизу обверткою, всѣ трубчатые, обоеполые (рис. 197, а), съ синими пыльниками; каждый цвѣтокъ съ частною обверткою, состоящею изъ 3 рядовъ пленокъ (а); сѣмянки цилиндрическія съ щетинистою коронкою (b).

мордовники—*Echinops* L.

Цвѣтки въ корзинкѣ окружены снизу общею обверткою.

4. Сѣмянки безъ волосистаго хохолка, а лишь иногда съ пленчатою коронкою или съ немногими (2, 4) щетинками или остями.




(Рис. 196).



(Рис. 197).



(Рис. 198).



(Рис. 199).

Сѣмянки съ волосистымъ хохолкомъ: перистымъ или простымъ, или же съ щетинистымъ—изъ цѣлаго пучка щетинокъ.

5. Обвертка 2-рядная (рис. 198, а).

Обвертка многорядная, черепчатая.

6. Чешуйки обвертки равныя (рис. 198, а); всѣ листья корневые, розеткою; стрѣлка обѣ 1 корзинкѣ, съ краевыми цвѣтками язычковыми, женскими, бѣлыми или розоватыми; срединные цвѣтки желтые, на выпукломъ голомъ ложѣ (а); сѣмянки безъ всякой коронки, обратно яйцевидныя, сплюснутыя, гладкія (b).

маргаритки—† *Bellis* L.

Наружныя чешуйки обвертки отогнуты, шире внутреннихъ; стебель покрытъ

супротивными листьями; корзинок б. ч. несколько, почти всегда с одними трубчатыми желтыми цветками (рис. 199, а), редко с лучевыми, неплодучими; ложе плоское с опадающими пленками; семянки с 2, 4 остями или щетинками, вниз зазубренными (а, б); пыльники черноватые. . . . череды—*Bidens* L.

7. Корзинки мелкие, шаровидные или овальные, в очень большом числе, в густых соцветиях; семянки обратно ланцетные, гладкие, без коронки. . . 8.

Корзинки б. м. крупные, в ограниченном числе, в редких щитках, иногда одиночные; краевые цветки б. ч. язычковые, иногда колокольчато-трубчатые, т. е. такой же формы, как и срединные. . . . 9.

8. Корзинки в частых метелках; краевые цветки не лучистые, нитевидные, женские (рис. 200), или их вовсе нет; все желтоватые или буроватые; ложе без пленок; пыльники на верхушке с нитевидным отростком. . .

полынь—*Artemisia* L.

Корзинки в частых щитках; краевых цветков мало: 5—10, с округлым коротким язычком, не длиннее обертки (рис. 201, а); срединные цветки со сплюснутой 2-крылою трубкою (б); ложе с пленками (б); чешуйки обертки с темным ободком; семянки сплюснутые. . . .

тысячелистники—*Achillea* L.

9. Наружные чешуйки обертки зеленые, листовидные; корзинки очень крупные; листья пильные, большие и широкие; все цветки желтые; ложе пленчатое; семянки с коронкою. . . . 10.



(Рис. 200).



(Рис. 201).



(Рис. 202).



(Рис. 203).



(Рис. 204).

Все чешуйки обертки пленчатые, с перепончатым, бурым или светлым краем; корзинки небольшие, листья перистораздельные, реже зубчатые. . . 11.

10. Краевые цветки бесполое, с широким язычком; пленки ложа охватывают 4-гранные семянки, с коронкою из 2, 4 пленок (рис. 202); пыльники черноватые, безхвостые. . . . подсолнечники—\* *Helianthus* L.

Краевые цветки женские, с узким линейным язычком; семянки линейные, цилиндрические, бороздчатые, с пильною коронкою (рис. 203—а, б); пыльники хвостатые. . . . телекия—† *Telèkia* Baumg.

11. Ложе с пленками (рис. 204, а); сильно выпуклое: полушаровидное или коническое; обертка полушаровидная или плоская, трубка срединных цветков сплюснутая, крылатая, с 2 крыльями; семянки с обеих сторон равномерно покрыты бороздками, к верхушке усечены (б). . . .

пухляки—*Anthemis* L.

Ложе без пленок; трубка срединных цветков цилиндрическая, нерядко приплюснутая, но не крылатая. . . . 12.

12. Ложе коническое, часто полое (рис. 205—а, б); обертка полушаровидная,


сильно выпуклая; листья перисторазсеченные на узкия, почти линейныя доли; бороздки покрывают сѣмянки неравномѣрно: онѣ сближены въ числѣ 5 или 3 на внутренней сторонѣ сѣмянокъ (с). . . . . ромашки—*Matricaria* L.

Ложе выпуклое или полушаровидное; листья зубчатые или перистораздѣльные, но доли ихъ не линейныя; сѣмянки равномѣрно покрыты 5 или 10 полосками (рис. 206, б). . . . . 13.

13. Корзинки одиночныя, крупныя; листья зубчатые, почти голые; коронки нѣтъ на всѣхъ сѣмянкахъ или есть только на краевыхъ (рис. 206, а); краевые цвѣтки бѣлые. . . . . нивяники—*Leucanthemum* Tourn.

Корзинокъ много въ щиткахъ; всѣ сѣмянки съ пленчатою коронкою, о 5 ребрышкахъ. . . . . 14.

14. Краевые цвѣтки трубчатые (рис. 207, б), какъ и срединные; всѣ ярко-желтые; листья кожистые, ямчато-точечные; чешуйки обертки тупыя (а), на



(Рис. 205). . . . . (Рис. 206). . . . . (Рис. 207). . . . . (Рис. 208).

верхушкѣ съ широкимъ, черноватымъ перепончатымъ краемъ; сѣмянки кубарчатая (с); сильно пахучія травы, въ густыхъ щиткахъ. . . . . пижмы—

*Tanacetum* L.

Краевые цвѣтки язычковые (рис. 208), бѣлые; листья не кожистые и безъ точечныхъ ямокъ, но плотные; травы не пахучія, въ рѣдкихъ щиткахъ; наружныя чешуйки обертки острыя; внутреннія тупыя, расщепленныя на концѣ.

поповники—† *Pyræthrum* Gaertn.

15 (4). Хохолокъ изъ простыхъ тонкихъ, гибкихъ волосковъ или изъ жесткихъ щетинокъ. . . . . 16.

Хохолокъ изъ вѣтвистыхъ или перистыхъ волосковъ, спаянныхъ надъ сѣмянкою въ кольцо; чешуйки обертки и листья б. ч. колючие. . . . . 34.

16. Всѣ листья супротивныя, глубоко-пальчато-3, 5-разсѣченныя; корзинки частымъ щиткомъ, малочвѣтныя (рис. 209, а); всѣ цвѣтки трубчатые, обоюполые, грязно-розовые, съ длинными нитевидными рыльцами (а, б); ложе голое; обертка цилиндрическая, изъ немногихъ чешуекъ (а); сѣмянки цилиндрическія, ребристыя (б). . . . . посконники—

*Eupatèrium* L. (Рис. 209).



Листья очередные или только одни корневые. . . . . 17.

17. Обертка корзинокъ 1-рядная, чашевидная, съ прицвѣтниками при основаніи, образующими наружную обертку (рис. 210), или безъ прицвѣтниковъ; ложе голое. . . . . 18.

Обертка многорядная, черепчатая. . . . . 21.

18. Всѣ листья корневые, сердцевидные, на длинныхъ черешкахъ; корзинки на цвѣтоносѣ, покрытомъ одними чешуйчатыми листьями; сѣмянки цилиндрическія, утоненныя къ концамъ; цвѣтутъ ранѣе развертыванія листьевъ . . . 19.

Стебель покрытъ листьями; цвѣтки желтые, краевые—женскіе . . . 20.

19. Цвѣтоносѣ обѣ одной корзинкѣ, съ желтыми цвѣтками; краевые язычковые, многорядные, женскіе; срединные — трубчатые, обоеполые, неплодучіе (рис. 210) . . . . . подбѣлы—*Tussilago* L.

Цвѣтоносѣ съ корзинками въ кистяхъ, щиткахъ или метелкахъ; цвѣтки желтовато-бѣлые или розоватые; травы 2-домныя или многобрачныя: въ женскихъ корзинкахъ цвѣтки нитевидные (рис. 211, а), многорядные, съ немно-



(Рис. 210).



(Рис. 211).



(Рис. 212).



(Рис. 213).

гими обоеполыми въ срединѣ (с); въ мужскихъ или обоеполыхъ—только 1 рядъ женскихъ цвѣтковъ или всѣ обоеполые, не плодучіе . . . бѣлокопытники—


*Petasites* Gaertn.

20. Корзинки щиткомъ, торчащія; обертка безъ прицвѣтныхъ чешуекъ или съ нѣсколькими короткими чешуйками при основаніи (212, а, б) . . . . .

крестовники—*Senecio* L.

Корзинки кистью, поникшія; обертка съ 2 длинными, супротивными прицвѣтниками при основаніи (рис. 213); краевые цвѣтки язычковые, длинные (рис. 213) . . . . . бузульники—*Ligularia* Cass.

21 (17). Краевые цвѣтки въ корзинкахъ язычковые, съ большимъ длиннымъ или широкимъ язычкомъ (рис. 214, а), остальные — короткіе, трубчатые



(Рис. 214).



(Рис. 215).



(Рис. 216).

(б); ложе голое, ровное; листья цѣльные и цѣльнокрайніе . . . . . 22.

Краевые цвѣтки съ малозамѣтнымъ язычкомъ или же трубчатые, какъ и срединные . . . . . 25.

22. Всѣ цвѣтки, какъ срединные, такъ и краевые, одноцвѣтные—желтые; сѣмянки цилиндрическія . . . . . 23.

Только срединные цвѣтки желтые; краевые синіе или лиловые; сѣмянки сплюснутыя . . . . . 24.


23. Корзинки въ рѣдкихъ щиткахъ — большія, со многими лучевыми цвѣтками; пыльники хвостатые (рис. 214). . . . . девясилы — *Inula* L.

Корзинки въ густыхъ щиткахъ, мелкія, о немногихъ лучевыхъ цвѣткахъ; пыльники безхвостые, сѣмянки ребристыя, утоненныя къ концамъ (рис. 215).

. . . . . золотарники — *Solidago* L.

24. Лучевые цвѣтки безполые (рис. 216, б); листья точечно-надколотые . . . . . солонечники — *Galatella* Cass.

Лучевые цвѣтки женскіе (рис. 217, а); листья безъ точечныхъ наколовъ . . . . . астры — *Aster* L.



(Рис. 217).



(Рис. 218).




(Рис. 219).

25 (21). Корзинки мелкія, скученныя въ большомъ числѣ, съ цвѣтками, едва выступающими за верхній край обертки; краевые цвѣтки нитевидные, женскіе; ложе голое, ровное, листья цѣльнокрайніе . . . . . 26.

Корзинки крупныя, рѣдкія; всѣ цвѣтки трубчатые, обоеполые или краевые ворончатые, безполые; ложе пленчато-щетиnistое . . . . . 30.

26. Чешуйки обертки травянистыя, зеленныя; листья волосистые или щетинистые; нитевидные женскіе цвѣтки многорядные (рис. 218); рыльца короткія; ложе ямчатое; сѣмянки линейно-удлиненныя. . . . . мелкодегестники — *Erigeron* L.

Чешуйки обертки пленчатая, б. м. окрашенныя, часто блестящія; пушистыя травы, покрытыя бѣлымъ или сѣрымъ войлокомъ; пыльники хвостатые. . . . . 27.



(Рис. 220).



(Рис. 221).



(Рис. 222).

27. Обертка овально-коническая, 5-гранная; чешуйки ея при основаніи травянистыя; въ пазухахъ наружныхъ чешуекъ нитевидные женскіе цвѣтки (рис. 219) съ сѣмянками безъ хохолка; внутренніе цвѣтки обоеполые, 4-зубчатые, желтоватыя. . . . . жабники — *Filago* L.

Обвертка округлая, съ чешуйками вполне пленчатыми, покрашенными, лепестковидными, безъ цвѣтковь въ пазухахъ ихъ; всѣ сѣмянки съ хохолкомъ; внутренніе цвѣтки 5-зубчатые . . . . . 28.

28. Ложе плоское, окруженное большими, многорядными, желтыми пленками (рис. 220, а); нитевидные цвѣтки 1-рядные; ихъ мало или вовсе нѣтъ . . . . .

циины—*Helichrysium* DC.


Ложе выпуклое, окруженное бѣлыми, розовыми или бурыми пленками; нитевидные цвѣтки многорядные или ихъ вовсе нѣтъ . . . . . 29.

29. Корзинки на ножкахъ расположены щиткомъ 2-хъ родовъ: въ одномъ всѣ корзинки розовыя, съ одними нитевидными женскими цвѣтками и нитевидными волосками хохолка (рис. 221—а, б); въ другомъ—онѣ бѣлыя, съ 5-зубчатыми, обоеполыми, неплодучими цвѣтками и булавовидными волосками хохолка (с, d); есть побѣги . . . . . кошачьи лапки—*Antennaria* Gaertn.


Корзинки сидячія, скучены въ короткіе колосы или клубочки въ пазухахъ листьевъ, всѣ одинакія, съ буроватыми чешуйками обвертки и свѣтложелтыми цвѣтками: краевыми—женскими, срединными—обоеполыми (рис. 222); у всѣхъ волоски хохолка нитевидные; побѣговъ нѣтъ . . . сушеницы—*Gnaphalium* L.

30 (25). Хохолокъ изъ длинныхъ волосковъ, спаянныхъ надъ сѣмянкою въ кольцо (рис. 224, d); верхніе придатки пыльниковъ острые (с); чешуйки обвертки остроконечныя (а) . . . . . 31.


Хохолокъ изъ щетинокъ, не спаянныхъ въ кольцо; сѣмянки сплюснутыя . 32.



(Рис. 223).



(Рис. 224).



(Рис. 225).

31. Ложе мясистое, глубоко-ячеистое (рис. 223); придатки пыльниковъ широкотреугольные; волоски хохолка рѣсничные, розовые; стебель и вѣтви до верху ширококрылатые, безъ прерывающихся крыльевъ . . татарники—*Onopordon* L.

Ложе не мясистое и не ячеистое (рис. 224, а); придатки пыльниковъ линейно-ланцетовидные (с); волоски хохолка зазубренные, бѣлые; стебель и вѣтви не крылатые или съ узкими, прерывающимися крыльями . . . чертополохи—

*Carduus* L.

32. Чешуйки обвертки съ крючковатымъ остріемъ (рис. 225, а); хохолокъ изъ одинаковыхъ, короткихъ, опадающихъ щетинокъ (б); сѣмянки 4-гранныя (б); листья пѣльнокрайніе . . . . . лопухи—*Lappa* Tournef.

Чешуйки обвертки съ прямымъ остріемъ, хохолокъ изъ неодинаковыхъ щетинокъ . . . . . 33.


33. Чешуйки обвертки съ пленчатою каймою: перистою, гребенчатою или расщепленною (рис. 226, а); краевые цвѣтки ворончатые (б), крупнѣе средин-




ныхъ (с), безполые, неплодучіе; волоски внутреннего ряда хохолка сходящіеся, короче остальныхъ (d, e); сѣмянки обратно-овальныя (d, e).

васильки—*Centaurea* L.

Чешуйки обертки безъ пленчатой каймы; краевые цвѣтки трубчатые; ложе ямчатое; волоски внутреннего ряда хохолка длиннѣе остальныхъ (рис. 227, a); сѣмянки удлиненно-ланцетовидныя (a); пыльники съ придаткомъ, не раздвоеннымъ (b); иногда 2-домныя травы . . . . . серпухи—*Serratula* L.



(Рис. 226).



(Рис. 227).



(Рис. 228).

34 (15). Наружная обертка въ видѣ колючихъ листьевъ; внутренняя—изъ пленчатыхъ чешуекъ, окрашенныхъ, лучистыхъ, лепестковидныхъ; перистые волоски хохолка срослись внизу въ пленки и кажутся вѣтвистыми (рис. 228, d), сѣмянки продолговато-цилиндрическія, пушистыя (с). . колючики—*Carlina* L.

Всѣ чешуйки обертки кожистыя, не пленчатые, не окрашенные и не лучистыя; хохолокъ просто перистый . . . . . 35.

35. Листья сверху блестящіе, съ бѣлыми пятнами; наружная обертка зеленая изъ отогнутыхъ чешуй, съ желтыми колючками по краямъ (рис. 229), какъ и на листьяхъ; тычинковыя нити сросшіяся, шершавыя; хохолокъ коротко-перистый; ложе мясистое. . . . . лягушечники—*Silybum* Vaill.



(Рис. 229).



(Рис. 230).



(Рис. 231).

Листья не блестящіе и не пятнистые; чешуйки обертки съ одною только колючкою на концѣ; нити тычинокъ свободныя . . . . . 36.

36. Чешуйки обертки внизу мясистыя, на верхушкѣ выемчатыя, съ колючкою (рис. 230); ложе б. м. мясистое. . . . . артишоки—*Cynara* L.

Чешуйки обертки не мясисты, прямо вытянуты въ колючку или остріе; ложе не мясистое (рис. 231) . . . . . маточники—**Cirsium** Tougn.

37 (2). Обертка 2-рядная: наружная изъ немногихъ (5) короткихъ чешуекъ; внутренняя—изъ 8-10 (рис. 232, а); волосистаго хохолка нѣтъ (b) . . . 38.

Обертка многорядная, черепичатая, или простая, 1-рядная; волосистый хохолокъ есть . . . . . 39.

38. Стебель покрытъ до верху листьями, въ пазухѣ которыхъ корзинки клубочками; ложе лишь въ срединѣ съ щетинистыми пленками; сѣмянки 4-гранныя, съ пленчатою коронкою (рис. 232, b); вѣнчикъ голубой . . . . .

цикоріи—**Cichorium** L.


Стебель только внизу съ листьями; корзинки щиткомъ; ложе вполне голое; сѣмянки сплюснутыя, о 20 бороздкахъ, безъ всякой коронки (рис. 233 b); вѣнчикъ свѣтложелтый . . . . .

бородавники—**Lampsana** L.

39. Хохолокъ изъ простыхъ волосковъ . . . . . 40.


Хохолокъ изъ волосковъ перистыхъ или вѣтвистыхъ; сѣмянки вытянуты въ носикъ или утонены къ верхушкѣ . . . . . 44.

40. Обертка узко-цилиндрическая или коническая (рис. 234, а); корзинки мелкія о немногихъ свѣтложелтыхъ цвѣткахъ, въ метелкахъ; сѣмянки борозчатыя, сплюснутыя, съ длиннымъ нитевиднымъ носикомъ и вѣнцомъ бѣлыхъ, мягкихъ волосковъ, окруженныхъ коронкою (b); стебель покрытъ листьями, объемлющими стебель ушками или широкимъ основаніемъ; травы съ бѣлымъ млечнымъ сокомъ . . . . . салаты—**Lactuca** L.




(Рис. 232).


(Рис. 233).



(Рис. 234).



(Рис. 235).



(Рис. 236).

Обертка широкая, многорядная; корзинки съ большимъ числомъ цвѣт-  
ковъ . . . . . 41.

41. Обертка съ чешуйками при основаніи корзинки (рис. 235, а); сѣ-  
мянки вверху утоненныя или вытянутыя въ носикъ . . . . . 42.

Обертка черепичатая, безъ чешуекъ при основаніи корзинки: сѣмянки  
вверху усѣченныя . . . . . 43.


42. Стрѣлка обѣ 1 корзинкѣ, полая; сѣмянки слегка сплюснутыя, вы-

тянуты въ длинный носикъ, окруженный острыми бугорками (рис. 235, b); листья розеткою, съ толстою срединною жилкою . . . . .

одуванчики—*Taraxacum* Juss.

Стебель о многихъ корзинкахъ; сѣмянки цилиндрическія, утоненныя къ верхушкѣ, о 10—30 ребрышкахъ (рис. 236, b); волоски хохолка бѣлые, гибкіе, рѣдко грязножелтые, ломкіе; стеблевые листья съ стрѣловиднымъ или сердцевиднымъ основаніемъ . . . . . ескерды—*Crèpis* L.


43. Обертка кувшинчатая или кубарчатая (рис. 237, a); волоски хохолка бѣлые, мягкіе; сѣмянки сплюснутыя; стебель покрытъ листьями выемчатыми, съ ушками и колючими зазубринами . . . . . осоты—*Sonchus* L.



(Рис. 237). . . . . (Рис. 238). . . . . (Рис. 239). . . . . (Рис. 240).

Обертка цилиндрическая или колокольчатая (рис. 238, a); волоски хохолка грязнобѣлые, ломкіе; сѣмянки почти цилиндрическія, внизу суженныя, о 10 ребрышкахъ (b); листья б. ч. корневые, цѣльно-крайніе, рѣдко съ мелкими зубцами . . . . . ястребинки—*Hieracium* L.

44 (39). Корзинки щиткомъ; стебель покрытъ до верху шершавыми листьями; волоски хохолка спаяны въ кольцо, опадающіе: наружные простые, внутренніе перистые (рис. 239); сѣмянки съ короткимъ носикомъ . . . . . горчаки—*Picris* L.



(Рис. 241). . . . . (Рис. 242). . . . . (Рис. 243).

Корзинокъ 1 или 2, 3 на концѣ голой стрѣлки или длинныхъ цвѣтоносозъ; почти всѣ листья корневые; б. ч. всѣ волоски хохолка перистые, не спаянные въ кольцо . . . . . 45.

45. Цвѣтоносы подъ корзинками утолщены; перышки хохолка простые, свободныя . . . . . 46.

Цвѣтоносы не утолщены подъ корзинками; перышки хохолка переплетены въ видѣ паутины или сѣти. . . . . 47.

46. Чешуйки обертки съ бѣлымъ ободкомъ; ложе голое; сѣмянки вверху утонены (рис. 240); листья надрѣзные или выемчатые. . . . .

кульбабы—*Leontodon* L.

Чешуйки обертки безъ бѣлаго ободка; ложе пленчатое; пленки опадающія; сѣмянки съ носикомъ или краевыя безъ носика; хохолокъ изъ 1 ряда волосковъ (рис. 241); листья цѣльные. . . . . пазники—*Achyrophorus* Scop.

47. Обертка корзинки простая, однорядная, о 8 чешуйкахъ, спаянныхъ при основаніи (рис. 242, а); сѣмянки съ волнистыми ребрышками и длиннымъ носикомъ (б); листья узкіе, длинные съ широкими влагалищами, какъ у злаковъ. . . . . козлобородники—*Tragopogon* L.

Обертка корзинки черепчатая; чешуйки свободныя (рис. 243, а); сѣмянки вверху утонены (б); листья съ продольными жилками. . . . .

козельцы—*Scorzonera* L.

**XV. Convolvulaceae Vent.**—вьюнки. Влѣво вьющіяся травы; листья черешковые; цвѣтки правильные, пазушные, по 1—3; вѣничикъ 5-лопастный, ворончато-колокольчатый, вдоль складчатый, въ почкосложеніи скрученный; тычинокъ 5; пыльники по опыленіи спирально скрученные; завязь на подпестничномъ дискѣ, 2-гнѣздная; столбикъ 1, съ 2-лопастнымъ или 2-раздѣльнымъ рыльцемъ; коробочка 2-гнѣздная, по 1 сѣмени въ каждомъ гнѣздѣ; перегородки срастаются съ срединнымъ сѣменосцемъ.



(Рис. 244).



(Рис. 245).

а. Прицвѣтники крупные, длиннѣе долей чашечки и покрываютъ ее (рис. 224—а, б); цвѣтоножки обь 1 цвѣткѣ; лопасти рыльца короткія (б); коробочка вскрывается многими продольными щелями. . . . .

калистегія—*Calystegia* R. Br.

б. Прицвѣтники мелкіе, отодвинуты отъ цвѣтка (рис. 245); лопасти рыльца нитевидныя; коробочка вскрывается близъ перегородокъ или вполне неправильно. . . . . вьюнки—*Convolvulus* L.

**XVI. Crassulaceae DC.**—толстянковые. Мясистыя, сочныя травы; цвѣтки полные, правильные, 5-ые или 6-ые; завязей съ чешуйками при основаніи столько же, сколько лепестковъ или чашелистиковъ, б. м. спаянныхъ при основаніи; вѣничикъ вмѣстѣ съ тычинками прикрѣпленъ къ основанію чашечки; тычинокъ вдвое болѣе числа лепестковъ; мѣшечки.

а. Стебель покрытъ развитыми листьями; цвѣтки мелкіе 5-ые (рис. 246); чашечка 5-раздѣльная, лепестковъ 5, свободныхъ; тычинокъ 10 (а); 5 цѣльно-

крайнихъ железистыхъ чешуекъ окружають 5 завязей (а), при самомъ основаніи сросшихся. . . . . очитки—*Sedum* L.

б. Листья въ корневой розеткѣ; цвѣточный стебель покрытъ чешуйчатыми листьями; цвѣтки крупные 6-ые (рис. 247); чашечка 6-раздѣльная, лепестковъ 6, сросшихся внизу между собою и съ 12 тычинками; 6 плодниковъ съ 6 чередующимися съ ними, расщепленными железистыми чешуйками . . . . . молодилы—*Sempervivum* L.



(Рис. 246).



(Рис. 247).




(Рис. 248).


**XVII. Cruciferae Juss.**—крестоцвѣтныя. Травы съ очередными или корневыми листьями и цвѣтками 4-ными въ кистяхъ и щиткахъ: чашечка 4-листная, опадающая; лепестковъ 4, крестомъ расположенныхъ; тычинокъ 6, въ 4-большинствѣ (въ одномъ только видѣ — у *Lepidium ruderale*, всего 2 тычинки и нѣтъ лепестковъ); завязь свободная, б. ч. вполне 2-гнездная съ перегородкою; стручекъ или стручекъ, б. ч. съ отпадающими створками и остающеюся перегородкою; рѣдко колѣнчатый стручекъ или орѣшекъ.

1. Цвѣтки мелкіе въ густыхъ щиткахъ или щитковидныхъ кистяхъ. . . . . 2.

Цвѣтки б. м. крупныя, въ рѣдкихъ щиткахъ, скоро переходящихъ въ кисть . . . . . 18.



(Рис. 249).



(Рис. 250).



(Рис. 251).

2. Лепестки выемчатые или 2-раздѣльные (рис. 248, а); листья съ звѣздчатыми или вильчатыми волосками; стручки округлые или продолговатояйцевидные (b) . . . . . 3.

Лепестки цѣльные, на верхушкѣ округленные, тупые или заостренные . . . . . 6.

3. Тычиночныя нити безъ зубцовъ; листья зеленые, пушистые; стручки продолговатояйцевидные, слегка выпуклые, створки 1-первныя; сѣмена 2-рядныя, въ большомъ числѣ (рис. 248, b) . . . . . крупки—*Draba* L.

Всѣ тычиночныя нити или только короткія съ крыловидными зубцами (рис. 249, c); листья сѣрые, цѣльные; сидячіе . . . . . 4.

4. Лепестки 2-раздѣльные, бѣлые (рис. 249, а); створки выпуклыя, овальныя (d); гнѣзда о 6 сѣменахъ (b) . . . . . икотники—*Bertéroa* DC.

Лепестки слегка выемчатые (рис. 250, а), желтые или желтоватые; створки приплюснуты к широкой перегородке, почти круглые; гнёзда о 2 сѣменахъ (с) . . . . . 5.

5. Чашелистики опадаютъ и не облекаютъ стручечка; нити у длинныхъ тычинокъ крылатыя, у короткихъ съ крыловидными придатками (рис. 250 б).

бурачки—*Alyssum* L.

Чашелистики остающіеся и облекаютъ стручечекъ (рис. 251, а); нити у длинныхъ тычинокъ безъ зубцовъ, — у короткихъ съ боковъ по зубцу, въ видѣ щетинки (б); столбикъ короткій, цвѣтки свѣтложелтые . . . . .


голонитники—*Psiloneuma* C.A.M.

6. (2) Верхняя часть стебля съ листовыми черешками и плоды покрыты железистыми бородавками (рис. 252); орѣшекъ косоовальный, неравнобокій, поперекъ 2-гнѣздный, бородавчатый, 1-сѣменный. . . . . свербиги—*Bunias* L.

Стебель, черешки и плоды безъ железистыхъ бородавокъ . . . . . 7.

7. Завязь и плодъ длинные: длина стручка превышаетъ, по крайней мѣрѣ, въ 4 раза ширину. . . . . 8.

Завязь и плодъ короткіе; длина стручка или орѣшка не превышаетъ ширины болѣе 3 разъ. . . . . 12.



(Рис. 252). (Рис. 253). (Рис. 254). (Рис. 255). (Рис. 256). (Рис. 257).

8. Стеблевые листья сидячіе, съ стрѣловиднымъ основаніемъ или сердцевиднымъ; корневые листья розеткою; цвѣтки бѣлые или желтоватобѣлые. . . . . 9.

Стеблевые листья при основаніи съ ушками или суженные въ черешокъ, или же черешковые, стрѣловидные . . . . . 10.

9. Корневые листья въ рѣдкой розеткѣ, рано пропадаютъ; стеблевые голые, сизые; длинные цилиндрические стручки объ 1 толстой жилкѣ (рис. 253, б), съ 2 рядами сѣмянъ въ каждомъ гнѣздѣ (а); цвѣтки желтоватобѣлые . . . . .

вяжечки—*Turritis* L.

Корневые листья образуютъ густую и прочную розетку, пушистые, какъ и стеблевые; стручки плоскіе, линейные съ 1 слабою жилкою на каждой створкѣ (рис. 254); сѣмена въ 1 рядъ въ каждомъ гнѣздѣ; цвѣтки бѣлые . . . . .

рѣзухи—*Arabis* L.

10. Листья при основаніи съ большими ушками, нижніе — ланцетные; цвѣтки яркожелтые; столбикъ длинный, превышаетъ н. к. м. ширину стручка (рис. 255) . . . . . сурѣпицы—*Barbarea* R. Br.

Листья безъ ушковъ, суженные къ основанію, иногда черешковые; цвѣтки желтые или бѣлые; столбикъ короткій, короче ширины стручка . . . . . 11.

11. Стеблевые листья цѣльные, цѣльнокрайніе или рѣдко и слабо зубчатые, сидячіе; цвѣтки желтые; стручечекъ 4-гранный (рис. 256, б), створки 1-первыя (а, б) . . . . . желтушники—*Erysimum* L.




Стеблевые листья не цѣльные, перисто-раздѣльные или-разсѣченные; если же цѣльные, то глубоко или выемчато зубчатые; иногда всѣ листья корневые и образуют розетку; стручки цилиндрические или шиловидные (рис. 257, а), створки выпуклыя о 3 толстых жилкахъ (b); рыльце цѣльное, тупое гулявники—*Sisymbrium* L.

12. (7) Стебель и листья шершавые отъ вѣтвистыхъ волосковъ; стеблевые листья стрѣловидные; орѣшки 1-сѣменные, почти шаровидные (рис. 258, b), сѣтчато-морщинистые, со столбикомъ (a), цвѣтки яркожелтые . . . . .

песеля—*Neslea* Desv.


Листья гладкіе, голые, или только снизу шероховатые; постоянніе стручечки, не морщинистые. . . . . 13.




(Рис. 258).



(Рис. 259).



(Рис. 260).



(Рис. 261).

13. Стручечки сплюснутые, съ плоскими створками (рис. 259); мелкія травы . . . . . 14.

Стручечки съ выпуклыми створками, нерѣдко вздутые . . . . . 16.

14. Корневые листья розеткою, стеблевые—стрѣловидные; стручечки обратно-треугольные, съ сердцевидною выемкою (рис. 259, а); перегородка узкая (b); цвѣтки бѣлые . . . . . сумочники—*Capsella* Med.

Корневые листья не образуютъ розетки; стручечки округлые, ребристые, часто крылатые (рис. 260). . . . . 15.

15. Стручечки съ широкими крыльями отъ самаго низу и съ глубокою выемкою вверху (рис. 260, а); въ каждомъ гнѣздѣ много сѣмянъ (b) . . . . .


ярутки—*Thlaspi* L.

Стручечки не крылатые, и тогда безъ выемки на верхушкѣ, или килеватые, и тогда съ слабою выемкою (рис. 261, а); въ гнѣздѣ по 1 сѣмени (b) . . . . .

жерухи—*Lepidium* L.



(Рис. 262).



(Рис. 263).



(Рис. 264).

16. (13) Листья съ стрѣловиднымъ основаніемъ; стручечки грушевидные, вздутые (рис. 262) съ тонкимъ ребрышкомъ близъ столбика, опадающаго вмѣстѣ съ одною створкою; створки 1-первыя, цвѣтки желтые . . . . .

камелина—*Camelinea* Crtz


Листья съ сердцевиднымъ основаніемъ или часто съ ушками; стручечки шаровидные или продолговатые, безъ ребрышка, съ остающимся столбикомъ и съ 2 рядами сѣмянъ . . . . . 17.

17. Цвѣтки желтые, створки безъ жилокъ или съ слабою жилкою при основаніи стручечка, гладкія или сѣтчатыя, съ большимъ числомъ сѣмянъ (рис. 263). . . . . жерухи—*Nasturtium* R. Br.


Цвѣтки бѣлые, створки либо безъ жилокъ, и тогда слегка сѣтчатыя (рис. 264, а), либо обѣ 1 явственной жилкѣ, съ малымъ числомъ (2—6) сѣмянъ . . . . . ложечники—*Cochlearia* L.



(Рис. 265).



(Рис. 266).



(Рис. 267).



(Рис. 268).

18. (1) Цвѣтки лиловые или бѣлые, нерѣдко съ лиловыми жилками; наружные чашелистики съ выпуклинами. . . . . 19.

Цвѣтки желтые; паружные чашелистики безъ выпуклинъ; столбикъ и носикъ на плодѣ длинный . . . . . 23.

19. Въ листья перистосложные; цвѣтки бѣлые или свѣтлолиловые; стручечекъ линейный, плоскій, безъ нервовъ на скручивающихся створкахъ (рис. 265); рыльце цѣльное . . . . . сердечники—*Cardamine* L.

Листья цѣльные, вырѣзные, перистораздѣльные, рѣдко только нижніе перистосложные. . . . . 20.

20. Стеблевые листья, кромѣ самыхъ верхнихъ, на длинныхъ черешкахъ, съ сердцевиднымъ основаніемъ; стручечки очень крупныя, плоскія, эллиптическія, повислыя на длинныхъ и тонкихъ сочлененныхъ плодоножкахъ (рис. 266, b); сѣмена съ перепончатою каймою (c); вѣнчикъ лиловый. . . . .

лунники—*Lunaria* L.

Стеблевые листья сидячіе или суженные къ основанію въ черешокъ; стручки длинныя на оттопыренныхъ или прижатыхъ плодоножкахъ . . . . . 21

21. Рыльце головчатое; стручекъ не вскрывается створками, 2-членистый, неправильно перетянутый; зрѣлый плодъ поздраватый, раздѣленъ поперекъ ложными перегородками на 1-сѣменные гнѣзда (рис. 267—а, b); завязь съ продольною перегородкою; лепестки бѣлые или лиловые съ темными жилками . . . . . рѣдьки—\* *Raphanus* L.

Рыльце изъ 2-сплюснутыхъ пластинокъ; лепестки ярко-лиловые, безъ выдающихся жилокъ . . . . . 22.

22. Лепестки обратно-яйцевидные (рис. 268, а); рыльце изъ 2 плоскихъ, широкихъ, прижатыхъ одна къ другой, лопастей (b); стручки почти цилиндрические, торчащие, бугорчатые; створки ихъ о 3 жилкахъ; сѣмена въ 1 рядъ . . . . . вечерницы—*Hesperis* L.

Лепестки продолговато-клиновидные; рыльце острое, коническое изъ 2 торчащихъ пластинокъ; стручки членистые, линейные, сѣуженные въ длинный носикъ, распадаются на 2 ряда односѣменныхъ члениковъ . . . . . раздѣльносѣмянники—*Chorispora* DC.



(Рис. 269).



(Рис. 270).



(Рис. 271).



(Рис. 272).

23 (18). Цвѣтки съ перисто-раздѣльными прицвѣтными листьями (рис. 269, а); стручекъ линейный, сплюснuto-4 гранный (b); листья глубоко-перистораздѣльные, безъ ушковъ . . . . . жучки—*Erucastrum* Presl.

Цвѣтки безъ прицвѣтныхъ листьевъ . . . . . 24.

24. Всѣ листья или п.-к.-м. стеблевые, кромѣ нижнихъ, голые; носикъ стручка цилиндрическій (рис. 270—а, b); створки обѣ 1 срединномъ нервѣ (b) . . . . . капуста—*Brassica* L.

Всѣ листья жестковолосистые или шершавые . . . . . 25.

25. Чашелистики оттопыренные; носикъ плода сплюснутый, обоюдоострый или мечевидный, длинный (рис. 271), стручекъ не равнобугорчатый; створки о 3 нервахъ . . . . . горчицы—*Sinapis* L.

Чашелистики прижатые къ цвѣтку; плодъ не раскрывается створками, 2-членистый, плотный, кожистый; нижній членикъ его пустой, верхній—четковидный, распадается на 1-сѣменные членики (рис. 272—а, b) . . . . .

рѣдешники—*Raphanis trum* Tourg.

**XVIII. Cucurbitaceae Juss.**—тыквенныя. Однодомныя травы, съ очередными шершавыми листьями, сердцевидными, 5-лопастными, съ усиками и стелющимся или вьющимся стеблемъ; цвѣтки полные, правильные, 5-ные: вѣничикъ верхній, ворончатый, приросшій къ низу чашечки и вмѣстѣ съ нею опадающій; тычинокъ 5, приросшихъ къ самому основанію чашечки, 1-или 3-братственныхъ; рылецъ 3, толстыхъ, 2-лопастныхъ; нижняя 3-гнѣздная завязь; ягода.

1. Усики вѣтвистые; вѣничикъ 5-надрѣзной (рис. 273, а); всѣ 5 тычинокъ срослись вверху нитями и пыльниками; женскіе цвѣтки съ 3 сросшимися стаминодіями; ягода огромная, гладкая; сѣмена съ толстымъ краемъ . . . . .

ТЫКВЫ—\* *Cucurbita* L.

Усики простые; вѣничек 5-раздѣльный (рис. 274); тычинки 3-братственныя: нити срослись попарно, 5-ая свободная. . . . . 2.

2. Цвѣтоножки короткія, цвѣтки крупныя (рис. 274), яркочелтые; мужскіе цвѣтки скучены пучками; женскіе одиночныя; столбикъ короткій; 3 двуплодныхъ рыльца; ягода зеленая, впоследствии желтая, съ толстою кожурою, съ 3 двураздѣльными гнѣздами; сѣмена сплюснутыя, съ острымъ краемъ. . . . . огурцы—\**Cucumis* L.




(Рис. 273).



(Рис. 274).

Цвѣтки въ полузонтникахъ, мелкіе (рис. 275), желтовато-бѣлые: мужскіе (а) на длинномъ цвѣтоножѣ, женскіе (b) на короткомъ; столбикъ 3-лопастный, рыльца головчатыя или почковидныя; ягода черная, съ тонкою кожурою, 3-гнѣздная, б. ч. о 2 сѣменахъ въ каждомъ гнѣздѣ; сѣмена слегка сплюснутыя. . . . . переступни—†\**Bryonia* L.

XIX. Cupressineae Rich.—кипарисовыя. Хвойныя кусты съ зимующими игольчатыми или чешуйчатыми листьями, супротивными или мутовчатыми, съ разнополыми, иногда голыми, цвѣтками, въ короткихъ сережкахъ или шишечкахъ; мужскія изъ однихъ тычинокъ, въ видѣ щитковъ, подъ которыми



(Рис. 275).



(Рис. 276).



(Рис. 277).



(Рис. 278).

3—6 пыльниковъ, вскрывающихся продольною щелью; женскія изъ раскрытыхъ плодниковъ въ видѣ чешуекъ, съ немногими голыми прямыми сѣменопочками.

1. Вѣтви сплюснутыя, 2-рядно развѣтвленныя; листья чешуйчатые, прижатые, крестообразно-4-рядные (рис. 276, а); 1-домные кусты; мужскія сережки шаровидныя; женскія изъ крестообразно-расположенныхъ чешуекъ (а), каждая съ 2 сѣменопочками; кожистая шишечка (b). . . . .

туя—\**Thuja* Tourn.


Вѣтви округлыя, расходящіяся; 2-домные кусты; мужскія сережки овальныя; женскія только въ верхнихъ чешуйкахъ съ сѣменопочками, по одной въ па-

зубъ каждой изъ чешуекъ, становящихся мясистыми и срастающимися въ мясистую ложную ягоду . . . . . 2.

2. Листья въ мутовкахъ о 3 иглахъ, шиловидныхъ, колючихъ, при основании сочлененныхъ, безъ железокъ; въ женскихъ сержкахъ (рис. 277, с) только 1 верхняя мутовка изъ 3 чешуекъ несетъ 3 сѣменопочки и образуетъ ложную ягоду . . . . . можжевельники—*Juniperus* L.

Листья 4-рядные, черепичатые, изъ ромбическихъ низбогающихъ чешуекъ, не сочлененныхъ, и съ вдавленными железками на спинкѣ; въ женскихъ сержкахъ (рис. 278) б. ч. 2 верхнихъ пары супротивныхъ чешуекъ несутъ 4 сѣменопочки и образуютъ ложную ягоду . . . сабина—\**Sabina* Spach.


**XX. Cyperaceae** Juss.—осоки. Односѣменодольные травы; листья линейные, очередные съ цѣльнымъ, не разсѣченнымъ влагалищемъ; цвѣтки въ колосыхъ, состоящихъ изъ плотно скупенныхъ черепичатыхъ пленокъ и окруженныхъ снизу тоже пленчатыми прицвѣтниками, голые или съ зачаточнымъ околоцвѣтникомъ, въ видѣ щетинокъ, волосковъ или сросшихся пленокъ; тычинокъ 3; столбикъ 1, о 2 или 3 рыльцахъ, на простой завязи; орѣшекъ или же ложный мѣшечекъ.



(Рис. 279).



(Рис. 280).



(Рис. 281).

1. Цвѣтки однополые, въ одиночномъ верхушечномъ колосѣ, и тогда травы 2-домныя, или колосевъ нѣсколько, скупенныхъ пучкомъ или расположенныхъ кистью или метелкою, и тогда травы 1-домныя; мужскіе цвѣтки совершенно голые, о 3 тычинкахъ (рис. 279, а); женскіе съ пестикомъ, о 2, 3 нитевидныхъ рыльцахъ (б), заключенномъ въ кувшинчатый мѣшечекъ, состоящій изъ двухъ сросшихся пленокъ зачаточнаго околоцвѣтника и образующій, вмѣстѣ съ завязью, ложный мѣшечекъ (с) . . . . . осоки—*Carex* L.

Цвѣтки обоеполые, въ одиночныхъ или скупенныхъ колосыхъ, голые или съ зачаточнымъ околоцвѣтникомъ, въ видѣ щетинокъ и волосковъ; плодъ орѣшекъ . . . . . 2.

2. Пленки колоса или же самые колосы расположены въ 2 ряда (рис. 280); столбикъ внизу не утолщенъ, опадаетъ . . . . . 3.

Колосы съ пленками, спирально расположенными . . . . . 4.

3. Колосы о многихъ цвѣткахъ, съ 2-рядно расположенными пленками (рис. 280), скупены въ большомъ числѣ въ головчатый или пучковатый полузонтикъ, окруженный длинными прицвѣтными листьями; цвѣтки голые, безъ зачаточнаго околоцвѣтника (рис. 280, справа) . . . . . сыты—*Cyperus* L.

Колосы съ малымъ числомъ цвѣтковъ (рис. 281, а), 2-рядно расположены на верхушкѣ стебля сложнымъ колосомъ; связники пыльниковъ съ лопатчатымъ, зубчатымъ выростомъ (с); 3—6 щетинокъ, окружающихъ плодъ, вдвое его длиннѣе (б) . . . . . близма—*Blasmus* Panz.

4. Колосья о нѣсколькихъ цвѣткахъ (рис. 282, а), въ головчатомъ пучкѣ; только верхнія 2, 3 пленки съ цвѣтками; нижнія—очень короткія, безъ цвѣт-  
ковъ; столбикъ сочлененный: нижній членикъ остается на орѣшкѣ; 2 рыльца (b)  
..... очеретники—*Rhynchospora* Vahl



(Рис. 282).



(Рис. 283).



(Рис. 284)



(Рис. 285).

Колосья о многихъ цвѣткахъ, съ нижними пленками не короче остальныхъ пленокъ; только 1, 2 нижнія безъ цвѣтковъ—пустыя; колосъ одинъ или ихъ много, б. ч. въ развѣсистыхъ полузонтикахъ . . . . . 5.


5. Цвѣтки съ цѣлымъ пучкомъ длинныхъ и тонкихъ нитей, переростающихъ пленки по отцвѣтаніи и придающихъ колосу видъ бѣлой кисти; рылецъ 3; столбикъ нитевидный, опадающій (рис. 283) . . . пушицы—*Eriophorum* L.

Цвѣтки съ немногими короткими щетинками, не выдающимися изъ за пленокъ . . . . . 6.

6. Колосъ одинъ, безъ большихъ прицвѣтныхъ листьевъ, на концѣ совершенно голой стрѣлки; столбикъ внизу утолщенъ (рис. 284, b), отдѣляется отъ завязи перетяжкою и остается на плодѣ; 2—6 щетинокъ, короче или не длиннѣе плода; рылецъ 3 или 2 (a, b). . . водолубы—*Heleobcharis* R. Br.

Колосевъ много, окруженныхъ большими зелеными прицвѣтными листьями; столбикъ внизу не утолщенъ, опадаетъ; щетинокъ 6, равныхъ плоду или нѣ. сколько длиннѣе его; рылецъ 3 (рис. 285). . . . . камыши—*Scirpus* L.

**XXI. Dipsacæ** DC.—ворсянковые. Травы съ супротивными листьямиа цвѣтки полные, мелкіе въ корзинкахъ, съ многолистною обверткою; чашечк,



(Рис. 286).



(Рис. 287).



(Рис. 288).

двойная: наружная въ видѣ выростовъ по верхнему краю нижней завязи-внутренняя зачаточная, въ видѣ щетинокъ, остающихся на сѣмянѣ; вѣнчикъ верхній, 4 (5)-надрѣзной, съ приросшими къ нему 4 свободными тычинками; завязь простая, съ однимъ столбикомъ и цѣльнымъ рыльцемъ.

1. Ложе щетинистое, безъ пленокъ; вѣнчикъ 4-надрѣзной (рис. 286, a)



лиловый; наружная чашечка о 4 коротких зубцах; внутренняя—о 8 щетинках (b); сѣмянка гладкая, сплюснута-4-гранная, . . . . .

короставники—*Knaütia* Coult.


Ложе пленчатое; вѣнчикъ синий или желтоватый; сѣмянка снаружи о 8 бороздкахъ; внутренняя чашечка о 5 щетинкахъ (рис. 287, b). . . . . 2.

2. Краевые цвѣтки правильные; вѣнчикъ синий, рѣдко бѣлый, 4-надрѣзной (рис. 287, a); наружная чашечка чашевидная, волосистая, о 4 травянистыхъ острыхъ и колючихъ зубцахъ (b); листья цѣльные . . . . .


сивцы—*Succisa* Vaill.

Краевые цвѣтки лучистые (рис. 288, a); вѣнчикъ желтоватый, б. ч. 5-надрѣзной (b); наружная чашечка колокольчатая съ пленчатымъ выемчато-зубчатымъ отгибомъ (c); стеблевые листья перистораздѣльные . . . . .

скабіоза—*Scabiosa* L.



(Рис. 289).



(Рис. 290).

**XXII. Elaeagnaceae R. Вг.**—лоховыя. Кусты съ листьями очередными, покрытыми п.-к.-м. снизу серебристыми чешуйками, (рис. 289, c), какъ и верхушки вѣтвей и цвѣтки снаружи; цвѣтки пазушные, неполные, съ простымъ нижнимъ околоцвѣтникомъ, внутри желтымъ; 4 тычинки прикрѣплены у самаго отгиба околоцвѣтника; завязь простая, съ 1 столбикомъ и рыльцемъ; орѣшекъ, облеченный мясистою трубкою околоцвѣтника. и такимъ образомъ обращенный въ ложную костянку.

а. Кусты съ многобрачными цвѣтками (рис. 289): обоеполыми (b, d) и мужскими (a), по 1—3 на цвѣтоножкахъ; околоцвѣтникъ колокольчатый, съ 4-раздѣльнымъ опадающимъ отгибомъ; косточка въ костянкѣ о 8 бороздкахъ; цвѣтки развертываются послѣ листьевъ . . . . . лохи—\**Elaeagnus* L.


б. Кусты 2-домные, колючіе, съ цвѣтками сидячими: мужскіе цвѣтки (рис. 290, a, b) съ 2 прицвѣтниками въ пазухѣ бурыхъ чешуекъ, образующихъ короткій колосъ; околоцвѣтникъ глубоко 2-раздѣльный (a, b); женскій околоцвѣтникъ трубчатый, 2-надрѣзной; рыльце вытянутое, съ продольною бороздою (c); косточка гладкая, съ 1 бороздою; цвѣтки развертываются одновременно съ листьями . . . . . обленихи—\**Hippophaë* L.

**XXIII. Fumariaceae DC.**—дымницевыя. Травы съ глубокораздѣльными листьями; цвѣтки въ кистяхъ, полные; чашечка 2-листная, падучая, или ея вовсе нѣтъ; вѣнчикъ 4-лепестный, неправильный: верхній лепестокъ со шпорцемъ; тычинокъ 6, сросшихся въ 2 пучка; завязь простая, верхняя.


а. Стебель вѣтвистый; листья удвоенно-перистораздѣченные; цвѣтки съ

короткими прицветниками (рис. 291—а, б); чашечка замѣтная (с); 1-сѣменный орѣшек (е). . . . . дымницы—*Fumaria* L.

б. Стебель простой, не вѣтвистый, съ клубнемъ; листья удвоенно 3-чатораздѣльные; цвѣтки съ большими прицветниками (рис. 292, а); чашечка б. ч. не замѣтна; сплюснутый стручекъ или бобъ, безъ перегородки (б), съ черными, блестящими, хвостатыми сѣменами. . . хохлатки—*Corydalis* DC.



(Рис. 291).



(Рис. 292).

**XXIV. Gentianeae Juss.**—горечавковые. Травы съ листьями или долями сложныхъ листьевъ цѣльнокрайними; цвѣтки полные, правильные, 5-ные или 4-ные, съ колокольчатымъ или ворончатымъ нижнимъ вѣнчикомъ, увядающимъ и остающимся вокругъ многосѣменной коробочки.


1. Листья корневые, тройчатые, очередные, цвѣтки кистью, съ 2 прицветниками; вѣнчикъ ворончатый, розоватый, съ 5 раздѣльными отги-



(Рис. 293).



(Рис. 294).



(Рис. 295).

бомъ, внутри мохнатымъ (рис. 293); завязь простая; коробочка неправильно вскрывающаяся; болотныя травы. . . . . вахты—*Menyanthes* L.

Листья стеблевые, простые, супротивные, сидячие; вѣнчикъ безъ мохнатого отгиба; коробочка 2-створчатая. . . . . 2.

2. Вѣнчикъ розовый, скручивающійся винтомъ по отцвѣтаніи, какъ и пыльники, послѣ опыления (рис. 294, б); столбикъ явственный, опадающій; коробочка внизу 2-гнѣздная. . . . . золототысячники—*Erythraea* Rich.


Вѣнчикъ синий или лиловый, по отцвѣтаніи не скручивающійся, какъ и пыльники; рыльце сидячее, глубоко 2-лопастное (рис. 295, а), остающееся на простой 1-гнѣздной коробочкѣ. . . . . горечавки—*Gentiana* L.

**XXV. Geraniaceae DC.**—журавельниковыя. Травы съ листьями супротивными, раздѣльными, съ прилистниками; цвѣтки полные 5-ные; чашечка и вѣнчикъ изъ свободныхъ листковъ: чашечка остающаяся; тычинокъ нижнихъ 10, внизу однобратственныхъ; 5 пестиковъ, сросшихся завязями и столбиками въ длинный клювъ, съ 5 свободными рыльцами; 5 сѣмянокъ отдѣляются отъ

срединного столбца снизу вверх, вмѣстѣ съ скручивающимся въ видѣ ости столбикомъ.

а) Листья дланевидно раздѣльные; всѣ 10 тычинокъ съ пыльниками и съ железками у корня нитей: тычинки, чередующіяся съ лепестками, длиннѣе 5 другихъ (рис. 296, б); столбики зрѣлыхъ сѣмянокъ отдѣляются отъ срединнаго столбца въ видѣ остей, съ внутренней стороны голыхъ, и закручиваются дугою или кольцомъ (рис. 297, б) . . . журавельники—*Geranium* L.

б) Листья перистораздѣльные; только 5 тычинокъ съ пыльниками и съ железками у корня нитей; 5 другихъ, супротивныхъ лепесткамъ, расширены и безъ пыльниковъ; столбики зрѣлыхъ сѣмянокъ отдѣляются отъ срединнаго столбца въ видѣ остей, съ внутренней стороны волосистыхъ, и закручиваются спиралью (рис. 298) . . . аистники—*Erodium* L'Her.



(Рис. 296).



(Рис. 297).



(Рис. 298).

**Gramineae** Juss.—злаки. Односѣменодольныя травы съ линейными очередными влагалищными листьями; влагалища б. ч. вдоль расщепленныя; цвѣтки пленчатые въ колоскахъ, расположенныхъ сложнымъ колосомъ, сложною кистью или метелкою; каждый колосокъ, обв. 1 или нѣсколькихъ цвѣткахъ, облеченъ снизу обверткой изъ 2 (1,0) такъ наз. чашечныхъ пленокъ; каждый цвѣтокъ состоитъ изъ 2 (1) такъ наз. цвѣточныхъ пленокъ, изъ коихъ нижняя составляетъ прицвѣтникъ, съ срединною жилкою, часто вытянутою на верхушкѣ въ тонкую ость или несущую ее на спинѣ, а верхняя—предцвѣтникъ, безъ срединной жилки и ости, но съ 2 боковыми жилками; самый околоцвѣтникъ зачаточный и состоитъ изъ 2, 3 очень маленькихъ и нѣжныхъ чешуекъ; тычинокъ 3 (2) съ пыльниками, прикрѣпленными спинкою къ очень тонкой и длинной нити; завязь свободная, обв. 1 сѣмянопочкѣ и о 2 (1) столбикахъ, б. ч. съ перистыми рыльцами; зерновка голая или облечена въ остающіяся цвѣточные пленки.

1. Однодомные злаки: верхушечная развѣсистая метелка состоитъ изъ однихъ мужскихъ колосковъ, собранныхъ въ ложные колосья; пазушные початки, съ пучкомъ длинныхъ и тонкихъ столбиковъ, окруженные листовыми влагалищами, образованы изъ однихъ женскихъ колосковъ; мужскіе колоски (рис. 299, а) попарно на короткихъ ножкахъ, о 2 цвѣткахъ, съ наружными травянистыми, ланцетными, острыми пленками и перепончатыми внутренними; женскіе колоски (б), сидячіе тоже попарно, обв. 1 цвѣткѣ съ однимъ столбикомъ и нитевиднымъ рыльцемъ и съ широкими плен-

ками: наружныя—мясистыя, тупыя; внутреннія—перепончатыя; за нижнею чашечною пленкою 1 или 2 прозрачныя пленочки зачаточнаго мужскаго цвѣтка.

кукурузы—\* *Zea* L.

Злаки съ цвѣтками обоеполыми, рѣже съ однополыми, и тогда въ одномъ и томъ же колоскѣ съ обоеполыми . . . . . 2.

2. Одиночный верхушечный колосъ, либо настоящій, т. е. съ колосками или цвѣтками, вполне сидячими на цвѣточномъ стержнѣ, либо ложный, т. е. съ цвѣтками на очень короткихъ ножкахъ, замѣтныхъ только при отгибаніи колосковъ . . . . . 3.

Метелка съ вѣтвистымъ цвѣточнымъ стержнемъ, боковые цвѣтоносы котораго несутъ колоски, либо на длинныхъ ножкахъ и образуютъ настоящую метелку, либо на очень короткихъ и составляютъ ложные колосыя или кисти, метельчато расположенные. . . . . 16.

3. Всѣ цвѣтки, одиночные или собранные въ колоски, вполне сидячіе на зубцахъ цвѣточнаго стержня, образуютъ настоящій одиночный колосъ—1-бочный, 2-или многорядный . . . . . 4.

Всѣ колоски на очень короткихъ ножкахъ, замѣтныхъ лишь при отгибаніи колосковъ, образуютъ одиночный ложный колосъ, т. е. колосовидную метелку, рѣдко колосовидную кисть (рис. 306) . . . . . 9.

4. Соломинка тонкая, голая, безъ узловъ, только внизу съ узкими листьями . . . . . 5.

Соломинка узловатая, покрыта по всей длинѣ линейными листьями; колосъ 2-или многорядный . . . . . 6.



(Рис. 299).



(Рис. 300).



(Рис. 301).



(Рис. 302).

5. Колосъ однобочный, тонкій; колоски линейношиловидные (рис. 300), безъ наружныхъ—чашечныхъ пленокъ; нижняя цвѣточная пленка вытянута въ длинную шловидную ость, длиннѣе тупой верхней пленки; рыльце 1, длинное, нитевидное, выступающее изъ подъ верхушки цвѣтка. . . . .

бѣлоусы—*Nardus* L.

Колосъ 2-рядный; колоски очень мелкіе, попеременно расположенные по извилистому стержню (рис. 301); обѣ чашечныя пленки довольно ровныя, длиннѣе цвѣточныхъ, тупыя, на спинкѣ округленныя; цвѣточные пленки одинаковой длины, усѣченныя, вверху зубчатые, снаружи шероховатыя; нижняя цвѣточная пленка безъ кия о 5 жилкахъ охватываетъ верхнюю; рыльце 2, нитевидныхъ . . . . . полевики—† *Chamagröstis* Borkh.

6. Колоски сплюснутые, о многихъ цвѣткахъ, обращены ребромъ къ стержню колоса (рис. 302), обѣ одной верхней чашечной пленкѣ на наружной сто-

ронъ колоска, кромѣ макушечнаго, который о 2 чашечныхъ пленкахъ; цвѣтки съ короткою остью или безъ ости. . . . . плевелы—*Lolium* L.

Колоски обращены широкою, плоскою стороною къ стержню колоса; всѣ колоски о 2 чашечныхъ пленкахъ, расположенныхъ по бокамъ стержня . . . 7.

7. Колоски скучены по 3 вмѣстѣ (рис. 303): средній обтѣ обоополомъ цвѣткѣ съ другимъ зачаточнымъ; боковые — обоополоые или мужскіе, иногда на ножкахъ; наружныя чашечныя пленки нитевидныя, въ видѣ остей, расположены на крестъ къ внутреннимъ цвѣточнымъ пленкамъ; нижняя цвѣточная пленка вытянута въ длинную ость (рис. 303); макушечнаго колоска въ колосѣ нѣтъ . . . . . ячмени—\* *Hordeum* L.



(Рис. 303).



(Рис. 304).



(Рис. 305).

Колоски одиночные, 2-или многоцвѣтные; чашечныя пленки передъ цвѣточными . . . . . 8.

8. Чашечныя пленки широкія, ланцетовидныя, притупленныя или вытянутыя въ остріе или же въ ость; нижняя цвѣточная пленка на спинкѣ округленная; колоски о 3—5 цвѣткахъ (рис. 304) . . . пшеницы—\* *Triticum* L.



(Рис. 306).



(Рис. 307).



(Рис. 308).

Чашечныя пленки шиловидныя; колоски о 2 цвѣткахъ, съ зачаточнымъ 3 цвѣткомъ; нижняя цвѣточная пленка килеватая, на верхушкѣ остистая (рис. 305) . . . . . ржи—*Secale* L.

9 (3). Колоски крупные, длинные, узколанцетные, о многих цвѣткахъ; образуютъ сжатую въ колосъ кисть, на едва замѣтныхъ ножкахъ (рис. 306); чашечныя и цвѣточные пленки на спинкѣ округленныя; чашечныя—неравныя; нижняя цвѣточная съ остію на концѣ; верхняя—на краю гребенчаторѣсничная . . . . . коротконожки—*Brachypodium* P. B.

Колоски мелкіе, короткіе, обѣ 1 или о немногихъ цвѣткахъ, сжаты въ частую метелку въ видѣ колоса . . . . . 10.

10. Колоски съ обверткою, въ видѣ щетинокъ или гребенчато-перистыхъ придатковъ (изъ неразвитыхъ цвѣтковъ или цвѣтоножекъ), придающихъ колосу шершавый или щетинистый видъ . . . . . 11.

Колоски безъ обвертки . . . . . 12.

11. Обвертка изъ остистыхъ щетинокъ на цвѣтоножкахъ (рис. 307); колоски сплюснутые со спинки, съ чашечными пленками, очень неравными: нижняя много короче верхней; цвѣтокъ въ колоскѣ 1 и другой зачаточный, въ видѣ одной только пленки; цвѣточные пленки хрящеватыя; рыльца малиновыя, въ видѣ кисточекъ, на длинныхъ столбикахъ, выступаютъ у верхушки цвѣтка . . . . . щетинники—*Setaria* P. B.

Обвертка гребенчатая изъ попеременно 2-рядно-перистыхъ остей (рис. 308); колоски со спинки округленныя, о 3—5 цвѣткахъ, съ чашечными пленками почти равными, колючими; нижняя цвѣточная пленка изъ подъ 2-зубчатой верхушки остистая; рыльца перистыя, не окрашенныя, сидячія, выступаютъ по бокамъ цвѣтка . . . . . гребенники—*Cynosurus* L.



(Рис. 309).



(Рис. 310).



(Рис. 311).



(Рис. 312).



(Рис. 313).

12 (10). Колосъ плотный, частый, на поверхности ровный, цилиндрическій или овальный; колоски обѣ 1 развитомъ цвѣткѣ; чашечныя пленки равныя, длиннѣе цвѣточныхъ . . . . . 13.

Колосъ рѣдкій, б. м. лопастной, часто внизу прерывающійся, по отцвѣтаніи становится замѣтно метельчатымъ; чашечныя пленки неравныя . . . 15.

13. Колосъ широко овальный; чашечныя пленки съ широкимъ крылатымъ килемъ (рис. 309), цвѣточные—безъ остей; между тѣми и другими пленками еще по небольшой чешуйкѣ (двухъ зачаточныхъ цвѣтковъ). . . . .

канареечники — † *Phalaris* L.

Колосъ цилиндрическій или овальноцилиндрическій; чашечныя пленки килеватыя, но безъ широкаго крылатога кила; промежуточныхъ чешуйчатыхъ пленокъ нѣтъ. . . . . 14.

14. Колосъ мягкій, гладкій, остистый; чашечныя пленки внизу сросшіяся (рис. 310); цвѣточная пленка только 1—нижняя, свернутая въ мѣшечекъ, съ длинною остію, на спинкѣ; верхней пленки нѣтъ; рыльца нитевидныя; столбики б. ч. сросшіяся . . . . . батлачики—*Alopecurus* L.

Колосъ жесткій, шершавый; чашечныя пленки не сросшіяся, килеватыя, ко-



люція или короткоостистыя (рис. 311); цвѣточныхъ пленокъ 2: нижняя—тупая, безъ ости, облекаетъ верхнюю; колоски иногда съ зачаткомъ 2 цвѣтка; рыльца перистыя; столбики свободные. . . . . аржанцы—*Phleum* L.

15 (12). Колоски обѣ 1 полномъ цвѣткѣ съ наружными пленками очень неравными: нижняя вдвое короче верхней; обѣ цвѣточные пленки тупыя, очень короткія, облечены 2 другими остистыми пленками, которыя тоже короче чашечныхъ; тычинокъ 2; рыльца нитевидныя, на длинныхъ столбикахъ, выступаютъ изъ верхушки колоска (рис. 312). . . . .

желтостебельники—*Anthoxanthum* L.


Колоски о 2—4 цвѣткахъ съ наружными пленками нѣсколько неравными (рис. 313): нижняя покороче верхней; нижняя цвѣточная пленка заостренная, колючая, почти равна верхней чашечной пленкѣ; тычинокъ 3; рыльца перистыя, сидячія, выступаютъ по бокамъ колоска . . . келерія—*Koeleria* Pers.

16 (2). Вѣтви метелки, обыкновенно попеременно расположенныя по цвѣточному стержню, несутъ на короткихъ ножкахъ много колосковъ, скученныхъ пучками или ложными колосьями (колосовидными кистями), и образуютъ либо однобочную лопастную метелку, либо однобочный лопастной или пальчатый ложный колосъ (рис. 317). . . . . 17.

Вѣтви метелки, обыкновенно мутовчато расположенныя по цвѣточному стержню, несутъ на своихъ развѣтвленіяхъ колоски, не скученные пучками, а одиночные, на б. м. длинныхъ ножкахъ, и образуютъ развѣсистую или сжатую настоящую метелку. . . . . 21.

17. Колоски скучены пучками и образуютъ лопастную однобочную метелку; пленки сплюснута килеватыя, острыя или заостренныя. . . . . 18.

Колоски на очень короткихъ ножкахъ или отчасти сидячіе собраны въ колосовидныя кисти, размѣщенныя въ свою очередь вѣтвистымъ — метельчатымъ или пальчатымъ — ложнымъ колосомъ (рис. 317). . . . . 19.



(Рис. 314).



(Рис. 315).



(Рис. 316).



(Рис. 317).

18. Колоски о 3—4 цвѣткахъ (рис. 314, а); наружныя чашечныя пленки много короче цвѣточныхъ (а, b) и нижняя короче верхней (b); нижняя цвѣточная пленка неравнобокая, на концѣ колючая (с); рыльца перистыя, сидячія, выступаютъ по бокамъ колоска (а); листовыя влагалища цѣльныя, не расщепленныя. . . . . ежи—*Dactylis* L.

Колоски обѣ 1 цвѣткѣ (рис. 315) съ 2 зачаточными боковыми, въ видѣ короткихъ чешуекъ, такъ что всего какъ бы 4 чашечныхъ пленки, изъ коихъ наружныя много длиннѣе обѣихъ внутреннихъ; рыльца кисточками на длинныхъ столбикахъ выступаютъ изъ верхушки колоска. . . . .

двукисточки—*Digraphis* Trin.

19. Колоски сплюснутые съ боковъ, тупые, о 3 цвѣткахъ (рис. 316); боковые цвѣтки обоеполые, верхній, или средній—мужской на ножкѣ; чашечныя пленки равныя, округленныя, вздутыя, кожистыя; цвѣточные—ланцетныя, заостренныя; нижняя у одного цвѣтка вытянута въ короткую ость . . .


зубровники—*Beckmannia* Host.

Колоски сплюснутые со спинки, заостренныя, объ 1 цвѣткѣ; чашечныя пленки заостренныя, очень неравныя: нижняя много короче верхней; цвѣточные пленки хрящеватыя; между нижними пленками чашечною и цвѣточною еще пленка неразвитаго цвѣтка; рыльца кисточками, окрашенныя, на столбикахъ . . . 20.

20. Колосовидныя кисти расположены метельчато; пленка неразвитаго цвѣтка, слѣдующая за короткою наружною пленкою, вытянута въ болѣе или менѣе длинную ость (рис. 318) . . . иглицы—*Echinochloa* P. B.

Колосовидныя кисти или ложные колосья размѣщены почти пальчато; ости ни при одной изъ пленокъ нѣтъ (рис. 319); колоски очень мелкіе, расположены попарно: изъ нихъ 1 на ножкѣ, другой почти сидячій . . .

пальчатки—*Digitaria* Scop.



(Рис. 318).

(Рис. 319).

(Рис. 320).

(Рис. 321).

21. (16) Колоски съ длинными волосками, превышающими ширину пленокъ; чашечныя пленки острыя, неравныя; нижняя цвѣточная пленка длиннѣе верхней цвѣточной; большіе злаки . . . 22.

Колоски внутри голые или ось ихъ подъ цвѣточными пленками покрыта лишь короткими волосками, далеко не достигающими ширины пленокъ . . . 23.

22. Колосокъ о 3—7 цвѣткахъ (рис. 320, а): нижній—голый, мужской или безполый; всѣ остальные обоеполые (b), съ длинными волосками; нижняя чашечная пленка вдвое короче верхней; нижняя цвѣточная пленка почти шловидная, въ 2—3 раза длиннѣе верхней; рыльца кисточками, окрашенныя, на столбикахъ довольно длинныхъ . . . тростники—*Phragmites* Trin.

Колосокъ объ 1 цвѣткѣ (рис. 321), съ волосистымъ столбцомъ—зачаткомъ 2 цвѣтка, или безъ столбца; нижняя чашечная пленка нѣсколько длиннѣе верхней и объ длиннѣе цвѣточныхъ пленокъ (b, а); нижняя цвѣточная пленка остистая, на верхушкѣ 2 или 4-зубчатая (b); рыльца не окрашенныя, перистыя, на короткихъ столбикахъ . . .

вѣйники—*Calamagrostis* Roth.

23. Злаки съ шершавоцѣпкими листьями и колосками; колоски голые, т. е. безъ чашечныхъ пленокъ вовсе или съ 4 зачаточными, объ 1

цвѣткѣ; цвѣточные пленки сильно сплюснуты съ боковъ, безъ ости (рис. 322); метелка рѣдкая, развѣсистая, съ извилистыми цвѣтоносами . . . . .

лерсія—*Léersia* Sol.

Злаки съ листьями и колосками гладкими или волосистыми, но не щетинисто-шершавыми; колоски съ чашечными пленками . . . . . 24.

24. Колоски сильно сплюснуты со спинки, съ чашечными пленками очень неравными (рис. 323, а): нижняя много меньше верхней; колосокъ обѣ 1 цвѣткѣ съ зачаточнымъ 2 цвѣткомъ въ пазухѣ цвѣточной пленки, одинаковой съ верхнею чашечною (b); цвѣточные пленки хрящеватыя; рыльца окрашенныя, кисточками, на длинныхъ столбикахъ, выступающихъ изъ подъ верхушки колоска; метелка развѣсистая, повислая, очень частая; листья широко-линейные . . . . . проса—*Panicum* L.



(Рис. 322).



(Рис. 323).



(Рис. 324).



(Рис. 325).



(Рис. 326).

Колоски со спинки округлые или на спинкѣ ребристые, т. е. сплюснутые съ боковъ; рыльца перистыя, почти сидячія. . . . . 25.

25. Чашечныя пленки длиннѣе или лишь немного короче цвѣточныхъ; метелка рѣдкая . . . . . 26.

Чашечныя пленки много короче цвѣточныхъ, которыя выступаютъ изъ за чашечныхъ пленокъ. . . . . 33.

26. Колоски обѣ 1 цвѣткѣ. . . . . 27.

Колоски о 2 цвѣткахъ и болѣе . . . . . 29.

27. Нижняя цвѣточная пленка на концѣ съ очень длинною остью, при основаніи сочлененною и 2 раза изогнутою; листья узкіе, желобчато-сплюснутые; метелка не выступаетъ изъ за верхнихъ листьевъ; чашечныя пленки почти равныя, остисто-заостренныя . . . . . ковыли—*Stipa* L.

Нижняя цвѣточная пленка безъ ости, рѣдко съ короткою прямою остью на спинкѣ; колоски очень мелкіе. . . . . 28.

28. Метелка растопыренная; колоски со спинки округленные или слегка сплюснутые (рис. 324); чашечныя пленки равныя, острыя, вздутыя; цвѣточные тоже одинакія, хрящеватыя, цѣльныя, безъ ости; листья широко-линейные . . . . . боры *Milium* L.

Метелка развѣсистая или сжатая; колоски съ боковъ сплюснутые (рис. 325); чашечныя пленки килеватыя, неравныя: нижняя нѣсколько длиннѣе верхней; цвѣточные пленки тоже неравныя, кожистыя: нижняя цвѣточная пленка значительно длиннѣе верхней (иногда верхней и нѣтъ), цѣльная или зубчатая, и тогда остистая; ось колоска подъ цвѣткомъ съ короткими волосками . . . . .

полевицы—*Agròstis* L.

29 (26). Колоски снаружи волосистые, тусклые, о 2 цветках (рис. 326): нижний обоеполюй без ости, верхний мужской на нижней пленке с остью; чашечные и цветочные пленки неравные: нижняя чашечная об 1 жилке, острая, уже и несколько короче верхней о 3 жилках; перистые рыльца выступают у основания колоска . . . . . бухарники—*Holcus* L.

Колоски снаружи голые, лоснящиеся; цветки обоеполюе или только один нижний мужской. . . . . 30.

30. Нижняя цветочная пленка на верхушке усеченная, многозубчатая; на спинке с остью, верхняя пленка—цельная; колоски мелкие о 2 цветках, обоеполюх (рис. 327) . . . . . луговики—*Deschampsia* P. B.

Нижняя цветочная пленка цельная или на верхушке 2-зубчатая; колоски б. ч. крупные о 2 цветках и больше . . . . . 31.



(Рис. 327).



(Рис. 328).



(Рис. 329).



(Рис. 330).

31. Чашечные пленки длиннее цветочных и облекают их; колоски о 3 цветках (рис. 328): 2 боковых—мужские о 3 тычинках; средний обоеполюй о 2 тычинках; нижние цветочные пленки цельные, у мужских цветков вытянуты в короткую ость; верхняя—2-зубчатая, у обоеполаго цветка—цельная; рыльца почти перистые выступают у верхушки колоска; трава пахнет сухим сеном . . . . . лядники—*Hierodchloa* Gmel.

Чашечные пленки почти такой же длины, как и цветочные; колоски о 2 цветках и больше, обоеполюх, только иногда один нижний мужской; нижняя цветочная пленка обыкновенно с остью, скрученную в нижней части и согнутою колѣномъ; ось колоска, по крайней мере под самым нижним цветком, покрыта волосами. . . . . 32.

32. Из 2 цветков, сближенных в колоске, нижний—мужской с длиною согнутою остью; верхний—обоеполюй, без ости или с короткою прямою остью (рис. 329) . . . . . шибечники—*Arrhenatherum* P. B.

Все развитые цветки (2 и больше) в колоске обоеполюе, раздвинутые по оси колоска, обыкновенно на спинке нижних цветочных пленок со скрученную остью (рис. 330) . . . . . овсы—*Avena* L.

33 (25). Соломина безлистная и без узлов, только при нижних листьях с узлами; пыльники, рыльца и колоски лиловые; колоски мелкие о 2—5 цветках, с булабовидным столбцом—зачаточным вершинным цветком (рис. 331); цветочные пленки почти равные, на спинке округлые, внизу вздутые, без ости; ось колоска под цветками с короткими волосами; болотные злаки . . . . . молиния—*Molinia* Schrk.

Соломинка по всей длинѣ съ узлами и листьями; пыльники и рыльца не окрашенные . . . . . 34.

34. Колоски обѣ 1, 2 развитыхъ цвѣткахъ; только однѣ чашечныя пленки черепичато покрываютъ наружныя цвѣточные пленки; чашечныя пленки неравныя: нижняя б. м. короче верхней. . . . . 35.

Колоски обыкновенно о многихъ цвѣткахъ; кромѣ чашечныхъ пленокъ и наружныя цвѣточные черепичато покрываютъ однѣ другія . . . . . 37.

35. Колоски на спинкѣ ребристые, обѣ 1 цвѣткѣ (рис. 332), очень мел-



(Рис. 331).

(Рис. 332).

(Рис. 333).

(Рис. 334).

кіе, съ выступающею наружу остью со спинки 2-зубчатой наружной цвѣточной пленки, съ волосками при основаніи ея; развѣсистая, частая метелка. . . . . метлицы—*Apëra* Adans.

Колоски на спинкѣ округлые, о 2 развитыхъ цвѣткахъ, безъ ости и безъ волосковъ; чашечныя пленки тупыя; листовыя влагалища вполнѣ или отчасти цѣльныя, не расщепленныя . . . . . 36.

36. Колоски очень мелкіе (рис. 333); чашечныя пленки много короче цвѣточныхъ и очень неравны: нижняя овальная, тупо выемчатая, 1-нервная; верхняя много шире, неправильно закругленная, о 3 нервахъ; нижняя цвѣточная пленка тупая; листовыя влагалища въ нижней половинѣ цѣльныя; водяные знаки . . . . . катаброза—*Catabrosa* P. V.

Колоски среднихъ размѣровъ, блестящіе, выпуклые, съ большимъ булавовиднымъ зачаткомъ 3 цвѣтка (рис. 334); чашечныя пленки продолговатыя, лишь немного короче цвѣточныхъ, верхняя немного длиннѣе нижней; нижняя цвѣточная пленка острая, хрящеватая, вверху перепончатая; листовыя влагалища вполнѣ цѣльныя; колоски на понижшихъ пушистыхъ ножкахъ; метелка однобокая. . . . . перловники—*Mëlica* L.

37 (34). Колоски, съ чашечными и цвѣточными пленками гилеватыми, острыми или заостренными, мелкіе, сплюснутые съ боковъ, овальные или ланцетные (рис. 334); нижняя цвѣточная пленка безъ ости . . . . .

мятлики—*Poa* L.

Колоски съ чашечными и въ особенности цвѣточными пленками на спинкѣ округленными; нижняя цвѣточная пленка безъ ости или съ остью на верхушкѣ, или же подъ самую верхушкою; колоски сплюснутые или цилиндрическіе . . . . . 38.

38. Колоски сердцевидные, широкіе, округло тупые (рис. 336, а); чашечныя пленки равныя (b); нижняя цвѣточная пленка внизу съ сердцевид-

ными ушками, безъ ости, охватываетъ верхнюю пленку (с); колоски блестящіе, на тонкихъ цвѣтоносахъ, подъ конецъ повислые . . . . .

трясушки—*Briza* L.

Колоски не сердцевидные, продолговатые; чашечныя пленки неравныя: нижняя всегда болѣе или менѣе короче верхней . . . . . 39.



(Рис. 335).



(Рис. 336).



(Рис. 337).



(Рис. 338).

39. Вѣтви метелки послѣдовательно выходятъ съ 2 противоположныхъ сторонъ 4-граннаго цвѣточного стержня, и потому попеременно 2-рядныя; листовыя влагалища только вверху расщепленныя, въ нижней части цѣльныя; рыльца выходятъ съ боку пушистой вверху завязи (рис. 337, а); колоски большіе, ланцетные или овальные, о 5 — 9 цвѣткахъ (рис. 338); чашечныя пленки неравныя; нижняя цвѣточная пленка на верхушкѣ или подъ 2-зубчатою верхушкою съ остію (рис. 337, б), рѣдко почти безъ ости . . . . .

костры—*Bròmus* L.

Вѣтви метелки попеременно выходятъ съ 2 сторонъ 3-граннаго цвѣточного стержня, поэтому однобочныя; листовыя влагалища либо вполнѣ расщепленныя, либо вполнѣ цѣльныя; рыльца или столбики выходятъ изъ верхушки завязи . . . . . 40.

40. Листовыя влагалища цѣльныя; нижняя цвѣточная пленка тупая или притупленная, безъ ости, б. ч. съ 7 толстыми жилками; на каждой чашечной пленкѣ по 1 жилкѣ (рис. 339); большіе водяные злаки . . . . .

манники—*Glycèria* R. Br.



(Рис. 339).



(Рис. 340).



(Рис. 341).

Листовыя влагалища расщепленныя; нижняя цвѣточная пленка безъ ости или съ остію, тупая или острая; верхняя чашечная пленка б. ч. о 3 или 5 жилкахъ . . . . . 41.

41. Ось колосковъ подъ цвѣтками волосистая (рис. 340); нижняя цвѣ-



точная пленка о 3 зубцах на верхушкѣ, безъ ости, о 7 жилкахъ; верхняя цвѣточная — съ густыми рѣсничками на жилкахъ; чашечныя пленки острия; нижняя чашечная пленка о 3 жилкахъ, верхняя о 5; большой бо-  
лотный злакъ съ крупною, но не густою метелкою . . . . .  
трезубки—*Scolòchloa* Lk.

Ось колосковъ подъ цвѣтками голая; нижняя цвѣточная пленка цѣльная, безъ ости или съ остью на концѣ; верхняя цвѣточная—на жилкахъ, съ короткими рѣсничками; нижняя чашечная пленка обѣ 1 жилкѣ, верхняя б. ч. о 3 жилкахъ . . . . . 42.


42. Колоски сплюснутые съ боковъ (рис. 341); нижняя цвѣточная пленка ланцетная, кверху суженная; вѣтви метелки пероховатыя . . . . .

овсянницы—*Festuca* L.


Колоски цилиндрическіе; нижняя цвѣточная пленка округло-тупая, вверху широко-перепончатая, неясно 5-нервная; листья въ почкосложеніи складчатые. . . . . безкильники—*Atròpis* Rupr.

XXVII. \**Hippocastaneae* DC.—желудниковыя. Деревца съ листьями супротивными, пальчато-сложными; цвѣтки ярко окрашенные въ большихъ пирамидкахъ; чашечка 5-зубчатая; вѣнчикъ неправильный о 4, 5 лепесткахъ съ длинными ноготками, прикрѣпленными, какъ и 7 (5—8) неравныхъ тычинокъ, къ околопестичному диску; завязь 3-гнѣздная; коробочка крупная, шаровидная.

а. Чашечка колокольчатая (рис. 342, б); лепестковъ б. ч. 5, растопыренныхъ (а); тычинокъ 7, выдающихся изъ вѣнчика и отогнутыхъ книзу (а);



(Рис. 342).



(Рис. 343).

коробочка колючая, съ травянистыми иглами . . . желудники—\**Aësculus* L.

б) Чашечка трубчатая (рис. 343, а); лепестковъ 4, прямыхъ; тычинокъ 5 — 8, прямыхъ, не длиннѣе вѣнчика (а); коробочка гладкая, безъ колючекъ . . . . . павія—\**Pavía* Boerh.

XXVIII. *Hydrocharideae* DC.—водокрасовыя. Односѣменодольныя, 2-домныя водяныя травы, съ пазушными цвѣтками, правильными, полными, тройчатыми, верхними; чашечка 3-листная, зеленая; вѣнчикъ 3-лепестный, бѣлый или розоватый; мужскіе цвѣтки о 12 и болѣе тычинкахъ; женскіе—съ нижнею завязью о 3, 6 двураздѣльныхъ рыльцахъ и съ зачаточными тычинками—стаминодіями; зеленая ягода.

1. Погруженный въ воду вѣтвистый стебель покрытъ мелкими, сидячими, мутовчатыми (3, 4) листьями, съ пазушными прилистными чешуйками; цвѣтки (рис. 344) одиночныя, только женскіе, сидячіе въ 2-лопастномъ прозрачно-пленчатомъ чехлѣ; чашечка съ очень длинною нитевидною трубкою; вѣнчикъ

маленькій, розовый; 3 стаминодія и 3 сидячих рыльца, пурпуровыхъ; завязь простая . . . . . болотницы—*Elodea* Rich. & Mich.

Стебель съ побѣгами; листья розеткою; цвѣтки окружены 2-листной оберткою; женскіе одиночныя о 6, 12 стаминодіяхъ; мужскіе по 3 на цвѣтоножкахъ, съ черешчатою оберткою; вѣнчикъ крупный, бѣлый; завязь 6-губная о 6 рыльцахъ. . . . . 2.


2. Листья сидячіе, широколинейные, волночезубчатые, погруженные въ воду; обертка соцвѣтій кожистая, остающаяся; мужскіе цвѣтки безъ всякихъ слѣдовъ завязи со множествомъ свободныхъ тычинокъ: около 12 внутрен-



(Рис. 344).



(Рис. 345).



(Рис. 346).

няго ряда съ линейными пыльниками и почти столько же короткихъ стаминодій; женскіе цвѣтки почти сидячіе тоже со многими стаминодіями (рис. 345).

тѣлорѣзы—*Stratiotes* L.

Листья длинно-черешковые, широкіе, сердцевидные, плавающие, съ 2 большими прозрачными прилистниками; обертка соцвѣтій пленчатая, у женскихъ цвѣтковъ сидячая; мужскіе цвѣтки съ зачаточною завязью и о 12 тычинкахъ, сросшихся внизу кольцомъ, вверху попарно, съ овальными пыльниками; 3 наружныхъ тычинки безъ пыльниковъ—стаминодіи; женскіе цвѣтки на длинныхъ цвѣтоножкахъ о 6 стаминодіяхъ, попарно спаянныхъ (рис. 346)

. . . . . водокрасы—*Hydrocharis* L.



(Рис. 347).



(Рис. 348).

**XXIX. Irideae** Juss.—касатиковыя. Травы односѣменодольныя, съ очевидными листьями и 3-чатыми, крупными, яркими цвѣтками, въ кистяхъ или колосомъ, съ большими прицвѣтниками; околоцвѣтникъ верхній, двойной, въ видѣ глубоко 6-раздѣльнаго вѣнчика, о 3 тычинкахъ, съ пыльни-

ками, вскрывающимися наружу; завязь нижняя, 3-гнѣздная обь 1 столбикъ съ 3 лепестковидными рыльцами; коробочка 3-гнѣздная, 3-створчатая.

а) Цвѣтки на длинныхъ ножкахъ въ малоцвѣтной кисти, съ верхушечнымъ цвѣткомъ; верхній боковой цвѣтокъ съ 1 прицвѣтникомъ; нижній съ 3; околоцвѣтникъ правильный (рис. 347), наружныя доли его отогнуты, внутреннія прямыя; столбикъ короткій, 3-гранный; рыльца очень широкія, къ верхушкѣ 2-лопастныя; сѣмена ребристыя . . . . . касатики—Iris L.

б) Цвѣтки сидячіе въ частомъ одностороннемъ колосѣ, безъ верхушечнаго цвѣтка; всѣ съ 2 большими зелеными прицвѣтниками (рис. 348, а); околоцвѣтникъ слегка неправильный, нѣсколько 2-губый, съ короткою трубкою, книзу согнутою; столбикъ длинный нитевидный, съ рыльцами цѣльными, почти лепестковидно расширенными (b); сѣмена крылатыя (c); клубнелуковицы . . . . . шпажники—Gladolus L.

XXX. Juncaceae DC.—ситниковыя. Односѣменодольныя травы съ листьями стеблеобъемлющими, линейными или цилиндрическими и 3-чатыми цвѣтками въ ободкахъ, скученныхъ иногда въ головки или колосы; околоцвѣтникъ пленчатый, двойной, о 6 листкахъ, б. м. спаянныхъ внизу; тычинокъ 6 (3), прикрѣпленныхъ къ самому основанію листковъ околоцвѣтника; завязь верхняя съ 1 столбикомъ о 3 нитевидныхъ рыльцахъ; коробочка 3-створчатая.



Рис. 349).



(Рис. 350).

а) Листья цилиндрическіе, линейно шиловидные, корневые или стеблевые; листочки околоцвѣтника слегка спаянные внизу (рис. 349, а); тычинокъ 6 или 3; коробочка 3-гнѣздная, многосѣменная (b, c); створки отдѣляются съ перегородками по срединѣ (c); сѣмена безъ придатковъ . . . . .

ситники—Juncus L.

б) Листья плоскіе, широколинейные, по краямъ съ клочковатыми волосками; листочки околоцвѣтника вполне сросшіяся внизу (рис. 350, а); тычинокъ постоянно 6; коробочка простая, 3-сѣменная (b); створки безъ перегородокъ; сѣмена съ бѣлымъ мѣшечатымъ придаткомъ (c) . . . . .

ожики—Luzula DC.


XXXI. Juncagineae Rich.—ситниковидныя. Односѣменодольныя, болотныя травы, съ влагалищными узколинейными, желобчатыми листьями и цвѣтками 3-чатыми въ кистяхъ; околоцвѣтникъ 2-рядный, зеленый, нижній; тычинокъ 6; завязей 3 (6), сросшихся вполне или только внизу, съ 3 (6) сидячими рыльцами; зрѣлый плодъ распадается на 3 (6) свободныхъ мѣшечка.

а) Стебель покрытъ листьями; цвѣтки въ рѣдкихъ кистяхъ; околоцвѣтникъ 6-раздѣльный, остающійся (рис. 351, а); доли внутреннего ряда уже;

пыльники съ выдающимся связникомъ; завязи срослись только внизу, съ косо насаженнымъ кнаружи рыльцемъ; мѣшечки вздутые (б) . . . . .

шейхцерія—*Scheuchzeria* L.

б) Листья въ корневой розеткѣ, 2-рядные; цвѣтки на стрѣлкѣ густою кистью; околоцвѣтникъ 6-листный, опадающій (рис. 352—а, б): внутренние



(Рис. 351).


(Рис. 352).

3 листка его приподняты надъ 3 наружными; связникъ не выдается; 3 или 6 завязей о 3,6 рыльцахъ срослись вполне; мѣшечки отдѣляются отъ плодоваго стержня снизу вверхъ (d) . . . . . триостренники—*Triglochin* L.

XXXII. Labiatae Juss.—губоцвѣтныя. Листья супротивные; цвѣтки полные въ пазухахъ стеблевыхъ листьевъ или прицвѣтниковъ, въ полумутовкахъ, различнымъ образомъ расположенныхъ; чашечка трубчатая, остающаяся; вѣнчикъ б. ч. губастый, рѣдко почти правильный; тычинокъ 4 (2), въ 2-большинствѣ; завязь 4-лопастная, со столбикомъ въ срединѣ, распадается на 4 односѣменныхъ орѣшка.

1. Вѣнчикъ почти правильный, колокольчатый или ворончатый, съ 4-лопастнымъ плоскимъ отгибомъ; чашечка 5-зубчатая; тычинки растопыренные; цвѣтки мелкіе . . . . . 2.

Вѣнчикъ неправильный, губастый . . . . . 4.



(Рис. 353).

(Рис. 354).

(Рис. 355).

(Рис. 356).

(Рис. 357).

2. Листья перистонадрѣзные или перистораздѣльные; цвѣтки бѣлые о 2 тычинкахъ (рис. 353); вѣнчикъ почти равенъ колокольчатой чашечкѣ; 1 зубецъ чашечки короче прочихъ; полумутовки частыя въ пазухѣ стеблевыхъ листьевъ . . . . . зюзники—*Lycopus* L.

Листья зубчатые или городковые; цвѣтки лиловые о 4 тычинкахъ; вѣнчикъ длиннѣе чашечки о 5. равныхъ зубцахъ . . . . . 3.

3. Полумутовки скучены въ односторонние ложные колосья, въ пазухѣ 2-рядныхъ прицвѣтниковъ, попеременно съ желвакомъ при основаніи; прицвѣт-

ники длиннѣ цвѣтковь; тычинки неравны: нижнія длиннѣ (рис. 354); гнѣзда пыльниковъ разобщены, подѣ конецъ сливаются . . . . .

шандры—† *Elsshölzia* Willd.

Полумутовки въ пазухѣ стеблевыхъ листьевъ или же въ пазухѣ короткихъ прицвѣтничковъ безъ желвака, и тогда образуютъ колосъ, но не односторонній; тычинки почти равныя (рис. 355); гнѣзда пыльниковъ разобщены и не сливаются . . . . . мяты—*Mentha* L.

4 (2). Верхняя губа вѣнчика очень короткая, выемчатая (рис. 356, а); нижняя губа вѣнчика 3-надрѣзная, средняя лопасть ея выемчатая (б); чашечка 5-зубчатая; тычинки сближенные, далеко выдаются изъ трубки вѣнчика, съ волосянымъ кольцомъ, нижнія длиннѣ; гнѣзда пыльниковъ растопыренные, подѣ конецъ сливаются; вѣничикъ увядаетъ и облекаетъ плодъ; столбикъ остающийся; полумутовки въ верхушечномъ ложномъ колосѣ, въ пазухѣ окрашенныхъ прицвѣтныхъ листьевъ . . . . . живучки—*Ajuga* L.

Верхняя губа вѣнчика развита; вѣничикъ 2-губый . . . . . 5.

5. Верхняя губа вѣнчика плоская . . . . . 6.


Верхняя губа вѣнчика выпуклая, часто шлемовидная . . . . . 14.

6. Чашечка правильная, о 5 зубцахъ, рѣдко вовсе безъ зубцовъ . . . . . 7.

Чашечка 2-губая: верхняя губа ея о 3 ланцетныхъ зубцахъ; нижняя о 2 узкихъ, отогнутыхъ; верхняя губа вѣнчика выемчатая, нижняя 3-лопастная: лопасти ровныя; тычинки приподняты; пыльники округлые, гнѣзда ихъ разобщены связникомъ . . . . . 12.

7. Листья лопастные или пальчатонадрѣзные; верхняя губа вѣнчика цѣльнокрайняя (рис. 357); нижняя отвислая, узкая, по опыленіи скрученная, какъ и болѣе длинныя нижнія тычинки, отогнутыя тогда книзу (а); чашечка губарчатая о 5 жилкахъ; чашечные зубцы колючие: 2 нижнихъ отогнутыхъ нѣсколько длиннѣ (а, б); трубка вѣнчика съ косымъ волосянымъ кольцомъ . . . . . пустырники—*Leonurus* L.


Листья цѣльные или зубчатые; верхняя губа выемчатая или 2-надрѣзная; нижняя губа и паружныя тычинки не скрученныя; чашечка не колючая . . . . . 8.



(Рис. 358).



(Рис. 359).



(Рис. 360).



(Рис. 361).



(Рис. 362).

8. Листья цѣльнокрайніе; тычинки растопыренные, нижнія длиннѣ верхнихъ; пыльники съ расширеннымъ связникомъ . . . . . 9.

Листья городковые или зубчатые; тычинки сближенные и прикрыты верхней губою, верхнія длиннѣ нижнихъ; гнѣзда пыльниковъ сливаются и вскрываются продольною щелью; средняя лопасть нижней губы большая, широкая . . . . . 11.

9. Цвѣтки мелкіе на ножкахъ, въ рѣдкихъ полумутовкахъ въ пазухѣ узкихъ стеблевыхъ листьевъ; чашечка колокольчатая о 10 жилкахъ; тычинки

согнуты дугою и нѣсколько сближены подъ верхнюю губою вѣнчика (рис. 358).  
 . . . . . чабры—\**Satureja* L.

Цвѣтки скучены въ частыя полумутовки, расположенныя ложными колосьями или головками; тычинки отогнуты наружу . . . . . 10.

10. Полумутовки сидячія въ пазухахъ узкихъ верхнихъ листьевъ образуютъ верхушечный односторонній ложный колосъ; чашечка трубчато-ворончатая о 15 жилкахъ (рис. 359); нижняя губа вѣнчика съ большою среднею лопастью, обратно-серцевидною; гнѣзда пыльниковъ вверху сливаются . . .

иссопъ—\**Hyssopus* L.

Цвѣтки въ пазухѣ черепичатыхъ прицвѣтничковъ образуютъ колосъ или головки, расположенныя верхушечнымъ и боковымъ щиткомъ или клубочкомъ; чашечка 5-зубчатая или цѣльнокрайняя, расщепленная спереди, о 10—13 жилкахъ; нижняя губа вѣнчика о 3 равныхъ лопастяхъ (рис. 361); гнѣзда пыльниковъ вверху разобщены; цвѣтки мелкіе. . . душицы—*Origanum* L.

11. Стебель ползучій, укореняющійся; цвѣтки по 1—3 въ пазухѣ стеблевыхъ листьевъ; чашечка трубчатая съ шиловидными зубцами (рис. 360, а), въ 2, 3 раза короче вѣнчика; средняя лопасть нижней губы въ зѣвѣ бороздчатая (b); гнѣзда пыльниковъ расходятся подъ тупымъ угломъ и попарно крестомъ (b) . . . . . будры—*Glechoma* L.

Стебель прямой, цвѣтки въ пазухѣ прицвѣтныхъ листьевъ мутовками, расположенными верхушечнымъ и боковыми колосьями или кистями; чашечка съ зубцами острыми или заостренными, вдвое короче вѣнчика (рис. 362); средняя лопасть нижней губы вогнутая; гнѣзда пыльниковъ сливаются, прямо расходятся и открываются продольною щелью . . . котовики—*Nepeta* L.



(Рис. 363).



(Рис. 364).



(Рис. 365).



(Рис. 366).



(Рис. 367).

12 (6). Листья цѣльнокрайніе, трубка чашечки колокольчатая, короткая, прямая, по отцвѣтаніи закрывается вѣнцомъ волосковъ (рис. 363, b); тычинки растопырены (a) . . . . . тимьяны—*Thymus* L.

Листья зазубренные; трубка чашечки цилиндрическая, длинная, изогнутая, тычинки согнуты дугою и сближены подъ верхнюю губою вѣнчика . . 13.

13. Цвѣтки по 3—5 въ пазухѣ стеблевыхъ листьевъ; трубка чашечки подъ зубцами сужена (рис. 364); зѣвъ ея по отцвѣтаніи закрытъ вѣнцомъ волосковъ . . . . . душистики—*Calamintha* Moench.

Цвѣтки скучены въ большомъ числѣ въ верхушечную головку, окруженную пучкомъ длинныхъ шиловидныхъ прицвѣтничковъ; трубка чашечки не сужена подъ зубцами (рис. 365); зѣвъ ея безъ вѣнца волосковъ . . .

пахучки—*Clinopodium* L.



14 (5). Чашечка о 5 зубахъ, равныхъ или неравныхъ. . . . . 15.

Чашечка явственно 2-губая, съ зубцами, направленными вверхъ и внизъ. . . . . 22.

15. Чашечка 5-надрѣзная: верхній зубецъ больше и шире прочихъ (рис. 366, б); верхнія тычинки длиннѣ нижнихъ; верхняя губа вѣнчика въ видѣ колпачка, выемчатая и прямо вытянута (а); нижняя губа 3-лопастная, съ большою плоскою среднею лопастью, обратно-сердцевидною (а). . . . .

змѣеголовники—*Dracoscephalum* L.

Чашечка 5-зубчатая; зубы ея всѣ равны или 2 верхнихъ нѣсколько длиннѣ; нижнія тычинки длиннѣ верхнихъ; верхняя губа вѣнчика б. ч. шлемовидная. . . . . 16.

16. Чашечка о 5 равныхъ шиловидныхъ зубахъ, съ городками по сторонамъ, окружена длинными шиловидными прицвѣтниками (рис. 367); 2 переднія тычинки, болѣе длинныя, съ серповиднымъ отросткомъ. . . . .

зопники—*Phlomis* L.

Чашечка съ зубцами ланцетными или треугольными, безъ городковъ между ними; серповидныхъ отростковъ у тычинокъ нѣтъ. . . . . 17.



(Рис. 368).

(Рис. 369).

(Рис. 370).

(Рис. 371).

(Рис. 372).

17. Чашечка ворончатая, съ выдающимися 10 жилками, о 5 равныхъ, широкихъ, треугольно-овальныхъ зубахъ, суженныхъ въ колючку (рис. 368, а); трубка вѣнчика съ волосянымъ кольцомъ (б); цвѣтки съ прицвѣтниками очень узкими, короче чашечки (а). . . . . бѣлокудренники—*Ballota* L.

Чашечка съ ланцетными колючими зубцами, не вполне равными; цвѣтки безъ узкихъ прицвѣтничковъ. . . . . 18.

18. Боковые лопасти нижней губы не развиты, въ видѣ короткихъ острыхъ зубцовъ (рис. 369, а), средняя лопасть очень большая, обратно-сердцевидная, при основаніи стянута въ ножку; пыльники бородачатые. . . . .

яснотки—*Lamium* L.

Нижняя губа вѣнчика 3-лопастная; средняя лопасть больше боковыхъ; пыльники голые. . . . . 19.

19. Лопасти нижней губы ланцетныя, острыя, цѣльнокрайнія, средняя лопасть нѣсколько больше (рис. 370); трубка вѣнчика съ косымъ волосянымъ кольцомъ. . . . . зеленчуки—*Galeobdolon* Huds.

Нижняя губа вѣнчика тупая; средняя лопасть ея много больше остальныхъ, обратно-сердцевидная или обратно-яйцевидная. . . . . 20.

20. Средняя лопасть нижней губы при основаніи у краевъ съ полымъ прямымъ зубцомъ съ каждой стороны (рис. 371); волосянаго кольца въ трубкѣ

вѣнчика нѣтъ; пыльники вскрываются поперекъ 2 створками . . . . .

пикульники—*Galeopsis* L.


Нижняя губа вѣнчика безъ полыхъ прямыхъ зубцовъ; пыльники вскрываются одною продольною щелью . . . . . 21.

21. Ложный вершинный колосъ замѣтно раздѣленъ верхними листьями на отдѣльныя мутовки; трубка вѣнчика съ волосянымъ кольцомъ; обѣ длинныя тычинки по опыленіи скручены и отогнуты наружу (рис. 372); гнѣзда пыльниковъ расходятся прямолинейно . . . . . чистецы—*Stachys* L.

Всѣ цвѣточныя мутовки сближены и скучены въ вершинный колосъ, окруженный только 2 верхними листьями; трубка вѣнчика безъ волосянаго кольца; тычинки по опыленіи не отогнуты внизъ и не скручены (рис. 373—а, b); гнѣзда пыльниковъ не расходятся прямолинейно (b). . . . . буквицы—*Betonica* L.




(Рис. 373).




(Рис. 374).

22 (14). Цвѣтки по одиночкѣ въ пазухѣ стеблевыхъ листьевъ, обращены въ одну сторону; губы чашечки цѣльныя, на спинкѣ ея верхней губы прямой выростъ (рис. 374—а, b); чашечка облекаетъ плодъ, растрескивается вдоль, такъ что верхняя губа съ выростомъ отпадаетъ; верхняя губа вѣн-



(Рис. 375).



(Рис. 376).

чика 3-лопастная (с, а), нижняя губа цѣльная; пыльники разобщены, по краямъ рѣсничные, вскрываются общою щелью . . . . . шлемники—*Scutellaria* L.

Цвѣтки мутовками въ пазухѣ прицвѣтниковъ образуютъ верхушечный ложный колосъ; чашечка безъ выроста на верхней губѣ; верхняя губа вѣнчика цѣльная или слегка выемчатая, сплюснутая съ боковъ; нижняя—3-лопастная . . . . . 23.

23. Верхняя губа чашечки о 3 короткихъ остисто-колючихъ зубцахъ; нижняя губа—о 2 (рис. 375, b); чашечный зѣвъ по отцвѣтаніи закрытъ; трубка вѣнчика внизу перетянута (а), съ волосянымъ кольцомъ; верхняя губа вѣн-

чика цѣльная, средняя лопасть нижней губы вогнутая, городковая (а); 2 длинных тычинки подъ пыльниками съ зубцомъ (с), 2 другихъ безъ зубцовъ; пыльники рѣсничные, каждый вскрывается особою щелью . . . . .

черноголовки—*Brunella* L.

Верхняя губа чашечки цѣльная или 3-зубчатая, нижняя 2-надрѣзная (рис. 376, а); верхняя губа вѣнчика почти цѣльная, средняя лопасть нижней губы округлая; только 2 нижнихъ тычинки съ пыльниками сближены подъ верхнею губою (b); нити ихъ очень короткія; связникъ очень длинный, въ видѣ коромысла, и сочлененъ съ тычинковою нитью: одно колѣно его поднято къ верхней губѣ и окапчивается 1-гнѣзднымъ пыльникомъ; другое колѣно короткое опущено, съ маленькимъ другимъ гнѣздомъ или вовсе безъ гнѣзда . .

шалфеи—*Salvia* L.


**XXXIII. Liliaceae DC.** — лилейныя. Одноѣмнородныя луковичныя, съ 3-чатыми цвѣтками; околоцвѣтникъ окрашенный, 6-лиственный; тычинокъ 6, прикрѣпленныхъ къ цвѣтоложу или къ основанію околоцвѣтника; завязь верхняя, 3-гнѣздная обѣ 1 цѣльномъ столбикѣ, съ рыльцемъ тупымъ или 3-лопастнымъ; коробочка 3-гранная, 3-створчатая, 3-гнѣздная.

1. Цвѣтки на цвѣточной стрѣлкѣ, вполнѣ голыя или только внизу покрытой длинными влагалищами корневыхъ листьевъ; околоцвѣтникъ безъ медниковой ямки; тычинки прикрѣплены къ основанію околоцвѣтника; пыльники прикрѣплены къ нитямъ спинкою; рыльце тупое; гнѣзда коробочки малосѣмныя . . . . . 2.

Цвѣтки на стеблѣ, покрытомъ сидячими листьями; рыльце 3-лопастное или 3-гранное . . . . . 3.



(Рис. 377).



(Рис. 378).

2. Цвѣтки мелкіе (рис. 377, а), красноватые или бѣловатые, въ ложномъ зонтикѣ, съ 2-листной оберткою, облекающею зонтикъ до его распусканія; околоцвѣтникъ остающійся; нити тычинокъ внизу расширены и сходятся (b), часто съ зубцами; столбикъ нитевидный (с), остающійся по вскрытіи коробочки, вѣдренъ въ средину 3-гнѣздной завязи . . . . . чесноки—*Allium* L.

Цвѣтки среднихъ размѣровъ, синіе, въ рѣдкой кисти, безъ вершиннаго цвѣтка, съ прицвѣтниками; околоцвѣтникъ опадающій, слегка колокольчатый (рис. 378, а); нити тычинокъ не расширены и безъ зубцовъ; 3-гранный столбикъ прикрѣпленъ къ вершинѣ завязи (b) . . . . . пролѣски—*Scilla* L.

3. Цвѣтки въ ложномъ зонтикѣ или въ рѣдкой кисти, съ оттопыренными или отогнутыми листками околоцвѣтника . . . . . 4.

Цвѣтки одиночныя; околоцвѣтникъ колокольчатый, опадающій; сѣмянъ въ коробочкѣ много . . . . . 5.

4. Цвѣтки среднихъ размѣровъ въ ложномъ зонтикѣ, окруженномъ 2-стеблевыми листьями; околоцвѣтникъ остающійся (рис. 379, с), съ листьями

растопыренными (а) и медниками въ видѣ ямки, внутри желтый, снаружи зеленоватый; пыльники насажены на нить однимъ концомъ (b); столбикъ прямой; гнѣзда коробочки малосѣмнныя; приземистыя весеннія травы . . . . .

гусятники—*Gagea* Salisb.

Цвѣтки въ рѣдкой кисти, очень крупныя, ярко окрашенныя, съ 2 прицвѣтниками каждый; околоцвѣтникъ опадающій, съ отогнутыми и закрученными листками и съ медниками въ видѣ бороздки (рис. 380); пыльники при-



(Рис. 379).

крѣплены спинкою къ нити; столбикъ изогнутый; гнѣзда коробочки многосѣмнныя . . . . . лиліи—† *Lilium* L.

5 (3). Цвѣтокъ пазушный, повислый, на короткой ножкѣ; столбикъ вытянутый съ 3-лопастнымъ рыльцемъ (рис. 381); околоцвѣтникъ съ продолговатою медниковою ямкою; верхніе листья съ спирально скрученнымъ усикомъ на концѣ . . . . . рябчики—*Fritillaria* L.



(Рис. 380).



(Рис. 381).



(Рис. 382).


Цвѣтокъ верхушечный на концѣ стебля, только до распусканія поникшій; рыльце сидячее, тупо и коротко 3-лопастное (рис. 382); медниковою ямки нѣтъ . . . . . тюльпаны—*Tulipa* L.

XXXIV. *Lythraceae* Juss.—дербенниковыя. Травы съ листьями супротивными и цвѣтками пазушными, почти сидячими, 6-ными, о 2 прицвѣтникахъ; чашечка остающаяся трубчатая, о 12 зубцахъ; зубцы 2-рядные, попеременно прямые и отогнутые, наружные короче; 6 лепестковъ прикрѣплены къ верхнему краю чашечной трубки и чередуются съ внутренними прямыми зубцами чашечки; тычинки (6,12) тоже прикрѣплены къ чашечной трубкѣ; завязь 2-гнѣздная, объ 1 столбикѣ, съ простымъ рыльцемъ; коробочка 2-гнѣздная, кожистая, неправильно разрывающаяся.

а) Пушистыя травы, съ прямымъ, простымъ стеблемъ; листья сидячіе, острые, иногда мутовчатые (по 3); цвѣтки малиновые, довольно крупныя, въ полумутовкахъ, расположенныхъ колосомъ; чашечка ворончато-цилиндрическая

(рис. 383, а); лепестки прикрѣплены къ срединѣ ея трубки или глубже; тычинокъ 12 (b); коробочка продолговатая . . . дербенники—*Lythrum* L.

б) Мелкія голыя береговые травы съ вѣтвистымъ стелющимся стеблемъ, часто укореняющимся; листья тупые; цвѣтки одиночные, пазушные, съ вѣнчикомъ очень маленькимъ, опадающимъ, розовымъ (рис. 384, b); иногда его



(Рис. 383).



(Рис. 384).

нѣтъ; тычинокъ 6, прикрѣпленныхъ къ верхнему краю колокольчатой чашечки (а) . . . . . окучники—*Péplis* L.

**XXXV. Malvaceae R. Br.**—просвирняковыя. Травы; листья пальчато-лопастные или пальчато-раздѣльные, съ прилистниками; цвѣтки пазушные, съ оберткою въ видѣ наружной чашечки; чашечка въ почкосложеніи створчатая, 5-надрѣзная; 5 лепестковъ, въ почкосложеніи скрученныхъ; тычинки срослись въ трубку; пыльники одногнѣздные, вскрываются полукольцомъ; завязи и столбики внизу срослись и расширены дискомъ или конусомъ; плоды 1-сѣменные, почковидные, собраны въ приплюснутый кружокъ, зрѣлые отдѣляются по одиночкѣ.

а) Наружная чашечка 3-листная, при основаніи срослась съ чашечкой (рис. 385); цвѣтки б. ч. скучены въ пазушные пучки . . . просвирняки—*Málva* L.



(Рис. 385).



(Рис. 386).

б) Наружная чашечка 3-лопастная, свободная (рис. 386); цвѣтки одиночные, на длинныхъ ножкахъ, крупныя . . . . . хатьмы—*Lavatera* L.

**XXXVI. Najadeae Endl.**—рѣзакковыя. Односѣменодольныя водныя травы, съ цѣльными листьями; перепончатые прилистники обыкновенно охватываютъ стебель въ видѣ пазушнаго влагалища; цвѣточный покровъ зачаточный или его нѣтъ вовсе; 1 или 4 тычинки состоятъ только изъ сидячаго пыльника; 1 или 4 завязи; орѣшекъ или костянка.

1. Цвѣтки въ колосьяхъ, обоеполые, безъ околоцвѣтника (рис. 387, а); 4 сидячихъ пыльника съ гнѣздами, разобщенными связникомъ, который расширенъ въ большую чешуйку въ видѣ лепестка (с); столбиковъ нѣтъ,

рыльце сидячее; 4 сидячихъ костянки (b); листья очередные, цѣльнокрайніе . . . . . рдесты—*Potamogeton* L.

Цвѣтки одиночные, пазушные, однополые: мужскіе цвѣтки обь одной тычинкѣ съ 1 пыльникомъ; женскій цвѣтокъ съ нитевиднымъ столбикомъ; однодомныя травы съ узколинейными, ложнумотовчатыми листьями (по 3 сближенныхъ листа въ мутовкѣ) . . . . . 2.



(Рис. 387).



(Рис. 388).



(Рис. 389).

2. Листья цѣльнокрайніе, нитевидные; прилистники цѣльные; мужскіе цвѣтки голые, безъ околоцвѣтника, на длинной ножкѣ въ видѣ тычиночной нити, несущей 1 пыльникъ (рис. 388); связникъ вытянутъ въ короткое остріе; женскій цвѣтокъ съ маленькимъ зачаточнымъ перепончатымъ околоцвѣтникомъ, о 4 плодникахъ; рыльце въ видѣ щитка (рис. 388); 4 орѣшка на короткихъ ножкахъ . . . . . занихелія—*Zanichellia* L.

Листья шиновато-мелкозубчатые; прилистники рѣсничато-зубчатые (рис. 389); мужской цвѣтокъ (a) съ трубчатымъ околоцвѣтникомъ, охватывающимъ сидячій пыльникъ; женскій цвѣтокъ (b) голый, безъ покрова, изъ 1 пестика съ 2 нитевидными, остающимися столбиками; 1-сѣменная костянка . . .

каулинія—*Caulinia* Willd.

XXXVII. *Nymphaeaceae* DC. — кувшинковыя. Водныя травы съ толстымъ корневищемъ; листья плавающіе, кожистые, сердцевидно-овальные на длинныхъ черешкахъ; цвѣтки большіе, одиночные, правильные, полные, съ



(Рис. 390).



(Рис. 391).

4, 5-листной чашечкою и со многими свободными лепестками, постепенно переходящими въ тычинки; тычинокъ много: нижнія прикрѣплены къ мясистому околопестичному диску; завязь многогнѣздная; рыльце сидячее, звѣздчатое; плодъ кожистый, не растрескивающийся, многосѣменный.

a) Чашечка 4-листная, зеленая, короче бѣлыхъ лепестковъ наружнаго ряда;



лепестки безъ медниковой ямки; тычинки приросли къ завязи, на которой по отцвѣтаніи онѣ оставляють рубцы (рис. 390); прилистники ланцетные.

кувшинки—*Nymphaea* L.

б) Чашечка 5-листная, желтая, много длиннѣе желтыхъ лепестковъ, съ медниковою ямкою на спинкѣ; завязь безъ приросшихъ къ ней тычинокъ (рис. 391); прилистниковъ нѣтъ . . . . . кубышки—*Nuphar* Sm.

**XXXVIII. Oleaceae Lindl.** — маслины. Деревья и кусты съ листьями супротивными, черешковыми; цвѣтки или голые, и тогда въ пучкахъ, или полные, и тогда въ пирамидкахъ, съ 4-зубчатою чашечкою и 4-надрѣзнымъ вѣнчикомъ, — тѣ и другіе о 2 тычинкахъ и обѣ одной 2-гнѣздной завязи, съ 2 висющими сѣменопочками и 2-лопастнымъ рыльцемъ; односѣменный, сухой, 2-гнѣздный плодъ.



(Рис. 392).



(Рис. 393).

а) Деревья съ листьями или листочками сложныхъ листьевъ зубчатыми; цвѣтки мелкіе, голые, многобрачные—обоеполые (рис. 392, а) и мужскіе (b),—въ густыхъ пучкахъ на безлистныхъ вѣтвяхъ; сплюснутая 2-гнѣздная, 1-сѣменная крылатка (c) . . . . . ясени—*Fraxinus* L.

б) Кусты съ листьями цѣльнокрайними; цвѣтки полные, съ 4-зубчатою чашечкою (рис. 393, c) и 4-надрѣзнымъ правильнымъ вѣнчикомъ; обѣ тычинки прикрѣплены къ его трубкѣ (b); цвѣтки въ пирамидкахъ, пахучіе; коробочка 2-створчатая, продолговато-яйцевидная, кожистая (d).

сирени—\* *Syringa* L.


**XXXIX. Onagraceae Juss.** — кипрейниковыя. Травы съ цвѣтками полными, 4-ными или двойчатыми, расположенными кистью; чашечка верхняя, б. м. трубчатая, въ почкосложеніи створчатая, 4-или 2-раздѣльная, опадающая; вѣнчикъ верхній, раздѣльнолепестный; лепестки въ почкосложеніи скрученные, вмѣстѣ съ тычинками прикрѣплены къ чашечкѣ; лепестковъ по числу долей чашечки; тычинокъ 8 въ 4-омъ цвѣткѣ или 2—въ цвѣткѣ двойчатомъ; завязь нижняя—4,2-гнѣздная; столбикъ простой, нитевидный; плодъ сухой.

1. Листъ супротивные; цвѣтки очень мелкіе, бѣлые (рис. 395, а); чашечка 2-раздѣльная, чашечная трубка едва замѣтна; вѣнчикъ 2-лепестный; 2 тычинки; плодъ въ видѣ грушевиднаго орѣшка (b), 2-или 1-гнѣздный; гнѣзда 1-сѣменные. . . . . козлунцы—*Circaea* L.

Листья очередные или только нижніе супротивные; цвѣтки довольно крупныя; чашечка трубчатая, вверху 4-раздѣльная, отрывается отъ завязи кольцомъ; вѣнчикъ 4-лепестный; тычинокъ 8; коробочка длинная, 4-гранная, 4-гнѣздная, 4-створчатая, многосѣменная . . . . . 2.

2. Чашечная трубка короткая (рис. 394, b); коробочка линейная, въ видѣ стручка, сѣмена хохлатая—съ длиннымъ пучкомъ шелковистыхъ волосковъ (с); лепестки малиновые, розовые, бѣлые. . . . кипрей—*Epilobium* L.


Чашечная трубка длинная (рис. 396—а, b); коробочка продолговатая, внизу толще (с); сѣмена голыя, безъ пучка волосковъ; лепестки желтые. . . . ослинники—*Oenothera* L.



(Рис. 394).




(Рис. 395)




(Рис. 396).

**XL. Ophioglossaceae R. Br.**—ужовниковыя. Тайнобрачныя съ подземнымъ корневищемъ, обыкновенно обь 1 мясистомъ листѣ, въ почкосложеніи не свернутомъ улиткою и раздѣленномъ на двѣ половины: наружную или нижнюю въ видѣ листовой пластинки, и внутреннюю или верхнюю, состоящую изъ спорангіевъ, 2-рядно расположенныхъ колосомъ или метелкою; спорангіи шаровидные, кожистые, безъ упругаго кольца, 1-гнѣздные, до половины 2-створчатые; створки раскрываются вдоль спорангія, къ стержню же колоса или вѣтви метелки—поперекъ.



(Рис. 397).



(Рис. 398).

а) Листовая пластинка цѣльная, безъ срединной жилки, но съ сѣтчатыми жилками; спорангіи срослись между собою и образуютъ сплюснутый линейный колосъ (рис. 397) . . . . . ужовники—*Ophioglossum* L.


б) Листовая пластинка перисто или 2-перистораздѣльная; доли ея съ вѣрообразными, повторно-вильчатыми жилками; спорангіи не сросшіеся, собраны въ однобочные 2-рядные колосья, расположенные метелкою (рис. 398)

гроздовики—*Botrychium* Sw.


**XLI. Orchideae Juss.**—ятрышниковыя. Односѣменодольныя травы съ листьями цѣльнокрайними и цвѣтками въ колосьяхъ или кистяхъ, рѣдко одиночными; околоцвѣтникъ верхній, неправильный, окрашенный, изъ двухъ 3-лепестныхъ вѣнцовъ: 3 лепестка наружнаго вѣнца и 2 внутреннихъ часто образуютъ шлемъ; третій лепестокъ внутренняго вѣнца всегда особой формы—губа, нерѣдко углубленная и удлинненная въ полый отростокъ—шпорецъ; изъ 3 тычинокъ развивается обыкновенно только 1 средняя, боковыя же зачаточныя—стаминодіи; тычиновыя нити срослись со столбикомъ и образуютъ въ срединѣ цвѣтка столбецъ, на передней и верхней сторонѣ котораго помѣщается рыльце, въ видѣ железистой ямки, съ выступающимъ отросткомъ въ видѣ острія или пластинки—носикомъ, а на верхушкѣ—2-гнѣздный пыльникъ; завязь нижняя, простая, часто скрученная винтомъ; коробочка растрескивается вдоль 3 створками; сѣмянъ, очень мелкихъ, много.



(Рис. 399).



(Рис. 400).



(Рис. 401).

1. Цвѣтки одиночные, крупныя, 1 или 2 на стеблѣ, о 5 лепесткахъ и о 2 пыльникахъ; околоцвѣтникъ раскрытый, съ большою вздутою губою, въ видѣ сумки (рис. 399, а); наружныя боковыя лепестки срослись въ 1 нижній, на верхушкѣ 2-зубчатый лепестокъ (а); столбецъ короткій, 3-лопастной (b, c); боковыя лопасти съ пыльниками; средняя лопасть со стаминодіемъ, въ видѣ лепестка; стебель и листья вдоль жилокъ пушистые . . .

башмачки—*Cypripedium* L.

Цвѣтковъ мелкихъ много въ колосьяхъ или кистяхъ о 6 свободныхъ лепесткахъ и о 1 пыльникѣ, съ 2 боковыми стаминодіями . . . . . 2

2. Цвѣтки въ кистяхъ: завязь прямая на скрученной ножкѣ; губа безъ шпорца; пыльникъ вполне свободный или только внизу приросшій къ столбцу; пыльцевые комочки безъ ножки . . . . . 3.

Цвѣтки въ колосьяхъ; завязь сидячая, скрученная; губа со шпорцемъ или съ мѣшечкомъ; пыльцевые комочки на длинной или короткой ножкѣ . . 8.

3. Верхняя часть стебля, съ цвѣтоножками и цвѣтками, пушистая; пыльникъ приросъ внизу къ углубленію короткаго столбца и не опадаетъ; пыльцевые комочки порошковые, 2-раздѣльные . . . . . 4.

Все растение голое . . . . . 5.

4. Цвѣтки въ кистяхъ однобочныхъ; нижняя губа о 2 членикахъ (рис. 400—а, b); передній, округленный, горошковый; задній—вогнутый съ медникомъ, подъ прямымъ угломъ къ столбцу; пыльникъ сидячій, верхушечный;

рыльце съ короткимъ носикомъ (с); весь стебель покрытъ сидячими темно-зелеными листьями. . . . . дремлики—*Epipactis* Rich.

Цвѣтки въ кистяхъ не одностороннихъ, съ длинною и узкою отвислою губою, 2-лопастною, не членистою, много длиннѣе остальныхъ лепестковъ (рис. 401—а, б); пыльникъ прикрѣпленъ къ верхушкѣ столбца и къ носику въ видѣ язычка (с); стебель съ 2 почти супротивными, свѣтлозелеными листьями въ нижней части стебля. . . . . тайники—*Listera* R. Br.



(Рис. 402).



(Рис. 403).




(Рис. 404).

5 (3). Стебель съ 1, 2 зелеными листьями, внизу утолщенъ въ зеленый клубень; цвѣтки очень мелкіе, зеленоватые; приземистыя, болотныя травы. . . . . 6.


Стебель безъ зеленыхъ листьевъ, покрытъ буроватыми или желтоватыми влагалищами съ цвѣтками такой же окраски. . . . . 7.

6. Кисть длинная съ большимъ числомъ цвѣтковъ; нижняя губа съ широкимъ яйцевиднымъ основаніемъ стянута въ заостренный ланцетный кончикъ и обращена вверхъ (рис. 402, а, б); столбецъ прямой, короткій; пыльникъ безъ придатка, длиннѣе прямого треугольнаго носика; обыкновенно 1 стеблевой листъ . . . . . стагачки—*Microstylis* Lind.

Кисть короткая, рѣдкая, о немногихъ цвѣткахъ; нижняя губа продолговатая, тупая, съ городковымъ краемъ (рис. 403, а); столбецъ согнутый, вверху крылатый (б); пыльникъ вверху съ пленчатымъ придаткомъ короче носика въ видѣ горизонтальной пластинки; стеблевыхъ листьевъ постоянно 2 . . . . . лосняки—*Liparis* Rich.



(Рис. 405).



(Рис. 406).



(Рис. 407)

7. Кисть длинная и частая съ большимъ числомъ цвѣтковъ; нижняя губа длиннѣе остальныхъ лепестковъ, 2-лопастная (рис. 404—а, б); пыльникъ прикрѣпленъ къ верхушкѣ длиннаго столбца и къ носику въ видѣ язычка; корни толстыя, спутанныя въ клубокъ . . . . . гнѣздовки—*Neottia* L.

Кисть короткая и рѣдкая о немногихъ цвѣткахъ; нижняя губа слегка 3-лопастная, короче верхнихъ лепестковъ (рис. 405—а, с); наружные боковые срослись подъ губою въ маленькую бородавку (а); столбецъ согнутый (b); корней нѣтъ, есть только ломкое корневище, развѣтвленное въ видѣ коралла . . . . . ладыны—**Corallorrhiza** Hall.

8 (2). Нижніе листья собраны розеткою, черешковые, съ сѣтчатыми жилками; верхняя часть стебля съ цвѣтками пушистая; завязь почти сидячая, лишь нѣсколько скрученная (рис. 406—а, b); губа короче наружныхъ листковъ околоцвѣтника, при основаніи мѣшеччатая (а, b); пыльникъ, только внизу приросшій къ короткому столбцу, прилегаетъ къ 2-зубчатому носіку (с, d); железа округлая, 2-раздѣльная . . . гудьера—**Goodyera** R. Br.

Листья сидячіе, съ параллельными жилками; травы голыя; завязь вполнѣ сидячая, сильно скрученная, губа длиннѣ наружныхъ листковъ околоцвѣтника; пыльникъ вполнѣ сросся со столбцомъ . . . . . 9.

9. Нижняя губа при основаніи мѣшеччатая (рис. 407, b), на концѣ 3-лопастная, копьевидная (с); околоцвѣтникъ колокольчатый, желтозеленый (а); пыльцевые комочки на очень короткихъ ножкахъ; железы ихъ прикрѣплены къ короткому широкому носіку (d); стаминодій большіе . . . . . бровники—**Herminium** R. Br.


Нижняя губа при основаніи вытянута въ б. м. длинный шпорецъ; околоцвѣтникъ б. ч. шлемовидный; пыльцевые комочки на длинной ножкѣ (рис. 410, с) . . . . . 10.



(Рис. 408).



(Рис. 409).



(Рис. 410).



(Рис. 411).

10. Нижняя губа цѣльная, узкая, линейная, много длиннѣ боковыхъ лепестковъ; гнѣзда пыльника внизу разобщены выемкою носика; цвѣтки бѣлые или зеленоватые . . . . . 11.

Нижняя губа 3-лопастная или 3-раздѣльная, лишь немного длиннѣ боковыхъ лепестковъ; гнѣзда пыльника параллельныя, внизу прилегаютъ другъ къ другу; цвѣтки лиловые или розовые, шпорецъ длинный, не короче половины завязи . . . . . 12.

11. Стебель только съ 2 вполнѣ развитыми корневыми листьями; нитевидный шпорецъ длиннѣ завязи (рис. 408, а); губа вполнѣ цѣльная, нитевидная; наружные боковые лепестки оттопыренные; железа насажена на ножку пыльцевыхъ комочковъ сбоку (b) . . . . . любки—**Platanthera** Rich.

Стебель покрытъ 3—5 листьями; шпорецъ толстый, очень короткій, много короче завязи (рис. 409, а), губа линейная, на концѣ 3-зубчатая (b); околоцвѣтникъ шлемовидный (а); железа насажена на конецъ ножки пыльцевыхъ комочковъ . . . . . околостолбники—**Peristylus** Blume


12. Шпорец прямой или слегка согнутый, короче завязи (рис. 410, а); лепестки пятнистые, часто и листья; железки ножек прикрыты 2-губздной сумкою (б) . . . . . ятрышники—*Orchis* L.

Шпорец согнут дугою (рис. 411); лепестки одноцветные, красновато-лиловые, редко белые; железки ножек голые, прикреплены к носику, сжато-тому с боков . . . . . кокушники—*Gymnadenia* R. Br.

**XLII. Orobanchaceae Lindl.**—заразиховые. Паразитны на зеленых травах с чешуйчатыми листьями; цветки в колосках, полные, 4-ные; вичник с явственною трубкою, 2-губый, нижняя губа 3-лопастная, б. ч. в зеве с 2 бугорками; 2 пары неравных тычинок—в 2-большинстве; пыльники внизу с шпиком; коробочка простая, 2-створчатая; створки расположены вверх и вниз цветка.



(Рис. 412).




(Рис. 413).

а) Чашечка 2-листная (рис. 412, а, б); листки ее часто внизу спаяны, б. ч. 2-надрезные; вичник по отцветании отделяется кольцом от остающегося низа трубки; завязь с приросшею внизу железкою; лопасти рыльца расположены по сторонам цветка—справа и слева; створки коробочки наверху и внизу не расходятся; листья очерченные . . . . .

заразихи—*Orobanche* L.

б) Чашечка колокольчатая, 4-надрезная (рис. 413—а, б) вичник по отцветании отпадает целиком; верхняя губа его цельная, короче 3-лопастной нижней (а, б); у завязи большая полукруглая свободная железа (б); лопасти



(Рис. 414).



(Рис. 415).

рыльца направлены вверх и вниз; коробочка вверху 2-створчатая; листья супротивные . . . . . чешуйники—*Lathraea* L.

**XLIII. Papaveraceae DC.**—маковые. Травы волосистые с млечным соком; цветок полный; чашечка 2-листная, падающая; вичник 4-лепестный,



правильный, въ почкосложеніи неправильно складчатый—скомканный; много тычинокъ прикрѣплено къ цвѣтоложу; завязь одна, съ сидячимъ рыльцемъ; коробочка простая или съ неполными перегородками.


а) Рыльце широкое, звѣздчатое о 8—15 лучахъ (рис. 414, с); коробочка раздѣлена неполными перегородками на 8—15 гнѣздъ, вскрывается подъ рыльцемъ столькими же дырочками; цвѣтки большіе, на длинныхъ ножкахъ (б, а), красные, бѣловатые или лиловые; млечный сокъ бѣлый. . . . .

маки—\*† *Papàver* L.

б) Рыльце узкое, 2-лопастное (рис. 415, а); коробочка простая, въ видѣ стручка, 2-створчатая (б); створки отдѣляются снизу вверхъ отъ 2 остающихся семеносовъ, похожихъ на продырявленную перегородку; цвѣтки желтые въ малоцвѣтномъ зонтикѣ; млечный сокъ желтый. . . . .

чистотѣлы—*Chelidonium* L.


**XLIV. Papilionaceae** L.—мотыльковыя. Листья съ прилистниками; цвѣтокъ полный; чашечка 5-зубчатая и притомъ часто 2-губая; вѣнчикъ неправильный, мотыльковый, прикрѣпленный къ низу чашечки, 5-лепестный: оба нижніе лепестка срослись въ лодочку, верхній наибольшій—парусъ или флагъ, оба боковые—крылушки; тычинокъ 10, либо двубратственныхъ, т. е. 9 сросшихся и 1 свободная, либо однобратственныхъ, когда всѣ 10 срослись нитями въ трубку; завязь 1, съ боковымъ семеносомъ; бобъ простой или членистый, рѣдко орѣшекъ.



(Рис. 416).



(Рис. 417).



(Рис. 418).

1. Кустарники, съ желтыми цвѣтками. . . . . 2.
- Травы. . . . . 4.


2. Прилистники колючіе; листья парноперистые, оканчивающіеся шипикомъ; цвѣтки на сочлененныхъ ножкахъ (рис. 416, а); чашечка съ короткою широкою трубкою, о 5 зубцахъ (б, а); тычинки въ 2-братствѣ (б); бобъ сначала сплюснутый, потомъ почти цилиндрической, многосемянный; цвѣтки одиночные или по нѣскольку, пучкомъ. . . . . акаціи—\* *Caragana* Lam.

Прилистники травянистые, не колючіе; листья простые или 3-чатые; цвѣтоножки не сочлененныя; чашечка 2-губая, нижняя губа 3-зубчатая; тычинки однобратственныя; крылья вѣнчика къ верхушкѣ морщинисто-складчатыя; столбикъ согнуть внутрь цвѣтка; рыльце косое. . . . . 3.


3. Листья простые, цѣлюкрайніе; верхняя губа чашечки 2-раздѣльная (рис. 417, с); рыльце скошено внутрь цвѣтка (б); бобъ линейно-продолговатый. . . . . дроки—*Genista* L.

Листья тройчатые; верхняя губа чашечки 2-зубчатая; рыльце скошено кнаружи цвѣтка (рис. 418, б). . . . . раkitники—*Cytisus* L.


- 4 (1). Листья тройчатые . . . . . 5.  
 Листья перистые . . . . . 9.  
 5. Вьющаяся трава, съ крупными цвѣтками и листьями; листочки съ при-  
 листничками: чашечка 2-губая: верхняя губа 2-зубчатая, нижняя—3-зубча-  
 тая; столбикъ подъ верхушкою бородатый (419, d), вмѣстѣ съ тычинками  
 и лодочкою скрученный (b, c); бобъ съ губчатыми неполными поперечными  
 перегородками . . . . . фасоль—\* *Phaseolus* L.



(Рис. 419).



(Рис. 420).



(Рис. 421).

Травы не вьющіяся; листочки безъ прилистничковъ; чашечка 5-зубчатая  
 или 5-надрѣзная; столбикъ голый, не скрученный . . . . . 6.

6. Лодочка съ шиловиднымъ клювомъ (рис. 420 b, a); всѣ тычинки срос-  
 лись въ 1. пучекъ, нити ихъ вверху расширены; бобъ вздутый, овальный,  
 остающійся въ травянистой открытой чашечкѣ (c); вѣнчикъ розовый . . .  
 стальники—*Ononis* L.

Лодочка тупая; тычинки въ 2-братствѣ; бобы мелкіе, малосѣменные, не  
 вполне растрескивающіеся . . . . . 7.

7. Тычиночная трубка срослась съ лепестками, которые часто также всѣ  
 между собою срастаются (рис. 421, b); вѣнчикъ увядающій, остается въ ча-  
 шечкѣ и закрываетъ овальный 1, 2-сѣменный бобъ (c); завязь прямая;  
 цвѣтки въ головкахъ или плотныхъ головчатыхъ кистяхъ . . . . .

трилистники—*Trifolium* L.

Тычиночная трубка не срослась съ лепестками, а приросла къ чашечкѣ  
 (рис. 422, b); только одни лепестки лодочки сросшіеся (c); вѣнчикъ опа-  
 дающій (d) . . . . . 8.




(Рис. 422).



(Рис. 423).



(Рис. 424).



(Рис. 425).

8. Цвѣтки обыкновенно въ длинныхъ кистяхъ, рѣдко въ головчатой кисти,  
 и тогда голубые; завязь прямая (рис. 422, d); бобъ прямой, короткій, шаро-  
 видный или продолговатый . . . . . допники—*Melilotus* Tourn.

Цвѣтки въ головчатыхъ кистяхъ, желтые; завязь изогнута вверху и прилегасть къ парусу; бобъ серповидный (рис. 423, а) или почковидный (b) . . . . . медунки—*Medicago* L.

9 (4). Листья непарноперистые, заканчиваются вверху листочкомъ; столбикъ голый . . . . . 10.

Листья парноперистые, заканчиваются на верхушкѣ усикомъ или шипикомъ; столбикъ волосистый или бородатый . . . . . 14.

10. Цвѣтки въ головкахъ съ оберткою изъ пальчато-раздѣльныхъ прицвѣтничковъ; только стеблевые листья перистые, съ большимъ верхушечнымъ листочкомъ, нижние листья пѣльные, черешковые; всѣ тычинки срослись въ 1 пучекъ, съ нитями вверху расширенными; чашечка 5-зубчатая, увядающая, подъ конецъ закрытая, вздутая, перепончатая (рис. 424); вѣнчикъ желтый . . . . . язвенники—*Anthyllis* L.

Цвѣтки въ головчатыхъ зонтикахъ или въ кистяхъ, безъ обертки; всѣ листья перистые; верхушечный листокъ не больше прочихъ; тычинки 2-братственные; чашечка не вздутая . . . . . 11.

11. Лодочка вытянута въ клювъ (рис. 425, b) . . . . . 12.

Лодочка тупая . . . . . 13.

12. Листья о большомъ числѣ листочковъ; чашечка почти 2-губая, съ 2 верхними сросшимися зубцами; бобъ членистый, почти 4-гранный, распадается на 1-сѣменные членики (рис. 425, c); цвѣтки розовые . . . . .


вязели — *Coronilla* L.



(Рис. 426).



(Рис. 427).



(Рис. 428).

Листья о 5 листочкахъ; изъ нихъ нижняя пара въ видѣ прилистниковъ у основанія черешка; настоящіе прилистники маленькіе, шиловидные; чашечка 5-зубчатая или 5-надрѣзная (рис. 426, a); бобъ линейный (c), растрескивается 2 спирально скрученными створками; цвѣтки желтые; крылья вѣнчика вверху сходятся; столбикъ постепенно утонень (c) . . . . . лядвеицы — *Lotus* L.

13. Лодочка скошенная (рис. 427, a); не растрескивающейся, 1-сѣменный твердый орѣшекъ, сѣтчато-морщинистый, сплюснутый, обратноовальный (b); верхній край его толстый, прямой; нижній—тонкій, согнутый, крылато-килеватый, гребенчатый или зубчатый; цвѣтки розовые . . . . .


эспарсеть — *Onobrychis* Tourn.

Лодочка закругленная (рис. 428, a); бобъ многосѣменный, б. м. 2-гнездный отъ вдавленнаго внутрь его нижняго шва, не несущаго сѣмянъ (d); цвѣтки лиловые или желтоватые . . . . . астрагалъ — *Astragalus* L.


14 (9). Трубка тычиночныхъ нитей скошена (съ косымъ краемъ), такъ какъ нижнія тычинки срослись больше верхнихъ (рис. 429, a); листья б. ч. съ вѣтвистыми усиками . . . . . 15.

Трубка тычиночных нитей съ прямымъ ровнымъ краемъ, т. е. свободная часть ихъ одинаковой длины (рис. 432, а) . . . . . 17.

15. Чашечка 5-раздѣльная (рис. 429, с); столбикъ плоскій, на внутренней сторонѣ (обращенной къ срединѣ цвѣтка) волосистый (b); бобъ сплюснутый, ромбическій, 1, 2-сѣменный (с); кисть малоцвѣтная — обь 1—3 очень мелкихъ цвѣткахъ . . . . . чечевицы—\* *Lens* Tourt.



(Рис. 429).



(Рис. 430).



(Рис. 431).



(Рис. 432).

Чашечка 5-зубчатая или 5-надрѣзная, верхніе зубы короче; столбикъ нитевидный, прямой, вверху кругомъ пушистый, или подъ верхушкою на наружной сторонѣ бородатый; бобъ 2-или многосѣмный . . . . . 16.

16. Кисть о немногихъ (не свыше 8) цвѣткахъ на длинномъ цвѣтоносѣ; не короче листа; цвѣтки очень мелкіе, голубоватые; столбикъ (430, а) кругомъ волосистый, но не бородатый; листья линейные . . . . . пашенницы—*Ervum* L.

Кисть о множествѣ цвѣтковъ на длинномъ цвѣтоносѣ, и тогда столбикъ кругомъ волосистый, или нѣсколько пазушныхъ цвѣтковъ на короткихъ ножкахъ, и тогда столбикъ снаружи бородатый (рис. 430, b); цвѣтки средней величины, листья отъ овальныхъ до ланцетолинейныхъ, но не линейные. . . . .

горьшки—*Vicia* L.

17 (14). Прилистники очень большіе, не короче цвѣтоноса, несущаго 1, 2 цвѣтка; столбикъ 3-гранный, съ боковъ сплюснутый, сверху килеватый, снизу желобчатый, на внутренней сторонѣ бородатый (рис. 431); бобъ продолговатый, сплюснутый, многосѣмный . . . . . горохи—\* *Pisum* L.

Прилистники всегда много короче цвѣтоноса; кисть о многихъ цвѣткахъ; столбикъ къ верхушкѣ плоскій, на всей внутренней сторонѣ волосистый, на наружной—голый (рис. 432, b); бобъ сплюснутый, 2-или многосѣмный . . . . . 18.

18. Стебель слабый, цѣлкій; листья съ вѣтвистыми усиками; бобъ линейно-продолговатый . . . . . чины—*Lathyrus* L.

Стебель твердый, ребристый, голый; листовые черешки заканчиваются шипикомъ; бобъ линейный . . . . . сочевичники—*Orobus* L.

**XLV. Pirolaceae** Lindl. — грушанковые. Полукустарники съ листьями цѣлными, б. м. кожистыми и б. ч. зимующими; цвѣтокъ полный, 5-ной; чашечка 5-раздѣльная; вѣнчикъ 5-лепестный, опадающій; 10 свободныхъ тычинокъ; гнѣзда пыльниковъ раздѣльные, вскрываются дырочкою, и погибаются верхушкою книзу; завязь и коробочка 5-гнѣздная; створки 5-створчатой коробочки приросли обоими концами къ сѣменосу и несутъ отдѣлившіяся отъ него перегородки.

1. Цвѣтки въ ложномъ зонтикѣ, розовые; листья ложною мутовкою, на короткихъ черешкахъ, къ основанію клиновидные, сверху съ вдавленными жилками; основаніе завязи окружено железистымъ кольцомъ, въ видѣ чашечки

съ ровнымъ краемъ; рыльце почти сидячее, щитковидное, 5-угольное (рис. 433); пыльцевыя зерна склеены по 4. . . . зимолюбки—*Chimophila* Pursh


Цвѣтки въ кистяхъ, рѣдко одиночные; листья б. ч. корневые или же и стеблевые, очередные, на б. м. длинныхъ черешкахъ, къ основанію округленные, сверху съ выпуклыми жилками; столбикъ длинный. . . . 2.




(Рис. 433).



(Рис. 434).



(Рис. 435).



(Рис. 436).

2. Цвѣтки въ однобокой кисти, почти колокольчатые, съ длиннымъ выдающимся столбикомъ (рис. 434), зеленоватые; основаніе завязи окружено железистымъ кольцомъ, 10-раздѣльнымъ; листья корневые и стеблевые, свѣтлые, не зимующіе; пыльцевыя зерна свободныя . . . . боровинки—

*Ranischia* Opiz.


Цвѣтки въ многосторонней кисти или одиночные; железистаго кольца нѣтъ; всѣ листья корневые или еще нѣсколько стеблевыхъ нижнихъ, темные, кожистые, зимующіе; пыльцевыя зерна склеены по 4. . . . 3.

3. Цвѣтки кистью, полушаровидные; тычиночныя нити шиловидныя, приподнятыя (рис. 435, а); пыльники безъ рожковъ; коробочка (b, c) повислая, по краямъ створокъ съ войлочною оторочкою; корневище ползучее, нитевидное, вѣтвистое . . . . грушанки—*Pirola* L.

Одиночный верхушечный цвѣтокъ—звѣздчатый (рис. 436, а); тычиночныя нити внизу 3-гранныя, толстыя, изогнутыя; пыльники съ 2 короткими рожками (а); коробочка торчащая (b); края створокъ голыя . . . .

одноцвѣтки—*Monesis* Salisb.

**XLVI. Polygonaceae** Juss.—гречишныя. Травы съ листьями очередными и съ прилистниками, сросшимися во влагалище, охватывающее стебель—



(Рис. 437).



(Рис. 438).


раструбъ; цвѣтки на сочлененныхъ цветоножкахъ пучками, расположенными колосовидно или развѣистой метелкою, съ околоцвѣтникомъ простымъ, 5 (4,3)-раздѣльнымъ или двойнымъ—3-тымъ; столбиковъ и рыльце 2, 3, 4, завязь одна, объ 1 съменопочкѣ; орѣшекъ заключенъ въ остающийся околоцвѣтникъ.

1. Околоцвѣтникъ 1-рядный, 5 (3,4)-раздѣльный, б. м. окрашенный, съ долями равными, прямыми (рис. 437—а, в); тычинокъ 5—8, столбиковъ и рылецъ 2,3 (с) . . . . . 2.


Околоцвѣтникъ 2-рядный, 6-листный, зеленый (рис. 439—а, в); тычинокъ 6 или 9; столбиковъ очень короткихъ 3, о столькихъ же рыльцахъ, въ видѣ кисточки (с) . . . . . 3.

2. Околоцвѣтникъ вполне окрашенный, въ видѣ вѣнчика, по отцвѣтаніи облекаетъ 3-гранный орѣшекъ только при основаніи (рис. 437, d); тычинокъ 8, столбиковъ и рылецъ 3; завязь окружена железистымъ кольцомъ . . . . . гречихи—\* *Fagopyrum* L.

Околоцвѣтникъ только снаружи окрашенный, по отцвѣтаніи вполне облекаетъ 2,3-гранный орѣшекъ (рис. 438—d, e); тычинокъ 5—8; рылецъ 2,3 (с) . . . . . горцы—*Polygonum* L.



(Рис. 439)



(Рис. 440).

3. Доли околоцвѣтника неравныя (рис. 439—а, в): 3 внутреннихъ больше, прямые, сходящіеся, разрастаются и облекаютъ 3-гранный орѣшекъ; 3 наружныхъ меньше, растопырены или отогнуты и не увеличиваются впоследствии, тычинокъ 6; травы обоеполая, многобрачныя или двудомныя. . . . .

щавели—*Rumex* L.

Доли околоцвѣтника почти равныя (рис. 440, а); орѣшекъ 3-крылый (b); тычинокъ 9 (а); густыя метелки съ мелкими обоеполыми цвѣтками . . . . .

ревени—\* *Rheum* L.

**XLVII. Polypodiaceae R. Br.**—папоротники. Травы тайнобрачныя, съ подземнымъ корневищемъ, съ перисто-раздѣльными листьями, свернутыми въ молодомъ возрастѣ улиткою и несущими на нижней—задней поверхности долекъ листа кучки спорангіевъ съ покрываломъ или безъ покрывала; спорангіи на ножкахъ съ упрягимъ кольцомъ, растрескиваются поперекъ.



(Рис. 441).




(Рис. 442).

1. Боковыя жилки на долькахъ листа выходятъ подъ острымъ угломъ къ средней жилкѣ, загибаются дугою, выпуклою къ средней жилкѣ и, вильчато развѣтвляясь, подходятъ къ самому краю листовыхъ долекъ, гдѣ всѣ онѣ схо-



дятся концами въ краевую жилку (рис. 441), несущую кучки спорангіевъ, въ видѣ непрерывной полосы; спорангіи прикрыты 2 узкими покрывалами, изъ коихъ верхнее свернуто на подобіе края листа (рис. 442); большой папоротникъ съ листьями 2,3-перисторазрѣзными, на длинныхъ голыхъ черешкахъ; корневище ползучее, съ членистыми волосками. . . орляки—*Pteridium Gleditsch*

Боковые жилки на долькахъ листа загибаются къ краю листа дугою; вогнутою къ средней жилкѣ, т. е. расположены перисто, и не доходятъ до самого края листа; кучки спорангіевъ, округлыя или продолговатыя, расположены на жилкахъ, отступя отъ края листа . . . . . 2.



(Рис. 443).



(Рис. 444).



(Рис. 445).

2. Боковые жилки на послѣднихъ долькахъ листа не развѣтвляются (443, а); листья, несущіе споры, съ дольками, свернутыми до самой средней жилки и совершенно закрывающими кучки спорангіевъ (b); покрывало снизу приросло къ спороносу и быстро исчезаетъ (рис. 444); большой папоротникъ съ вѣнцомъ перисторазрѣзныхъ листьевъ, не несущихъ спорангіи; въ срединѣ вѣнца болѣе короткіе спороносные листья . . . разнолистники—*Onoclea Sw.*

Боковые жилки вильчато-раздѣляются къ краю долекъ листа (рис. 447, а); всѣ листья одинаковой формы, несутъ споры и не бываютъ свернуты до средней жилки . . . . . 3.

3. Споровыя кучки продолговатыя, вытянуты вдоль наружной стороны боковыхъ жилокъ или согнуты крючкомъ или подковою, и тогда заходятъ по другую сторону жилки (рис. 445); покрывало той же формы пригнѣплено однимъ краемъ къ жилкѣ; большіе папоротники съ 2,3-перисто-разрѣзными



(Рис. 446).



(Рис. 447).



(Рис. 448).

листьями; жилки въ разрѣзѣ верхней части листового черешка въ видѣ подковы . . . . . кочедыжники—*Athyrium Roth*

Споровыя кучки круглыя или округлыя, сидятъ на самыхъ жилкахъ . 4.

4. Споровыя кучки голыя, безъ покрывала (рис. 446); не большіе папо-

ретики съ тонкимъ ползучимъ корневищемъ, обь 1 листъ . . . . .  
буковичники—*Phegopteris* Fée

Споровыя кучки съ покрываломъ . . . . . 5.

5. Покрывало почковидное или округло-почковидное сверху прикрываетъ споровую кучку и складкою въ выемкѣ прикрѣплено къ спороносу (рис. 447, а); большіе папоротники съ перисторазрѣзными листьями. . . . .

щитники—*Aspidium* Sw.

Покрывало однобокое, вначалѣ выпуклое, перегнутое черезъ споровую кучку, прикрѣплено подъ нею къ спороносу (рис. 448, а), подъ конецъ отвороченное (b); маленькіе папоротники съ нѣжными 2,3-перисто-разрѣзными листьями; вторичныя жилки на долькахъ ихъ извилистыя. . . . .

пузырики—*Cystopteris* Bernh.

**XLVIII. Romaceae Lindl.** — яблонныя. Деревья и кустарники; листья съ прилистниками; цвѣтки полные, 5-ные: чашечный отгибъ 5-зубчатый или 5-надрѣзной, засыхающій, въ почкосложеніи черепичатый; вѣнчикъ 5-лепестный, верхній; тычинокъ 20 и болѣе, прикрѣпленныхъ, какъ и лепестки, къ кольцу, окружающему зѣвъ чашечки; завязь 2—5-гнѣздная, столбиковъ по числу гнѣздъ; плодъ ложный—въ видѣ ягоды, образованной изъ мясистаго расширеннаго плодоложа, сросшагося съ пленчатою или костистою оболочкою плодовыхъ гнѣздъ.



(Рис. 449).



(Рис. 450).



(Рис. 451).

1. Цвѣтки въ кистяхъ на концѣ вѣтвей, съ лепестками узко-овальными, клиновидно суженными (449, а); листья острозубчатые; плодъ съ прямыми чашечными долями (b), всѣ 5 гнѣздъ его, съ пленчатыми перегородками, раздѣлены еще неполными ложными перегородками. ирги—\**Amelanchier* Med.

Цвѣтки щиткомъ, зонтикомъ или пучкомъ, съ лепестками широкими, округленными; плодъ безъ ложныхъ перегородокъ . . . . . 2.

2. Листья цѣльные; цвѣтки въ рѣдкомъ зонтикѣ или пучкомъ. . . . . 3.

Листья лопастные, перистораздѣльные или перистосложные; цвѣтки средних размѣровъ, бѣлые, въ частыхъ или даже метельчатыхъ щиткахъ. 4.

3. Листья вполне цѣльнокрайніе; цвѣтки мелкіе, лазущіе на короткихъ ножкахъ, по 1—3 (рис. 450, а); ложная ягода (b) о 3—5 косточкахъ, выступающихъ изъ за мясистой оболочки плода; мелкіе кустарники. . . . .

кизилники—\**Cotoneaster* Med.

Листья слегка зазубренные; цвѣтки крупныя (рис. 451), въ рѣдкихъ малоцвѣтныхъ зонтикахъ, на длинныхъ ножкахъ; ложный плодъ съ 5 пленчатыми перегородками, среди мясистой его оболочки; деревья или большіе кусты . . . . . груши—*Pirus* L.

4. Колючіе кустарники; цвѣтки простыми щиткомъ; ложная ягода обь

1—5 косточкахъ, съ кружкомъ на верхушкѣ (рис. 452, b) . . . . .

боярышники—†\**Crataegus* L.

Кустарники безъ колючекъ и шиповъ, съ цвѣтками, расположенными частымъ, метельчатымъ щиткомъ; ложная ягода съ тонкими пленчатыми перегородками, безъ кружка на верхушкѣ (рис. 453) . . рябины—*Sorbus* L.



(Рис. 452).




(Рис. 453).

**XLIX. Portulacaceae Juss.**—портулаковые. Небольшія травы, съ б. м. мясистыми, цѣлюкрайними листьями; цвѣтокъ полный; чашечка 2-надрѣзная; вѣнчикъ о 5 лепесткахъ, обыкновенно слегка сросшихся; завязь простая объ 1 столбикѣ и нѣсколькихъ рыльцахъ; коробочка простая, съ среднимъ сѣменосомъ.

а) Цвѣтки сидячіе, одиночные или клубочкомъ, правильные, о 5 (4—6) лепесткахъ, свободныхъ или внизу слегка сросшихся (рис. 454, а); лепестки прикрѣплены къ чашечной трубкѣ, падучіе, желтые; тычинокъ 12 (8—15), свободныхъ или при основаніи сросшихся съ лепестками; столбикъ 3—6-раздѣльный; коробочка многосѣмянная, вскрывается крышечкою (d), отдѣляющеюся кольцомъ вмѣстѣ съ верхушкою чашечки отъ остающагося низа (b) . . . . . портулакъ—\**Portulaca* L.



(Рис. 454).



(Рис. 455).


б) Цвѣтки на ножкахъ, не совсемъ правильные; вѣнчикъ ворончатый, съ расщепленною трубкою и неравно 5-раздѣльнымъ отгибомъ (рис. 455—а, b); тычинокъ 3, прикрѣпленныхъ къ 3 меньшимъ долямъ вѣнчика (b); столбикъ очень короткій о 3 рыльцахъ (c); коробочка 3-створчатая, 2, 3 сѣменная (d); чашечка остающаяся . . . . . монція—*Montia* L.

**L. Primulaceae Vent.**—скороспѣлковыя. Травы съ полнымъ цвѣткомъ и спайно-лепестнымъ вѣнчикомъ; чашечка о 4—7(9)-надрѣзяхъ, остающаяся; вѣнчикъ правильный, 4—7(9)-надрѣзной; тычинокъ по числу долей вѣнчика, которыми онѣ супротивны; завязь простая, съ свободнымъ срединнымъ, шаровиднымъ сѣменосомъ; многосѣменная коробочка.

1. Всѣ листья корневыя, розеткою; цвѣтки простымъ зонтикомъ на концѣ голой стрѣлки, съ обверткою, 5-ные; чашечка зубчатая или надрѣзная;

рыльце головчатое; 5-створчатая коробочка, вскрывающаяся сверху зубцами. . . . . 2.

Стебель покрыт листьями; цветки в кистях или одиночные; чашечка глубоко раздельная; рыльце тупое. . . . . 4.



(Рис. 456).



(Рис. 457).



(Рис. 458).


2. Чашечка колокольчатая, 5-зубчатая (рис. 456, а); трубка вѣнчика длинная, цилиндрическая,верху расширенная (б, с); лопасти его тупыя, выемчатые (а, б); цветоножки повислыя, однобочныя; листья морщинистые съ крылатымъ черешкомъ . . . . . скороспѣлки—*Primula* L.

Чашечка ворончатая, 5-надрѣзная; трубка вѣнчика короткая, ворончатая или кувшинчатая. . . . . 3.


3. Вѣнчикъ блюдчатый съ 5 округлыми или тупыми лопастями (рис. 457—а, б), увядающій, остающійся на шаровидной коробочкѣ (с); трубка вѣнчика кувшинчатая, къ зѣву суженная, съ коронкою изъ 5 полыхъ чешуекъ (б); тычинки прикрѣпленыверху трубки вѣнчика: нити ихъ свободныя, пыльники округлые (б); цветки мелкіе, бѣлые; листья сидячіе . . . . .

проломники—*Androsace* L.

Вѣнчикъ ворончатый съ острыми лопастями (рис. 458); тычинки прикрѣплены къ самому низу вѣнчика; нити ихъ спаяны въ короткое кольцо; пыльники остроконечные (рис. 458); цветки малиновыя, поникшіе; листья на длинныхъ черешкахъ . . . . . кортуза—*Cortusa* L.



(Рис. 459).



(Рис. 460).



(Рис. 461).

4 (1). Цветки почти сидячие, одиночные, пазушные, очень мелкие, 4-ные (рис. 459); чашечка длиннее 4-надрѣзнаго кувшинчатого вѣнчика (а, с), съ трубкою почти шаровидною; тычинки прикрѣплены къ основанію долей вѣнчика (б); коробочка растрескивается поперекъ и вскрывается крышечкою, съ остающимся столбикомъ и увядшимъ вѣнчикомъ (с); мелкія травы съ очередными листьями . . . . . низянки—*Centunculus* L.

Цвѣтки на б. м. длинныхъ цвѣтоножкахъ средней величины, 5-ные или 6, 7, 9-ные; чашечка б. м. короче раздѣльнаго вѣнчика, колесовиднаго, блюдчататаго или ворончататаго; коробочка вскрывается створками; листья, по крайней мѣрѣ верхніе, супротивные или мутовчато-сближенные . . . . . 5.

5. Вѣнчикъ блюдчатый съ 5-раздѣльнымъ отгибомъ (рис. 460, а) и довольно длинною трубкою, вверху которой прикрѣплены тычинки; коробочка овальная, вскрывается съ боковъ 5 створками, вверху и внизу спаянными, и съ остающимся столбикомъ (б); водяныя травы съ листьями подводными, гребенчато-перисто-раздѣльными и мутовчато-сближенными; цвѣтки въ голой мутовчатой кисти, розовые. . . . . турчи—*Hottônia* L.

Вѣнчикъ колесовидный или ворончатый, глубоко раздѣльный, съ трубкою очень короткою; тычинки прикрѣплены къ основанію долей вѣнчика; коробочка вскрывается съ верхушки зубцами или створками; столбикъ опадаетъ; наземныя или болотныя травы съ листьями цѣльными и пазушными цвѣтками или цвѣтоносами . . . . . 6.

6. Нижніе листья очередные, мелкіе; верхніе крупныя сближены въ ложную мутовку по числу частей цвѣтка, б. ч. 7-наго, иногда 5—9-наго (рис. 461, а); тычинки свободныя; коробочка овальная съ отвороченными створками (б); сѣмянъ мало; цвѣтки бѣлые на очень длинныхъ ножкахъ . . . . . седмичники—*Trientalis* L.

Листья супротивные, иногда (по 3—4) мутовчато сближенные, съ мелкими точечными железками; тычинки спаяны внизу въ б. м. короткое кольцо (рис. 462, б); коробочка шаровидная; цвѣтки желтые. . . . . 7.



(Рис. 462).



(Рис. 463).

7. Цвѣтокъ 5-ой; вѣнчикъ колесовидный (рис. 462, а), безъ промежуточныхъ зубцовъ между его долями; завязь безъ железокъ; сѣмена окаймленные; цвѣтки довольно крупныя, одиночныя или въ рѣдкой метельчатой кисти; листья на короткихъ черешкахъ . . . вербейники—*Lysimachia* L.

Цвѣтокъ 6, 7-ой вѣнчикъ ворончатый (рис. 463, б), съ промежуточными зубцами между его долями (а); завязь железистая; сѣмена почти безъ ободка; цвѣтки мелкіе въ частой пазушной кисти; листья сидячіе . . .

кизяки—*Naumburgia* Moench


II. *Ranunculaceae* Juss.—лютиковѣя. Травы съ цвѣтками очень разнообразной формы и устройства; тычинки или пестики, или тѣ и другіе въ большомъ числѣ, болѣе чѣмъ въ 2 раза, обыкновенно во много разъ, превышаютъ число листковъ цвѣточнаго покрова и расположены спирально, а не мутовчато; тычинки прикрѣплены къ ложу цвѣтка; гнѣзда ихъ вскрываются долевою щелью; завязь простая, съ однимъ столбикомъ и рыльцемъ; околоцвѣтникъ раздѣльнолепестный (въ одномъ только случаѣ, — у *Delphinium Consolida*—спайнолепестный), двойной или простой, окрашенный.

1. Цвѣтокъ неправильный; чашечка неправильная, 5-листная, окрашенная, много больше мало развитыхъ и скрытыхъ въ чашечкѣ лепестковъ (рис. 464, а); пестиковъ 1—5; многосѣмный мѣшечекъ (с); цвѣты въ кистяхъ; листья раздѣльные. . . . . 2.

Цвѣтокъ правильный . . . . . 3.



(Рис. 464).



(Рис. 465).

2. Верхній чашелистикъ со шпорцемъ (рис. 464, б); вѣничикъ либо сросло-лепестный объ 1 шпорцѣ, либо о 4 свободныхъ лепесткахъ, изъ коихъ 2 верхнихъ со шпорцами, вложенными въ шпорецъ верхняго чашелистика; пестиковъ 1, 3 (5) . . . . . живокости—*Delphinium* L.

Верхній чашелистикъ въ видѣ шлема (рис. 465, а); лепестковъ 5: оба верхніе въ видѣ каски, со шпорцемъ и на длинныхъ ноготкахъ (б); нижніе—короткіе, узкіе или вовсе не развитые; пестиковъ 3, 5 . . . . . борцы—*Aconitum* L.

3. Цвѣтки въ большемъ числѣ скучены въ кисть, метелку или метельчатый щитокъ, мелкіе, бѣлые; листья перистосложные. . . . . 4.

Цвѣтки одиночные или по нѣскольку на стеблѣ не образуютъ частаго соцвѣтія . . . . . 6.



(Рис. 466).



(Рис. 467).



(Рис. 468).

4. Цвѣтки въ головчатыхъ кистяхъ, съ чашечкою и вѣничикомъ 4-листными, быстро опадающими (рис. 466); лепестки узкіе, линейные, похожіе на тычиночныя нити и не длиннѣе ихъ; пыльники вскрываются внутрь цвѣтка; пестикъ 1, обращается въ многосѣмную черную ягоду; листья 3-чато 2-перистые . . . . . воронцы—*Actaea* L.

Цвѣтки въ большихъ развѣсистыхъ метелкахъ или щиткахъ; околоцвѣтникъ простой; пыльники вскрываются наружу; пестиковъ много, обращаются въ орѣшки. . . . . 5.

5. Листья супротивные, просто-перистые; тычинки не длиннѣе околоцвѣтника (рис. 467, а), въ почкосложеніи створчатого, 4-листнаго; плодники съ длиннымъ перистымъ столбикомъ, остающимся на плодѣ (б). . . . .


ломоносы—*Clematis* L.



Листья очередные, многократно перистые; тычинки длиннее околоцветника (рис. 468, а), въ почкосложеніи черепчатого, 5 (4)-листнаго; плодники съ короткимъ, опадающимъ рыльцемъ (b) . . . василистники—*Thalictrum* L.

6 (3). Стебель съ одними корневыми листьями или же съ одною только мутовкою изъ 3 листьевъ, образующихъ обертку на цветоносъ съ 1, рѣдко 2 цвѣтками. . . . . 7.

Стебель по всей длинѣ покрытъ очередными листьями; цветоносъ не окруженъ оберткою и несетъ нѣсколько цвѣтковъ, рѣдко 1 . . . . . 10.




7. Стрѣлка голая обѣ 1 маленькомъ цвѣткѣ (рис. 469); тычинокъ 5 (до 10); плодники на длинномъ цилиндрическомъ цветоножѣ; лепестки узкіе, питевидные, зеленоватые, съ ноготкомъ длиннѣ короткой пластинки; чашечка покрашенная, листки ея при основаніи со шпорцемъ; мелкія, невзрачныя травки съ розеткою линейныхъ листьевъ . . мышехвостники—*Myosûrus* L.

Стебель обѣ 1 (2) крупномъ цвѣткѣ, ярко окрашенномъ; околоцветникъ простой, обыкновенно болѣе чѣмъ о 5 лепесткахъ; тычинокъ множество; обертка изъ 3 мутовчатыхъ листьевъ, иногда въ видѣ чашечки . . . 8.

8. Цвѣтокъ о 8—10 лепесткахъ, съ оберткою изъ 3 зеленыхъ цѣльныхъ листковъ, въ видѣ чашечки, и короче околоцветника (рис. 470); листья корневыя, кожистые, зимующіе, 3-лопастные, сердцевидные, длинночерешковые. . . . . перелѣски—*Hepatica* Dill.

Цвѣтокъ о 5—6 лепесткахъ, съ оберткою изъ раздѣльныхъ листьевъ, длиннѣ околоцветника; корневыя листья тоже многораздѣльные, не кожистые и не зимующіе . . . . . 9.



9. Обертка пальчато-многораздѣльная, внизу сросшаяся во влагалище (рис. 471), не похожа на корневыя листья; плодники съ длиннымъ, остающимся на плодѣ перистымъ столбикомъ . . . прострѣлы—*Pulsatilla* Tournef.

Обертка из 3-чатых черешковых листьев, схожих с корневыми; остающийся столбик короткий, не перистый (рис. 472) . . . . .

вѣтреницы—*Anemone* L.

10 (6). Околоцвѣтникъ простой изъ 5 желтыхъ листковъ, раскрытый (рис. 473, а); плодниковъ 5—10 на плоскомъ цвѣтоложѣ; сѣмена въ мѣшечкѣ 1-рядныя (b); листья цѣльные, городковые, широкіе, почковидные . . . . .

калужницы—*Caltha* L.


Околоцвѣтникъ двойной . . . . . 11.

11. Чашелистиковъ обыкновенно 10, желтыхъ, сложенныхъ шаромъ (рис. 474, а); лепестки мелкіе, линейные, равны тычинкамъ и похожи на ихъ нити (с, b); плодниковъ много на выпукломъ ложѣ; сѣмена въ мѣшечки 2-рядныя (d); листья раздѣльные . . . . . купальницы—*Tröllius* L.

Чашелистиковъ 5 (3) короче 5 (рѣдко 8—10) лепестковъ . . . . . 12.



(Рис. 475).



(Рис. 476).

12. Лепестки со шпорцемъ, ворончатые, большіе, вставлены между чашелистиками, окрашенными въ цвѣтъ (не желтый) вѣчика (рис. 475); плодниковъ 5, внизу нѣсколько сросшихся; сѣмена въ мѣшечкѣ, 2-рядныя; внутреннія тычинки безъ пыльниковъ; листья 3-чато-2-сложные . . . . .

водосборы—† *Aquilégia* L.

Лепестки безъ шпорца, желтые или бѣлые; чашечка зеленая или желтоватая (рис. 476, b); свободныхъ пестиковъ много (а); 1-сѣменные орѣшки на выпукломъ ложѣ (d); всѣ тычинки съ пыльниками; лепестки съ медниковою ямкою (с); листья цѣльные или раздѣльные . . . . .

лютики—*Ranunculus* L.


LII. Rosaceae Juss. — розанныя. Листья съ прилистниками; цвѣточные покровы 5-ные, рѣдко 4-ные; чашечка 5 (4)-надрѣзная, часто окруженная прицвѣтниками, б. ч. въ видѣ 5 (4)-надрѣзной паружной чашечки, доли которой чередуются съ долями чашечки; лепестки, если только есть, прикрѣплены къ чашечкѣ, какъ и тычинки, супротивныя лепесткамъ, въ почкосложеніи внутрь загнутыя; завязь простая съ простымъ столбикомъ; тычинокъ и пестиковъ б. ч. много; односѣменные орѣшки, рѣже костянки.

1. Цвѣтки мелкіе, сученные въ очень большомъ числѣ въ густыя соцвѣтія . . . . . 2.

Цвѣтки крупныя, одиночныя или по нѣскольку въ рѣдкихъ соцвѣтіяхъ; околоцвѣтникъ двойной, съ окрашеннымъ вѣчикомъ и обыкновенно зеленою чашечкою, 5-ной, рѣдко 4-ной; тычинокъ и пестиковъ много . . . . . 6.

2. Цвѣтки въ щитковидныхъ метелкахъ . . . . . 3.


Цвѣтки въ колосовидныхъ кистяхъ или головчатыхъ колосьяхъ, съ 2, 3  
прицвѣтниками; 1 или 2 орѣшка заключены въ отвердѣвающую чашечку;  
листья перистые . . . . . 4.



(Рис. 477).



(Рис. 478).



(Рис. 479).


3. Цвѣтки 4-ные (рис. 477, b); 4 тычинки супротивны долямъ 4-надрѣзной остающейся чашечки, окруженной 4 прицвѣтниками, въ видѣ наружной чашечки (b); вѣнчикъ нѣтъ; плодникъ 1 съ боковымъ столбикомъ (a); орѣшекъ заключенъ въ чашечку (a); листья лопастные, вдоль складчатые . .

манжетки—*Alchemilla* L.

Цвѣтки 5-ные, съ чашечкою и бѣлымъ вѣнчикомъ; тычинокъ много (рис. 478, a); плодниковъ 6—12 (b), по 2 съменопочкахъ каждый; листья прерывисто перистые, съ большими полусердцевидными прилистниками, выросшими къ листовому черешку . . . . . таволги—*Filipendula* L.

4. Цвѣтки желтые въ длинной колосовидной кисти; цветоножки на верхушкѣ сочлененныя, съ 2 прицвѣтниками; околоцвѣтникъ двойной, 5-ной (рис. 479, a); цвѣтоложе кубарчатое, спаружи съ крючковатыми щетинками и съ 5-надрѣзами чашечки, по отцвѣтаніи сходящимися (c); тычинокъ немного (6—8); пестиковъ 2 (b); рыльце почти 2-лопастное; листья прерывисто перистые, съ сочлененнымъ черешкомъ . . . репейники—*Agrimonia* L.

Цвѣтки въ головчатомъ колосѣ окружены каждый 3 прицвѣтниками; околоцвѣтникъ простой съ 4-листнымъ отгибомъ; столбикъ верхушечный; листья просто перистые . . . . . 5.



(Рис. 480).




(Рис. 481).

5. Цвѣтки обоеполые (рис. 480, a); околоцвѣтникъ темномалиновый; тычинокъ б. ч. 4; плодникъ 1, рыльце головчатое, бородавчатое (b); орѣшекъ въ 4-гранной чашечной трубкѣ . . . . . кровохлебки—*Sanguisorba* L.


Цвѣтки многобрачные, зеленоватые: верхніе въ колосѣ женскіе, о 2, 3 плодникахъ, съ кистевиднымъ малиновымъ рыльцемъ (рис. 481, а); нижніе — мужскіе о 20—30 тычинкахъ; средніе чаще обоюполые (b); орѣшекъ въ морщинистой, не крылатой чашечкой трубкѣ . . . . . черноголовки—*Potèrium* L.

6 (1). Цвѣтки съ наружной чашечкою изъ 5 (4) сросшихся прицвѣтниковъ (рис. 482, а); чашечка въ почкосложеніи створчатая; цвѣтоложе и особенно плодоложе выпуклое. . . . . 7.


Прицвѣтниковъ въ видѣ наружной чашечки нѣтъ. . . . . 10.




(Рис. 482).



(Рис. 483).



(Рис. 484).



(Рис. 485).

7. Столбики длинныя, верхушечныя, 2-членистыя (рис. 482—b, c): верхній членикъ ихъ согнуть крючкомъ и отпадаетъ; нижній остается на плодѣ; плодоложе сухое, цилиндрическое; нижніе листья прерывисто лировидно-перистые, съ большою верхушечною лопастью; верхніе—3-чатые или 3-раздѣльные . . . . . гравилаты—*Gèum* L.

Столбики короткіе, б. м. боковыя, опадающіе или увядающіе; ложе коническое или овальное; листья пальчатые: 3-тые, 5, 7-ные, рѣже перистые . . . 8.

8. Лепестки остающіеся, ланцетные, заостренные, темно-малиновыя (рис. 483); плодоложе выпуклое, волосистое, подъ конецъ разрастается и становится ноздреватымъ; полукустарникъ съ пальчатыми листьями . . . . . сабельники—*Sòmarum* L.

Лепестки опадающіе, округлыя или слегка выемчатые, бѣлыя или желтыя; плодоложе овальное или коническое . . . . . 9.


9. Лепестки обратно-яйцевидныя, бѣлыя (рис. 484, а); плодоложе голое, по отцвѣтаніи увеличивается и разрастается въ сочную нѣжную ягоду (b), отдѣляющуюся отъ чашечки; столбики увядающіе; листья тройчатые . . . . . земляники—*Fràgaria* L.

Лепестки округлыя или обратно-сердцевидныя (рис. 485, а), иногда по 4 въ цвѣтѣ, желтыя, рѣдко бѣлыя; плодоложе волосистое, сухое и не отдѣляется отъ чашечки (c); столбики опадающіе; листья пальчатые, рѣже перистые . . . . . лапчатки—*Potentilla* L.


10 (6). Цвѣтоложе выпуклое, коническое, ноздреватое, несетъ много плодниковъ, которые становятся сочными костянками, сливающимися въ ложную сочную ягоду, которая отдѣляется отъ плодоложа въ видѣ шапочки (485, b); листья съ мелкими, линейными или яйцевидными прилистниками . . . . . малины—*Rubus* L.

Цвѣтоложе вогнутое, кувшинчатое, внутри щетинистое (рис. 487), образуется въ ложную сочную ягоду, заключающую волосистыя орѣшки; колючіе кусты съ перистыми листьями . . . . . розы—*Ròsa* L.

**LIII. Rubiaceae Juss.**—мареннияз. Травы съ мутовчатыми цѣльнокрайними листьями, по 4, 6, 8 въ каждой мутовкѣ, въ составъ которой входятъ 1 или 2 пары прилистниковъ, ничѣмъ не отличающихся отъ настоящихъ листьевъ; цвѣтокъ полный, б. ч. 4-ой, съ мало развитою чашечкою; вѣнчикъ спайнолепестный, верхній, въ почкосложеніи створчатый; тычинки



(Рис. 486).



(Рис. 487).

прикрѣплены между лопастями вѣнчика; завязь 2-гнѣздная, нижняя, гнѣзда обѣ 1 сѣменопочкѣ; плодъ изъ 2 односѣменныхъ орѣшковъ, подѣ концевъ отдѣляющихся одинъ отъ другаго.

1. Цвѣтки почти сидятъ, скученные въ головку, окруженную ложною мутовкою листочковъ, при основаніи сросшихся, въ видѣ обвертки; чашечный отгибъ явственный, 6-зубчатый, съ 2 меньшими зубцами, остающійся (рис. 488, б); вѣнчикъ ворончатый, 4-надрѣзной, лиловый . . . . .

шерардія—† *Sherardia* L.

Цвѣтки на ножкахъ въ метелкахъ, полусонтикахъ, безъ обвертки; чашечный отгибъ неявный; зубцы его не развитые . . . . . 2.



(Рис. 488).



(Рис. 489).



(Рис. 490).

2. Вѣнчикъ ворончатый или колокольчатый, съ явственною трубкою (рис. 489, а), 4 (3, 5)-надрѣзной; цвѣтки на короткихъ ножкахъ, въ рѣдкихъ метелчатыхъ полусонтикахъ, бѣлые или синеватые . . . ясенники—*Asperula* L.

Вѣнчикъ колесовидный, плоскій (рис. 490, а), съ очень короткою трубкою (б), 4 (3)-надрѣзной; цвѣтки на длинныхъ ножкахъ, въ пазушныхъ полусонтикахъ или въ вершинныхъ метелкахъ, бѣлые или желтые . . .

подмаренники—*Galium* L.

**LIV. Salicineae Rich.**—ивовыя. Деревья и кусты, б. ч. 2-домныя, съ листьями очередными, цѣльными и съ прилистниками; цвѣтки однополые въ сережкахъ, состоящихъ изъ прицвѣтныхъ чешуекъ, съ зачаточнымъ околоцвѣтникомъ въ видѣ медниковъ; мужскіе цвѣтки изъ однихъ только тычинокъ,

женские—изъ одного пестика; завязь простая, о 2 рыльцахъ, часто расщепленныхъ; коробочка б. ч. 2-створчатая; сѣмена съ хохолкомъ.

а) Деревья и кусты съ почками боковыми; листья на короткихъ черешкахъ; прицвѣтныя чешуйки цѣльнокрайнія (491, а); медникъ въ видѣ 1 задней или 2 маленькихъ чешуекъ—задней и передней,—не облекающихъ



(Рис. 491).



(Рис. 492).


цвѣтка (а); тычинокъ б. ч. 2 (до 12); коробочка постоянно 2-створчатая (с); листья б. ч. зазубренные, съ утолщенными концами зубцовъ . . .

ивы—*Salix* L.


б) Деревья съ почками верхушечными; листья на длинныхъ черешкахъ; прицвѣтныя чешуйки расщепленные (рис. 492, а); медникъ бокальчатый или блюдчатый окружаетъ цвѣтокъ (а); тычинокъ 8—30 (а); коробочка 2-створчатая (б), рѣже 3, 4-створчатая; цвѣтки на короткихъ ножкахъ; прицвѣтники опадаютъ ранѣе созрѣванія коробочекъ, всегда голыхъ; сережки голыя—не окруженные внизу листьями, распускаются ранѣе листьевъ . . .

тополя—*Populus* L.

**LV. Saxifragaceae DC.**—каменеломковыя. Травы съ очередными цѣльными листьями; цвѣтокъ 5-ной или 4-ной, съ простымъ или двойнымъ околоцвѣтникомъ, раздѣльнолистнымъ, и съ тычинками по числу всѣхъ листковъ околоцвѣтника; завязь съ 2 короткими столбиками, въ видѣ клюва или носика; рыльце косо насажено на концѣ носика; коробочка, вскрывающаяся съ внутренняго края носика.



(Рис. 493).



(Рис. 494).

а) Околоцвѣтникъ двойной, 5-ной, свободный (рис. 493); чашечка 5-раздѣльная; вѣничикъ 5-лепестный; тычинокъ 10; коробочка 2-гнездная, съ остающимися столбиками въ видѣ рожковъ, между которыми она вскрывается дырочкою; сѣмена прикреплены къ перегородкѣ; цвѣтки почти всегда одиночные, желтые; листья ланцетные, цѣльнокрайнія . . .

каменеломки—*Saxifraga* L.



б) Околоцвѣтникъ простой (рис. 794, б), сросшійся съ завязью (с), 4-надрѣзной (только средній цвѣтокъ 5-ной); 2 супротивныхъ лопасти меньше двухъ другихъ; 4 (5) тычинки расщеплены до самаго низу, такъ что ихъ кажется 8 (10), и прикрѣплены къ надпестичному железистому диску (б, с); коробочка простая, о 2 рожкахъ, вскрывается до половины 2-створками, по краямъ съ черными блестящими сѣменами; цвѣтки скучены въ частый полузонтикъ и окружены верхними, окрашенными листьями; листья почковидные, городчовые . . . . . селезеночники—*Chrysosplenium* L.


**LVI. Scrophulariaceae** R. Вг.—поричниковыя. Травы съ цвѣткомъ полнымъ и нижнимъ, спайнолепестнымъ вѣнчикомъ, вполне неправильнымъ или неравнолопастнымъ; завязь б. ч. 2-гнѣздная, съ простымъ столбикомъ и 2-лопастнымъ рыльцемъ; коробочка, вполне или на половину 2-гнѣздная, вскрывается створками, зубцами или дырочками.

1. Вѣнчикъ съ очень короткою трубкою, колесовидный, почти правильный; тычинокъ 2 или 5 . . . . . 2.

Вѣнчикъ съ б. ч. длинною трубкою, колокольчатый или ворончатый; тычинокъ или по крайней мѣрѣ тычиночныхъ нитей 4, въ 2 большинства; очень рѣдко 2 . . . . . 3.



(Рис. 495).



(Рис. 496).



(Рис. 497).

2. Вѣнчикъ о 5 надрѣзахъ, нѣсколько перавныхъ (рис. 495); 5 неравныхъ тычинокъ: 3 верхнія нити короче, мохнатыя, часто также и обѣ нижнія; цвѣтки желтые, довольно крупныя, въ ложныхъ колосьяхъ, б. ч. метельчато расположенныхъ; листья очередные . . . . . коровяки—*Verbascum* L.

Вѣнчикъ 4-лопастный; верхняя лопасть больше прочихъ и несетъ всего только 2 голыя тычинки (рис. 497, а); цвѣтки голубые, мелкіе, въ кистяхъ; всѣ листья или, по крайней мѣрѣ, нижніе супротивные . . . . .

вероника—*Veronica* L.

3. Вѣнчикъ вполне 2-губый, б. ч. шлемовидный . . . . . 4.

Вѣнчикъ неясвенно 2-губый или почти правильный . . . . . 12.

4. Вѣнчикъ внизу со шпорцемъ, личинковый (рис. 496, а); коробочка вскрывается 4—10 короткими зубцами (б) или 3 дырочками подъ верхушкою; всѣ листья, иногда кромѣ нижнихъ, очередные . . . . . льнянки—*Linaria* Juss.


Вѣнчикъ безъ шпорца и не личинковый; коробочка вскрывается створками . . . . . 5.

5. Верхняя губа вѣнчика въ видѣ шлема . . . . . 6.

Верхняя губа вѣнчика не согнута шлемомъ . . . . . 10.

6. Листья очередные, рѣдко почти супротивные, перистораздѣльные; чашечка 5-зубчатая или 2-лопастная, вздутая (рис. 498, б); верхняя губа вѣнчика сплюснута съ боковъ, нижняя съ 2 выдающимися ребрышками (рис. 499); коробочка косо-яйцевидная (рис. 498, с) или шаровидная, съ небольшимъ числомъ крупныхъ сѣмянъ . . . . . мытники—*Pedicularis* L.

Листья супротивные, цѣльные; чашечка 4-зубчатая или 4-надрѣзная; коробочка сплюснутая; гнѣзда пыльниковъ мохнатыя, съ остроконечіемъ внизу . . . . . 7.




7. Чашечка 4-надрѣзная, трубчато-колокольчатая; нижняя губа вѣнчика 3-надрѣзная, плоская (рис. 500, а); коробочка овальная или продолговатая, тупая или выемчатая (с); сѣмена мелкія, косо-продолговатыя, вдоль бороздчатая (d) . . . . . 8.

Чашечка 4-зубчатая (рис. 502, а); нижняя губа вѣнчика коротко 3-лопастная; верхняя губа сплюснута съ боковъ; коробочка заостренная или округлая (с) . . . . . 9.

8. Верхняя губа вѣнчика выемчатая, 2-лопастная, съ растопыренными лопастями и отвороченными краями (рис. 500, а); нижняя губа о 3 глубоко-выемчатыхъ лопастяхъ (а); пыльники при основаніи бородастые, нижнія доли ихъ у 2 короткихъ тычинокъ съ длиннымъ шпорцемъ (b) . . . . .

очанки—*Euphrasia* L.

Верхняя губа вѣнчика цѣльная, усѣченная, съ краями не отвороченными (рис. 501, а); нижняя губа о 3 цѣльныхъ тупыхъ лопастяхъ, короче верх-



ней (а); пыльники на верхушкѣ спутаны волосами; обѣ доли ихъ у всѣхъ тычинокъ съ одинаковыми короткими шпорцами (b) . . . . .

зубчатки—*Odontites* Hall.

9. Чашечка сплюснута съ боковъ, вздутая, съ сѣтчатыми жилками (рис. 502); верхняя губа вѣнчика съ 2 зубцами подъ верхушкою; коробочка почти

круглая (с); сѣмянъ не много, большихъ, круглыхъ, крылатыхъ (d); листья узкіе, городковые . . . . . погремки—*Rhinanthus* L.

Чашечка трубчатая, съ заостренными зубцами (рис. 503—а, b); верхняя губа вѣнчика съ отвороченными краями; нижняя—съ 2 бугорками при основании (а); коробочка яйцевидная, заостренная (b); сѣмянъ очень мало (по 1, 2 въ гнѣздѣ), продолговато-овальныхъ, гладкихъ, не крылатыхъ (с); листья цѣльнокрайніе . . . . . марьянники—*Melampyrum* L.


10 (5). Чашечка трубчатая, 5-угольная, 5-зубчатая; вѣнчикъ съ верхнею губою 2-лопастною, нижнею—3-лопастною (рис. 504), темножелтый . . .

личипочники—† *Mimulus* L.

Чашечка 5-раздѣльная или 5-надрѣзная . . . . . 11.



(Рис. 505).



(Рис. 506).



(Рис. 507).

11. Два прицвѣтника подъ самою чашечкою (рис. 506, а); трубка вѣнчика удлинненная (b); верхняя губа 2-лопастная, нижняя—3-лопастная (рис. 505); подъ 2 тычинками съ пыльниками еще 2 болѣе длинныя, почти безъ пыльниковъ (рис. 506, b); рыльце 2-лопастное, коробочка вскрывается вдоль перегородки 2 створками, б. ч. 2-расщепленными (с); листья цѣльные, супротивные; цвѣтки одиночные, въ пазухахъ листьевъ . . . . . авраны—*Gratiola* L.

Прицвѣтничковъ подъ чашечкою нѣтъ; трубка вѣнчика вздутая, почти шаровидная (рис. 507, а); верхняя губа длиннѣе, средняя лопасть нижней губы отвислая (а); створки острой коробочки цѣльныя, отдѣляются отъ перегородки (d); цвѣтки мелкіе; листья супротивные . . . . . поричники—*Scrophularia* L.



(Рис. 508).



(Рис. 509).

12 (3). Чашечка 5-раздѣльная; вѣнчикъ вздуто-колокольчатый, крупный (рис. 508); трубка его наклонена, книзу сужена, съ короткимъ 4-лопастнымъ отгибомъ; верхняя губа короткая, широкая; средняя лопасть нижней губы шире боковыхъ, длиннѣе ихъ и верхней губы; тычинки приподнятыя; рыльце 2-лопастное; листья очередные; нижніе розеткою . . . . .

наперстянки—† *Digitalis* L.


Чашечка 5-зубчатая; вѣнчикъ коротко-колокольчатый, почти правильный, 5-надрѣзной (рис. 509), розоватый, мелкій; рыльце почти головчатое; коробочка только внизу 2-гнѣздная, вскрывается по перегородкѣ; всѣ листья

въ корневой розеткѣ, длинночерешковые; цвѣтки одиночные, назушные; мелкія травы . . . . . лужники—*Limosella* L.

**LVII. Sileneae DC.** — смолевковыя. Травы съ супротивными, цѣльно-крайними листьями и полнымъ 5-нымъ цвѣткомъ: чашечка спайнолистная; вѣнчикъ о 5 лепесткахъ, прикрѣпленныхъ съ 10 тычинками подъ завязью къ б. м. развитому плодоносу; завязь 1, свободныхъ столбиковъ 2, 3, 5; сѣмепосъ въ срединѣ плода.

1. Чашечка съ жилками вдоль спайки чашелистиковъ, и потому жилокъ на чашечкѣ не менѣе 10; столбиковъ 3 или 5 . . . . . 2.


Чашечка безъ жилокъ вдоль спайки чашелистиковъ, и потому жилокъ на чашечкѣ не болѣе 5 или ихъ вовсе нѣтъ; столбиковъ 2; коробочка простая, на верхушкѣ 4-зубчатая . . . . . 7.



(Рис. 510).



(Рис. 511).



(Рис. 512).

2. Чашечка длиннѣе вѣнчика, 5-раздѣльная, съ длинными, острыми, зелеными долями (рис. 510—b, a); лепестки цѣльные, ноготки ихъ съ крылатымъ ободкомъ, безъ язычка; столбиковъ 5; 5-зубчатая коробочка, сидячая . . . . . куколи—*Githago* Desf.

Чашечка короче вѣнчика, 5-зубчатая или 5-надрѣзная . . . . . 3.

3. Чашечка коротко-колокольчатая, 5-надрѣзная (рис. 511, a); лепестки съ отогнутымъ отгибомъ, постепенно суженымъ въ ноготокъ, и съ короткимъ язычкомъ; столбиковъ 3 (b); плодъ въ видѣ круглой черной ягоды; вѣтви растопыренныя; листья яйцевидные . . . . . волдырники—*Cucubalus* Tourn.

Чашечка трубчатая, 5-зубчатая; лепестки быстро стянуты въ узкій ноготокъ; коробочка . . . . . 4.

4. Лепестки 4-раздѣльные, съ язычкомъ, но безъ крылатого ободка (рис. 512), столбиковъ 5; коробочка простая, сидячая, вскрывается 5 зубцами (рис. 512) . . . . . горичвѣты—*Lychnis* Tourn.

Лепестки 2-раздѣльные или цѣльные . . . . . 5.


5. Столбиковъ 3 (рис. 513, a), коробочка вскрывается 6 зубцами (b), или столбиковъ и коробочекъ не бываетъ (въ мужскихъ цвѣткахъ 2-домныхъ видовъ), и тогда либо лепестки цѣльные, либо при раздѣльныхъ лепесткахъ чашечка съ сѣтчатыми жилками . . . . . смолевки—*Silene* L.

Столбиковъ 5 (рис. 514, b); коробочка вскрывается 5 или 10 зубцами (c); лепестки съ язычкомъ (b); если же столбиковъ и коробочки нѣтъ (въ мужскихъ цвѣткахъ 2-домныхъ видовъ), то лепестки съ глубоко 2-лопастною пластинкою . . . . . 6.

6. Лепестки съ цѣльною или слегка выемчатою пластинкою (рис. 514, b); коробочка на длинномъ плодоносѣ (с), при основаніи 5-гнѣздная, вскрывается 5 зубцами (с); стебель подъ узлами линкій; обоюполая травы. . . . .

дремы—*Visciaria* Roehl.


Лепестки съ глубокою 2-раздѣльною пластинкою (рис. 515, a); коробочка простая на короткомъ плодоносѣ и вскрывается 10 зубцами (с); 2-домыи пушистыя травы. . . . . шелкуницы—*Melandryum* Roehl.



(Рис. 513).



(Рис. 514).



(Рис. 515).

7 (1). Чашечка цилиндрическая, безъ выдающихся жилокъ (b); окружена внизу 1—3 парами остистыхъ листочковъ или чешуекъ, составляющихъ наружную чашечку (рис. 516—b, a), лепестки быстро стянуты въ длинный ноготокъ, отгибъ ихъ горизонтально отогнутый, зазубренный (a) или глубоко перисто-надрѣзанный; листья срослись внизу во влагалище; верхніе — въ видѣ прицвѣтниковъ или обвертки. . . . . гвоздики—*Diànthus* L.

Чашечка безъ наружной чашечки и цвѣтки безъ обвертки; лепестки на концѣ цѣльные, не расщепленные. . . . . 8.




(Рис. 516).



(Рис. 517).



(Рис. 518).



(Рис. 519).

8. Чашечка короткая и широкая, съ широкою перепончатою каймою (рис. 517, b); вѣнчикъ колокольчатый, лепестки постепенно сужены въ клиновидный ноготокъ (a); цвѣтки мелкіе; листья узкіе, линейные. . . . .

качимы—*Gypsophila* L.

Чашечка удлиннная; лепестки быстро стянуты въ длинный, узкій ноготокъ, съ крылатымъ ободкомъ; цвѣтки довольно крупныя; листья ланцетные или овальные. . . . . 9.

9. Чашечка вздутая, остро 5-гранная (рис. 518—b, a); вѣнчикъ безъ коронки; только наружная оболочка плода вскрывается 4 зубцами, внутренняя—неправильно разрывается. . . . . тысячеголовы—*Vaccària* Med.

Чашечка трубчатая, безъ граней, гладкая (рис. 519, б); отгибъ лепестковъ съ 2 острыми язычками (а); коробочка 4-зубчатая (с) . . . . .

мыльнянки—*Saponaria* L.

**LVIII. Smilacae R. Br.**—сассапарильныя. Односѣменодольныя травы; околоцвѣтникъ простой или двойной; тычинокъ по числу долей околоцвѣтника; завязь 1, верхняя; ягода.

1. Цвѣтокъ 4-ной (рѣдко 5-ной или 3-ной), съ околоцвѣтникомъ почти раздѣльно-лепестнымъ; тычинки прикрѣплены къ самому низу растопыренныхъ или отогнутыхъ долей околоцвѣтника; листья только въ срединѣ стебля . . . . . 2.

Цвѣтокъ 6-ной, съ околоцвѣтникомъ простымъ, 6-зубчатымъ или 6-надрѣзнымъ, опадающимъ; тычинки прикрѣплены къ трубкѣ ворончатого или колокольчатого околоцвѣтника; стебель весь покрытъ листьями или только при основаніи; цвѣтоножки сочлененныя . . . . . 3.




(Рис. 520).



(Рис. 521).

2. Цвѣтокъ одинъ на верхушкѣ простаго стебля, съ мутовкою листьевъ по числу частей цвѣтка (4, 5, 3); околоцвѣтникъ остающійся, двойной (рис. 520, а); наружные листья его ланцетные, зеленые; внутренніе—линейные, желтоватые; тычинокъ 8 (10, 6), пыльники съ длиннымъ заостреннымъ связникомъ (а); рыльца, внизу сросшіяся (б); ягода черная, 4 (5, 3)-гнѣздная, малосѣменная . . . . . одноягодники—*Pàris* L.


Цвѣтковь много въ верхушечной кисти, на концѣ простаго стебля съ 2 сближенными листьями; околоцвѣтникъ опадающій, простой, о 4-доляхъ; тычинокъ 4 (рис. 521, а); столбикъ короткій и толстый; ягода (б) красновато-зеленая, 2-гнѣздная, 1-сѣменная; цвѣтки мелкіе, бѣлые, на сочлененныхъ цвѣтоножкахъ . . . . . майники—*Majanthemum* Web.



(Рис. 522).



(Рис. 523).



(Рис. 524).

3. Стебель вѣтвистый, покрытъ чешуйчатыми листьями; вѣтви несутъ укороченныя вѣточки, въ видѣ пучковъ узкихъ нитевидныхъ листьевъ; цвѣтки однополые; околоцвѣтникъ глубоко 6-раздѣльный, колокольчатый (рис. 522—а, б); тычиночныя нити, шиловидныя; столбикъ короткій, 3-лопастно



рыльце (b); цветки пазушные, по 1-2, желтоватые; травы двудомныя...

спаржи—*Asparagus* L.

Стебель простой, покрыт широкими листьями; цветки обоеполые, повислые; околоцветник 6-зубчатый... 4.

4. Цветки в однобокой повислой кисти на голой стрелке; только 2 листа внизу стебля; околоцветник колокольчатый (рис. 523, a); тычинки прикреплены в нижней его части (b); столбик короткий и толстый; цветки чисто белые... ландыши—*Convallaria* L.

Цветки по 1 или по несколько короткою кистью в пазухе очередных листьев, 2-рядно покрывающих сверху дугообразный стебель; околоцветник трубчатый (рис. 524, a); тычинки прикреплены к средине трубки (b); столбик нитевидный; цветки белые, кончики их зеленые...

купены—*Polygonatum* Tourm.


**LIX. Solanaceae** Juss.—пасленовыя. Цветок полный, б. ч. 5-ной (6, 7-ной); чашечка спайнолистная; веник спайнолепестный, нижний, опадающий, в почкосложении складчатый; тычинок 5 (6, 7); завязь 2, 4-гнездная, с срединными семеносами; плод 2, 4-гнездный, многосемянный.

1. Веник колесовидный (рис. 525, a); пыльники, сходящиеся трубкою (b, a); ягода сочная; цветки в завитках... 2.

Веник ворончатый или колокольчатый; пыльники не сходятся трубкою, вскрываются продольною щелью... 3.



(Рис. 525).



(Рис. 526).



(Рис. 527).

Цветок 5-ной (рис. 525, a); чашечка зубчатая или лопастная (d), веник лопастной или раздельный (a); пыльники не спаяны и без шпиговидных связников (b); гнезда их вскрываются на верхушке дырочкою; ягода 2-гнездная (d, e)... паслены—*Solanum* L.

Цветок б. ч. 6, 7-ной: чашечка глубоко-раздельная (рис. 526); веник раздельный; пыльники спаяны вытянутыми в шпиговидные отростки связниками; гнезда их вскрываются изнутри продольною щелью; ягода многосемянная... баклажаны—*Lycopersicon* Mill.

3. Колючий кустарник с повислыми ветвями; чашечка трубчатая, 2-лопастная (рис. 527), по отцветании не разрастается, только внизу окружает ягоду; веник ворончатый, лиловокрасный... лиция—*Lycium* L.

Травы; чашечка о 5 равных долях или зубах... 4.

4. Чашечка 5-раздельная, вздутая, остро 5-гранная, с стреловидными острыми долями (рис. 528); веник колокольчатый с слабо 5-лопастным плоским отгибом; пыльники сближены, тычиночные нити книзу шире; сухая, 3—5-гнездная ягода заключена во вздутую чашечку...

никандра—*Nicandra* Adans.

Чашечка 5-зубчатая или 5-надрѣзная; вѣнчикъ ворончатый или блюдчатый; пыльники не сближены; коробочка . . . . . 5.


5. Вѣнчикъ съ тупыми, нѣсколько неравными лопастями; тычинки согнуты (рис. 529, а); 2-гнездная коробочка заключена въ разрастающуюся кувшинчатую 5-зубчатую чашечку (б), растрескивается поперекъ кольцомъ и вскрывается крышечкою; цвѣтки въ пазухѣ верхнихъ листьевъ въ видѣ однобочной кисти . . . . . белены—† *Nyoscyamus* L.



(Рис. 528).



(Рис. 529).



(Рис. 530).

Вѣнчикъ вполне правильный; тычинки прямые; цвѣтки одиночные; очень крупные, бѣлые, съ 5-зубчатымъ отгибомъ (рис. 530, а); чашечка трубчатая, граненая, отдѣляется кольцомъ отъ остающейся нижней части ея въ видѣ щитка; коробочка 2-гнездная, внизу раздѣлена ложными перегородками на 4 гнезда, вскрывается 4 створками, снаружи съ зелеными иглами (б). . .

дурманы—† *Datura* L.

LX. \* *Spiraeaceae* Maxim.—спирейныя. Кусты съ очердными листьями и мелкими цвѣтками, бѣлыми или розовыми, скученными въ верхушечныя щитки или метелки, съ прицвѣтниками; цвѣточные покровы 5-ные: чашечная трубка съ дискомъ, отгибъ ея 5-лопастный или 5-раздѣльный, остающийся; лепестки и тычинки прикрѣплены къ чашечкѣ; лепестки цѣльные,



(Рис. 531).



(Рис. 532).



(Рис. 533).

округлые, падучіе; тычинокъ много, наружныя длиннѣе; плодниковъ 5 (3, 2, 1), въ мутовкѣ, съ вершиннымъ столбикомъ, засыхающимъ на мѣшечкѣ 2, 3-сѣменномъ.

1. Листья съ большими прилистниками, непарно-перистые; пестики супротивны долямъ чашечки (рис. 531); мѣшечки на треть спаяны внизу


внизу съ внутренней стороны, вскрываются вдоль всей спинки и до спайки съ внутренней стороны; сѣмянъ много; цвѣтки въ метелкѣ; листочки зубчатые . . . . . рябинники—\* *Sorbària* A. Br.

Листья цѣльные или лопастные, либо вовсе безъ прилистниковъ, либо съ короткими, опадающими; пестики чередуются съ чашелистиками и супротивны лепесткамъ . . . . . 2.

2. Прилистники пленчатые, паучіе; листья 3-лопастные; мѣшечки перепончатые, вздутые, 2-створчатые, сросшіеся своими ножками внизу въ общую плодоножку (рис. 532); цвѣтки щиткомъ; кожа сѣмянъ очень твердая, блестящая . . . . . пузырчатники—\* *Physocàrpus* Camb.

Прилистниковъ вовсе нѣтъ; листья зубчатые или же надрѣзочно-зубчатые, п. к. м. къ верхушкѣ; мѣшечки не вздутые, хрящеватые, свободные—не сросшіеся (рис. 533—b, c), вскрываются одною щелью вдоль внутренняго края мѣшечковъ; сѣмянъ много; кожа сѣмянъ тонкая; цвѣтки въ щиткахъ или метелкахъ . . . . . спирея—\* *Spiràea* L.

**LXI. Turpàceae** Juss.—рогозовыя. Односѣменодольныя болотныя, однодольныя травы, съ влагалищными, широколинейными листьями; цвѣтки 1-полые, очень мелкіе, плотно скученные въ цилиндрическіе или шаровидные початки, въ видѣ ложныхъ колосовъ или головокъ, изъ коихъ верхніе—мужскіе, нижніе—женскіе; околоцвѣтникъ зачаточный изъ волосковъ или чешуекъ; мужскіе цвѣтки о 3 тычинкахъ; женскіе обѣ 1 пестикѣ, съ 1-сѣменною завязью; орѣшекъ или костянка.



(Рис. 534).



(Рис. 535).

а) Цвѣтки скучены въ ложные колосы; околоцвѣтникъ состоитъ изъ частыхъ волосковъ (рис. 534—а, b); тычиночныя нити внизу сросшіеся (а); связникъ выдается въ видѣ короткаго тупаго отростка; завязь на короткой ножкѣ; столбикъ съ рыльцемъ во много разъ длиннѣ завязи (b); орѣшекъ на длинной ножкѣ, съ остающимся столбикомъ и рыльцемъ . . . . .

рогозы—*Typha* L.

б) Цвѣтки въ нѣсколькихъ головкахъ, расположенныхъ колосомъ, простыми или вѣтвистыми; околоцвѣтникъ о 3 пленчатыхъ чешуйкахъ (рис. 535—а, b); тычиночныя нити свободныя, гнѣзда пыльниковъ вверхъ расходятся; завязь сидячая; рыльце косо насажено, подъ конецъ опадаетъ; костянка (c) . . . . . ежеголовки—*Spargànium* L.

**LXII. Umbelliferae** Juss.—зонтичныя. Травы съ листьями очередными, б. ч. перисто-разбѣчными, и цвѣтками полными, 5-лыми, обоеполыми, со-


брованными б. ч. въ зонтички, лучи которыхъ обыкновенно окружены снизу такъ наз. частною обверткою или обверточкою изъ прицвѣтниковъ; въ свою очередь зонтички расположены почти всегда тоже зонтикомъ и составляютъ сложный зонтикъ; внизу б. ч. съ общою обверткою; чашечка съ 5-зубчатымъ или неяснымъ отгибомъ; вѣнчикъ верхній; 5 лепестковъ, обыкновенно на концѣ съ лопастью, внутрь загнутаю, прикрѣплены къ чашечкѣ и чередуются съ чашечными зубцами; тычинокъ 5, въ почкосложеніи внутрь свернутыхъ, подобно лепесткамъ; завязь 2-гнѣздная, нижняя, столбиковъ 2, внизу расширены въ надпестичный дискъ, покрывающій верхушку завязи и составляющій такъ наз. пестичную подушечку; плодъ — вислоплодникъ, состоитъ изъ 2 односѣменныхъ долекъ, подъ конецъ отдѣляющихся по спайкѣ и висячихъ на б. ч. вильчатомъ столбцѣ. На спинкѣ и по бокамъ каждой дольки вислоплодника выступаютъ продольныя ребрышки, а между ними — бороздки или ложбинки. Кромѣ главныхъ ребрышекъ, обыкновенно въ числѣ 5 на каждой долкѣ — 3 на спинкѣ и 2 по бокамъ, гдѣ дольки плода сходятся, — бываютъ въ промежуткѣ между ними еще вторичныя ребрышки. Подъ ребрышками проходятъ вдоль плода жилки, а подъ ложбинками — каналы, выполненные пахучими маслами; это такъ наз. струйки.

1. Цвѣтки въ головкахъ или головчатыхъ зонтичкахъ, окруженныхъ многолистной обверточкою; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, стеблевые — сидячіе; чашечка о 5 ланцетныхъ зубахъ; лепестки перегнуты почти пополамъ; плодъ безъ реберъ, столбецъ незамѣтный . . . . . 2.


Всѣ цвѣтки на ножкахъ расположены зонтичками, собранными въ сложный зонтикъ . . . . . 3.



(Рис. 536).



(Рис. 537).



(Рис. 538).

2. Всѣ цвѣтки сидячіе, обоеполые, собраны въ головки, расположенныя рѣдкимъ щиткомъ; листья съ колючками, какъ и обверточки головокъ; плодъ почти цилиндрической, покрытъ чешуйками или бугорками, безъ струекъ (рис. 536) . . . . . синеголовники — *Eryngium* L.

Розоватыя цвѣтки многобрачные, скучены въ головчатые зонтички, расположенные тоже зонтикомъ: краевые цвѣтки на короткихъ ножкахъ мужскіе (рис. 537, а); остальные — сидячіе, обоеполые (б); листья съ роговатыми зубцами, почти всѣ корневые, пальчатораздѣльные; плодъ почти шаровидный, съ крючковатыми щетинками (с), о многихъ струйкахъ . . . . .

поддѣсники — *Sanicula* L.

3. Общій зонтикъ съ обверткою; частные зонтики, или зонтички, тоже съ обверточками . . . . . 4.

Общій зонтикъ безъ обертки или иногда съ немногими листочками, не свыше 3 . . . . . 11.


4. Стебель волосистый или п. к. м. въ верхней части пушистый; завязь и плоды щетинистые; чашечка 5-зубчатая; цвѣтки бѣлые или розовые . 5.

Стебель, завязь и плоды голые . . . . . 8.

5. Только верхняя часть стебля, лучи, цвѣтоножки и плоды пушистые; листья голые; чашечные зубцы шиловидные, опадающіе (рис. 538, а); дольки плода съ короткими щетинками, яйцевидныя, не сплюснутыя (б), о 5 толстых ребрышкахъ и о 2—3 струйкахъ въ ложбинкѣ (с) . . . . . 6.

порѣзники—*Libanotis* Crnz.

Весь стебель и листовые черешки жестко-волосистые; чашечные зубцы остающіеся; дольки плода о 5 нитевидныхъ главныхъ ребрышкахъ и о 4 болѣе выдающихся, промежуточныхъ—вторичныхъ; подъ ними ложбинки объ 1 струйкѣ; главные боковые ребрышки отодвинуты къ спайкѣ . . . . . 6.




(Рис. 539).



(Рис. 540).



(Рис. 541).



(Рис. 542).

6. Листочки обертки перистораздѣльные, у обверточекъ—3-чато-раздѣльные, такой же длины, какъ лучи зонтика, по отцвѣтаніи загнуты внутрь; плодъ чечевицеобразный, сплюснутый со спинки; главные ребрышки щетинистыя; вторичныя—съ 1 рядомъ иголъ (рис. 539); столбецъ цѣльный, не расщепленный; краевые цвѣтки лучистые . . . . . моркови—*Daucus* L.

Листочки обертки простые, цѣльные, много короче лучей зонтика, по отцвѣтаніи не загнуты внутрь . . . . . 7.

7. Стебель угловато-бороздчатый, жестковолосый, какъ и лучи зонтика; обертка и обвертки многолистные, листочки ихъ линейно-ланцетные, съ перепончатою каймою, отогнутые; всѣ 4 вторичныя ребрышка крылатыя (рис. 540; б); киль ихъ жестковолосый (а); столбецъ 2-раздѣльный . . .

гладыши—*Laserpitium* L.


Стебель округлый, остро-шершавый; въ оберткѣ и обверточкахъ не болѣе 6 шиловидныхъ листочковъ, прижатыхъ къ лучамъ; вторичныя ребрышки неясныя, усажены 3 рядами иголъ; главные ребра щетинистыя (рис. 541, б); столбецъ цѣльный, не раздѣльный; плодъ продолговатый, нѣсколько сжатый съ боковъ, сплошь усаженъ согнутыми иглами по ложбинкамъ (а) . .

пупырники—*Torilis* Adans.


8 (4). Обертка и обвертки 3—5-листные, отогнутыя; обвертки однобокія, съ овально-ланцетными листками; чашечка неясная; лепестки обратно-сердцевидные, съ очень короткимъ кончикомъ (рис. 542, а); плодъ вздутый, съ боковъ сжатый, яйцевидный; дольки его о 5 извилистыхъ—волнисто-городковыхъ ребрышкахъ (б); ложбинки безъ струекъ; столбецъ

2-раздѣльный; стебель съ сизымъ налетомъ, внизу съ красными пятнами; трава пахнетъ мышами . . . . . болиголовы—*Conium* L.


Обвертки многولیстные; частныя обвертки всестороннія; плодъ съ ребрышками прямыми . . . . . 9.



(Рис. 543).



(Рис. 544).



(Рис. 545).

9. Листочки обвертокъ приподнятые; листочки верхнихъ перистыхъ листьевъ мелко и остропильчатые; чашечка 5-зубчатая (рис. 543, b); лепестки бѣлые, обратно-яйцевидные (a); плодъ сплюснутый съ боковъ, продолговато-яйцевидный (b); дольки его о 5 тупыхъ нитевидныхъ ребрышкахъ, безъ крыльевъ (c); ложбинки о 3 струйкахъ у поверхности; колѣна вилки столбца срослись съ долками плодами; болотныя и водяныя травы . . . . .

поручейники—*Sium* L.

Листочки обвертокъ отогнутые; листочки стеблевыхъ листьевъ съ рѣдкими и глубокими зубцами или выемчато-зубчатые; плодъ чечевицеобразный, сплюснутый со спинки, съ боковыми или краевыми ребрышками крылатыми; ложбинки объ 1 струйкѣ; столбецъ 2-раздѣльный . . . . . 10.

10. Верхніе листья съ длиннымъ влагалищемъ; чашечка 5-зубчатая (рис. 544, b); лепестки бѣлые, обратно-яйцевидные, стянуты въ загнутую внутрь лопасть (a); дольки плода съ 3 тонкими средними спинными ребрышками (c, b), боковыя крылья обѣихъ долекъ прилегаютъ вдоль спайки (c) . . . . .

горичники—*Peucedanum* L.

Верхніе листья съ короткимъ влагалищемъ; чашечка неясная; лепестки желтоватыя, округлыя, съ короткимъ кончикомъ (рис. 545, a); боковыя крылья долекъ плода вдвое шире спинныхъ, по краямъ расходятся (c, b)

зори—*Levisticum* Koch

11 (3). Частныя зонтики съ обверточками. б. ч. многولیстными и не меньше какъ о 3 листочкахъ . . . . . 12.

Частныя зонтики безъ обверточекъ . . . . . 27.

12. Обвертки длиннѣе или не короче зонтичныхъ лучей . . . . . 13.

Обвертки много короче зонтичныхъ лучей . . . . . 16.


13. Обвертки о 3 листочкахъ, одностороннія, внизу отогнутыя; листья перисто 1, 2-сложные, листочки ромбическіе или почти треугольныя, глубоко 3-раздѣльные; чашечка неясная; краевыя цвѣтки лучистыя; плодъ округло-яйцевидный (рис. 546, a); ребрышки высокія, толстыя, съ острымъ килемъ (b); краевыя нѣсколько шире спинныхъ; ложбинки объ 1 струйкѣ; столбикъ 2-раздѣльный . . . . . корорыши—*Aethusa* L.

Обвертки многولیстные, всестороннія; листья перисто 2, 3-сложные,



дольки ихъ съ роговыми кончиками; краевыя ложбинки иногда о 2 струйкахъ . . . . . 14.


14. Листочки обверточекъ ланцетные, заостренные, рѣснично-зазубренные, съ широкой каймой; стебель округлый, дорожчатый; листовые черешки верхнихъ листьевъ расширены въ длинное охватывающее влагалище; чашечка 5-зубчатая, зубы треугольные, короткіе, толстые, остающіеся (рис. 547, а);



(Рис. 546).



(Рис. 547).




(Рис. 548).

плодъ овальный или продолговатый; ребрышки толстыя (b); столбецъ 2-раздѣльный; молодые плоды и лучи шероховатыя, столбики отогнутые . .

жабрицы—*Séseli* L.

Листочки обверточекъ линейные или шиловидные; стебель, п. к. м. вверху, остроребристый; чашечка неясная; плодъ яйцевидный . . . . . 15.


15. Листовые черешки у всѣхъ листьевъ вытянуты въ широкое и длинное влагалище; стебель внизу круглый, вверху угловато-бороздчатый; плодъ не сплюснутый, о 5 тонкихъ, равныхъ ребрышкахъ, нѣсколько крылатыхъ (рис. 548) . . . . . булдырники—*Cnidium* Cass.



(Рис. 549).



(Рис. 550).



(Рис. 551).

Листовые черешки у верхнихъ листьевъ съ короткимъ, не охватывающимъ влагалищемъ; стебель почти крылатый; плодъ сплюснутый со спинки, крылаторебристый (рис. 549, а); боковыя крылья вдвое шире спинныхъ, съ расходящимися краями (b) . . . . . гирчи—*Selinum* L.

16 (12). Стебель жестковолосый, весь или только въ нижней части 17.

Стебель голый, иногда покрытый рѣдкимъ пушкомъ . . . . . 18.

17. Листья перистосложные, о 3, 5, 7 широкихъ листочкахъ, нижніе листочки на черешечкахъ; листочки обверточекъ узколинейные; цвѣтки зеленовато-желтые; чашечка 5-зубчатая; плодъ чечевицеобразный; спинныя ребра очень тонкія, боковыя — ширококрылатая; струйки булавовидныя, не доходить до низу ложбинокъ (рис. 550) . . . борщевики—*Heracléum* L.


Листья перисто 2, 3-сложные; листочки (3 — 8) обверточекъ ланцетные, тонко заостренные; цвѣтки бѣлые; чашечка неясная; плодъ продолго-

ватый, съ боковъ сплюснутый (рис. 551, а); дольки плода о 5 тупыхъ равныхъ ребрышкахъ (b); струйки вдоль всей ложбинки; столбецъ коротко 2-надрѣзной . . . . . бутени—*Chaerophyllum* L.

18. Листовые черешки оттопырены отъ стебля; плодъ яйцевидно продолговатый . . . . . 19.

Листовые черешки отходить отъ стебля подъ острымъ угломъ или дугою 20.

19. Зонтики супротивны листьямъ; наружные цвѣтки съ лучистыми лепестками; край чашечки зубчатый (рис. 552, а); плодъ въ разрѣзѣ круглый, съ тупыми ребрышками: краевыя нѣсколько шире спинныхъ (d); столбики длинные, прямые (а); столбецъ приросшій, неясный; болотныя травы . . . . . омежники—*Oenanthe* L.



Зонтики не супротивны листьямъ; всѣ цвѣтки правильные; чашечныхъ зубцовъ незамѣтно (рис. 553, а); плодъ съ 5 равными острыми ребрышками, внутри вздуто полыми (b); большія вѣтвистыя травы; листовые черешки со вздутыми влагалищами . . . . . пусторѣбрышники—*Cenolophium* Koch.

20. Листочки стеблевыхъ листьевъ цѣльные, зазубренные . . . . . 21.

Листочки стеблевыхъ листьевъ раздѣлены на перистыя или тройчатые, ланцетныя или линейныя доли . . . . . 24.

21. Листочки ланцетные, иногда линейные, острозубчатые; влагалища листьевъ не расширены; чашечка 5-зубчатая (рис. 554, b); плодъ сжатосферовидный, съ узкою спайкой; дольки его о 5 плоскихъ, нитевидныхъ ребрышкахъ (с); листовые черешки полые; болотныя травы . . . . . вежи—*Cicuta* L.

Листочки широкіе, овальные или овальноланцетные; листовыя влагалища широкія; плодъ сплюснутый со спинки; боковыя ребрышки крылатые, съ расходящимися краями . . . . . 22.

22. Стебель ребристый, бороздчатый; листочки округлозубчатые; лучи и цвѣтоножки голые; лепестки съ длиннымъ ноготкомъ, округло-обратно-серцевидные (рис. 555, b); всѣ ребрышки плода полны (а); спинныя—нитевидныя; ложбинки съ 1 струйкою, скрытою подъ оболочкою плода, которая только тутъ срослась съ сѣменемъ; чашечка 5-зубчатая (с) . . . . .


маточники—*Ostëricum* Hoffm.

Стебель цилиндрическій, полосатый; листочки съ острыми зубцами; лучи и цвѣтоножки пушистые, лепестки съ короткимъ ноготкомъ; листовыя влагалища вздуты мѣшкомъ . . . . . 23.


23. Вторичные черешки листочковъ съ прилистничками; чашечка неясная (рис. 556, b); лепестки бѣлые, ланцетные, раскрытые или нѣсколько согну-

тые (а); среднія—спинныя ребрышки плода нитевидныя (с); ложбинки объ 1 струйкѣ, сѣмена приросли къ оболочкѣ плода . . . дудники—*Angèlica* L.


Прилистничковъ нѣтъ; чашечка 5-зубчатая; лепестки эллиптические, съ загнутымъ внутрь кончикомъ (рис. 557, а), зеленовато-бѣлые; среднія—спинныя ребрышки плода толстыя, килеватыя (с); ложбинки безъ струекъ; сѣмена свободныя въ полости плодовой оболочки, распадающейся на 2 слоя, изъ коихъ во внутреннемъ много струекъ . . . дягели—*Archangèlica* Hoffm.



(Рис. 556).




(Рис. 557).




(Рис. 558).

24 (20). Обвертки изъ 3—5 ланцетныхъ или овально ланцетныхъ рѣсничныхъ листочковъ; листочки стеблевыхъ листьевъ тусклые; чашечка неясная, плодъ сплюснутый съ боковъ, голый или пушистый, почти цилиндрический, безъ реберъ, вытянутъ въ носикъ о 5 ребрышкахъ (рис. 558, а); ложбинки безъ струекъ (b); столбецъ коротко 2-надрѣзной (а); краевые цвѣтки лучистые . . . купыри—*Anthriscus* Hoffm.


Листочки оберточки шиловидные или узколинейные; листочки стеблевыхъ листьевъ лоснящиеся; столбецъ 2-раздѣльный . . . 25.



(Рис. 559).



(Рис. 560).



(Рис. 561).

25. Верхніе листья съ узколинейными долями; цвѣтки бѣлые, краевые лучистые (рис. 559, а); лепестки обратнойцевидные, съ согнутымъ кончикомъ; чашечка 5-зубчатая; плодъ шаровидный (b), о 10 извилистыхъ главныхъ ребрышкахъ, почти плоскихъ, и о 8 килеватыхъ прямыхъ—вторичныхъ; струекъ нѣтъ (с) . . . кишеницы—\**Coriandrum* L.

Листья съ долями ланцетными или овальными; все цвѣтки правильные; чашечка неясная . . . . . 26.

26. Листочки съ долями 3-надрѣзными или зубчатыми; верхніе листья тройчатые; цвѣтки зеленовато-желтые; лепестки округлые, стянуты во внутрь загнутую лопасть (рис. 560, а); плодъ сплюснутъ съ боковъ, яйцевидный (с); дольки его о 5 нитевидныхъ ребрышкахъ, безъ вторичныхъ (d); ложбинки объ 1 струйкѣ; пестичная подушечка коническая (b) . . . . .


петрушки—\* *Petroselinum* Hoffm.

Листочки съ долями перисто-раздѣльными; верхніе листья просто перистые; цвѣтки бѣлые; плодъ слегка сплюснутый со спинки, крылато-ребристый (рис. 561—b, а); боковые крылья много шире спинныхъ; ложбинки о 2, 3 струйкахъ; стебель покрытъ сѣроватымъ налетомъ . . . . .


гиричовники—\* *Conioselinum* Fisch.

27 (11). Все листья перисто-многораздѣльные на тонкія, линейныя или нитевидныя доли; ложбинки объ 1 струйкѣ . . . . . 28.


Все листья просто перистые или 3-чатые, съ листочками широкими, овальными или ланцетными, иногда только кромѣ самыхъ верхнихъ листьевъ . 30.



(Рис. 562)



(Рис. 563).



(Рис. 564):

28. Листочки линейные; цвѣтоножки короткія; цвѣтки бѣлые; лепестки обратнояйцевидные, съ загнутымъ острымъ кончикомъ; плодъ явственно сплюснутый съ боковъ, продолговатый, вдоль перетянутый, о 5 нитевидныхъ ребрышкахъ (рис. 562—d, c); столбецъ свободный, на верхушкѣ раздвоенный (с); столбики отогнутые . . . . . тмины—\* *Carum* L.

Листочки нитевидные; цвѣтоножки не короткія; цвѣтки желтые; лепестки округлые, со свернутымъ, усѣченнымъ, почти 4-угольнымъ кончикомъ (рис. 563, а) . . . . . 29.


29. Стебель съ сизымъ налетомъ; влагалище верхнихъ и среднихъ листьевъ равно листовому отгибу или длиннѣе его; плодъ продолговато яйцевидный, не сплюснутый (рис. 563, b); ребрышки тупо килеватыя (с); столбецъ 2-раздѣльный; подушечка почти коническая (b) . . . . .

фенхель—\* *Foeniculum* Adans.


Стебель зеленый; влагалище верхнихъ и среднихъ листьевъ короче листового отгиба; плодъ чечевицеобразный (рис. 564—а, b); спинныя ребрышки нитевидныя, острокилеватыя, боковыя—ширококрылыя (b); подушечка плоская (а) . . . . . укропы—\* *Anethum* L.

30 (27). Верхніе листья перисто-раздѣльные, съ узкими линейными или ланцето-линейными долями; остальные листья съ округло-яйцевидными листочками; цвѣтки бѣлые; лепестки обратно-яйцевидные, съ небольшою лопастью; плодъ явственно сплюснутый съ боковъ, вдоль перетянутый, яйце-

видный (рис. 565, а), о 5 нитевидных ребрышках; ложбинки о 3 струйках (b); столбец свободный, 2-расщепленный (а); столбики нитевидные . . . . . бедренцы—*Pimpinella* L.  
Верхняя листья тройчатые; доли их широкия . . . . . 31.




(Рис. 565).




(Рис. 566).

31. Цветоножки очень короткия; нижние листья перистые съ клиновидными листочками, надрезными или зубчатыми; лепестки цѣльные, округлые, съ загнутымъ кончикомъ (рис. 566, а); вѣнчикъ звѣздчато-раскрытый, зеленовато-бѣлый; плодъ явственно сплюснутъ съ боковъ, вдоль перетянутый, округлый, о 5 нитевидныхъ ребрышкахъ (b); ложбинки объ 1 струйкѣ (c); столбецъ цѣльный; пестичная подушечка плоская (b) . . . . . сельдереи—\* *Apium* L.

Цветоножки длинныя . . . . . 32.



(Рис. 567).



(Рис. 568).

32. Листья перисто-сложные; стебель ребристо-желобчатый; цвѣтки желтые, лепестки округлые, съ тупою лопастью, свернутою внутрь (рис. 567, а); дольки плода чечевицеобразныя (b); спинныя ребрышки очень тонкія; боковыя—отодвинуты къ краю, ширококрылыя (c); ложбинки объ 1 струйкѣ; столбецъ 2-раздѣльный . . . . . пастернакъ—*Pastinaca* L.

Листья, п. к. м. нижнія, удвоенно 3-чатые; стебель бороздчатый; цвѣтки бѣлые; лепестки обратно-сердцевидные, съ маленькимъ загнутымъ кончикомъ (рис. 568, а); плодъ сплюснутый съ боковъ, продолговатый, ребристый (b) о 5 нитевидныхъ ребрышкахъ (c); ложбинки безъ струекъ; столбецъ въ видѣ щетины, только на концѣ расщепленный . . . . . сныти—*Aegorodium* L.

**LXIII. Vaccinieae DC.** — брусничные. Мелкіе, вѣтвистые кустарнички съ очередными цѣльными листьями; цвѣтки правильные, полные, 4-ные или 5-ные: чашечка верхняя; зубчатая; вѣнчикъ спайнолепестный о 4, 5 зубцахъ или доляхъ, опадающій; тычинки, въ вдвое большемъ числѣ, сидятъ на краю городковаго надпестичнаго диска; столбикъ 1 съ простымъ рыльцемъ; завязь нижняя, 4, 5-гнѣздная; ягода.



(Рис. 569).



(Рис. 570).

а) Стебель прямой или поднимающійся; вѣнчикъ 4-или 5-зубчатый, кувшинчатый или колокольчатый (рис. 569). . . . брусники—*Vaccinium* L.

б) Стебель ползучій, съ тонкими нитевидными вѣтвями; вѣнчикъ 4-раздѣльный, колесовидный, съ отогнутыми долями (рис. 570). . . . .


клюквы—*Oxycoccus* Tourn.



### III.

## ОПРЕДѢЛИТЕЛЬ ВИДОВЪ.

1. \**Abies* DC.—пихты. Хвойныя деревья, съ иглами на вѣтвяхъ 2-рядными, плоскими, снизу бѣлесоватыми; шишки торчащія; покровныя (прицвѣтныя) чешуйки ихъ обратно-сердцевидно-клиновидныя, вытянутыя въ остріе (рис. 571—а, в), много короче широкихъ обратно-клиновидныхъ съменныхъ чешуекъ, съ зубчатымъ краемъ; въ зрѣлыхъ шишкахъ чешуйки осыпаются со стержня . . . . . сибирская пихта—\* *A. sibirica* Led.



(Рис. 571).

#### 2. *Acer* L.—клены.

а. Деревья; листья большіе, выемчато-лопастные; лопасти ихъ заостренныя, выемки округлыя; цвѣтки желтозеленые, въ щиткахъ, распускаются ранѣ листьевъ; тычинки мужскихъ цвѣтковъ не длиннѣ лепестковъ; завязь голая; плодовые крылья растопыренныя . . . . .

(чинаролистный) кленъ—*A. platanoides* L.

б. Кусты; листья небольшіе, яйцевидные, заостренные, слегка лопастные, неровно зазубренные; цвѣтки въ кистяхъ; тычинки мужскихъ цвѣтковъ вдвое длиннѣ лепестковъ; завязь пушистая; плодовые крылья торчащія, почти параллельныя . . . . . чернокленъ—\* *A. tatàricum* L.

#### 3. *Achilléa* L.—тысячелистники.

1. Листья цѣльные, на краю пильчато-зазубренные, линейно-ланцетные,

заостренные; краевых цветков до 10; язычек их длиною съ полушаровидную обертку . . . . . чихотная трава—*A. Ptarmica* L.

Листья 2-перисто-разсеченные; краевых цветков не болѣе 6 (рис. 572, а); язычек их по крайней мѣрѣ вдвое короче яйцевидной обертки (а) . . . 2.

2. Листья въ очертаніи ланцетные, съ линейными заостренными перисто-надрѣзными долями; оторочка стерженька листа почти цѣльнокрайняя . . . . .

тысячелистникъ—*A. Millefolium* L.



(Рис. 572).

Листья въ очертаніи продолговато-яйцевидные, съ надрѣзано-зубчатыми долями; оторочка стерженька отъ середины къ верхушкѣ листа вся въ зубцахъ . . . . . бѣлоцвѣтъ—*A. nobile* L. 1).


4. *Achyrorhorus* Scop.—пазники. Стебель простой, обѣ 1, рѣже о 2 - 3 крупныхъ корзинкахъ, съ 1 стеблевымъ листомъ; всѣ остальные листья въ корневой розеткѣ, шершавые, какъ и стебель — продолговатые, выемчато-зубчатые, къ основанію суженные, б. ч. съ продолговатыми краснобурными пятнами; цвѣтки въ корзинкахъ ярко-желтые, длиннѣе обертки; паружья чешуйки ея ланцетныя; внутреннія—линейно-ланцетныя, вверху окаймлены желтоватымъ войлокомъ; цвѣтоносы утолщены только у верхушки . . . . .

(крапчатый) пазникъ—*A. maculatus* Scop.


5. *Aconitum* L.—борцы.

1. Листья мелкоразсѣченные на линейныя доли; цвѣтки желтые, пушистые; шлемъ выпуклый, округленный (рис. 573, а); 5 мѣшечковъ . . . . .

волкобойникъ—*A. Anthora* L. 2).



(Рис. 573).



(Рис. 574).

Листья 3-5-7 раздѣльные, съ ромбически-клиновидными, надрѣзными долями и ланцетными зубцами; шлемъ конически-цилиндрическій, сильно вытянутый (рис. 574, а); шпорцы завитые (b); 3 мѣшечка . . . . . 2.

2. Верхушка стебля съ цвѣтоножками покрыта прижатыми волосками (рис. 574) цвѣтки желтые; прицвѣтники б. ч. по срединѣ цвѣтоножки . . . . .

прикрытъ — *A. Lycostictum* L.

Стебель и цвѣтоножки съ оттопыренными волосками; цвѣтки обыкновенно грязнолиловые; прицвѣтники б. ч. у основанія цвѣтоножки . . . . .

(сѣверный) борецъ—*A. septentrionale* Kelle

6. *Acorus* L.—айры. Высокая трава съ толстымъ ароматическимъ корне-

1) Найдень одинъ только разъ занесеннымъ на паровомъ полѣ.

2) По Окѣ въ Серпуховскомъ уездѣ: Лужки, Зиброво.

вищемъ и мечевидными заостренными листьями; крыло много длиннѣ цилиндрически-конического початка желтаго цвѣта . . . . .

(тростяной) аиръ—*A. Calamus* L.

7. *Actaea* L.—воронцы. Листья большіе, длинночерешковые, въ очертаніи 3-угольные, 3-чато 1, 2-перистые, съ яйцевидными листочками, неравно-выемчато-зубчатыми, заостренными; цвѣтки желтоватые, мелкіе, въ короткихъ скученныхъ кистяхъ (б. ч. по 2) на длинныхъ цвѣтоносахъ . . .

(колосистый) воронецъ—*A. spicata* L.

8. *Adoxa* L.—адокса. Небольшая травка съ мясистымъ, чешуйчатымъ корневищемъ объ 1 (2) удвоенно-3-чатою корневою листь на длинномъ черешкѣ; стебель съ 2 супротивными, черешковыми, 3-чатыми листьями; листочки ихъ надрѣзные; 5—7 зеленоватыхъ цвѣтковъ въ маленькой головкѣ . . . . . (мускусная) адокса—*A. Moschatellina* L.

9. *Aegopodium* L.—сныть. Нижніе листья 3-чато 2-сложные; верхніе—3-чато сложные, съ яйцевидными листочками, заостренными, неравнозубчатыми; обвертки и обверточекъ нѣтъ; цвѣтки бѣлые . . . . .

(подагровая) сныть—*A. Podagraria* L.

10. \**Aesculus* L.—желудники. Большіе пальчато-сложные листья о 7 зазубренныхъ листочкахъ, клиновидно-обратно-ланцетныхъ, заостренныхъ; цвѣтки крупныя, лепестки бѣлые съ желтыми и красными пятнами; коробочка о 2—3 крупныхъ сѣменахъ . . . . . конскій каштанъ—

\**A. Hippocastanum* L.


11. *Aethusa* L.—кокорыши. Сорная трава съ листьями темнозелеными, сверху лоснящимися; стеблевые—перисто 2, 3-сложные; листочки съ глубоко-раздѣльными долями и остро-надрѣзными зубцами; обвертки нѣтъ; обверточки одностороннія о 3 отогнутыхъ линейныхъ листочкахъ, длиннѣ зонтичковыхъ . . . . . собачья петрушка—*A. Cynapium* L.

12. *Agrimonia* L.—ремейники.

а. Листочки съ обѣихъ сторонъ волосистые: сверху покрыты прижатыми волосками, снизу сѣроватымъ пушкомъ; наружныя щетинки у отвердѣвшей плодоносной чашечки оттопырены и слегка отогнуты (рис. 575—с, b) . . . . .

поскобный р.—*A. Eupatoria* L.

б. Листочки сверху голые, снизу только вдоль жилокъ рѣдко-волосые, щетинистые; всѣ щетинки на плодоносной чашечкѣ подняты и сближены . . . . .



(Рис. 575).

волосистый р.—*A. pilosa* Led.

13. *Agrostis* L.—полевицы.

1. Корневые листья свернутые, въ видѣ щетинокъ, сѣрозеленые; язычекъ ихъ удлиненный, зубчатый; отцвѣтшая метелка сжатая, съ шероховатыми вѣтвями; только 1 цвѣточная пленка (нижняя)—на верхушкѣ зубчатая, б. ч. ниже средины спинки съ согнутою колѣбною остью, которая длиннѣ самой пленки . . . . . дикая п.—*A. canina* L.

Всѣ листья плоскіе; 2 цвѣточные пленки—верхняя короче нижней (рис. 576) . . . . . 2.

2. Язычекъ короткій, усѣченный; отцвѣтшая метелка развѣсистая; вѣтви ея гладкія; листья снизу тоже гладкіе . . . обыкновенная п.—*A. vulgaris* With.

Язычекъ удлиненный; отцвѣтшая метелка сжатая; вѣтви ея шероховатые такъ же, какъ и узкіе листья . . . . . бѣлая п.—*A. alba* L.

**14. Ajuga L.—живучки.**



**a.** Стебель голый, только на 2 ребрахъ волосистый; стеблевые листья яйцевидные или обратно-яйцевидные на короткомъ черешкѣ; всѣ прицвѣтные листья цѣльные; корневище ползучее, почти постоянно пускающее длинные побѣги; ложный колосъ при основаніи прерывистый . . .

ползучая ж.—*A. reptans* L.

(Рис. 576).


**b.** Стебель шерстистый; стеблевые листья продолговатые, клиновидные, суженные въ черешокъ или сидячіе; средніе прицвѣтные листья 3-лопастные, длиннѣе цветочной мутовки; побѣговъ нѣтъ; ложный колосъ рѣдкій . . . . .

женевская ж.—*A. genevensis* L.<sup>1)</sup>

**15. Alchemilla L.—манжетки.** Корневые листья розеткою на длинныхъ черешкахъ, округло-почковидные, о 7—9 полукруглыхъ лопастяхъ, по всему краю зубчатыхъ; стеблевые листья рѣдкіе, мелкіе, верхніе—сидячіе; стебель и листовые черешки покрыты торчащими волосками . . . . .

(обыкновенная) манжетка—*A. vulgaris* L.

**16. Alisma L.—частухи.** Листья большіе, заостренные, съ толстыми продольными жилками и сѣтью тонкихъ жилокъ; цвѣтоносъ много длиннѣе листьевъ; цвѣтки розоватые, мелкіе, въ пирамидальной мутовчатой метелкѣ; столбикъ почти въ срединѣ внутреннего края завязи; плодники скучены въ сложный плодъ, почти 3-угольный, съ пустымъ промежуткомъ въ срединѣ (рис. 577, c) . . . . . (подорожниковая) частуха—*A. Plantago* L.



(Рис. 577).



(Рис. 578).

**17. Allium L.—чесноки.**

1. Околоцвѣтникъ звѣздчатый; листья дудчатые, въ разрѣзѣ круглые или полукруглые; чашоль зонтика 2-листный, листья его короче зонтика . . 2.

Околоцвѣтникъ колокольчатый (рис. 578, a); листья плоскіе или желобчатые, не дудчатые . . . . . 5.

2. Стебель вздутый, какъ и листья; лепестки много короче тычинокъ : 3.

Стебель не вздутый; листья цилиндрично шиловидные, не вздутые; лепестки длиннѣе или не короче тычинокъ . . . . . 4.

<sup>1)</sup> По Окъ, въ Серпуховскомъ и Коломенскомъ уѣздахъ, и въ прежнее время близъ Верей.

3. Стебель вздутъ ниже середины; цвѣтоножки разъ въ 8 длиннѣ цвѣт-  
ковъ; нити внутреннихъ тычинокъ съ 2 короткими зубцами по бокамъ, много  
длиннѣ расширенной нижней части нитей . . . рѣпчатый лукъ—\* *A. Cépa* L.

Стебель вздутъ въ самой срединѣ; цвѣтоножки въ 3—4 раза длиннѣ  
цвѣтковъ; всѣ тычинки безъ зубцовъ . . . песчаный лукъ—\* *A. fistulosum* L.

4. Чехолъ почти равенъ зонтику; цвѣтоножки короче довольно крупныхъ  
цвѣтковъ; лепестки ланцетные, длиннѣ шиловидныхъ тычинокъ безъ зуб-  
цовъ . . . . . цибуль—\* † *A. Schoenoprasum* L.

Чехолъ короче зонтика; цвѣтоножки длиннѣ цвѣтковъ; лепестки овально-  
ланцетные, равны тычинкамъ или немного длиннѣ ихъ; внутреннія тычинки  
съ короткими зубцами по бокамъ, во много разъ длиннѣ расширенной ниж-  
ней части нитей . . . . . шалотъ—\* *A. ascalonicum* L.

5 (1). Всѣ тычинки простыя, безъ зубцовъ, почти одинаковой длины съ  
лепестками (рис. 578, b); чехолъ остающійся . . . . . 6.

Внутреннія тычинки при основаніи крыловидно расширены, по бокамъ съ  
зубцами; чехолъ опадающій . . . . . 7.

6. Чехолъ 2-листный: одинъ листъ его длинно-заостренный, длиннѣ зон-  
тика; зонтикъ рѣдкій, съ луковками; лепестки тупые (рис. 578—b, a), зе-  
леноватые, съ грязнорозовымъ палетомъ; листья линейные, снизу явственно  
бороздчатые . . . . . огородный чеснокъ—\* *A. oleraceum* L.

Чехолъ 2, 3-раздѣльный: доли его не заостренныя, вдвое короче зонтика;  
зонтикъ частый, пучковатый, безъ луковокъ; лепестки продолговато-ланцет-  
ные, слегка острые; листья сплюснутые, килеватые, съ толстою срединною  
жилкою; цвѣточная стрѣлка вверху съ острыми ребрами; луковица на гори-  
зонтальномъ корневищѣ . . . . . ребристый ч.—\* *A. angulosum* L. <sup>1)</sup>

7. Зубцы внутреннихъ тычинокъ короткіе и тупые, много короче нижней  
расширенной части нити; зонтикъ съ луковками; тычинки нѣсколько короче  
вѣнчика; чехолъ 1-листный, вытянутый въ длинный рожокъ; цвѣтки крас-  
новатые, на длинной ножкѣ . . . . . посѣвный ч.—\* *A. sativum* L.

Зубцы внутреннихъ тычинокъ нитевидные, острые; зонтикъ безъ луковокъ;  
лепестки съ шершавымъ килемъ . . . . . 8.

8. Чехолъ о 2 листахъ, коротко заостренныхъ, короче небольшого зон-  
тика; вѣнчикъ длиннѣ тычинокъ; нити наружныхъ тычинокъ линейныя;  
нить внутреннихъ тычинокъ втрое короче всей тычинки; листья узколиней-  
ные; много побочныхъ луковицъ на длинной ножкѣ . . . . . круглый ч.—  
*A. rotundum* L.

Чехолъ съ длиннымъ рожкомъ, длиннѣ большого зонтика; вѣнчикъ ко-  
роче тычинокъ; нити наружныхъ тычинокъ продолговатыя, постепенно за-  
остренные; у внутреннихъ тычинокъ нить вдвое короче всей тычинки; листья  
широко-линейные; вѣнчикъ розовый; побочныхъ луковицъ нѣтъ . . . . .  
порей—\* *A. Porrum* L.

# 18. *Alnus* L.—ольхи.

a. Боковыя женскія сережки почти сидячія; листья яйцевидно-эллиптическіе,  
б. ч. острые или коротко заостренные, при основаніи б. ч. округленные,  
снизу сизозеленые, коротковолосые, подъ конецъ почти голые, за исключе-  
ніемъ жилокъ . . . . . сѣрая ол.—\* *A. incana* DC.

b. Боковыя женскія сережки на явственныхъ ножкахъ; листья округлые,

<sup>1)</sup> Попадается разсыянно и рѣдко.

б. ч. тупые или на верхушкѣ выемчатые, при основаніи клиновидные, снизу блѣднозеленые, голые, только въ углахъ жилокъ бородастые; молодыя вѣтви и листья липкіе . . . . . липкая ол.—*A. glutinosa* Gaertn.

19. *Alopecurus* L.—батлачики.



(Рис. 579).

1. Чашечныя пленки острыя, сросшіяся до середины или нѣсколько ниже (рис. 579, а), соломина обыкновенно прямая . . . . . 2.

Чашечныя пленки тупыя, сросшіяся только при основаніи; соломина восходящая, колѣчато согнутая, укореняющаяся . . . . . 4.

2. Колосъ рѣдкій, тонкій, сѣуженный къ концамъ, блѣднозеленый; чашечныя пленки сросшіяся до середины, на спинкѣ слегка крылатыя, съ короткими рѣсничками; ость выходитъ выше середины цвѣточной пленки, вдвое длиннѣ колоска; вѣтви колоса несутъ по 1—2 колоску; соломина вверху и влагалища слегка шероховатыя . . . . .

пашенный б.—*A. agréstitis* L. <sup>1)</sup>.

Колосъ плотный, цилиндричный, тупой; чашечныя пленки срослись ниже середины, на  $\frac{1}{3}$  длины ихъ (рис. 579, а), безъ крылатого кля, на спинкѣ мохнато-рѣсничныя (а); вѣтви колоса несутъ по 4—6 колосковъ; соломина и влагалища гладкія . . . . . 3.

3. Чашечныя пленки на верхушкѣ прямо заостренныя (рис. 579—б, а); ость выходитъ у основанія цвѣточной пленки; зрѣлый колосъ сѣроватый или черноватый . . . . . луговой б.—*A. praténsis* L.

Чашечныя пленки къ верхушкѣ расходятся концами; ость выходитъ изъ середины цвѣточной пленки или выше; зрѣлый колосъ черный . . . . .

русскій б.—*A. ruthénicus* Weinm. <sup>2)</sup>.


4. Ость почти вдвое длиннѣ чашечныхъ пленокъ, вверху расходящихся, выходитъ ниже середины острой цвѣточной пленки; пыльники свѣтложелтые, по опыленіи бурые; влагалища зеленые . колѣпчатый б.—*A. geniculátus* L.

Ость едва выдается изъ-за чашечныхъ пленокъ, на верхушкѣ съ прямыми сходящимися концами, выходитъ изъ середины тупой цвѣточной пленки; пыльники оранжевые; влагалища сизыя . . . . . оранжевый б.—*A. fúlvus* Sm.

20. *Alsine* Wahlb. — мокричники. Стебель снизу вѣтвится; листья шиловидные, о 3 жилкахъ; цвѣтоножки нитевидныя, по отцвѣтаніи прямые, много длиннѣ чашечки; чашелистики ланцетные, шиловидно-заостренные, 3-нервные, по краямъ пленчатые, длиннѣ бѣлыхъ лепестковъ, но короче коробочки (рис. 580) . . . . .



(Рис. 580).



(Рис. 581).

узколистный мокричникъ — *A. tenuifolia* Wahlb. <sup>3)</sup>.

21. *Alyssum* L.—бурочки.

а. Цвѣтки средней величины (рис. 581, а), яркожелтые; нити всѣхъ

1) Попадаетъ рѣдко и разсыяно.

2) Показано подъ Серпуховымъ.

3) Найдено въ прежнее время.




тычинокъ крылатыя (b); стручечки съ звѣздчатыми волосками и со столбикомъ почти такой же длины, какъ стручечекъ (c); стебель внизу деревянистый, развѣтвленный, съ короткими не цвѣтущими вѣтвями и съ лежащими или приподнимающимися цвѣтоносными стеблями; нижніе листья продолговато-обратно-яйцевидные, суженные въ черешокъ; стеблевые — ланцетные . . . . . горный б.—*A. montanum* L. 1).

б. Цвѣтки мелкіе, свѣтложелтые, при отцвѣтаніи бѣлѣющие; длинныя тычинковые нити безъ зубцовъ; короткія—съ крыловидными зубцами при основаніи; стручечки голые, со столбикомъ въ 6-ро короче стручечка; стебель простой или маловѣтвистый; листья продолговато-линейные; чашечка опадающая . . . . . мелкій б.—*A. minimum* Willd. 2).

**22. *Amarantus* L.—амарантъ.**

а. Трава свѣтлозеленая; стебель коротко-волосистый; прицвѣтники щетинисто-остистые (рис. 582, а), вдвое длиннѣе околоцвѣтника, съ листочками



(Рис. 582).



(Рис. 583).

колюче-острыми (b); цвѣтокъ б. ч. 5-ой (b); плодъ яйцевидный, поперекъ растрескивающийся, 1-сѣмennyй . . . подсекольникъ—*A. retroflexus* L.

б. Трава темнозеленая; стебель голый; прицвѣтники 3-угольно-ланцетные, безъ остей (рис. 583, б), короче околоцвѣтника, съ листочками ланцетными, тупыми или слегка заостренными (а, б); цвѣтокъ б. ч. 3-ый (а); плодъ не растрескивающийся, въ 1½ раза длиннѣе ширины (б). . . . .

щирца—*A. Blitum* L.

**23. \* *Amelanchier* Med.**—ирга. Листья черешковые, овальные, съ обоихъ концовъ закругленные или спереди усѣченные, городчато-пильчатые, молодые снизу пушистые, потомъ голые; лепестки бѣлые; ложныя ягоды темно-синія; кустъ . . . . . обыкновенная ирга—\* *A. vulgaris* Misch.

**24. \* *Ampelopsis* Michx.**—лозы. Цѣпкій кустарникъ, съ усиками, супротивными листьямъ; листья черешковые, 3—5 пальчатые, листочки черешковые, продолговатые, заостренные, зазубренные крупными колючими зубцами, голые, лоснящіеся, сверху темнозеленые, снизу блѣднѣе; цвѣтки зеленые въ вильчатыхъ полузонтикахъ, супротивныхъ листьямъ. . . . .

дикій виноградъ—\* *A. quinquefolia* R. & Sch.

**25. \* *Amygdalus* L.**—миндали. Кустъ съ цвѣтками, сидячими попарно, рѣдко по 1; листья ланцетные, пильчато-зубчатые, суженные въ листовую

1) По Окѣ, въ Серпуховскомъ уѣздѣ—Лужки.

2) По Окѣ, въ одномъ только мѣстѣ—Бѣлые Колодези, Коломенскаго уѣзда; цвѣтетъ въ началѣ мая.

черешокъ, который б. ч. короче ширины листа; плодъ округлый, покрытый войлокомъ; косточка почти гладкая, безъ ямокъ . . . . .

бобовникъ—\* *A. nana* L.

**26. Anchusa L.**—румянки. Стебель и листья жесткошершавые; листья ланцетные, цѣльнокрайніе, нижніе—сужены въ черешокъ, верхніе—сидячіе; прицвѣтники яйцевидно-ланцетные; чашечка колокольчатая, съ ланцетными острыми долями, расширяющаяся (рис. 584—b, c); лиловый вѣнчикъ становится голубымъ, съ бѣлыми бархатистыми чешуйками въ зѣвѣ (a); по отцвѣтаніи цвѣтоножки отгибаются. . . цѣлебная р.—*A. officinalis* L.<sup>1)</sup>

**27. Andromeda L.**—андромеда. Цвѣтки на длинныхъ поникшихъ цвѣтоножкахъ рѣдкимъ зонтикомъ на концѣ вѣтвей; цвѣтоножки и чашечка розовыя; вѣнчикъ розоватый; листья съ сильно свернутымъ краемъ, голые, сверху зеленые, лоснящіеся, снизу бѣловатые . . . подбѣлъ—*A. Polifolia* L.



(Рис. 584).



(Рис. 585).

**28. Androsace L.**—проломники.

1. Чашечка округлая; отцвѣтшій вѣнчикъ остается въ цвѣткѣ и становится сухоопленчатымъ; коробочка съ тонкими просвѣчивающими створками и толстымъ сѣменосомъ вскрывается 5 короткими отогнутыми зубцами; мелкихъ сѣмянъ много (свыше 100); верхушка травки покрыта въ молодости железистыми волосками, впоследствии голая . . . . . нитевидный п.—

*A. filiformis* Retz.

Чашечка 5-гранная (рис. 585—a, b); вѣнчикъ увядаетъ и опадаетъ (b); коробочка съ толстыми створками и узкимъ сѣменосомъ вскрывается почти до середины большими прямыми зубцами; крупныхъ сѣмянъ мало (до 20); вся травка покрыта вильчатыми или повторно-вильчатыми волосками . . . 2.

2. Волоски повторно-вильчатые; листочки обертки маленькіе, много меньше корневыхъ листьевъ; цвѣтоножки короче стрѣлки; вѣнчикъ длиннѣе чашечки (рис. 585, a), зубцы которой короче трубки (b) . . . . . сѣверный п.—

*A. septentrionalis* L.

Волоски просто-вильчатые; листочки обертки большіе, почти равные корневымъ листьямъ; цвѣтоножки длиннѣе или не короче стрѣлки; вѣнчикъ короче чашечки, зубцы которой равны трубкѣ . . . . . вытянутый п.—*A. elongata* L.

**29. Anemone L.**—вѣтреницы.

1. Корневые листья 5-раздѣльные, съ ромбическими надрѣзными долями, схожіе съ стеблевыми; стебель и снизу цвѣтокъ пушистые; плодники по-

<sup>1)</sup> Приводится въ список Линдемана.

крыты бѣлымъ войлокомъ; цвѣтки крупныя, бѣлыя съ лиловымъ оттѣнкомъ . . . . . лѣсная в.—*A. silvéstris* L. <sup>1)</sup>

Корневыхъ листьевъ нѣтъ; стебель голый; плодники слегка пушистыя; корневище горизонтальное, ползучее . . . . . 2.

2. Листья обертки на длинныхъ черешкахъ, въ половину отгиба листа; цвѣтокъ снизу голый, бѣлый съ розовымъ оттѣнкомъ . . . . . дубровная в.—*A. nemorôsa* L. <sup>2)</sup>.

Листья обертки на очень короткихъ черешкахъ; цвѣтокъ снизу слегка волосистый, желтый . . . . . лютиковая в.—*A. ranunculoides* L.

30. \**Anethum* L.—укропы. —Стебель вѣтвистый; листья 2, 3-перистые, съ многораздѣльными листочками и линейными долями; цвѣтки желтые. . . . . (воюнчій) укропъ—\**A. graveolens* L.

31. *Angèlica* L.—дудники. Стебель вверху нѣсколько ребристый, вѣтвистый; нижнiе листья перисто 2, 3-сложные; большiе овальные листочки ихъ съ пиловидными зазубринами ровными; лепестки бѣлые . . . . . (лѣсной) дудникъ—*A. silvéstris* L.

32. *Antennària* Gaertn.—кошачья лапка. Стебель съ ползучими, укореняющимися побѣгами; корневые листья лопатчатые, черешковые, тупые, образуютъ розетку: верхнiе линейно-ланцетные, острые, —всѣ сверху голые и съ бѣлымъ войлокомъ снизу . . . . . (двудомная) кошачья лапка—*A. dioica* Gaertn.

33. *Anthémis* L.—пушавки.

1. Ложь корзинки полушаровидное; лучевые цвѣтки желтые, женскiе; пленки на ложѣ узко-ромбическiя, суженныя въ колючку (рис. 586, а); сѣмянки сплюснутыя, узкокрылыя съ коронкою на верхушкѣ (б); листья пушистыя, доли ихъ гребенчато-надрѣзные, рѣдко-зубчатые. . . . . красильная п.—*A. tinctoria* L.

Ложь корзинки продолговато-коническое; лучевые цвѣтки бѣлые . . . . . 2.

2. Листья пушистыя, доли ихъ ланцетныя, цѣльнокрайнiя или о 2—3 зубцахъ; лучевые цвѣтки женскiе; чешуйки обертки подъ конецъ съ отогнутою верхушкою; пленки ложа ланцетныя, острыя; сѣмянки тупо 4-гранныя . . . . . полевая п.—*A. arvensis* L. <sup>3)</sup>

Листья почти голые, съ линейными, цѣльными или 2, 3-надрѣзными долями; лучевые цвѣтки безполые; чешуйки обертки всегда съ прямою верхушкою; пленки ложа линейно-щетиныстыя; сѣмянки почти цилиндрическiя, бородавчатыя . . . . . вонючая п.—*A. Còtula* L. <sup>4)</sup>

34. *Anthoxànthum* L.—желтостебельники. Колосовидная метелка продолговатая, книзу суженная, буровато-желтая, съ ароматическимъ запахомъ сухаго сѣна; обѣ наружныя пленки заостренныя, голыя (рис. 587, а), только вдоль жплокъ коротко-рѣсничныя; обѣ среднiя пленки, несущiя ость, волосистыя (а), немного длиннѣе нижней цвѣточной пленки, округленной и



(Рис. 586).

1) Преимущественно въ южныхъ уѣздахъ.  
2) Въ Можайскомъ уѣздѣ — Ильинское и Порѣчье, и подъ Москвою — въ Михалковѣ.  
3) Найдено вновь близъ Угрѣшскаго монастыря; отъ прежняго времени хранится въ гербарiи Гофмана.  
4) Въ южныхъ уѣздахъ, начиная съ Подольскаго.

охватывающей узкую верхнюю цветочную пленку (b). . . . .  
пахучий колосок—*A. odoratum* L.


**35. Anthriscus Hoffm.**—куныри.

a. Стебель весь голый или только внизу волосистый; листочки продолговато-ланцетные; обвертки 5-листные, съ ланцетными рёсничными листочками; плоды продолговатые, лоснящиеся; покрытый бороздками носикъ составляет не свыше  $\frac{1}{3}$  длины плода (рис. 588, a). . . . .

лѣсной к.—*A. silvestris* Hoffm.



(Рис. 587).



(Рис. 588).

b. Стебель покрытъ пушкомъ только надъ узлами; листочки широко-яйцевидные; обвертки 2,3-листные, одностороння; плодъ линейный, гладкій; покрытый бороздками носикъ составляет почти половину длины плода. .

кербель—\**A. Cerefolium* Hoffm.

**36. Anthyllis L.**—язвенники. Трава, покрытая частыми и мягкими волосками; нижние листья продолговатые, цѣльнокрайние, острые, снизу покрыты войлокомъ, часто съ парю боковыхъ листочковъ на листовомъ черешкѣ; листочки верхнихъ листьевъ линейно-продолговатые; чашечка, съ косымъ устьемъ и короткими зубцами (рис. 589), покрыта бѣлымъ войлокомъ; отгибъ у флага вдвое короче ноготка. . . . . язвенникъ—*A. Vulneraria* L.



(Рис. 589).

**37. Apëra Adans.**—метлицы. Колоски съ зачаткомъ 2 цвѣтка, выступающимъ въ видѣ короткаго отростка изъ колоска (рис. 590, a); чашеч-



(Рис. 590).

ная пленка о 5 жилкахъ, рёснично-шершавая вдоль жилокъ, подъ верхушкою съ остью, которая раза въ 3 длиннѣе пленки (b, a); метелка очень развѣсистая, съ шероховатыми цвѣтоносами; по отцвѣтаніи боковыя развѣтвленія ея сжаты; язычекъ листьевъ продолговатый . . . . . метла—*A. Spica venti* P. B.

**38. \*Apium L.**—сельдерей. Стебель голый, очень вѣтвистый; листочки сверху лоснящиеся, клиновидные, къ верхушкѣ надрѣзано-зубчатые; зонтики на очень короткихъ ножкахъ, цвѣтки почти сидячіе, бѣловатые, мелкіе. . . (вонючій) сельдерей—\**A. graveolens* L.

**39. †Aquilegia L.**—водосборы. Цвѣтки одиночные на длинныхъ ножкахъ: синіе, лиловые, розовые, рѣдко бѣлые; лепестки тупые, къ верхушкѣ слегка выемчатые (рис. 591), шпорецъ ихъ, на концѣ согнутый крючкомъ, длиннѣе отгиба, который немного короче тычинокъ; внутреннія тычинки, не несущія пыльниковъ, тупыя; чашелистики продолговато-


яйцевидные, острые (рис. 591); корневые листья 3-чато 2-сложные, съ округлыми, лопастными листочками, лопасти ихъ городковыя; средніе листья 3-чато-сложные, съ 3-чато-раздѣльными листочками; верхніе 3-раздѣльные обыкновенный водосборъ—*A. vulgaris* L.

**40. Arabis L.**—рѣзухи.

а. Стебель покрытъ оттопыренными волосками; стеблевые листья сидячіе, продолговато-яйцевидные; стручки прижаты къ цвѣтоносу; сѣмена на верхушкѣ съ узкимъ ободкомъ. . . . шершавая р.—*A. hirsuta* Scop. <sup>1)</sup>.

б. Стебель съ жесткими волосками; стеблевые листья стеблеобъемлющіе, продолговато-ланцетные; стручки на отклоненныхъ ножкахъ, повислые; сѣмена съ широкимъ ободкомъ. . . . повислая р.—*A. pendula* L. <sup>2)</sup>.

**41. Archangélica Hoffm.**—дятели. Стебель толстый, высокій, бороздчатый, вверху вѣтвистый; нижніе листья перисто 2, 3-сложные; яйцевидные листочки ихъ заостренные, пилородно зазубренные, съ зазубринами острыми, неравными, снизу сѣро-зеленые, конечные 3-лопастные; цвѣтки зеленовато-бѣлые. . . . цѣлебный д.—*A. officinalis* Hoffm.



(Рис. 591)



(Рис. 592).

**42. Arctostaphylos Adans.**—толокнянки. Стелющийся вѣтвистый кустарничекъ, съ зимующими листьями, снизу блѣдно-зелеными, цѣльнокрайними, тупыми, продолговато-обратно-яйцевидными, съ обѣихъ сторонъ съ вдавленными сѣтчатыми жилками (рис. 592, с); цвѣтки бѣлые, на верхушкѣ розовые, на короткихъ ножкахъ, въ малоцвѣтныхъ верхушечныхъ кистяхъ; пыльники на верхушкѣ съ 2 рожками, длиною съ тычинковую нить (b); ягода красная. . . . медвѣжья ягода—*A. uva ursi* Spr. <sup>3)</sup>.

**43. Arenaria L.**—песчанки.

а. Стебель вильчато-вѣтвистый; листья яйцевидные; заостренные, сидячіе; нижніе сужены въ черешокъ; цвѣтки въ рѣдкомъ полузонтикѣ; чашелистики яйцевидно-ланцетные, заостренные, о 3 жилкахъ (рис. 593), въ  $1\frac{1}{2}$  раза длиннѣе овальныхъ лепестковъ; коробочка не длиннѣе чашечки; сѣмена точечныя. . . . тимьянолистная п.—*A. serpyllifolia* L. (Рис. 593).



б. Стебель внизу приподнимающийся, съ нецвѣтущими вѣтвями; стеблевые листья линейно-шиловидные, по краямъ остро-шероватые, при осно-

<sup>1)</sup> Подъ Москвою—Воробьевы горы, Хорошово.

<sup>2)</sup> Кунцово, Софолово—подъ Москвою.

<sup>3)</sup> Подъ Москвою—Кузьминки, Угрѣши.

ваніи влагалищно-расширенные, не длиннѣе междоузліи; цвѣтки въ вѣтви-  
стомъ полузонтикѣ; чашелистики яйцевидно-округлые, тупые, по срединѣ  
зеленые, вдвое короче обратно-яйцевидныхъ лепестковъ; коробочка много  
длиннѣе чашечки. . . . . злаколистная п.—*A. graminifolia* Schrad. <sup>1)</sup>.

44. *Aristolochia* L. — кирказоны. Листья 2-рядные, округлые, слабо-  
выемчатые; цвѣтки свѣтло-желтые, довольно крупныя, въ малоцвѣтныхъ  
пучкахъ, которые много короче листьевъ; при основаніи цвѣточной почки  
маленькій прицвѣтникъ; плодъ шаровидный или почти грушевидный . . .  
(омоносный) кирказонъ—*A. Clematitis* L. <sup>2)</sup>.

45. *Arrhenatherum* P. B. — шибечники. Метелка всесторонняя, удли-  
ненная, узкая, прямая; чашечныя пленки продолговато-ланцетныя (рис.  
594, б), на килѣ рѣснично-шершавыя: нижняя обѣ 1 жилкѣ,  
уже и почти вдвое короче верхней о 3 жилкахъ; нижняя  
цвѣточная пленка о 7 шершавыхъ жилкахъ, на верхушкѣ  
коротко 2-зубчатая; ость вдвое длиннѣе пленки (а). . . . .

французскій рейграссъ—*A. elatius* M. & K. <sup>3)</sup>.

46. *Artemisia* L. — полыни.

1. Всѣ листья цѣльные и цѣльнокрайніе, линейно-ланцет-  
ные, острые, голые, зеленые, сильно пахучіе; корзиночки  
шаровидныя, очень мелкія, поникшія, черешчатыя, голыя; че-  
шуйки ихъ продолговатыя, широко-пленчатыя . . . . .



(Рис. 594).

эстрагонъ—*A. Dracunculus* L.

Листья перисто-раздѣльные или разсѣченные, только самыя верхніе, при-  
цвѣтныя, — цѣльные . . . . . 2.

2. Листовыя доли ланцетныя или продолговатыя . . . . . 3.

Доли перисто 2, 3-разрѣзныхъ листьевъ узколинейныя, почти нитевид-  
ныя; ложе голое . . . . . 4.

3. Всѣ листья перисто-раздѣльные; доли ихъ ланцетныя, перисто-над-  
рѣзные, разсѣченныя, сверху темно-зеленыя, снизу съ бѣлымъ войлокомъ;  
листовыя черешки съ многодольными ушками при основаніи;  
корзиночки продолговато-яйцевидныя (рис. 595), бѣловато-  
войлочные, почти сидячія; наружныя чешуйки ихъ ланцетныя,  
острыя; внутреннія продолговатыя, тупыя, съ широко-плен-  
чатымъ ободкомъ; ложе голое . . . . .



(Рис. 595).

чернобыльникъ—*A. vulgaris* L.

Только верхніе листья перисто-разсѣченные, остальные 2,  
3-перисто-разсѣченные, съ продолговатыми долями, шелкови-  
сто-бѣловатыми; листовыя черешки безъ ушковъ; корзиночки  
почти шаровидныя, бѣловатыя, повислыя; наружныя чешуйки  
ихъ линейныя, съ пленчатою верхушкою; внутреннія тупыя,  
по краямъ пленчатые; ложе волосистое . . . . .

(горькая) полынь—*A. Absinthium* L.

4. Листовыя черешки безъ ушковъ; листовыя доли снизу съ бѣлова-  
тымъ пушкомъ; корзиночки почти шаровидныя, повислыя, пушистыя; че-  
шуйки ихъ вверху пленчатые и рѣсничныя; наружныя ланцетныя, вну-

1) Найдено только одинъ разъ подъ Серпуховскимъ Владычнымъ монастыремъ.

2) По Москвѣ рѣкѣ и Окѣ—въ Коломенскомъ и Серпуховскомъ уѣздахъ.

3) Изрѣдка и разсѣяно по окрестностямъ Москвы.




тренія обратно-яйцевидныя; трава сильно пахучая. . . . . божье - дерево—*A. procera* Willd. 1).

Листовыя черешки съ ушками; корзиночки овальныя или округло-овальныя; травы не пахучія . . . . . 5.

5. Корзиночки овальныя, почти сидячія; цвѣтоносныя стебли восходящія, мало-вѣтвистыя; вѣтви прямыя, безплодныя вѣтви лежація . . . . . полевая п.—*A. campèstris* L.

Корзиночки шаровидно-овальныя, на явственныхъ ножкахъ, голыя, поникшія; всѣ стебли прямыя, много-вѣтвистыя, съ развѣсистыми вѣтвями . . . . . метельчатая п.—*A. scopària* Wald. & Kit. 2).

47. *Asarum* L.—копытени. Стебель и черешки мохнатыя; цвѣтки оди-  
ночныя, черешковые, поникшіе, много короче листьевъ; околоцвѣтникъ сна-  
ружи буроватый, внутри грязно-темно-красный;  
доли его коротко сжаты въ согнутый кончикъ  
(рис. 596, а); связникъ у тычинокъ вытянутъ  
въ шиловидное остріе (b), выдающееся надъ пыль-  
никовыми гнѣздами, которыя вскрываются нару-  
жу; пахнетъ перцемъ . . . . .




(Рис. 596).

(европейскій копытень)—*A. europaeum* L.

48. *Asparagus* L.—спаржи. Трубка около-  
цвѣтника въ половицу длины отгиба (рис. 597—  
а, b); тычинковыя нити въ мужскихъ цвѣткахъ длиною съ пыльникъ; цвѣтки  
довольно мелкіе, подъ конецъ повислые (а); ягода красная . . . . .

(цѣлебная) спаржа—*A. officinalis* L. 3).

49. *Asperugo* L.—острицы. Стебель ребристый, ломкій, съ отогнутыми  
щетинками; листья продолговато-эллиптическіе, коротко-заостренныя, гнѣз-



(Рис. 597).



(Рис. 598).

ные; нижніе очередныя, черешковые; верхніе по 2 — 4 сближенныя; ча-  
шечка съ сѣтчатыми жилками, рѣсничная (рис. 598); цвѣтки на корот-  
кихъ ножкахъ, по отцвѣтаніи отогнутыя . . . . .

(лежачая) острица—*A. procumbens* L.

50. *Asperula* L.—ясменники.

1. Листья ланцетныя, вдоль средней жилки и по краямъ щетинистыя;  
всѣ или только верхнія мутовки 8-листные; плоды не гладкіе . . . . . 2.

Листья линейныя, гладкіе или только по краямъ шероховатыя; плоды глад-  
кіе, голые (рис. 599, b) . . . . . 3.

1) и 2) По Окѣ въ Серпуховскомъ и Коломенскомъ уѣздахъ; первое часто раз-  
водится и дичаетъ.

3) Дико по заливнымъ лугамъ Оки, подъ Серпуховымъ, и по Москвѣ рѣкѣ, подъ  
Симоновымъ.

2. Стебель гибкий, длинный, ветвистый; ребра его, средняя жилка и края листьев съ отогнутыми щетинками; цвѣтки на короткихъ ножкахъ въ метельчатыхъ полузонтикахъ; вѣнчикъ колокольчатый, съ короткою трубкою; плоды бугорчатые. . . . . цѣпкій я. — *A. Aparine* Schott.



(Рис. 599).

Стебель прямой, простой, не высокий, гладкий; нижнія мутовки о 6 листьяхъ, лопатчатыхъ; верхнія о 8; цвѣтки на длинныхъ ножкахъ въ щитковидномъ полузонтикѣ; вѣнчикъ ворончатый, съ трубкою нѣсколько длиннѣе отгиба; плоды съ крючковатыми щетинками; пахнетъ сѣномъ. . . душистый я. — *A. odorata* L. 1).

3. Листья зеленые, съ слегка согнутымъ краемъ, неравные: верхніе по 4 въ мутовкѣ, нижніе по 6; цвѣтки въ щитковидномъ полузонтикѣ; вѣнчикъ ворончатый, съ трубкою, равною отгибу (рис. 599, а); корневище ползучее, желтое, стебель 4-гранный.

красильный я. — *A. tinctoria* L. 2).

Листья сѣрозеленые, плотные, съ сильно свернутымъ краемъ, по 8 въ мутовкѣ; полузонтикъ метельчатый; вѣнчикъ колокольчатый съ короткою трубкою; стебель округлый. . . . .

подмаренниковый я. — *A. galioides* M. B. 3).

#### 51. *Aspidium* Sw. — щитники.

1. Нижніе листочки перистыхъ листьевъ на замѣтныхъ черешкахъ; зубчатая доля ихъ съ шиловидными зубцами. . . . . 2.

Всѣ листочки перистыхъ листьевъ сидячіе или почти сидячіе; дольки ихъ цѣльные или съ простыми зубцами. . . . . 3.

2. Листья перисто 2, 3-сложные, удлинено-заостренные; листочки заостренные, нижніе яйцевидно-ланцетные, о 10—15 вторичныхъ листочкахъ. . . . . шиловатый щ. — *A. spinulosum* Sw.

Листья просто-перисто-сложные, узко-продолговатые, коротко-заостренные; нижніе листочки отодвинуты, съ широко-сердцевиднымъ основаніемъ, коротко-треугольные, съ тупою верхушкою и съ каждой стороны о 5, 7 перисто-раздѣльных, очень сближенныхъ долькахъ; спороносные листочки повернуты горизонтально и обращены нижнею стороною вверхъ. . . . . гребенчатый щ. —

*A. cristatum* Sw.

3. Листья пучками; черешекъ ихъ короткий, весь покрытъ длинными и узкими линейно-ланцетными пленчатыми чешуйками; доли листочковъ тупыя, къ верхушкѣ почти не суженныя, зубчатая (рис. 600, а); споровыя кучки большія, не сливающіяся, сближены къ срединной жилкѣ; покрывало остающееся, гладкое, только на передней вѣтви вильчатой боковой жилки по споровой кучкѣ



(Рис. 600).

мужской папоротникъ — *A. Filix mas* Sw.

Листья одиночные; черешокъ ихъ очень длинный, голый, безъ чешуекъ;

1) Кунцево, Воробьевы горы — цвѣтетъ въ маѣ.

2) Дужки, Серпуховскаго уѣзда, близъ берега Оки.

3) Найдено было одинъ только разъ.

доли листочковъ нѣсколько заостренныя, цѣлюкрайнія; споросныя дольки съ свернутыми краями треугольной или серповидной формы; споровыя кучки мелкія, сливающіяся въ срединѣ между среднею жилкою и краемъ; покрывало скоро опадающее, по краямъ зубчатое, железистое; на обѣихъ вѣтвяхъ вильчатой нижней боковой жилки по споровой кучкѣ . . . . .

женскій папоротникъ—*A. Thelypteris* Sw.

**52. Aster L.**—астры. Стебель и листья покрыты шершавымъ пушкомъ; нижніе листья черешковые, лопатчатые; верхніе продолговато-ланцетные, сидячіе; корзинки цвѣткомъ, довольно крупныя; листочки обертки оттопыренные, рѣсничные, округленные; наружныя лопатчатые, зеленые; внутренніе продолговато-ланцетные, на верхушкѣ окрашенные, выступаютъ изъ-за наружныхъ; волоски хохолка б. м. жесткіе; сѣмянки волосистыя . . . . .

(дикая) астра—*A. Amellus* L. <sup>1)</sup>

**53. Astragalus L.**—астрagalъ.

1. Листья и плоды голые; всѣ или только верхніе прилистники свободныя; листья обѣ 11-13 большихъ эллиптическихъ листочкахъ; цвѣтки желтоватыя; бобы линейныя, тупо-3-гранныя, согнутыя . . . . .

солодководлистный а.—*A. glycyphylus* L.

Листья и плоды волосистыя; всѣ или только верхніе прилистники спаяныя, супротиволостныя . . . . . 2.

2. Листья о 7-9 линейныхъ листочкахъ; цвѣточныя кисти рѣдкія, о немногихъ (4—8) цвѣткахъ; цвѣтоножки длиннѣе прицвѣтничковъ; цвѣтки красновато-лиловыя; бобы продолговатыя, на ножкахъ, длиною съ чашечную трубку, съ прижатými сѣрыми волосками, какъ и на листьяхъ . . . . .

песчаный а.—*A. arenarius* L.

Листья о 17-25 продолговатыхъ листочкахъ, цвѣточныя кисти частыя; цвѣтоножки короче прицвѣтничковъ и бобы почти сидячіе, съ черными торчащими волосками, какъ и на чашечкѣ . . . . . 3.

3. Прицвѣтники вдвое короче чашечной трубки; цвѣтки сине-лиловыя; бобы округло-овальные, прямые . . . . . подъязычный а.—*A. hypoglottis* L. <sup>2)</sup>

Прицвѣтники не короче чашечной трубки; цвѣтки желтоватыя; бобы почти шаровидныя, вздутыя . . . . . хлопунецъ—*A. Cicer* L. <sup>3)</sup>

**54. Athyrium Rth.**—кочедыжникъ. Листья небольшими пучками, пѣжные и тонкіе, свѣтлозеленыя, на короткихъ черешкахъ, съ рѣдкими пленчатыми чешуйками, продолговато-заостренныя, къ обоимъ концамъ суженныя; дольки листьевъ продолговатыя, тупыя, зубчатыя; кучки б. ч. возлѣ срединной жилки листочковъ; покрывало бахромчатое (рис. 601) . . . . . (женскій) кочедыжникъ—*A. Filix femina* Rth.



(Рис. 601).

**55. Atriplex L.**—лебеды.

1. Прицвѣтники женскихъ цвѣтковъ яйцевидные или округло-яйцевидные, съ сѣтчатыми жилками; цвѣтки многобрачныя и обоюполыя, съ 3, 5-надрѣзнымъ околоцвѣтничкомъ . . . . . 2.

Прицвѣтники женскихъ цвѣтковъ коньевидно-ромбическіе или треугольные, безъ сѣтчатыхъ жилокъ (рис. 602, б); цвѣтки однодомныя (а) . . . 3.

<sup>1)</sup> По Окѣ, въ Коломенскомъ и Серпуховскомъ уѣздахъ.

<sup>2)</sup> По Окѣ—подъ Серпуховымъ и ниже: между Лужками, Забровымъ и Никитиновымъ.

<sup>3)</sup> По Окѣ—Лужки, Серпух. у., и Карачеево; въ Коломенскомъ уѣздѣ.

2. Взрослые листья сверху лоснящиеся, зеленые, снизу съ сѣрымъ или бѣлымъ палетомъ; верхніе листья вытянуто-треугольные, внизу выемчато-зубчатые, вверху длинно-заостренные, цѣлюкрайніе; прицвѣтники яйцевидные, острые . . . . . лоснящаяся л.—*A. nitens* Rebert. <sup>1)</sup>.

Взрослые листья съ обѣихъ сторонъ одноцвѣтные, тусклые; верхніе листья продолговато-треугольные, при основаніи копьевидные, цѣлюкрайніе; прицвѣтники округло-яйцевидные, коротко заостренные . . . . .

садовая л.—† *A. hortense* L.

3. Листья при основаніи копьевидные, ланцетные; цѣлюкрайніе; самые верхніе линейные; прицвѣтники копьевидно-ромбическіе (рис. 602, b) . . .

раскидистая л.—*A. patulum* L.

Листья широко-треугольно-копьевидные, зубчатые; самые верхніе ланцетные, цѣльные; прицвѣтники треугольные, при основаніи усѣченные, округлые или слегка суженные . . . . . копелистная л.—*A. hastatum* L. <sup>2)</sup>.

56. *Atröpis* Rupr.—безкильники. Густодернистая, сизая трава, съ тонкимъ гладкимъ стеблемъ; язычекъ короткій, тупой; листья плоскіе узкіе; метелка рѣдкая, раскидистая, съ шероховатыми вѣтвями, по отцвѣтаніи отогнутыми; колоски продолговатые, мелкіе о 4—6 цвѣткахъ; чашечныя пленки неравныя, тупыя, почти сплошная перепончатая; нижняя почти втрое короче ближайшей цвѣточной пленки, продолговато-яйцевидной . . . . .

(раздвинутый) безкильникъ—*A. distans* Griseb. <sup>3)</sup>.



(Рис. 602).



(Рис. 603).

## 57. *Avena* L.—овсы.

1. Колоски, по крайней мѣрѣ отцвѣтшіе, поникшіе, большіе, ланцетные, о 2—3 цвѣткахъ; чашечныя пленки длиннѣе цвѣткѣвъ и закрываютъ ихъ, о 9—11 жилкахъ . . . . . 2.

Колоски торчащіе, б. ч. о 3—5 цвѣткахъ; чашечныя пленки короче цвѣткѣвъ обѣ 1—3 жилкахъ; весь стержень колоска покрытъ б. м. длинными волосками; всѣ цвѣтки съ остями длинными, колѣнчато-изогнутыми (рис. 603) . . . . . 4.

2. Метелка сжатая, однобокая, съ короткими цвѣтоносами; ость при основаніи не скрученная, почти прямая. . венгерскій ов.—\* *A. orientalis* Schreb.

Метелка развѣсистая, съ длинными цвѣтоносами во всѣ стороны; ость внизу скрученная . . . . . 3.

<sup>1)</sup> По берегамъ Москвы рѣки—Симоновъ, Коломенское, Мячково, и по Окѣ—Серпуховъ.

<sup>2)</sup> По берегу Яузы, у Военнаго Госпиталѣ.

<sup>3)</sup> Очень рѣдко. Указывалось въ прежнее время на Воробьевыхъ горахъ и во рвѣ Китайской стѣны; позднѣе вновь найдено одинъ разъ.

3. Нижняя цвѣточная пленка голая; стержень колоска только подъ нижнимъ цвѣткомъ съ короткими волосками и только нижній цвѣтокъ съ остью; колоски о 2 цвѣткахъ; цвѣтки не отчлениются отъ стержня колоска: . . .

посѣвный ов.—\* *A. sativa* L.

Нижняя цвѣточная пленка, какъ и стержень колоска, покрыта буроватыми жесткими волосками; колоски б. ч. о 3 цвѣткахъ, всѣ съ колѣчатными остями; цвѣтки отчлениются отъ стержня колоска: . . .

дикій ов.—† *A. fatua* L.

4. Колоски о 4-5 цвѣткахъ, попеременно то сидячіе, то на короткихъ ножкахъ, по 1-2 на вѣтвяхъ метелки; обѣ чашечныя пленки о 3 жилкахъ; влагалища, особенно нижнія, съ направленными внизъ волосками; листья въ почкосложеніи складчатые, сверху и по краямъ остро-шероховатые; язычекъ длинный, ланцетный: . . . луговой ов.—*A. pratensis* L. 1)

Колоски о 2-3 цвѣткахъ (рис. 603); нижняя чашечная пленка обѣ 1 жилкѣ, короче верхней о 3 жилкахъ; нижніе листья съ обѣихъ сторонъ и влагалища пушистые: . . . 5.

5. Вѣтви метелки несутъ до 3 колосковъ; колоски большіе (рис. 603); завязь волосистая; волоски на стержнѣ колоска вдвое короче втораго цвѣтка; нижняя цвѣточная пленка 2-надрѣзная на верхушкѣ; язычекъ длинный, острый; листья въ почкосложеніи складчатые: . . .

заячій ов.—*A. pubescens* L.

Вѣтви метелки съ 5-8 колосками; колоски небольшіе; завязь голая; волоски на стержнѣ колоска много короче цвѣтка; нижняя цвѣточная пленка на верхушкѣ расщеплена на 2 короткія тонкія щетинки; язычекъ короткій, усѣченный; листья въ почкосложеніи свернутые: . . .

желтоватый ов.—*A. flavescens* L.

58. *Ballota* L.—бѣлокудренники. Листья коротко-черешковые, яйцевидные, острые или нижніе притупленные, пильчато-городковые, при основаніи округленные или притупленные; вѣтчикъ грязно-розовый, рѣдко бѣлый: . . . (черный) бѣлокудренникъ—*B. nigra* L. 2).

59. *Barbarea* R. Br.—сурѣшницы.

а. Нижніе лировидные листья о 3-4 парахъ боковыхъ лопастей, изъ коихъ верхняя пара не уже крайней округло-овальной лопасти; верхніе листья обратно-яйцевидные, зубчатые; лепестки продолговато-овальные, почти вдвое длиннѣе чашелистиковъ; молодые стручки на оттопыренныхъ ножкахъ; цвѣтки ярко-желтые: . . . обыкновенная с.—*B. vulgaris* R. Br.

б. Нижніе лировидные листья о 2-3 парахъ очень маленькихъ боковыхъ лопастей, которыя много уже верхней продолговато-яйцевидной лопасти; верхніе листья продолговато-обратно-яйцевидные, выемчато-зубчатые; лепестки удлинено-клиновидные, немного длиннѣе чашелистиковъ; стручки торчащіе. прижатые къ цвѣтоносу; цвѣтки свѣтложелтые: . . .

торчащая с.—*B. stricta* Andr.

60. *Beckmannia* Host.—зубровники. Колосыя продолговатые, съ 2-рядно расположенными колосками (рис. 604); наружныя пленки ихъ блѣдно-зеленыя, съ свѣтлымъ перепончатымъ краемъ; листья съ длиннымъ, острымъ язычкомъ: . . . зубровникъ—*B. eruciformis* Host.

1) Останкино.

2) По Окъ—Дужки, Серпуховскаго уѣзда; Бѣлые Колодези—Коломенскаго.

61. †\* *Béllis* L. — маргаритки. Коротко-пушистые травки; листья въ розеткѣ лопатчатые, неравно-городковые, обѣ 1 жилкѣ, быстро сужены въ длинный широкій черешокъ; листочки обвертки травянистые, ланцетные, округло-тупые, спереди рѣбчатые (рис. 605, а). . . . . (многолѣтняя) маргаритка—†\* *B. perénis* L.




(Рис. 604):




(Рис. 605):

62. †\* *Berberis* L. — барбарисы. Кусты, у которыхъ вѣтви съ укороченными вѣточками въ видѣ пучковъ листьевъ; листья коротко-черешковые, продолговатые, обратно-яйцевидные, колюче-зубчатые, съ 3-раздѣльными шипами; замѣняющими прицвѣтники; каждый лепестокъ внизу съ 2 железками (рис. 606, б); ягоды красныя, продолговатыя (с); цвѣты пахучіе. . . . . (обыкновенный) барбарисъ—†\* *B. vulgaris* L.



(Рис. 606):



(Рис. 607):



(Рис. 608):

63. *Bertérea* DC. — икотники. Листья ланцетные, острые, рѣдко-зубчатые, только нижніе сужены въ черешокъ; длинныя тычинки внизу крылатыя; короткія—съ зубцомъ (рис. 607, с); стручечекъ эллиптической (d, b) . . . . . (сѣдой) икотникъ—*B. incana* DC.

64. \* *Béta* L. — свеклы. Листья черешковые; корневыя розеткою, продолговато-яйцевидные, тупые, нѣсколько сердцевидные, по краямъ слегка волнистые; стеблевые продолговатые или ланцетные, слегка острые; клубочки въ очень длинныхъ ложныхъ колосьяхъ; рылецъ продолговато-яйцевидныхъ б. ч. по 2 . . . . . (обыкновенная) свекла—\* *B. vulgaris* L.

65. *Betònica* L. — буквицы. Листья черешковые, продолговато-яйцевидные, сердцевидные, почти тупые, городковые; трубка вѣпчика выдается изъ чашечки (рис. 608, а); верхняя губа его продолговато-овальная, подъ конецъ отогнута (а); тычинки не доходятъ до ея середины (а); цвѣтки грязно-красныя, рѣдко бѣлыя . . . . . (лѣчебная) буквица—*B. officinális* L.

66. *Bétula* L. — березы.

1. Деревья или большіе кусты, съ листьями острыми или заостренными . . . . . 2.



Небольшие кустарники, съ мелкими тупыми или притупленными листьями; плодовые сережки торчащія, на коротких ножкахъ, усаженныхъ внизу листьями. . . . . 5.

2. Плодовые сережки почти сидячія, торчащія, яйцевидно-продолговатыя; крылья на плодахъ уже орѣшка; кора на стволѣ темно-сѣро-бурая; листья яйцевидно-продолговатые на короткихъ черешкахъ; черешки и жилки съ нижней стороны листа пушистые. . . . . гибкая б.—\* *B. lenta* L.

Плодовые сережки на длинныхъ ножкахъ, повислыя, цилиндрическія; крылья у плодовъ шире или не уже орѣшка; кора на стволѣ бѣлая. . . 3.

3. Листья не только по краямъ, но и при основаніи остро-зубчатые, дельтовидные, заостренные, усажены съ нижней стороны, какъ и листовой черешокъ, смолистыми железками. . . . . тополевая б.—\* *B. populifolia* Ait.

Листья только по краямъ зубчатые, при основаніи цѣлюкрайніе. . . 4.

4. Молодые вѣтви усажены смолистыми бородавками; взрослые листья б. ч. голые, толкіе, треугольно-ромбическіе, съ незакругленными боками, нижній край листа прямой; крылья вдвое шире орѣшка. . . . . бѣлая б.—*B. alba* L.

Молодые вѣтви безъ смолистыхъ бородавокъ; молодые листья б. ч. бархатистые, взрослые б. ч. въ углахъ жилокъ бородастые; листья плотные, почти кожистые, яйцевидные или яйцевидно-ромбическіе, съ закругленными боками; нижній край листа дугообразный; крылья не шире орѣшковь. . . . . пушистая б.—*B. pubescens* Ehrh.

5. Вѣтви усажены частыми железистыми бородавками; листья округло-яйцевидные или овальные, пильчато-городковые, съ неровными, часто двойными, острыми зубчатыми; сережки на явственныхъ ножкахъ, коротко-цилиндрическія или продолговатыя; орѣшекъ вдвое шире крыльевъ. . . . . приземистая б.—*B. humilis* Schrk. <sup>1)</sup>

Вѣтви безъ железистыхъ бородавокъ; листья округлые, ширина ихъ больше длины, кругло-городковые; сережки на очень короткихъ ножкахъ, яйцевидныя; орѣшекъ съ очень узкими крыльями. . . . . карликовая б.—*B. nana* L. <sup>2)</sup>

## 67. *Bidens* L.—череды.

a. Листья сужены въ короткій, крылатый черешокъ, обыкновенно 3-раздѣльные; корзинки торчащія, съ желто-бурыми цвѣтками; внутреннія чешуйки обертки яйцевидно-ланцетныя; сѣмянки продолговато-клиновидныя, сплюснутыя; б. ч. о 2 щетинкахъ (рис. 609, a). . . . .


трехраздѣльная ч.—*B. tripartita* L.

b. Листья сидячіе, нѣсколько сросшіеся, всегда цѣльные; корзинки поникшія, съ желтыми цвѣтками; внутреннія чешуйки обертки яйцевидныя; сѣмянки кинзу б. ч. суженныя, о 3—4 щетинкахъ (рис. 609, b)

. . . . . поникшая ч.—*B. cernuus* L.

## 68. *Blitum* L.—жминды.

a. Клубочки образуютъ безлистный голый вершинный колосъ; листья треугольные, при основаніи усѣченные, почти копьевидные, съ рѣдкими и



(Рис. 609.)

<sup>1)</sup> По торфянымъ болотамъ.

<sup>2)</sup> Сохранилось отъ прежняго времени въ гербаріи Максимовича.

мелкими зубцами; плоды съ острымъ краемъ; средніе цвѣтки 4-ные или 5-ные . . . . . головчатая ж.—*B. capitatum* L. <sup>1)</sup>.

b. Всѣ клубочки въ пазухѣ листьевъ; листья продолговато-ромбическіе, при основаніи клиновидные, заостренные, выемчато-зубчатые, на длинныхъ черешкахъ; плоды съ тупымъ краемъ и съ желобкомъ . . . . . лозная ж.—*B. virgatum* L.

69. *Blýsmus* Panz.—близма. Корневище ползучее; стебель округло-сжатый, вверху 3-гранный; листья линейные, килеватые, по краямъ немного рѣзущіе; колосъ въ 5-12, о 6-8 цвѣткахъ каждый; прицвѣтныя пленки продолговато-ланцетныя, острые, о 5 жилкахъ . . . . .

(сплюснутая) близма—*B. compressus* Panz.

70. <sup>†</sup>\* *Borràgo* L. — бурячники. Стебель толстый, сочный, вѣтвистый, усаженный, какъ и листья, жесткими щетинками; листья пахнутъ огурцами, морщинистые, по краямъ волнистые, нижніе эллиптические, суженные въ черешокъ; верхніе продолговатые, суженные надъ стеблеобъемлющимъ основаніемъ; цвѣтки на длинныхъ ножкахъ, поникшіе; доли чашечки линейныя, при плодосозрѣваніи сходящіяся; доли вѣнчика плоскія, яйцевидныя, заостренные (рис. 610, а); вѣнчикъ лоснящійся, синій, рѣдко бѣлый . . . . .



(Рис. 610).

огуречная трава—<sup>†</sup>\* *B. officinalis* L.

71. *Botrychium* Sw.—гроздовики <sup>2)</sup>.

1. Отгибъ листа вытянутый, въ 2, 3 раза больше ширины, перисто-разсѣченный; верхушка его притупленная; листовыя доли полукруглыя, съ широко-клиновиднымъ основаніемъ; трава голая, желтоватая, мясистая . . . . .

ключь-трава—*B. Lunaria* Sw.

Отгибъ листа въ ширину больше длины, треугольный, 2-перисто-разсѣченный, съ округленною или заостренною верхушкою; трава покрыта рѣдкими волосками . . . . . 2.

2. Листъ на длинномъ черешкѣ, выходящемъ у самаго корневища, толстый, мясистый, желтоватый, съ бѣловатыми волосками; доли листа сердцевидно или продолговато-яйцевидныя; нижнія доли на короткихъ черешкахъ; верхушка листа округленная . . . . . рутовый г.—*B. rutaefolium* A. Br.

Листъ сидячій, выходитъ выше середины спороноснаго черешка, зеленый, съ заостренною верхушкою; доли листа ланцетныя, перисто-раздѣльныя . . . . . виргинскій г.—*B. virginianum* Sw.

72. *Brachipodium* P. B.—коротконожки.

a. Кисть торчащая или слегка наклоненная; ось прямая, жесткая, у всѣхъ цвѣтковъ короче цвѣточныхъ пленокъ; нижняя цвѣточная пленка не длиннѣе верхней, б. ч. по бокамъ съ короткими щетинками; корневище ползучее . . . . . перистая к.—*B. pinnatum* P. B.

b. Кисть повислая; ось тонкая, часто извилистая, у верхнихъ цвѣтковъ длиннѣе или не короче цвѣточныхъ пленокъ (рис. 611); нижняя цвѣточная пленка длиннѣе верхней, часто голая . . . . .

лѣсная к.—*B. silvaticum* R. & S.

1) Сохранено въ гербаріяхъ прежняго времени.

2) Всѣ виды гроздовиковъ встрѣчаются разсѣянно и рѣдко.

**73. Brassica L.—капусты.**

1. Всѣ листья черешковые, ярко-зеленые: верхніе ланцетные, цѣльно-крайніе; чашечка горизонтально раскрытая; стручки съ носикомъ не длиннымъ и съ прямыми плодоножками, прижатыми къ цвѣтоносу; цвѣтки мелкіе . . . . .

черная к. — †\* *B. nigra* Koch

Только корневые листья черешковые; верхніе сидячіе или стеблеобъемлющіе; стручки съ длиннымъ носикомъ на отклоненныхъ отъ цвѣтоноса плодоножкахъ . . . . . 2.

2. Всѣ листья голые, лоснящіеся, сѣро-зеленые; верхніе — сидячіе, продолговатые, зубчатые; кисть до разцвѣтанія вытянутая, рѣдкая; чашелистики не растопыренные; всѣ тычинки прямые; цвѣтки крупныя; сѣмена гладкія . . . . . огородная к. — \* *B. oleracea* L.

Корневые листья б. м. волосистые; стеблевые — голые, сизые; верхніе — стеблеобъемлющіе; чашечка горизонтально раскрытая; короткія тычинки дугообразно отклоненныя; цвѣтки средней величины, сѣмена ячеисто-точечныя . . . . . 3.

3. Нижніе листья ярко-зеленые, верхніе — сизые, яйцевидные, охватывающіе стебель глубоко-сердцевиднымъ основаніемъ; кисть щитковидная; во время разцвѣтанія сжатая: распустившіеся цвѣтки перерастаютъ цвѣточные почки . . . . . рѣпа — *B. Rapa* L.

Всѣ листья сизые; стеблевые продолговатые, снизу суженные, затѣмъ опять расширенныя и при основаніи раскрыто-сердцевидные; кисть вытянутая, уже во время разцвѣтанія рѣдкая: распустившіеся цвѣтки не перерастаютъ цвѣточные почки . . . . . брюква — †\* *B. Napus* L.

**74. Briza L.—трясушки.** Стебель прямой, гладкій; листья узкіе, шероховатые; стеблевые — короткіе; язычекъ листа короткій, усѣченный; вѣтви метелки гладкія; колоски повислые на очень тонкихъ вѣточкахъ (рис. 612, а), о 5—9 цвѣткахъ, съ чашечными пленками обратно-яйцевидными (b) . . . . . (средняя) трясунка — *B. media* L.

**75. Bromus L.—костры.**

1. Всѣ листовыя влагалища голыя, гладкія; колоски безъ остей или съ короткими осями, которыя во много разъ короче нижней цвѣточной пленки . . . . . 2.

Всѣ или только нижнія листовыя влагалища пушистыя или щетинистыя; колоски съ длинными осями, по крайней мѣрѣ, въ половину длины нижней цвѣточной пленки (рис. 613) . . . . . 3.

2. Нижняя цвѣточная пленка ланцетная, на спинкѣ ребристая; нижняя чашечная пленка о 1 жилкѣ, верхняя — о 3; метелка короткая, широкая и торчащая; корневище ползучее съ побѣгами . . . . .

безостный к. — *B. inermis* Leyss.

Нижняя цвѣточная пленка широко-эллиптическая, на спинкѣ округленная; нижняя чашечная пленка о 3—5 жилкахъ, верхняя — о 7—9; метелка большая, многоколосная, по отцвѣтаніи свислая . . . . . ржаной к. — *B. secalinus* L.

3. Колоски къ верхушкѣ расширены, линейно-клиновидные, лоснящіеся;



(Рис. 611).



(Рис. 612).

метелка повислая, частая; вѣтви ея гладкія, очень тонкія, согнуты въ одну сторону; нижняя цвѣточная пленка на 2-расщепленной верхушкѣ съ длиною остью и широкимъ перепончатымъ краемъ . . . . .

кровельный к.—*B. tectorum* L.

Колоски къ верхушкѣ сжаты, ланцетные или продолговатые; вѣтви метелки шершавыя или пушистыя. . . . . 4.

4. Нижняя цвѣточная пленка ланцетная, ребристая, длиннѣе ости; нижняя чашечная пленка объ 1 жилкѣ, верхняя—о 3; листья зеленые . . . 5.

Нижняя цвѣточная пленка эллиптическая (рис. 613), равна или почти равна ости; нижняя чашечная пленка о 3-5 жилкахъ, верхняя о 7-9; листья сѣро-зеленые . . . . . 6.

5. Метелка рѣдкая, подъ конецъ повислая; стебель покрытъ короткими волосками, а нижнія влагалища—жесткими; листья темно-зеленые, довольно широкіе, шероховатые; язычекъ ихъ овальный, тупой; нижняя цвѣточная пленка нѣсколько длиннѣе (на  $\frac{1}{4}$ ) ости. . . шероховатый к.—*B. asper* Murr. 1).

Метелка довольно частая, узкая, прямая; стебель голый и гладкій; листья свѣтло-зеленые, съ рѣдкими волосками; нижніе—узкіе, складчатые; стеблевые много шире; язычекъ короткий, расщепленный; нижняя цвѣточная пленка вдвое длиннѣе ости . . . . . поднятый к.—*B. erectus* Huds. 2).

6. Метелка большая, развѣсистая, многоколосная, по отцвѣтаніи нѣсколько поникшая; вѣтви ея тонкія, очень длинныя, прямыя; нижняя цвѣточная пленка равна верхней, сжата къ верхушкѣ и расщеплена . . . . .

полевой к.—*B. arvensis* L.

Метелка прямая, рѣдкая, по отцвѣтаніи или уже во время цвѣтенія сжатая; нижняя цвѣточная пленка длиннѣе верхней, на тупой верхушкѣ цѣльная или 2-зубчатая. . . . . 7.

7. Метелка уже во время цвѣтенія сжатая; цвѣточные пленки въ зрѣломъ колоскѣ прилегаютъ одна къ другой и черепичато накрываютъ одиѣ другія; ость прямая (рис. 613). . . . . мягкій к.—*B. mollis* L.

Метелка лишь по отцвѣтаніи сжатая, и тогда свислая на одну сторону; нижнія цвѣточные пленки въ зрѣлыхъ колоскахъ расходятся и не прилегаютъ одиѣ къ другимъ; ость отогнутая . . . . .

раскрытый к.—*B. patulus* M. & K. 3).

## 76. *Brunella* L.—черноголовки.

a. Подъ самымъ колосомъ пара сидячихъ листьевъ; вѣнчикъ съ прямою трубкою (рис. 614, а), менѣе чѣмъ вдвое длиннѣе чашечки: верхняя губа ея съ зубцами, очень короткими, но равными, остроконечными; нижняя губа ея до половины 2-раздѣльная съ ланцетными, на концѣ шиловидными зубцами (б); нити у длинныхъ тычинокъ съ шиловиднымъ зубцомъ (с). . . . .

обыкновенная ч.—*B. vulgaris* L.

b. Подъ самымъ колосомъ нѣтъ листьевъ; вѣнчикъ съ трубкою отогнутою, болѣе чѣмъ вдвое длиннѣе чашечки: верхняя губа ея съ болѣе выдающимися, широко 3-угольными, кверху шиловидными зубцами; нижняя губа расщеплена на треть; нити у длинныхъ тычинокъ съ короткимъ, тупымъ бугоркомъ . . . . . крупноцвѣтная ч.—*B. grandiflora* Jacq. 4).

1) Подъ Москвою—Братцево, Кунцево.

2) Подъ Москвою—Петровское-Разумовское.


3) По Окъ, въ Коломенскомъ уѣздѣ: Протопопово, Карапчеево.

4) Въ южныхъ уѣздахъ: Подольскомъ, Серпуховскомъ, Коломенскомъ.


77. †\* *Bryonia* L.—переступни. Вьющаяся трава съ простыми усиками и рѣбовиднымъ корнемъ; листья коротко-волосистые, глубоко-сердцевидные, 3 - 7, б. ч. 5-лопастные, съ выемчато-зубчатыми острыми лопастями; чашечка женскаго цвѣтка такой же длины, какъ вѣничикъ (рис. 615, б); рыльце голое . . . . . (бѣлый) переступень—†\* *B. alba* L.



(Рис. 613).



(Рис. 614).



(Рис. 615).

78. *Bünias* L.—свербиги. Стебель большой, вѣтвистый; листья на длинныхъ черешкахъ, струговидно-раздѣльные, съ большою треугольною верхушечною долею; средние листья коротко-черешковые, при основаніи б. ч. копьевидные, продолговато-ланцетные, острые, неравно-зубчатые; верхніе—сидячіе, съ яйцевиднымъ основаніемъ, ланцетные, острые; чашелистики горизонтально оттопыренные; орѣшекъ заостренъ, во много разъ короче отклоненной плодоножки (рис. 616) . . . . .

(восточная) свербига — *B. orientalis* L.


79. *Bütomus* L.—сусаки. Листья корневою розеткою; цвѣтоносъ длиннѣе листьевъ; ложный зонтикъ въ пазухѣ мутовчатыхъ, перепончатыхъ прицвѣтничковъ; цвѣтоножки неравной длины, много длиннѣе цвѣтковъ, съ коротко-заостренными лепестками (рис. 617) розоваго цвѣта, снаружи лиловатаго . . . . . (зонтичный) сусакъ—*B. umbellatus* L.



(Рис. 616).



(Рис. 617).



(Рис. 618).

80. *Calamagrostis* Roth—вѣйники.

1. Обѣ цвѣточные пленки прозрачно-перепончатые; нижняя значительно длиннѣе верхней, на верхушкѣ 2-расщепленная, короче пучка волосковъ (рис. 618, а); зачатка другаго цвѣтка въ колоскѣ нѣтъ . . . . . 2.

Обѣ цвѣточные пленки только на спинкѣ перепончатые; нижняя лишь немного длиннѣе верхней, на верхушкѣ зубчатая, длиннѣе пучка волосковъ; зачатокъ другаго цвѣтка есть, въ видѣ волосистаго выроста . . . . . 3.

2. Метелка частая, вѣтви ея толстыя, твердыя; колоски уже во время распускания скучены въ односторонніе пучки; ость выходитъ со спинки цвѣточной пленки и выдается надъ нею; листья широкіе, сѣрозеленые . . .

наземный в. — *C. Epigæos* Roth

Метелка во время распускания развѣсистая; вѣтви ея тонкія; ость выходитъ между зубцами цвѣточной пленки и почти не выдается надъ ними (рис. 618—b, a); листья узкіе, зеленые . . .


ланцетный в. — *C. lanceolata* Roth

3. Ость колѣнчатая выходитъ у основанія нижней цвѣточной пленки, много длиннѣе чашечныхъ пленокъ и выдается изъ колоска; волоски очень короткіе, вчетверо короче нижней цвѣточной пленки; листья широкіе; язычекъ ихъ короткій, усѣченный . . . лѣсной в. — *C. silvatica* DC.

Ость б. ч. прямая, выходитъ ниже середины нижней цвѣточной пленки, короче чашечныхъ пленокъ и не выступаетъ изъ колоска; волоски лишь немного короче нижней цвѣточной пленки; листья узко-линейные, свернутые; язычекъ ихъ довольно длинный . . .

невидный в. — *C. neglecta* Fr. <sup>1)</sup>

81. *Calamintha* Mch. — душистики. Трава сильно пахучая; листья черешковые, мелкіе, плотные, свѣтло-зеленые, съ сильно выступающими боковыми жилками: нижніе яйцевидные, остальные — продолговато-ромбические; цветоножки сплюснутыя; чашечная трубка бороздчатая, съ жесткими волосками верхняя губа чашечки съ 3 шпловидными зубцами, подъ конецъ оттопыренными (рис. 619); вѣнчикъ небольшой, блѣдно-лиловый . . . зерновикъ — *C. Acinos* Clairv.



(Рис. 619).

(Рис. 620).

(Рис. 621).

82. *Calla* L. — белокрыльники. Корневище ползучее; листья дугонервные, яйцевидно-сердцевидные, заостренные, лоснящиеся; цветонось длиною съ листь; початокъ продолговато-цилиндрической, тупой (рис. 620, a), короче яйцевиднаго, коротко заостреннаго крыла . . .

(болотный) белокрыльник — *C. palustris* L.

83. *Callitriche* L. — болотники.

a. Листья къ основанію сужены или, по крайней мѣрѣ, не расширены; верхніе б. ч. собраны въ розетку; цвѣтки съ 2 серповидными прицвѣтниками (рис. 621—a, b). . . водная звѣздочка — *C. palustris* L.

b. Листья линейные, къ основанію расширены; верхніе сближенные, иногда не образуютъ розетки; стебель покрытъ частыми темно-зелеными

<sup>1)</sup> Въ торфяныхъ болотахъ.



листьями, на верхушкѣ выемчатыми, съ сильно выдающеюся среднею жилкою; прицвѣтничковъ нѣтъ. . . . . осенній болотникъ—*C. autumnalis* L.

**84. *Calluna* Salisb.**—верески. Небольшой кустарникъ съ мелкими, линейно-ланцетными, почти 3-гранными листьями, при основаніи вытянутыми въ 2 шиловидныхъ ушка; цвѣтки мелкіе, поникшіе, на короткихъ ножкахъ (рис. 622), собраны въ однобокую кисть; вѣнчикъ и чашечка красновато-лиловые, рѣдко бѣлые . . . . .

(обыкновенный) верескъ—*C. vulgaris* Salisb.


**85. *Calltha* L.**—калужницы. Стебель вверхъ вѣтвистый; листья темно-зеленые, голые, лоснящіеся; нижніе черешковые, сердцевидные, верхніе почковидные,—ширина ихъ больше длины; цвѣтки крупныя, ярко-желтыя.

(болотная) калужница—*C. palustris* L.

**86. *Calystégia* R. Br.**—калистегія. Трава голая, съ побѣгами подземными и надземными; листья продолговато-яйцевидные, заостренные, при основаніи стрѣловидные, съ угловато-усѣченными лопастями; цвѣтоносъ длиннѣе листа; прицвѣтники сердце-яйцевидные, острые (рис. 623, б); цвѣтки очень крупныя, бѣлые (а). . . . . (заборная) калистегія—*C. sépium* R. Br.



(Рис. 622).



(Рис. 623).



(Рис. 624).

**87. *Camelina* Crantz**—камелина.

а. Средніе стеблевые листья продолговато-ланцетные; цѣльнокрайніе или слегка зубчатые, при основаніи стрѣловидные; стручечекъ грушевидный (рис. 624). . . . . рыжикъ—*C. sativa* Crantz

б. Средніе стеблевые листья удлиненыя, выемчато-зубчатые или перисто-раздѣльные, къ срединѣ сужены, книзу снова расширены; стручечки шаровидно-грушевидныя, вдвое крупнѣе, чѣмъ у перваго вида . . . . . зубчатая к.—*C. dentata* Pers.

**88. *Campanula* L.**—колокольчики.

1. Цвѣтки сидячіе, скупенные въ верхушечныя и пазушныя головки . . . 2.

Цвѣтки на ножкахъ, въ кистяхъ и метелкахъ или одиночныя . . . 3.

2. Стебель съ тупыми ребрами покрытъ б. ч. короткимъ сѣрымъ пушкомъ, какъ и листья съ нижней стороны; доли чашечки ланцетныя, заостренныя; столбикъ не выдается изъ цвѣтка . . . . .

приточная трава—*C. glomerata* L.

Стебель съ острыми ребрами покрытъ жесткими, щетинистыми волосками, какъ и листья; доли чашечки яйцевидныя, тупыя; столбикъ сильно выдается изъ вѣнчика . . . . . балаболка—*C. Cervicaria* L.

3. Стеблевые листья широкие, яйцевидные, съ сердцевиднымъ или округлымъ основаніемъ, шершавые или волосистые; коробочка поникшая, вскрывается дырочками у своего основанія . . . . . 4.

Стеблевые листья узкіе, ланцетные или линейно-ланцетные . . . . . 7.

4. Цвѣтки повислые, въ длинной многоцвѣтной кисти или метелкѣ; чашечныя доли ланцетныя, отогнутыя . . . . . 5.

Цвѣтки торчащіе или отклоненные, одиночные или въ рѣдкой кисти; чашечныя доли широко-ланцетныя, прямые или отклоненныя . . . . . 6.

5. Стебель и листья съ обѣихъ сторонъ покрыты шершавыми жесткими волосками; кисть однобокая; вѣничикъ на краю рѣсничный; корневище ползучее съ побѣгами . . . . . боровой к.—*C. rapunculoides* L.

Стебель и листья съ нижней стороны покрыты мягкимъ сѣроватымъ пушкомъ, сверху листья шероховатые; кисть или метелка многорядная; вѣничикъ на краю голый . . . . . болонскій к.—*C. bononiensis* L.

6. Стебель округлый, вверху съ тупыми гранями, голый; листья съ обѣихъ сторонъ съ рѣдкимъ мягкимъ пушкомъ; цвѣтоножки ниже своей средины съ 2 прицвѣтниками; чашечка голая . . . . . широколиственный к.—*C. latifolia* L.

Стебель съ острыми гранями покрытъ рѣдкими жесткими волосками, какъ и листья; цвѣтоножки при основаніи съ 2 прицвѣтниками; чашечка съ щетинками . . . . . горляная трава—*C. Trachelium* L.

7 (3). Въ выемкахъ между долями чашечки отогнутые придатки, накрывающіе завязь; листья и стебель коротко-щетинистые; листья тупые, городковые, волнистые; корневые—продолговато-лопатчатые, стуженные въ черешокъ; стеблевые—продолговато-ланцетные или линейные, сидячіе; цвѣтки на длинныхъ ножкахъ, поникшіе, въ узкой кистистой метелкѣ, съ мало-отклоненными вѣтвями . . . . . сибирскій к.—*C. sibirica* L. <sup>1)</sup>

Придатковъ между выемками долей чашечки нѣтъ; листья голые или слегка волосистые . . . . . 8.


8. Цвѣтоножки и коробочки поникшія (рис. 625—d, a); чашечныя доли линейно-шиловидныя (b); коробочка вскрывается у самаго основанія дырочками (d); корневые листья рано опадающіе, почковидно-округлые или сердцевидно-яйцевидные, на длинныхъ черешкахъ; вѣничикъ 5-надрѣзной, съ надрѣзами почти прямыми . . . . .

круглолистный к.—*C. rotundifolia* L.

Цвѣтоножки и коробочки торчащія; чашечныя доли ланцетныя или шиловидныя; коробочка вскрывается дырочками близъ своей верхушки; корневые листья ланцетные или лопатчатые . . . . . 9.

9. Цвѣтки очень крупныя въ малоцвѣтныхъ кистяхъ; выемки ланцетныхъ чашечныхъ долей острыя; вѣничикъ широко-колокольчатый, 5-надрѣзной; цвѣтоножки при основаніи съ 2 прицвѣтниками; корневище ползучее . . . . . перенковолостный к.—*C. persicifolia* L.

Цвѣтки средней величины, въ развѣистой, почти щитковидной метелкѣ;



(Рис. 625).

<sup>1)</sup> По Олѣ—подъ Зибровымъ, Серпуховскаго уѣзда.

выемки ланцетно-шиловидныхъ долей чашечки тупыя; вѣничикъ почти ворончатый, 5-раздѣльный, съ отогнутыми долями; цвѣтоножки выше середины съ 2 прицвѣтниками; корень тонкій . . . раскрытый к.—*C. patula* L.

89. \* *Cannabis* L.—конопли. Стебель и листья шершавые отъ короткихъ волосковъ; глубоко пальчато-раздѣльные листья на длинныхъ черешкахъ, о 5, 7, 9 доляхъ, острыхъ, ланцетныхъ, суженныхъ къ концамъ, съ крупными пальчатыми зубцами; верхніе листья о 3 линейныхъ доляхъ или нераздѣльные. . . . (посѣвная) конопля—\* *C. sativa* L.

90. *Capsella* Med.—сумочники. Корневые листья—черешковые, продолговатые; стеблевые—сидячіе, верхніе—всегда цѣльные; стручечки на горизонтально оттопыренныхъ плодоножкахъ; столбикъ короткий, не выдается изъ выемки стручечка (рис. 626, а) . . . (пастуший) сумочникъ—*C. Bursa pastoris* Much.



(Рис. 626).



(Рис. 627).

91. \* *Caragana* Lam.—акаціи.

1. Листья о 4—8 парахъ эллиптическихъ листочковъ; чашечка съ зубцами очень короткими, въ 5—6 разъ короче ея трубки (рис. 627—а, б). . . . древовидная а.—\* *C. arborescens* Lam.

Листья о 2 парахъ сближенныхъ клиновидныхъ листочковъ; зубцы чашечки въ 3—4 раза короче ея трубки . . . 2.

2. Листочки клиновидно-обратно-яйцевидные, на верхушкѣ слегка выемчатые, съ колючкою, сближенные къ верхушкѣ колючаго листового черешка; цвѣтоножка сочленена выше середины . . .

кустарная ак.—\* *C. frutescens* DC.

Листочки линейно-клиновидные, на верхушкѣ округленные, съ остріемъ, вполне сидячіе; цвѣтоножки сочленены въ самой срединѣ или ниже середины . . . карликовая ак.—\* *C. pygmaea* DC.

92. *Cardamine* L.—сердечники.

1. Цвѣтки мелкіе, лепестки продолговатые, торчащіе, немного длиннѣе чашелистиковъ; черешки стеблевыхъ листьевъ съ стрѣловидными ушками; листья много (5-9)-парные; листочки нижнихъ листьевъ пальчато-надрѣзные; у верхнихъ—ланцетные, цѣльные . . . недотрога—*C. impatiens* L.

Цвѣтки среднихъ размѣровъ; лепестки обратно-яйцевидные, растопыренные, вдвое длиннѣе чашечки; черешки стеблевыхъ листьевъ безъ ушковъ . . . 2.

2. Стебель круглый, полый; корневые листья образуютъ розетку, съ цѣльнокрайними или выемчатыми листочками; листочки верхнихъ стеблевыхъ листьевъ линейные, цѣльнокрайнїе; тычинки съ желтыми пыльни-

нами, вдвое короче лиловатаго вѣчника; столбикъ короткій . . . . . луговой с.—*C. pratensis* L.

Стебель ребристый, плотный; листочки верхнихъ стеблевыхъ листьевъ продолговатые, угловато-зубчатые; тычинки съ лиловыми пыльниками почти равны бѣлому вѣчнику; плоды съ тонкимъ длиннымъ столбикомъ; корневище ползучее съ побѣгами. . . . . горькій с.—*C. amara* L.

### 93. *Carduus* L.—чертополохи.

а. Корзинки поникшія, сплюснута-шаровидныя, большія, на длинномъ безкрыломъ, согнутомъ и бѣломъ цвѣтоносѣ, б. ч. одиночныя; обертка съ чешуйками при основаніи яйцевидными и сжатыми въ ланцетно-шило-видную отогнутую колючку; листья жесткіе, плотные, голые, колючіе . . . . . поникшія ч.—*C. nutans* L.

б. Корзинки торчащія, округлыя, б. ч. скученныя, на цвѣтоносѣ крылатомъ или покрытомъ шипами до верху; чешуйки обертки линейно-ланцетныя, узкія, тонкія, слегка отклоненныя, мягкія, и только нижнія отогнутыя, колючія; листья мягкіе, снизу съ бѣлымъ войлокомъ или паутиною . . . . . курчавый ч.—*C. crispus* L.

### 94. *Carex* L.—осоки.

1. Небольшія двудомныя сѣро-зеленыя травы съ однимъ только вершиннымъ колоскомъ: мужскимъ или женскимъ; стебель тонкій, круглый, съ узкими нитевидными листьями, съ ползучимъ корневищемъ и съ побѣгами. . . . . двудомная ос.—*C. dioica* L. 1).

Однородныя травы съ нѣсколькими колосками, расположенными сложнымъ колосомъ, метелкою или головкою . . . . . 2.

2. Всѣ колоски одинаковой формы заключаютъ почти всегда мужскіе и женскіе цвѣтки . . . . . 3.

Колоски разной формы: 1 верхній (или нѣсколько) отличенъ по формѣ и окраскѣ отъ остальныхъ и содержитъ почти всегда только одни мужскіе цвѣтки . . . . . 17.

3. Верхніе и нижніе колоски въ сложномъ колосѣ женскіе; средніе—мужскіе; корневище ползучее съ побѣгами; листья узкіе, желобчатые; плоды яйцевидные, съ острымъ краемъ; цвѣточные пленки продолговатыя, острые . . . . . средняя ос.—*C. intermedia* Good. 2).

Всѣ колоски заключаютъ мужскіе и женскіе цвѣтки . . . . . 4.

4. Всѣ колоски книзу шире, къ верхушкѣ уже, несутъ въ пазухѣ верхнихъ цвѣточныхъ пленокъ мужскіе, неплодучіе цвѣтки, а въ пазухѣ нижнихъ—женскіе, влѣдствіе же плоды . . . . . 5.

Всѣ колоски книзу уже, къ верхушкѣ шире несутъ женскіе цвѣты и потому плоды въ пазухѣ верхнихъ пленокъ, а въ пазухѣ нижнихъ—мужскіе, неплодучіе цвѣтки . . . . . 10.

5. Колоски, въ числѣ 3 - 5, скучены въ яйцевидную или продолговатую головку; корневище ползучее съ побѣгами; стебель круглый, гладкій, много длиннѣе листьевъ; плоды овальные, по краямъ округленные, гладкіе, нѣсколько длиннѣе яйцевидныхъ пленокъ . . . . .

тонкокорневая ос.—*C. chordorrhiza* Ehrh. 3).

1) По торфянымъ болотамъ.

2) Найдено въ прежнее время.

3) По торфянымъ болотамъ.

Колосковъ много въ длинномъ, сложномъ, часто метельчатомъ колосѣ; побѣговъ нѣтъ; листья шероховатые. . . . . 6.

6. Листья ярко-зеленые; плоды сильно оттопыренные отъ стержня, нижніе — почти горизонтально отклоненные, плоско-выпуклые, съ крылатымъ ободкомъ, длиннѣе продолговатыхъ, заостренныхъ пленокъ . . . . . 7.

Листья сѣро-зеленые; плоды вверхъ торчащіе, съ обѣихъ сторонъ выпуклые, съ острыми краями, не длиннѣе пленокъ. . . . . 8.

7. Стебель крылато-трегранный, съ вогнутыми гранями, вдоль реберъ остро шероховатый; колосъ очень частый, внизу метельчатый; плоды яйцевидные, съ явственными 6 - 7 жилками. . . . . листья ос.—*C. vulpina* L.

Стебель 3-гранный, съ плоскими гранями, только вверхъ шероховатый; колосъ цилиндрической; плоды яйцевидно-ланцетные, лоснящіеся, гладкіе или только внизу съ неясными бороздками. . . . . колючая ос.—*C. muricata* L.

8. Стебель только вверхъ 3-гранный, съ нѣсколько выпуклыми гранями; колосъ цилиндрической, только иногда при основаніи метельчатый; плоды гладкіе, лоснящіеся. . . . . круглостебельная ос.—*C. teretiūscula* Good.

Весь стебель 3-гранный, съ плоскими гранями; колосъ метельчато-развѣтленный. . . . . 9.

9. Нижняя часть стебля съ темно-бурымъ волокнистымъ пучкомъ отжившихъ листьевъ; метелка плотная; вѣтви ея торчащія; плоды о 9-11 жилкахъ, тусклые; пленки съ узкимъ бѣлымъ ободкомъ . . . . .

странная ос.—*C. paradoxa* Willd.

Нижняя часть стебля голая; метелка рѣдкая; вѣтви ея отклонены; плоды лоснящіеся, гладкіе, только книзу на спинкѣ слегка бороздчатые; пленки съ широкимъ бѣлымъ ободкомъ. . . . .

метельчатая ос.—*C. paniculata* L. 1).

10 (4). Всѣ колоски сближены и сливаются въ одинъ болѣе или менѣе густой колосъ; листья короче стебля и покрываютъ его только въ нижней части. . . . . 11.

Колоски, п. к. м. нижніе, раздвинуты по стеблю; плоды со многими выдающимися тонкими жилками. . . . . 12.

11. Колоски скучены въ короткій яйцевидный колосъ; корневище ползучее, съ побѣгами; стебли очень тонкіе; листья очень узкіе; плоды продолговато-яйцевидные, съ крылатымъ зубчатымъ ободкомъ, нѣсколько длиннѣе яйцевидно-ланцетныхъ, тонко-заостренныхъ пленокъ. . . . .

Шреберова ос.—*C. Schreberi* Schrk.

Колоски расположены продолговатымъ, вытянутымъ колосомъ; корневища съ побѣгами нѣтъ; плоды торчащіе, плоско-выпуклые, овальные, съ тонкими бороздками, вытянуты въ довольно длинный 2-зубчатый носикъ, на краю шершавый, не длиннѣе продолговатыхъ, острыхъ пленокъ. . . . .

заячья ос.—*C. leporina* L.

12. Нижніе 2 - 4 колоска сильно удалены одинъ отъ другаго, въ пазухѣ длинныхъ прицвѣтныхъ листьевъ, превышающихъ весь колосъ; плоды яйцевидные, плоско-выпуклые, прижатые, зеленоватые, съ короткимъ 2-зубчатымъ носикомъ, длиннѣе продолговатыхъ, острыхъ, зеленоватыхъ пленокъ; корневище густо дернистое. . . . .

раздвинутая ос.—*C. remota* L. 2).

1) и 2) Найдено въ прежнее время.

Всѣ колоски въ пазухѣ короткихъ прицвѣтныхъ листьевъ или простыхъ прицвѣтниковъ, которые не длиннѣе колосковъ . . . . . 13.

13. Листья жесткіе, зеленые; стебель твердый, торчащій, явственно-3-гранный; плоды въ колоскахъ, п. к. м. зрѣлые, растопыренные, вытянуты въ 6. м. длинный носикъ, буроватые, какъ и яйцевидныя чешуйки, которыя короче плодовъ . . . . . 14.

Листья мягкіе, блѣдно-зеленые; стебель тонкій, обыкновенно слабый, гладкій, только вверху немного шероховатый; плоды прижатые, съ короткимъ носикомъ или вовсе безъ носика, на внутренней сторонѣ менѣе выпуклые, чѣмъ на наружной . . . . . 15.

14. Стебель гладкій, только вверху шероховатый; колосковъ 3 - 5, почти шаровидныхъ, съ звѣздчато-растопыренными плодами, яйцевидными, плоско-выпуклыми, вытянутыми въ длинный 2-зубчатый носикъ. . . . .

звѣздчатая ос.—*C. stellulata* Good.

Стебель и листья по краямъ остро-шероховатые; колосковъ обыкновенно много (8 - 12), продолговатыхъ, свѣтло-бурыхъ; плоды въ зрѣлыхъ колоскахъ слегка оттопыренные, продолговато-ланцетные, 2-выпуклые, съ сильно выдающимися жилками на обѣихъ сторонахъ, и заостренные въ короткій носикъ . . . . . вытянутая ос.—*C. elongata* L.

15. Колосковъ 3 - 4, шаровидныхъ, съ небольшимъ числомъ плодовъ; плоды яйцевидно-эллиптическіе, тупые, вовсе безъ носика, полосатые, зеленые, зрѣлые бурѣющие; пленки почти бѣлыя, вдвое короче плода; корневище нѣсколько ползучее, рѣдко-дернистое . . . . .

плевельная ос.—*C. loliacea* L. <sup>1)</sup>.

Колосковъ обыкновенно болѣе 4 (5 - 7) съ значительнымъ числомъ плодовъ; плоды почти торчащіе, яйцевидно-продолговатые, слегка бороздчатые, съ короткимъ носикомъ; пленки яйцевидныя, лишь немного короче плодовъ, б. ч. бѣловатыя. . . . . 16.

16. Колоски продолговатые или яйцевидные, желтоватые, нижніе значительно отодвинутые; плоды почти плосковыпуклые, желтоватые, съ весьма короткимъ выемчатымъ носикомъ; пленки острые, блѣдныя, прозрачно-перепончатые, съ слабою среднею жилкою; листья сѣро-зеленые, верхніе почти такой же длины, какъ стебель . . . бѣловатая ос.—*C. canescens* L.

Колоски почти шаровидные, всѣ или, по крайней мѣрѣ, нижніе нѣсколько удаленные; плоды сверху вздуто-выпуклые, снизу менѣе выпуклы, съ короткимъ 2-зубчатымъ носикомъ, зеленоватые, и тогда пленки свѣтлыя, или же плоды буроватые, съ такими же пленками, тонко-заостренными; листья часто въ половину длины стебля . . . спутанная о.—*C. vitilis* Fr. <sup>2)</sup>.

17 (2). Прицвѣтные листья съ длиннымъ влагалищемъ, либо вовсе безъ пластинокъ, либо съ короткою пластинкою не длиннѣе колоса; всѣ женскіе колоски на ножкѣ, раздвинутые, тонкіе, линейные или узко-цилиндрическіе, малоцвѣтные съ рѣдкими цвѣтками и плодами; корневище только вверху съ пучкомъ плоскихъ жесткихъ листьевъ . . . . . 18.

Прицвѣтные листья безъ влагалища или съ короткимъ влагалищемъ, обыкновенно съ зеленою пластинкою; женскіе колоски широкіе, длинные, цилиндрическіе или толстые, округлые, всегда плотные, съ большимъ числомъ цвѣтковъ и плодовъ . . . . . 22.

<sup>1)</sup> Въ Раменскомъ, Бронницкаго уѣзда, въ сыромъ лѣсу.

<sup>2)</sup> Подъ Москвою, по торфянымъ болотамъ.



18. Плоды пушистые; мужской колосок линейный; верхний женский перерастает его . . . . . 19.

Плоды голые; мужской колосок булабовидный; женские значительно отодвинуты от мужских, узко-цилиндричные; корневище съ ползучими побѣгами; прицвѣтные листья зеленые . . . . . 20.

19. Цвѣточные стебли слегка шероховатые, поднимаются из пазухи густаго пучка листьевъ, окруженныхъ при основаніи краснобурими чешуйчатыми влагалищами; влагалища прицвѣтныхъ листьевъ краснобурья, расширенныя, тупо-закругленныя, косо-срѣзанныя, съ тонкимъ острымъ кончикомъ; корневище короткое, дернистое . . . . . пальчатая ос.—*C. digitata* L.

Цвѣточные стебли остро-шероховатые выходятъ изъ середины пучка листьевъ, безъ чешуйчатыхъ влагалищъ при основаніи ихъ; влагалища прицвѣтныхъ листьевъ зеленые, только на краю красновато-пленчатые, нижнее вытянуто въ остріе; корневище ползучее, почти деревянистое . . . . . стоповидная ос.—*C. pediformis* C. A. Mey.

20. Листья по краямъ рѣсничные и снизу мягковолосные; широколинейные, не короче стебля; цвѣточный стебель одѣтъ внизу свѣтлобурими влагалищами съ короткою пластинкою; прицвѣтные листья съ пластинкою такой же длины, какъ и влагалище; плоды шаровидно-эллиптические съ выдающимися жилками, заостренныя въ довольно длинный 2-зубчатый носикъ; пленки длиннѣе, по краямъ бурья . . . . . волосистая ос.—*C. pilosa* Scop.

Листья голые, короче стебля; колоски рѣдкіе, продолговатые или коротко-цилиндричные, торчащіе, плоды шаровидно-овальные, съ короткимъ носикомъ, не раздвоеннымъ на 2 зубца . . . . . 21.

21. Цвѣточный стебель при основаніи съ пучкомъ короткихъ сизыхъ листьевъ; прицвѣтные листья съ зеленою пластинкою; нижній съ пластинкою, превышающею свой колосокъ; плоды съ замѣтными жилками, заостренныя въ короткій, толстый, тупой носикъ; пленки яйцевидныя, чернобурья, съ бѣловатымъ ободкомъ . . . . . просеяная о.—*C. panicea* L. <sup>1)</sup>.

Цвѣточный стебель покрытъ при основаніи влагалищами съ короткою зеленою пластинкою; нижній прицвѣтный листъ безъ пластинки, доходитъ концомъ влагалища только до основанія своего колоска; плоды безъ замѣтныхъ жилокъ, заостренныя въ нѣсколько удлинennyй, на верхушкѣ косою и выемчатый носикъ; пленки безъ бѣлаго ободка . . . . . влагалищная о.—*C. vaginata* Tausch <sup>2)</sup>.

22 (17). Женскіе колоски шаровидные, овальные, продолговатые . . . 23.

Женскіе колоски длинно-цилиндрическіе; плоды голые . . . . . 34.

23. Плоды безъ носика или съ короткимъ носикомъ, б. ч. усѣченнымъ . . . 24.

Плоды съ длиннымъ, 2-зубчатымъ носикомъ . . . . . 31.

24. Плоды голые; нижніе колоски на длинной ножкѣ; прицвѣтные листья длинныя, зеленые . . . . . 25.

Плоды пушистые; всѣ колоски сидячіе или только нижніе на короткой ножкѣ; прицвѣтные листья короткіе . . . . . 26.

25. Желто-зеленые широко-линейные листья и ихъ влагалища покрыты рѣдкими волосками; нижній прицвѣтный листъ длиннѣе всего колоса; женскіе колоски продолговатые, на ножкахъ, почти торчащихъ; плоды продолговато-

1) Подъ Москвою—Сокольники, Косино, на сырыхъ луговинахъ.

2) Подъ Москвою—въ Серебряномъ бору, за Хорошовымъ.

эллиптические, лоснящиеся, тупые, без носика, длиннѣ острыхъ пленокъ.  
блѣдная ос.—*C. palléscens* L.

Сѣро-зеленые, очень узкіе и вдоль складчатые листья и ихъ влагалища голые; прицвѣтные листья щетинисто-линейные, короче всего колоса; женскіе колоски овальные, поникшіе, подъ конецъ висячіе; плоды чечевицеобразные, сплюснутые, эллиптические, съ 5 жилками на спинкѣ и съ короткимъ, но замѣтнымъ носикомъ, короче яйцевидныхъ заостренныхъ пленокъ; корневище ползучее съ побѣгами . . . . . илистая ос.—*C. limòsa* L. <sup>1)</sup>.

26. Корневище длинное, ползучее, съ побѣгами; листья жесткіе, согнутые, короткіе, рѣдкимъ пучкомъ; прицвѣтные листья очень короткіе, пленчатые; нижній короче своего колоска . . . . . 27.

Корневище короткое, дернистое или коротко-ползучее; листья мягкіе или плотные, но не жесткіе, торчащіе, прямые, — большимъ пучкомъ; нижній прицвѣтный листъ почти всегда длиннѣ своего колоска . . . . . 28.

27. Женскіе колоски овальные, сближенные и прижатые къ самому мужскому колоску; пленки обратно-яйцевидныя, тупыя, бурныя, съ широкимъ бѣловатымъ ободкомъ, спереди бахромчатымъ; плоды съ короткимъ усѣченнымъ носикомъ; мужской колосокъ тонко-булавовидный, бурый . . . . .  
пустырная ос.—*C. ericetòrum* Poll.

Женскіе колоски яйцевидно-продолговатые; нижній отодвинутъ отъ остальныхъ и часто на короткой ножкѣ; пленки яйцевидныя, острыя, съ узкимъ бѣлымъ ободкомъ или безъ ободка; носикъ плодовъ слегка выемчатый; мужской колосокъ широко-булавовидный, краснобурый . . . . .

ранняя ос.—*C. praesox* Jacq. <sup>2)</sup>.

28. Женскіе колоски сближенные и прижатые къ мужскому . . . . . 29.

Нижній женскій колосокъ отодвинутъ отъ верхняго, на короткой ножкѣ . 30.

29. Женскихъ колосковъ б. ч. 2, округло-овальныхъ; нижній съ прицвѣтнымъ листомъ обыкновенно короче колоска; плоды продолговато-обратно-яйцевидные, яркозеленые, длиннѣ обратно-яйцевидныхъ остроконечныхъ чернобурыхъ пленокъ; мужской колосокъ цилиндрично-булавовидный; листья свѣтлозеленые на короткомъ корневищѣ, съ буровато-красными влагалищами, подъ конецъ переростають стебель . . . . .

горная ос.—*C. montàna* L. <sup>3)</sup>.

Женскихъ колосковъ б. ч. 3 (до 5), округлыхъ; нижній съ прицвѣтникомъ оттопыреннымъ длиннѣ колоска; плоды эллиптические, сѣроватые, короче пленокъ, продолговатыхъ, острыхъ, бурыхъ съ бѣлымъ ободкомъ; мужской колосокъ тонко-цилиндричный, книзу суженный; листья ярко-зеленые при основаніи съ свѣтлобурными влагалищами; плодоносные стебли пригнутые, длиннѣ листьевъ . . . . . пилюльная ос.—*C. pilulifera* L. <sup>3)</sup>.

30. Нижній прицвѣтный листъ оттопыренный, длиною почти съ весь колосъ; плоды почти шаровидные, съ едва замѣтнымъ носикомъ, бѣловатые, почти не длиннѣ бурыхъ острыхъ пленокъ; мужской колосъ тонко-цилиндричный; корневище ползучее, стебель остро-шероховатый, длиннѣ листьевъ

<sup>1)</sup> По торфянымъ болотамъ.

<sup>2)</sup> Подъ Москвою рѣдко (Останкино), по Окѣ часто—на лугахъ Серпуховскаго и Коломенскаго уѣздовъ.

<sup>3)</sup> По Окѣ—Вѣлые Колодези, Коломенскаго уѣзда.

<sup>3)</sup> Найдено въ прежнее время.

при основаніи съ краспобурными влагалищами; листья снизу сизоватые, узко-линейные . . . . . войлочная ос.—*C. tomentosa* L.<sup>1)</sup>

Нижній прицвѣтный листъ съ влагалищемъ и зеленою пластинкою, превышающею нижній колосокъ на ножкѣ, выступающей изъ влагалища; плоды грушевидные, съ замѣтнымъ 2-зубчатымъ носикомъ, буровато-зеленые, нѣсколько длиннѣе островатыхъ бурыхъ пленокъ; мужской колосокъ булавовидный; корневище короткое, дернистое; листья зеленые, длиннѣе плодоснаго стебля . . . . . тѣпистая ос.—*C. umbræsa* Horpe<sup>2)</sup>


31 (23). Плоды голые, вздутые, яйцевидные, длиннѣе пленокъ; нижній прицвѣтный листъ очень длинный, отогнутъ, съ короткимъ влагалищемъ . . . . . 32.

Плоды пушистые . . . . . 33.

32. Стебель острогранный, внизу съ чешуйчатыми влагалищами и съ короткими листьями только при его основаніи; женскихъ колосковъ 2-3, округло-овальныхъ; плоды оттопыренные, нижніе отклонены внизъ, сжужены въ длинный, шиловидный, отогнутый носикъ; пленки яйцевидно-ланцетныя, заостренные, бурья съ узкимъ бѣловатымъ ободкомъ, много короче плодовъ . . . . . желтая ос.—*C. flava* L.

Стебель тупогранный, книзу покрытъ листьями, которые длиннѣе стебля, съ небольшими чешуйчатыми влагалищами при основаніи его; женскихъ колосковъ 3-5, шаровидныхъ; плоды сжужены въ довольно короткій, б. ч. прямой носикъ и мало растопырены; пленки ихъ яйцевидныя, по краямъ бурья, немного короче плодовъ . . . . . Эдерова ос.—*C. Oederi* Ehrh.<sup>3)</sup>

33. Листья яркозеленые, широколинейные, плоскіе; нижній прицвѣтный листъ съ длиннымъ влагалищемъ; плоды яйцевидно-конические о многихъ жилкахъ, съ очень длиннымъ носикомъ (рис. 628, с), длиннѣе продолговато-овальныхъ пленокъ, снаружи пушистыхъ, стянутыхъ въ длинный кончикъ, на краю зазубренный (b) . . . опушенная ос.—*C. hirta* L.



(Рис. 628)

Листья сѣрозеленые, очень узкіе, желобчатые или складчатые; нижній прицвѣтный листъ съ очень короткимъ влагалищемъ или безъ

влагалища; плоды продолговато-овальные, вздутые, съ слабыми жилками, сжуженные въ носикъ не особенно длинный, не длиннѣе ланцетныхъ острыхъ пленокъ . . . . . нитевидная ос.—*C. filiformis* L.

34 (22). Плоды безъ носика или съ очень короткимъ, усѣченнымъ носикомъ; завязь о 2 рыльцахъ . . . . . 35.

Плоды съ длиннымъ, расщепленнымъ, 2-зубчатымъ носикомъ; завязь о 3 рыльцахъ . . . . . 38.

35. При основаніи цвѣточнаго стебля одни только листовыя влагалища безъ пластинки, сѣтчато-волокнистыя; выше нѣсколько вполне развитыхъ листьевъ, которые высыхая свертываются краями наружу; подземный стебель дернистый . . . . . 36.

При основаніи цвѣточнаго стебля вполне развитые листья съ пластинкою, влагалища ихъ цѣльныя; подземный стебель съ побѣгами . . . . . 37.

1) По Окъ—Бѣлопесочная слобода, Серпуховскаго уѣзда.

2) По Окъ—деревня Бычково, Серпуховскаго уѣзда.

3) Въ одномъ изъ гербаріевъ прежняго времени.

36. Листья сѣро-зеленые; всѣ влагалища ихъ сѣтчато-расщепленные; стебель только вверху шероховатый, твердый, прямой; плоды о 5 - 7 явственныхъ жилкахъ; б. ч. длиннѣ продолговато-ланцетныхъ пленокъ . . .

торчащая ос.—*C. stricta* Good.

Листья желтовато-зеленые; только нижнія влагалища ихъ темно-краснаго цвѣта сѣтчато-расщепленные; стебель до пизу шероховатый, тонкій, гибкій; плоды безъ жилокъ; длиннѣ тупыхъ пленокъ . . .

дернистая ос.—*C. caespitosa* L.

37. Листья сѣро-зеленые, обыкновенно высухая свертываются краями вутрь; нижнія влагалища бурья; стебель только вверху шероховатый; нижній прицвѣтный листъ не длиннѣ всего колоса; колоски коротко-цилиндрическіе, прямые, сидячіе или нижній на короткой ножкѣ; плоды только снаружи выпуклые, съ внутренней стороны плоскіе, длиннѣ яйцевидныхъ, тупыхъ пленокъ . . . обыкновенная ос.—*C. vulgaris* Fr.

Листья ярко-зеленые, высухая свертываются краями наружу; стебель по всей длинѣ шероховатый; нижній прицвѣтный листъ б. ч. длиннѣ всего колоса; колоски тонко-цилиндрическіе, отвисшіе, нижній б. ч. на ножкѣ, при основаніи съ рѣдкими цвѣтками; плоды съ обѣихъ сторонъ выпуклые; пленки продолговатыя, острыя . . . острая ос.—*C. acuta* L.

38 (34). Всѣ женскіе колоски на длинныхъ ножкахъ, повислые, удлинённые; мужской колосокъ 1; подземный стебель дернистый . . . 39.

Женскіе колоски сидячіе или только одинъ нижній на ножкѣ; мужскихъ колосковъ нѣсколько; подземный стебель ползучій . . . 40.

39. Женскіе колоски тонкіе, длинные, рѣдкіе, очень раздвинутые; прицвѣтный листъ съ длиннымъ влагалищемъ; плоды продолговато-эллиптическіе, гладкіе, безъ жилокъ, съ длиннымъ, тонкимъ, на краю гладкимъ носикомъ, немного короче ланцетныхъ, заостренныхъ пленокъ; стебель гибкій, гладкій . . . лѣсная ос.—*C. silvatica* Huds.

Женскіе колоски толстые, плотные, скученные въ видѣ зонтика; прицвѣтный листъ съ короткимъ влагалищемъ; плоды продолговато-ланцетные, съ жилками, лоснящіеся, вытянуты въ длинный носикъ, по краямъ зазубренный, нѣсколько длиннѣ линейно-шиловидныхъ, спереди зазубренныхъ пленокъ; стебель шероховатый съ острыми гранями . . .

сытевидная ос.—*C. Pseudocyperus* L.

40. Мужскіе колоски тонкіе; плоды вздутые, значительно длиннѣ туповатыхъ пленокъ; нижнія влагалища сѣтчатыя . . . 41.

Мужскіе колоски толстые, къ концамъ округленные, скученные; плоды не вздутые, многонервные; пленки ихъ ланцетныя, вытянуты въ тонкое, зазубренное по краямъ остріе; стебель остро-ребристый, вверху шероховатый, съ листьями сѣро-зелеными . . . 42.

41. Стебель съ тупыми ребрами, гладкій, б. ч. короче узкихъ, часто свернутыхъ сѣро-зеленыхъ листьевъ; плоды въ колоскахъ горизонтально оттопыренные, нижніе часто отогнутые, почти шаровидные, на спинкѣ о 7 жилкахъ, быстро стянуты въ сжатый длинный носикъ; пленки продолговатыя . . . бутыльчатая ос.—*C. ampullacea* Good.

Стебель съ острыми ребрами, вверху шероховатый; листья шире, плоскіе, ярко зеленые; плоды косо отклоненные, яйцевидно-коническіе, постепенно сужены въ довольно длинный носикъ; пленки ланцетныя . . .

пузырчатая ос.—*C. vesicaria* L.

42. Листовыя влагалища сѣтчато-расщепленные; женскіе колоски торчащіе, почти сидячіе; плоды продолговато-яйцевидные, сплюснuto 3-гранные; нижнія пленки въ мужскихъ колоскахъ тупыя, остальные—острыя. . . . .

болотная ос.—*C. paludosa* Good.

Листовыя влагалища цѣльныя; нижній женскій колосокъ б. ч. отодвинутъ, на довольно длинной ножкѣ, подъ конецъ отклоненъ; плоды яйцевидно-конические, съ обѣихъ сторонъ выпуклые, по краямъ округленные; всѣ пленки въ мужскихъ колоскахъ вытянуты въ острие . . . . .

береговая ос.—*C. riparia* Curt. 1).

95. *Carlina* L.—ролючники. Листья ланцетные, довольно жесткіе, выемчато-зубчатые, съ колючими зубцами, сверху зеленые, снизу покрыты пльями паутины, какъ и стебель; нижніе—сужены въ черешокъ; стеблевые—полустеблеобъемлющіе; верхніе—прижатые къ корзинкамъ, въ видѣ прицвѣтничковъ; корзинки довольно крупныя, по нѣскольку расположены щиткомъ; паружныя чешуйки обертки по краямъ съ вѣтвистыми шипами, почти 2-перисто-раздѣльныя, короче внутреннихъ, линейно-ланцетныхъ, колючихъ, до середины щетинисто-рѣсничныхъ, соломенно-желтаго цвѣта . . . . . (обыкновенный) ролючникъ—*C. vulgaris* L.


96. *Carum* L.—тминъ. Корень веретенообразный; стебель ребристый, вѣтвистый, голый, какъ и листья; оба нижнихъ листочка перисто-много-разрѣзныхъ листьевъ скрещиваются при основаніи влагалищаго листового черешка . . . . . тминъ—*C. Carvi* L.

97. *Cassandra* Don — кассандра. Цвѣтки на очень короткихъ ножкахъ образуютъ скученную одностороннюю кисть на нижней сторонѣ вѣтвей, покрытыхъ листьями; чашечка блѣдно-зеленая, большая; вѣнчикъ бѣлый; листья продолговатые, съ слегка загнутымъ краемъ, покрыты бѣлыми чешуйками, снизу ржавчиннаго цвѣта . . болотный верескъ—*C. calyculata* Don 2).

98. *Catabrosa* P. B. — катаброза. Корневище ползучее, съ побѣгами; стебель поднимающийся, гибкій, голый, какъ листья и ихъ влагалища; листья довольно широкіе, быстро стянутые въ кончикъ или тупые; метелка развѣсистая, съ очень тонкими, гладкими, отклоненными цвѣтоносами . . . . .

(водяная) катаброза—*C. aquatica* P. B.

99. *Caulinia* Willd.—каулинія. Жесткія подводныя травы, съ вильчато-вѣтвистымъ стеблемъ, укореняющимся своими нижними узлами; листья безъ жилокъ въ ложной 3-листной мутовкѣ, узколинейныя, шиповато-мелко-зубчатые (рис. 629); цвѣтки ложно-пазушные, сближенные по нѣскольку, однополые (а, б); околоцвѣтникъ мужскаго цвѣтка перепончатый, на верхушкѣ зубчатъ (а); пыльникъ вскрывается на верхушкѣ; орѣшекъ веретенообразный, тонко-заостренный, съ остающимися столбиками . . . . .



(Рис. 629).

(ломкая) каулинія—*C. fragilis* Willd. 3).

100. *Cenolophium* Koch — пусторебришники. Стебель ребристый, го-

1) Близъ Глубокаго озера, Рузскаго уѣзда.

2) По торфянымъ болотамъ.

3) Въ озерахъ по Клязьмѣ, близъ Каргашина, Московскаго уѣзда, а также у острова на Окѣ, противъ Бачманова, Коломенскаго уѣзда.

лый; листья перисто 3-сложные; общие черешки их угловато изогнутые и оттопыренные, как и частные черешки; листочки глубоко-перисто-раздѣльные; верхніе чаще 3 (2)-раздѣльные; доли почти линейныя, острокопечные; многостыныя обертчкы изъ линейно-шмловидныхъ листочковъ. . . .  
(Фишеровъ) пусторелышникъ—*C. Fischeri* Koch<sup>1)</sup>.

**101. Centauria L.—васильки.**

1. Стеблевые листья цѣльные, иногда только выемчатые. . . . . 2.  
Стеблевые листья перисто-разсѣченные, съ долями, почти горизонтально растопыренными; чешуйки обертки на верхушкѣ и по краямъ съ гребенчато-бахромчатою каймою . . . . . 4.

2. Листья узкіе, линейно-ланцетные; верхніе—вполнѣ цѣльнокрайніе; чешуйки обертки съ узкою и тонкою пильчато-бахромчатою каймою (рис. 630, а); краевые ворончатые цвѣтки (b) голубые, срединные—трубчатые (c) лиловые; хохолокъ такой же длины, какъ сѣмянка (d). . . . голубой в.—*C. Cyanus* L.

Листья б. м. широкіе, продолговатые, широкооватые отъ короткихъ волосковъ; чешуйки обертки на верхушкѣ съ пленчатомъ придаткомъ, цѣльнымъ или мелко-расщепленнымъ; цвѣтки лилово-красные, рѣдко бѣлые; хохолокъ много короче сѣмянки . . . . . 3.

3. Листья ланцетные, сидячіе, цѣльнокрайніе или съ рѣдкими зубцами; чешуйки обертки совсѣмъ прикрыты прижатыми пленчатыми придатками ихъ, округлыми, выпуклыми, цѣльными, расщепленными или на нижнихъ пленкахъ гребенчато-бахромчатыми; хохолокъ очень короткий, опадающій, или его вовсе нѣтъ. . . . . лиловый в.—*C. Jascea* L.


Листья яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, по краямъ зубчатые; придатки у чешуекъ длиннѣе самихъ чешуекъ, щетинисто-перистые, отогнутые; верхнія щетинки ихъ раздвинуты, нижнія—сближены; придатки верхняго ряда чешуекъ пленчатые, почти округлые, бахромчато-расщепленные, выступаютъ надъ остальными; хохолокъ втрое короче сѣмянки . . . . . фригійскій в.—*C. Phrygia* L.

4 (1). Стебель и вѣтви въ верхней части безлистные; листовыя доли широко-линейно-ланцетныя; корзинки крупныя, съ оберткою шаровидно-яйцевидною, чешуйки ея почти безъ выдающихся ребрышекъ; хохолокъ почти такой же длины, какъ и сѣмянка; корневище у основанія стебля волокнисто-хохлатое . . . . . чесоточный в.—*C. Scabiosa* L.

Листья покрываютъ всѣ вѣтви и подходятъ подъ самыя корзинки; листовыя доли узко-линейныя или ланцетно-линейныя; корзинки мелкія, съ яйцевидно-продолговатою оберткою; чешуйки съ выдающимися ребрышками; хохолокъ въ половину короче сѣмянки; цвѣтки блѣднолиловые . . . . .

Биберштейновъ в.—*C. Biebersteinii* DC.<sup>2)</sup>

**102. Centunculus L.—низянки.** Голая, очень маленькая травка, съ листьями округло-яйцевидными, заостренными, на короткихъ черешкахъ;



(Рис. 630).

<sup>1)</sup> По берегамъ Оки и Москвы рѣки, на галымныхъ гексахъ.

<sup>2)</sup> По берегу Оки.




пазушные цвѣтки, бѣлые или розовые, на очень короткихъ ножкахъ; доли чашечки линейно-ланцетныя, длиннѣ вѣнчика (рис. 631, а) и нѣсколько длиннѣ коробочки (с) . . . . . (мелкая) низмянка—*C. minimus* L. <sup>1)</sup>.

### 103. *Cerastium* L.—ясколки.

а. Листья широкіе, овальные или эллиптическіе; лепестки лишь нѣсколько длиннѣ чашелистиковъ (рис. 632); прицвѣтники и чашечка по краямъ пленчатые . . . . . заурядная я.—*C. triviale* Link.

б. Листья узкіе, ланцетно-линейные или линейные, съ пучками листьевъ въ пазухахъ; лепестки вдвое длиннѣ чашелистиковъ, вѣнчикъ ворончато-колокольчатый; прицвѣтники и чашелистики съ широкимъ пленчатымъ краемъ . . . . . полевая я.—*C. arvense* L.



(Рис. 631).

(Рис. 632).

(Рис. 633).

(Рис. 634).

### 104. *Ceratophyllum* L.—роголистники.

а. Листья темно-зеленые, вильчато 1 - 2-раздѣльные на 2 - 4 линейныя доли съ частыми колючими зубцами (рис. 633, а); плодъ о 3 шипикахъ: 2 боковыхъ отогнуты книзу, макушечный не короче или немного длиннѣ плода (а) . . . . . потопленный р.—*C. demersum* L.

б. Листья свѣтло-зеленые, вильчато 3-раздѣльные на 5 - 8 ланцетныхъ долей, съ рѣдкими колючими зубцами на спинкѣ ихъ; плодъ съ однимъ только макушечнымъ шипикомъ, который много короче плода . . . . . подводный р.—*C. submersum* L. <sup>2)</sup>.

### 105. *Chaerophyllum* L.—бутени.

а. Листья перисто 2, 3-сложные; листочки крупныя, цѣльныя, яйцевидныя, заостренныя, пильчато-зазубренныя, съ короткими жесткими волосками, какъ и на всемъ стеблѣ; листочки обверточекъ широко-ланцетныя, рѣсничныя, въ числѣ 5 - 8; столбики растопыреныя, длиннѣ конической подушечки (рис. 634, а) . . . . . душистый б.—*C. aromaticum* L.

б. Листья перисто 3, 4-сложные; листочки глубоко-перисто-раздѣльные, съ острыми ланцетными долями, вдоль жилокъ и черешковъ съ рѣдкими волосками; доли верхнихъ листьевъ узколинейныя, почти нитевидныя; листочки обверточекъ на краю голые, въ числѣ 3 - 6; столбики отогнутыя, не длиннѣ подушечки; корень въ видѣ клубня . . . клубненосный б.—*C. bulbosum* L.

106. † *Chamagrostis* Borkh. — полевички. Мелкая, нѣжная, дернистая травка, съ узкими, вдоль складчатыми листьями, съ влагалищами почти до

1) Подъ Москвою—Раменки, по холмамъ.

2) Въ одномъ изъ гербаріевъ прежняго времени сохранились сомнительные экземпляры этого вида, безъ плодовъ.



верху замкнутыми и язычком довольно длинным; стебель нитевидный, гладкий. . . . . (мелкая) полевичка—† *Ch. minima* Borkh. <sup>1)</sup>.

**107 *Chelidonium* L.**—чистотѣлы. Стебель вѣтвистый, покрытый, какъ и листья, рѣдкими волосками; листья пѣжные, снизу сѣрозеленые, глубоко-перисто-раздѣльные; тычинковыя нити къ верхушкѣ утолщенныя . . . . . (большой) чистотѣлъ—*Ch. majus* L.

**108. *Chenopodium* L.**—марь.

1. Листья съ сердцевиднымъ основаніемъ, яйцевидно-треугольные, глубоко выемчато-зубчатые, съ заостренными зубцами, вытянуты въ длинный кончикъ; ложные колосы метельчатые, безлистные, съ отходящими вѣтвями; плоды ямчато-точечные, съ тупымъ краемъ, лежащіе въ околѣвѣтніи плоскою стороною—горизонтальные. . . . . свиная лебеда—*Ch. hybridum* L.

Листья при основаніи копьевидные или клиновидные . . . . . 2.

2. Нижніе и средніе листья треугольные съ копьевиднымъ основаніемъ, сверху лопнящіеся . . . . . 3.

Всѣ листья съ клиновиднымъ основаніемъ, суженнымъ къ черешку . 4.

3. Листья цѣльнокрайніе, на длинныхъ черешкахъ; цвѣточные клубочки скучены вверху стебля въ коническій безлистный сложный колосъ; всѣ плоды вертикальные . . . . . моралки—*Ch. Bonus Henricus* L.

Листья выемчато-зубчатые, съ расходящимися заостренными зубцами; ложные колосы въ метелкѣ почти безлистной, съ прямо-торчащими цвѣтоносами, прижатыми къ стеблю; плоды горизонтальные . . . . .

городская м.—*Ch. urbicum* L.

4. Листья клейкіе, съ мягкими железистыми волосками, перисто-лопастные, съ тупыми лопастями; назушные ложные колосы въ вытянутой кисти; плоды горизонтальные съ тупымъ краемъ; трава пахучая . . . . .

курчавая м.—† *Ch. Botrys* L. <sup>2)</sup>.

Листья безъ железистыхъ волосковъ, выемчато-зубчатые или цѣльнокрайніе . . . . . 5.

5. Всѣ или, по крайней мѣрѣ, верхніе листья цѣльнокрайніе; плоды горизонтальные . . . . . 6.

Всѣ листья выемчато-зубчатые, плоды частью горизонтальные, частью вертикальные . . . . . 8.

6. Плодоносная чашечка растопыренная, не охватываетъ плода; всѣ листья цѣльнокрайніе, нижніе—яйцевидные, на длинномъ черешкѣ; верхніе продолговатые или ланцетные . . . . . мелкая лебеда—*Ch. polyspermum* L.

Плодоносная чашечка прижатая къ плоду и закрываетъ его; листья яйцевидно-ромбическіе. . . . . 7.

7. Листья широко-ромбическіе, длиною едва превышаютъ ширину, мелкіе, длинно-черешковые, всѣ вполнѣ цѣльнокрайніе, покрыты сѣрымъ мунистымъ налетомъ, вонючіе; стебель съ лежащими вѣтвями . . . . . вонючая м.—

*Ch. Vulvãria* L. <sup>3)</sup>.

Листья удлинненно-ромбическіе, длиною вдвое превышаютъ ширину, б. ч. съ мелкими неровными зубцами, только продолговатые верхніе всегда цѣльнокрайніе . . . . . бѣлая м.—*Ch. album* L.

8 (5). Листья снизу покрыты сѣрымъ мунистымъ налетомъ; сверху тем-

<sup>1)</sup> Указано въ прежнее время.

<sup>2)</sup> и <sup>3)</sup> Найдено было въ прежнее время.

нозеленые; продолговато-овальные, б. ч. тупые, съ удаленными выемчатыми зубцами; клубочки въ безлистныхъ ложныхъ колосьяхъ; плоды съ острымъ краемъ, б. ч. горизонтальные, немногіе вертикальные; цвѣтки б. ч. 4-ные

..... сизая м.—*Ch. glaucum* L.

Листья снизу зеленые, сверху лоснящіеся, острые или заостренные, б. ч. копьевидно 3-лопастные; клубочки въ ложныхъ колосьяхъ, покрытыхъ листьями; плоды съ тупымъ краемъ; одни вершинные цвѣтки въ клубочкахъ 5-ные съ горизонтальнымъ плодомъ, остальные съ околоцвѣтникомъ 9 3 (2) доляхъ, обь 1, 2 тычинкахъ и съ плодомъ вертикальнымъ

красная м.—*Ch. rubrum* L.

**109. Chimophila Pursh**—зимолюбки. Листья въ мутовкѣ продолговато-ланцетные, кожистые, къ верхушкѣ шире и пильчато-зазубрены, къ клиновидному основанію цѣльнокрайніе; доли чашечки округло-яйцевидныя, тупыя, зазубренныя; вѣнчикъ плоско-колокольчатый (рис. 635); тычиночныя нити у 3-граннаго основанія расширены, кверху шиловидныя; пыльники съ рожками



(Рис. 635).

(зонтичная) зимолюбка—*Ch. umbellata* Nutt.<sup>1)</sup>

**110. Chorispora DC.**—раздѣльносѣмянники. Стебель и листья съ короткими и железистыми волосками; нижніе листья выемчато-крупно-зубчатые; стеблевые рѣдко-зубчатые, продолговатые; членистые стручки на короткихъ оттопыренныхъ ножкахъ, слегка согнутые


(нѣжный) раздѣльносѣмянникъ—*C. tenella* DC.<sup>2)</sup>

**111. Chrysosplenium L.**—селезеночники. Стебель маленький, ребристый, съ нитевидными побѣгами; листья очередные, скучены только внизу и вверху стебля, блѣднозеленые, на длинныхъ черешкахъ, округло-почковидные, выемчато-городковые

(очереднолистный) селезеночникъ—*Ch. alternifolium* L.

**112. Cichorium L.**—цикорій.

а. Трава съ жесткими волосками; нижніе листья выемчато-перистораздѣльные, съ большою острою конечною долею; верхніе—ланцетные, въ половину охватываютъ стебель расширеннымъ основаніемъ; хохолокъ во много разъ короче сѣмянки (рис. 636, б)



цикорій—*C. Intybus* L.

(Рис. 636).

б. Трава почти голая; нижніе и средніе листья продолговатые, выемчато-зубчатые; верхніе широко-яйцевидные, вполне охватываютъ стебель сердцевиднымъ основаніемъ; хохолокъ вчетверо короче сѣмянки

..... эндивій—\* *C. Endivia* L.

**113. Cicuta L.**—вехи. Болотная трава съ длиннымъ, толстымъ корневищемъ, внутри полымъ, съ поперечными перегородками; 2, 3-перисто-сложные листья съ ланцетными пильчато-зубчатыми листочками

(ядовитый) вехъ—*C. viridula* L.

**114. Circaea L.**—колдунницы.

а. Цвѣточная кисть безъ прицвѣтничковъ; лепестки при основаніи округленные, длиною съ чашечку (рис. 637, а); плодъ обратно-яйцевидный,


<sup>1)</sup> По хвойнымъ лѣсамъ.

<sup>2)</sup> По заливному лугу р. Оки—Зиброво, Серпуховскаго уѣзда.

2-гнѣздный, съ частыми крючковатыми щетинками (b); листья тусклые; черешокъ ихъ безкрылый, сверху желобчатый . . . . .

колдунъ - трава—*C. lutetiāna* L.

b. Цвѣточная кисть съ шиловидными прицвѣтниками; лепестки при основаніи клиновидные; короче чашечки; плодъ продолговато-булавовидный, 1-гнѣздный, съ рѣдкими крючковатыми щетинками; листья лоснящіеся; черешокъ ихъ крылатый, сверху плоскій . . . . .



(Рис. 637).

# 115. *Cirsium* Tourn.—маточники.

1. Листья сверху гладкіе, по краямъ съ мягкими шипиками или рѣсничками . . . . . 2.

Листья сверху покрыты жесткими и короткими щетинками, по краямъ съ твердыми шипами . . . . . 5.

2. Стебель вверху почти безлистный и простой, съ довольно крупными одиночными шаровидными корзинками на длинной ножкѣ, съ прижатой оберткою; листья снизу съ бѣлымъ войлокомъ, ланцетные, средніе и верхніе сидячіе широкимъ сердцевиднымъ основаніемъ; нижніе сужены въ крылатый черешокъ; ползучіе подземные побѣги . . . . .

разнолистный м.—*C. heterophyllum* All.

Стебель до верху покрытъ листьями, вѣтвистый; корзинокъ много; листья снизу зеленые или съ рѣдкимъ паутинистымъ пушкомъ . . . . . 3.

3. Скученные корзинки окутаны широкими яйцевидными блѣдножелтоватыми прицвѣтными листьями; цвѣтки желтоватые; листья желтозеленые; стеблевые—охватываютъ стебель широкимъ основаніемъ; нижніе, въ очертаніи ланцетные, сужены въ крылатый черешокъ, перистораздѣльные съ яйцевидно-ланцетными долями; верхніе яйцевидно-ланцетные, выемчато-зубчатые . . . . . огородный м.—*C. oleraceum* Scop.

Корзинки безъ прицвѣтныхъ листьевъ, съ лилово-красными, рѣдко бѣлыми цвѣтками; листья яркозеленые, б. м. низбѣгающіе . . . . . 4.

4. Корзинки на короткихъ ножкахъ плотно скучены клубочками; стебель крылатый отъ сильно низбѣгающихъ листьевъ; листья въ очертаніи линейно-ланцетные, мягкіе, б. м. перисто-надрѣзные, съ 2, 3-лопастными долями; трубка вѣнчика короче отгиба; цвѣтки обоюполые; тычинки волосистые; хохолокъ короче вѣнчика . . . . . болотный м.—*C. palustre* Scop.

Корзинки на длинныхъ ножкахъ, расположены метелкою; листья лишь немного низбѣгающіе по стеблю, продолговато-ланцетные, шиповидно-рѣсничные, жесткіе; трубка вѣнчика въ нѣсколько разъ длиннѣе отгиба, цвѣтки однополые и корзинки 2-домныя; тычинки почти голыя; хохолокъ подъ конецъ втрое длиннѣе вѣнчика . . . . . полевой м.—*C. arvense* Scop.

5 (1). Стебель съ колючими крыльями отъ низбѣгающихъ листьевъ: снизу они съ сѣроватымъ паутинистымъ пушкомъ и съ краями слегка свернутыми; обертка яйцевидная, нѣсколько паутинистая; чешуйки ея ланцетно-шиловидныя, немного отогнутыя, съ твердою и довольно длинною колючкою . . . . . ланцетолистный м.—*C. lanceolatum* Scop.

Стебель не крылатый и листья не низбѣгающіе, снизу съ бѣлымъ войлокомъ и сильно свернутыми краями; обертка шаровидная; чешуйки ея ланцетныя, съ сильно отогнутою шиловато-рѣсничною верхушкою . . . . . 6.

6. Обертка покрыта густою паутиною; среднія чешуйки ея кверху расширены лопаткою съ колюче-острымъ кончикомъ; внутреннія—тонко-шило-

видныя, съ мягкимъ кончикомъ. . . . . шерстистый м. — *C. eridphorum* Scop. <sup>1)</sup>.

Обвертка голая; средняя чешуйки ея удлинено-ланцетныя, съ длинными рѣсничками; внутреннія съ тонкимъ отогнутымъ шиловиднымъ кончикомъ рѣсничный м. — *C. ciliatum* M. B. <sup>2)</sup>.

116. *Clematis* L. — ломоносы. Травя съ прямымъ, бороздчатымъ стеблемъ; перистые листья б. ч. о 7 яйцевидныхъ, заостренныхъ листочкахъ; листки околоцвѣтника продолговатые, тупые (рис. 638, а), на наружномъ краѣ пушистые . . . . .



(Рис. 638).

(прямой) ломоносъ — *C. recta* L. <sup>3)</sup>.  
117. *Clinopodium* L. — пахучки. Листья черешковые, яйцевидные, мягкіе, пушистые, снизу блѣдно-зеленые; верхніе — почти сидячіе и отогнутые; шиловидные прицвѣтники мохнатые, длиною съ чашечку, тоже мохнатую; вѣничекъ малиновый . . . . . (обыкновенная) пахучка — *C. vulgare* L.

118. *Cnidium* Cuss. — булдырники. Стебель тонкій, гладкій, только вверху слегка бороздчатый, простой; верхнія листовыя влагалища длинныя, плотно охватывающія стебель; 2, 3 - перистые листья съ узкими, линейными или ланцетно-линейными листочками, коротко заостренными; многolistная обверточка съ шиловидными листочками такой же длины, какъ и зонтички . . . . . жгуны - корень — *C. venosum* Koch.

119. *Cochlearia* L. — ложечники.


а. Стебель покрытъ частыми листьями; корневые — очень большіе, продолговатые, гороdkовые; средніе стебельные — гребенчато-перистые, верхніе ланцетные, по краямъ съ тупыми зубцами, сидятъ съжатымъ основаніемъ; макушечные — линейные, почти цѣльнокрайніе; плодоножки отклонены отъ цвѣтоноса, стручечки безъ срединной жилки на створкахъ . . . . .

хрѣнь — \* *C. Armoracia* L.

б. Стебель съ немногими листьями; корневые розеткою, на длинныхъ черешкахъ, округлые, цѣльнокрайніе; стеблевые слегка угловато-зубчатые, охватываютъ стебель сердцевиднымъ основаніемъ; плодоножки горизонтально оттопыренныя; стручечки съ продольною жилкою на каждой створкѣ . . . . .

лѣчебный л. — † \* *C. officinalis* L.

120. *Comarum* L. — сабельники. Корневище ползучее; стебель восходящій, вѣтвистый; верхніе листья 3-чатые, почти сидячіе; остальные пальчатые о 5 - 7 листочкахъ, черешковые; листочки продолговатые, пальчатые; снизу сизые, войлочныя; лепестки маленькіе, втрое короче чашечки (рис. 639) . . . . .



(Рис. 639).

(болотный) сабельникъ — *C. palustre* L.

121. *Conioselinum* Fisch. — гирчовники. Стебель извилистый, цилиндрическій, полосатый; листочки перисто 2, 3-сложныхъ листьевъ продолговатые, перисто-раздѣльные, съ долями перисто-надрѣзными или зазубренными, или

<sup>1)</sup> По Окѣ — Бачманово, Озерки, Коломенскаго уѣзда.


<sup>2)</sup> Въ прежнее время.

<sup>3)</sup> По берегу Оки.


же цѣльными; общая обертка падучая объ 1, 2 листкахъ; многolistныхъ частяхъ оберточки б. ч. односторонняя, повислая, съ щетинистыми листочками . . . . . (Фишеровъ) гирчевникъ—*C. Fischeri* Wimm. & Grab.

122. *Conium* L.—болитголовы. Стебель очень вѣтвистый, бороздчатый; листья перисто 3-сложные, съ полыми черешками и продолговатыми листочками, перисто-раздѣльными или надрѣзными; доли ихъ ланцетныя . . . . . (крапчатый) болитголовъ—*C. maculatum* L.


123. *Convallaria* L.—ландыши. Корневые листья эллиптические, острые; цвѣтоножки длиннѣе пленчатыхъ прицвѣтничковъ (рис. 640, а); цвѣтки пахучіе, внутри, въ мѣстѣ прикрѣпленія тычинокъ, съ лиловымъ пятномъ; ягоды ярко-красныя . . . . . (майскій) ландышъ—*C. majalis* L.



(Рис. 640).



(Рис. 641).



(Рис. 642).

124. *Convallulus* L.—вьюнки. Голая или слегка опушенная трава; листья продолговато-яйцевидные или ланцетные, при основаніи стрѣловидные или копьевидные; прицвѣтники линейные (рис. 641); чашечка почти до основанія раздѣлена на круглыя, тупыя или выемчатые доли, плотно облегающія яйцевидную, острую, голую коробочку; вѣнчикъ крупный, бѣлый или розовый, съ 5 розовыми полосками снаружы; пахучій . . . . . (полевой) вьюнокъ—*C. arvensis* L.

125. *Corallorrhiza* Hall.—ладьяны. Стебель тонкій, желто-зеленый, б. ч. съ 3 нѣсколько вздутыми листовыми влагалищами; кисть, рѣдкая; прицвѣтники много короче завязи; листочки околоцвѣтника острые, зеленоватые (рис. 642, а), наружные съ красновато-бурымъ кончикомъ; губа продолговатая, тупая, внизу клиновидная, сверху съ 2 продольными полосками и съ красными крапинами по срединѣ, слегка 3-лопастная, средняя лопасть выемчатая (с) . . . . . (приросшій) ладьянъ—*C. innata* R. Br. <sup>1)</sup>.

126. \**Coriandrum* L.—кишнецы. Стебель округлый, вверху вѣтвистый; нижніе листья перистые, съ округло-клиновидными листочками, перисто-надрѣзными; стеблевые листья перисто 2-сложные, съ перисто-раздѣльными листочками и узко-линейными долями . . . . . (посѣвный) кишнецъ—\* *C. sativum* L.

127. *Corispermum* L.—глопосѣмянники.

а. Орѣшки съ широкимъ крылатымъ ободкомъ, кверху уширеннымъ, по бокамъ зазубреннымъ, на верхушкѣ съ выемкою, въ срединѣ которой 2

<sup>1)</sup> Подъ Москвою—по торфянымъ болотамъ.

острыхъ кончика—оставшееся основаніе столбиковъ. . . . .

Маршаловъ к.—*C. Marschali* Stev. <sup>1)</sup>.

б. Орѣшки съ узкимъ ободкомъ, цѣльнокрайнимъ,верху не уширеннымъ, на верхушкѣ безъ выемки, съ 2 острыми кончиками (рис. 643—б, с).

. . . . . иссополистный к.—*C. hyssopifolium* Juss. <sup>2)</sup>.

**128. Cornus L.**—дерны.

1. Цвѣточный дискъ желтый; костянка черная; старыя вѣтви красной бурья, прямыя. . . . . кровянокрасный д.—*C. sanguinea* L. <sup>3)</sup>.


Цвѣточный дискъ оранжевый или красный, костянка бѣлая; старыя вѣтви отогнутыя. . . . . 2.

2. Оранжевый дискъ, подъ конецъ розовый; костянка синеваго-бѣлая; косточка косо-яйцевидная, съ 8 бѣлыми полосками; главный стебель прямой; старыя вѣтви кораллово-красныя. . . . .


сибирскій д.—\* *C. sibirica* Lodd.

Дискъ красный; костянка чисто бѣлая; косточка круглая, сверху нѣсколько сплюснутая, съ 2 бороздками по бокамъ; главный стебель лежачій, укореняющійся; вѣтви кровянокрасныя. . . . .

порослистый д.—\* *C. stolonifera* Michx.



(Рис. 643).



(Рис. 644).

**129. Coronilla L.**—вязели. Стебель поднимающійся, вѣтвистый, голый; прилистники свободные, ланцетные; перистые листья обь 11—21 продолговатыхъ листочкахъ; до 20 цвѣтковъ въ шаровидномъ зонтикѣ на длинномъ цвѣтоножѣ, длиннѣ листьевъ; цвѣтоножки втрое длиннѣ чашечной трубки; парусъ розовый; крылья и лодочка почти бѣлые, клювъ темно-красный. . . . . (пестрый) вязель—*C. varia* E. <sup>4)</sup>.

**130. Cortusa L.**—кортуза. Травя пушистая; длинно-черешковые листья сердцевидные, округлые, угловато-лопастные; лопасти съ неравными острыми зубцами. . . . . (Матиолева) кортуза — *C. Matthioli* L. <sup>5)</sup>.

**131. Corydalis DC.**—хохлатки.

а. Прицвѣтники клиновидные, пальчато-раздѣльные (рис. 644, а); плодоножки длиною со стручковъ; нижній листъ чешуевидный; клубень плотный. . . . . плотная х.—*C. solida* Sm.

б. Прицвѣтники яйцевидные, цѣльные; плодоножки втрое короче стручка; стебель о 2 листахъ, безъ чешуевиднаго нижняго листа; клубень внутри пустой. . . . . полая х.—*C. cava* Schweigg. & Koerte

<sup>1)</sup> и <sup>2)</sup> По Окъ, на береговыхъ пескахъ и песчаныхъ отмеляхъ.

<sup>3)</sup> По Пахрѣ, близъ Подольска; прежде—около Серпухова.

<sup>4)</sup> По берегу Оки.

<sup>5)</sup> По берегу Москвы рѣки—Григорово, Рузскаго уѣзда.

**132. *Corylus* L.**—лещины. Вѣтви сѣрыя съ 2-рядными листьями; молодая вѣтвь и короткіе листовые черешки съ железистыми шершавыми волосками (рис. 645); листья округлые, сердцевидные, заостренные, слегка угловато-лопастные, 2-зубчатые; плодовая обертка колокольчатая, раскрытая, съ листочками, разсѣченными на зубцы, немного длиннѣ орѣха . . .

орѣшникъ—***C. Avellana* L.**

**133. †\* *Cotoneaster* Med.**—кизильники. Листья яйцевидные, цѣльно-крайніе, сверху голые, снизу покрыты сѣрымъ войлокомъ; цвѣтоножки пушистыя; чашечная трубка голая, съ округлыми, спереди опушенными зубцами (рис. 646, а); плодъ повислый, голый, круглый (б) . . .

(обыкновенный) кизильникъ—†\* ***C. vulgaris* Lindl.**



(Рис. 645).



(Рис. 646).

**134. \* † *Crataegus* L.**—боярышники.

1. Листья пушистые; длинныя черешки ихъ, цвѣтоножки и большія зубчатая доли чашечки покрыты частымъ пухомъ и железистыми волосками; столбиковъ 5; колючки длинныя, твердыя, согнутыя . . .

ярко красный б.—\* ***C. coccinea* L.**

Листья б. ч. голые, только иногда вдоль жилокъ и по краямъ пушистые; железистыхъ волосковъ нѣтъ; столбиковъ не болѣе 3. . . . . 2.

2. Листья зубчатые или слабо лопастные, съ острыми зазубринами. . . . . 3.

Листья глубоко-лопастные или надрѣзные, съ острыми зубцами . . . . . 4.

3. Листья вдоль края и жилокъ и листовой черешокъ съ рѣдкими длинными волосками; цвѣтки съ отвороченными долями чашечки, о 3 столбикахъ . . . . .

кровонокраанный б.—†\* ***C. sanguinea* Pall.**

Листья вполнѣ голые, кожистые, сверху лоснящіеся, темнозеленые; чашечка съ прямыми долями; столбиковъ 1 - 2; колючки очень длинныя, согнутыя . . . . . шпористый б.—\* ***C. Crus galli* L.**

4. Листья снизу свѣтло-зеленые; нижнія боковыя жилки изогнуты внутрь; цвѣтоножки голыя; зубцы чашечки короткіе, треугольные, на плодъ оттопыренные; столбиковъ 2 - 3; плодъ овальный, о 2 - 3 косточкахъ . . . . .

колючій б.—\* ***C. Oxyacantha* L.**

Листья снизу сѣро-зеленые; нижнія боковыя жилки отогнуты наружу; цвѣтоножки пушистыя; зубцы чашечки ланцетные, на плодъ отогнутые; столбикъ б. ч. 1; плодъ круглый обь 1 косточкѣ . . . . .

однопестичный б.—\* ***C. monogyna* Jacq.**

**135. *Crepis* L.**—скерды.

1. Всѣ листья корневые, тупые, розеткою; стрѣлка голая, съ корзинками, расположенными продолговатою метелкою; обертка ихъ слегка пушистая,



съ прижатыми наружными чешуйками; сѣмянки не сжуженныя, о 10 ребрышкахъ; корневище усѣченное . . . усѣченная с.—*C. praemorsa* Tausch. 1).

Стебель покрытъ листьями, заостренными или острыми; корзинки метельчатымъ щиткомъ; обертка густо покрыта волосами . . . . . 2.

2. Обертка съ сѣроватымъ пушкомъ и рѣдкими черными железистыми волосами; хохолокъ бѣлый, мягкій . . . . . 3.

Обертка безъ сѣраго пушка, но съ одними железистыми или одними щетинистыми волосами; хохолокъ сѣрый, ломкій . . . . . 4.

3. Верхніе стеблевые листья со свернутыми краями линейные; наружныя чешуйки обертки линейныя; внутреннія — ланцетныя, заостренныя (рис. 647, а); столбикъ бурый; сѣмянки бурныя о 10 ребрышкахъ, къ верхушкѣ вытянуты въ короткій шершавый носикъ (б) . . . . .

кровельная с. — *C. tectorum* L.

Верхніе стеблевые листья съ плоскими краями, ланцетные; наружныя чешуйки обертки тоже ланцетныя; внутреннія — продолговато-линейныя: всѣ тупыя; столбикъ желтый; сѣмянки желтыя о 12—15 ребрышкахъ, къ верхушкѣ сжуженныя . . . . . двулѣтная с.—*C. biennis* L. 2).

4. Стебель и листья голые; листья гладкіе, снизу сизые, явственно-зубчатые; корневые и нижніе сжужены въ черешокъ; стеблевые листья съ стѣловиднымъ основаніемъ, длинно-заостренныя; обертка съ черными железистыми волосами; сѣмянки о 10 ребрышкахъ . . . болотная с.—*C. paludosa* Moench.

Стебель и листья шершавые; листья морщинистые, мелкозубчатые; нижніе сжужены въ короткій широко-крылатый зубчатый черешокъ, охватывающій стебель; средніе листья съ сердцевиднымъ основаніемъ; обертка съ щетинистыми волосами; сѣмянки о 25—30 ребрышкахъ . . . . .

сибирская с.—*C. sibirica* L. 3).


136. *Cucubalus* Tourm.—волдырники. Стебель очень вѣтвистый, шершавый, какъ и продолговатыя острые листья; цвѣтки зеленовато-бѣлые. . . (ягодный) волдырникъ—*C. baccifer* L.

137. \* *Cucumis* L.—огурцы. Листья 5-угольно-лопастные съ острыми неравно-зубчатыми лопастями, сердцевидные, съ глубокою узкою выемкою при основаніи; плодъ продолговатый, бугорчатый, съ зеленоватою или бѣловатою мякотью . . . . . (посѣвный) огурецъ—\* *C. sativus* L.

138. \* *Cucurbita* L.—тыквы. Листья слегка 5-угольно-лопастные, мелкозубчатые, сердцевидные, очень большіе; плодъ округлый или продолговатый, гладкій съ желтою мякотью . . . . . тыква — \* *C. Pepo* L.

139. *Cuscuta* L.—повилики.

а. Цвѣтки сидятъ въ кругловатыхъ клубочкахъ, въ пазухѣ прицвѣтничковъ; трубка колокольчатаго вѣничка почти равна отгибу (рис. 648—а, б); стол-



(Рис. 647).

1) Въ уѣздахъ: Рузскомъ (Красный станъ), Серпуховскомъ (Борисово) и Коломенскомъ (Бѣлые Колодези).


2) Указано въ прежнее время.

3) По Окѣ—Лужки, Серпуховскаго уѣзда; Бѣлые-Колодези—Коломенскаго уѣзда.

биковъ 2, свободныхъ, съ нитевидными рыльцами; коробочка яйцевидно-сферовидная (d) . . . . . европейская п.—*C. europaea* L.

b. Цвѣтки на короткихъ ножкахъ въ колосовидныхъ кистяхъ; трубка вѣнчика вдвое длиннѣе отгиба; столбикъ одинъ, много длиннѣе глубоко-2-лопастнаго рыльца; коробочка яйцевидно-коническая . . . . .

хмѣлевидная п.—*C. lupuliformis* Krock. <sup>1)</sup>.



(Рис. 648).

(Рис. 649).

(Рис. 650).

(Рис. 651).

#### 140. \**Cynara* L.—артишоки.

a. Чешуйки обертки яйцевидныя, выемчато-3-зубчатыя, мало-колючія (рис. 649), какъ и листовыя доли; корзинки съ очень мясистымъ ложемъ . . . . .

. . . . . артишокъ — \**C. Scòlymus* L.

b. Чешуйки обертки яйцевидно-ланцетныя, перетянутыя, съ большими колючками, какъ и листовыя доли; корзинки съ ложемъ мало мясистымъ . . . . .

. . . . . кардонъ — \**C. Cardunculus* L.

141. *Cynoglossum* L.—чернокорни. Стебель и листья покрыты мягкими, сърыми волосками; листья острые, продолговато-ланцетные: нижнiе вытянуты въ черешекъ; остальные съ полустеблеобъемлющимъ основанiемъ; завитки короткiе, плотные, метельчатые; плодоножки отогнутыя; плодовая чашечка широко-раскрытая (рис. 650, d); орѣшки окаймлены валикомъ; чешуйки въ зѣвѣ чернобурыя, волосистыя (b) . . . . .

(лѣчебный) чернокорень—*C. officinale* L.

142. *Cynosurus* L.—гребники. Желто-зеленый дернистый злакъ, со стеблемъ и влагалищами гладкими; листья узколинейные, съ короткимъ, усѣченнымъ язычкомъ; колосовидная метелка 2-рядная, однобокая, линейная, гребенчато-лопастная, съ общимъ цвѣтоносомъ изгибистымъ; только верхнiе колоски съ развитыми цвѣтками, остальные безплодые; ость нижней цвѣточной пленки короче ея . . . . . гребникъ—*C. cristatus* L.

143. *Cyperus* L.—сыти. Стебель остро-3-гранный, только при основанiи съ листьями плоскими, на краю нѣсколько шероховатыми, безъ киля, а вверху съ оберткою изъ 3 оттопыренныхъ листьевъ неравной длины, окружающею пучки продолговато-линейныхъ колосковъ (рис. 651); прицвѣтныя чешуйки темнобурыя, съ зеленымъ килемъ; тычинокъ 2; рылецъ 3 (a); орѣшекъ эллиптическiй, остро-3-гранный . . . . . (бурая) сить—*C. fuscus* L. <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> По Окъ—подъ Серпуховымъ; противъ Бачманова и Бѣлые-Колодези,—Коломенскаго уѣзда.

<sup>2)</sup> По берегу Москвы рѣки, близъ Угрѣвскаго монастыря.

**144. *Cypripedium* L. — башмачки.**

**а.** Стебель о 3-4 листахъ, о 2-3 (1) цвѣткахъ; лепестки заостренные; краснобурые, длиннѣ нижней округлой губы свѣтложелтаго цвѣта съ узкимъ устьемъ (рис. 652, а); наружные лепестки яйцевидно-ланцетные; боковые — ланцетно-линейные, оттопыренные, подъ конецъ скрученные (а); пыльники на ножкахъ (b; c). . . . . башмачекъ — *C. Calceolus* L.


**б.** Стебель о 2 листьяхъ (сухіе чернѣютъ) и обѣ 1 цвѣткѣ; верхній лепестокъ одинаковой длины съ губою, острый; нижній — зеленоватый, вдвое короче; остальные немного короче губы съ широкимъ устьемъ; боковые лепестки тупые, линейные, съ широкимъ основаніемъ; пыльники сидячіе; всѣ лепестки кромѣ нижняго розовые. съ бѣлыми крапинками; корневище ползучее . . . . . куропатка — *C. guttatum* Sm.



(Рис. 652).



(Рис. 653).



(Рис. 654).

**145. *Cystopteris* Bernh. — пузырники.** Корневище горизонтальное, толстое, короткое; черешокъ листьевъ лишь нѣсколько короче пластинки, въ очертаніи ланцетной, заостренной; нижняя пара перистыхъ листочковъ короче слѣдующихъ; вторичные листочки съ лопалями тупыми или съ тупыми зубцами (рис. 653). . . . . (ломкій) пузырникъ — *C. fragilis* Bernh.

**146. *Cytisus* L. — ракитники.**

**а.** Цвѣтки пазушные, по 2—3 на короткихъ цвѣтоножкахъ, съ кругловатымъ прицвѣтникомъ; чашечка трубчатая, до  $\frac{1}{3}$  двугубая, — трубка ея длиннѣ губъ; лодочка тупая; листья и сверху покрыты волосками . . . . .

двунцвѣтковый р. — *C. biflorus* L'Herit. <sup>1)</sup>

**б.** Цвѣтки въ длинныхъ, верхушечныхъ, торчащихъ кистяхъ о многихъ цвѣткахъ; цвѣтоножки съ длиннымъ линейнымъ прицвѣтникомъ; чашечка колокольчатая, глубоко 2-губая; лодочка заостренная клювомъ; листья сверху голые, на длинныхъ черешкахъ; сухіе чернѣютъ . . . . .

чернѣющій р. — \* *C. nigricans* L.

**147. *Dactylis* L. — ежи.** Листовыя влагалища сплюснуты, остро-шероховатые, какъ и листья; язычекъ продолговатый; цвѣтущая метелка треугольная, съ оттопыренными односторонними вѣтвями, по отцвѣтаніи сжатая; нижняя чашечная пленка обѣ 1 жилкѣ, верхняя — о 3-хъ (рис. 654, b); нижняя цвѣточная пленка о 5 жилкахъ; на спинкѣ щетинисто-рѣсничная (с), какъ и верхняя чашечная пленка (b). . . . .


(скученная) ежа — *D. glomerata* L.

<sup>1)</sup> Быково, Раменское — Бронницкаго уѣзда, и по Окѣ въ Серпуховскомъ уѣздѣ, на пескахъ.

148. *Daphne* L. — ягодки. Кора морщинистая, желтовато-сѣрая, съ буроватыми бородавками; листья снизу сѣро-зеленые, продолговатые, обратно-ланцетные, суженные въ черешокъ, туповатые; лопасти околоцвѣтника яйцевидныя, почти такой же длины, какъ и пушистая трубка (рис. 655—а, б): цвѣтки розовые, душистые; ягода ярко-красная . . . . .

волчье лыко—*D. Mezereum* L.

149. † *Datura* L. — дурманы. Листья черешковые, яйцевидные, заостренные, съ крупными выемчатыми зубцами; цвѣтки на короткихъ ножкахъ очень крупные; лопасти вѣника тонко-заостренные (рис. 656, а); коробочка торчащая, овальная съ отогнутымъ основаніемъ остающейся чашечки (б) . . . . . (вонючій) дурмань—† *D. Stramonium* L. <sup>1)</sup>.




(Рис. 655).




(Рис. 656).

150. *Daucus* L. — моркови. Стебель бороздчатый; листья въ очертаніи продолговатые, перисто 2, 3-сложные, съ перисто-раздѣльными тусклыми листочками и ланцетными, коротко заостренными долями; плодъ эллиптический, съ тонкими шипиками въ ширину плода (рис. 657) . . . . . морковь—*D. Carota* L. <sup>2)</sup>.



(Рис. 657).



(Рис. 658).



(Рис. 659).

151. *Delphinium* L. — живокости.

а. Вѣничекъ изъ 2 сросшихся лепестковъ; пестикъ <sup>1)</sup>; отклоненныя цвѣтоножки много длиннѣе нитевидныхъ цѣльныхъ прицвѣтниковъ (рис. 658, а);

1) По берегамъ Москвы рѣки—подъ Москвою и подъ Угръшами.

2) По берегамъ Пахры (Подольскъ), Москвы рѣки и Сѣверки—на известнякѣ.

кисть малоцвѣтная; листья многораздѣченные, съ линейными долями: стебель вѣтвистый; вѣтви раскинуты; цвѣтки ярко-синіе. . . . .

затяжная ж.—*D. Consolida* L.

б. Вѣтчикъ изъ 4 свободныхъ лепестковъ: оба верхнихъ со шпорцемъ; оба нижнихъ 2-надрѣзные, въ срединѣ бородастые (рис. 659); торчащія цвѣтоножки вверху съ 2. линейными прицвѣтниками; пестиковъ 3; кисть частая; листья пальчато 5-раздѣльные; доли ихъ 3-лопастныя, надрѣзанныя, продолговатыя или почти ромбическія; цвѣтки темно-синіе. . . . .


высокая ж.—*D. elatum* L.

## 152. *Deschampsia* P. B.—луговики.

а. Листья плоскіе, ярко-зеленые, сверху остро-шероховатые; метелка развѣсистая, широко пирамидальная, многоколосная, съ горизонтально расходящимися вѣтвями; цвѣтки съ остью почти прямою, не скрученную, бѣловатою, не длиннѣе нижней цвѣточной пленки, и не выступающею изъ колоска (рис. 660). . . . . щучка—*D. caespitosa* P. B.

б. Листья очень узкіе, въ видѣ щетинокъ, сѣро-зеленые; метелка въ очертаніи почти овальная, съ очень тонкими извилистыми вѣтвями, слегка отклоненными отъ общаго цвѣтоноса; цвѣтки съ колѣнчатой, скрученную остью, при основаніи буроватою, длиннѣе нижней цвѣточной пленки, и выступающею изъ колоска (рис. 661). . . . .

извилистый л.—*D. flexuosa* Trin. <sup>1)</sup>



## 153. *Dianthus* L.—гвоздики.

1. Лепестки зубчатые (рис 662, а), цвѣтки малиновые или розовые. . . 2.  
Лепестки перисто-многораздѣльные (рис. 665); цвѣтки бѣлые или лиловые, пахучіе . . . . . 5.

2. Стебель покрытъ короткимъ пушкомъ; нижніе листья продолговато-линейные, тупые, остальные линейные, острые; прицвѣтники отодвинуты отъ наружной чашечки изъ 2 чешуекъ, эллиптическихъ, шиловидно-остистыхъ (рис. 662.—а, б); цвѣтки б. ч. одиночные на длинныхъ ножкахъ . . . . . травянка—*D. deltoides* L.

Стебель голый или слегка шероховатый; всѣ листья острые; прицвѣтники плотно придвинуты къ наружной чашечкѣ изъ 4 - 6 овальныхъ чешуекъ; цвѣтки б. ч. скученные въ пучки, на короткихъ ножкахъ или сидячіе. . . 3.

3. Листья широко-ланцетные, къ основанію суженные почти въ чере

<sup>1)</sup> Серебряный боръ — за Хорошовымъ, и Петровское - Разумовское (подъ Москвою).

шокъ; цвѣточный пучекъ окруженъ такой же длины отогнутыми линейно-ланцетными, очень острыми зелеными прицвѣтниками; чешуйки наружной чашечки шиловидно-остистыя, вполне травянистыя, такой же длины, какъ вся чашечка съ зубцами (рис. 663).

бородатая г. — † *D. barbatus* L.

Листья узко-ланцетные или линейные, не суженные въ черешокъ; прицвѣтники короче цвѣтковь или пучковъ; чешуйки наружной чашечки остисто-заостренные, не длиннѣ чашечной трубки; и тѣ, и другія по краямъ пленчато-кожистыя.

4. Листья узко-линейные; влагалища ихъ вдвое длиннѣ ширины листьевъ, а у верхнихъ листьевъ въ 3 - 4 раза; листочки обвертки и чешуйки наружной чашечки кожистые, буроватые, съ широкимъ пленчатымъ краемъ, длиннѣ половины трубки чашечки, обыкновенно красно-бурой.

картезианская г. — *D. Carthusianorum* L. <sup>1)</sup>



(Рис. 664).



(Рис. 665).

Листья узко-ланцетные; влагалища не длиннѣ ширины листа; прицвѣтники ланцетно-шиловидные и чешуйки наружной чашечки съ травянистою остью (рис. 664).

Сегьерова г. — *D. Seguiéri* Vill.

5 (2). Листья линейно-ланцетные; нижніе — притупленные, остальные острые; прицвѣтники заостренные, коротко-остистые, вдвое короче чашечной трубки (рис. 665); лепестки блѣдно-лиловые.

пышная г. — *D. superbus* L.

Листья линейные, все острые; прицвѣтники усѣченные, съ острымъ кончикомъ, вчетверо короче чашечной трубки; лепестки бѣлые.

песчаная г. — *D. arenarius* L. <sup>2)</sup>

**154. † Digitalis L.** — наперстянки. Листья пушистые, ланцетные, неравно-пильчатые: нижніе сужены въ черешокъ, верхніе слегка стеблеобъемлющие; цвѣтки въ длинной, почти однобокой кисти, железисто-пушистой; доли чашечки ланцетныя, острия; вѣнчикъ свѣтло-желтый, съ бурыми сѣточатыми жилками: верхняя губа его тупая; лопасти нижней губы 3-угольныя (рис. 666).

(крупноцвѣтная) наперстянка — † *D. grandiflora* Lam. <sup>3)</sup>

**155. Digitaria Scop.** — пальчатки. Листья и влагалища ихъ голые; лож-

<sup>1)</sup> По Окъ, преимущественно на пѣскахъ.

<sup>2)</sup> и <sup>3)</sup> Найдено было въ прежнее время.

ныхъ колосевъ, пальчато расположенныхъ, 2 - 4; колоски яйцевидно-эллиптическіе, пушистые (рис. 667, b); нижней чашечной пленки б. ч. нѣтъ; верхняя такой же длины, какъ и колосокъ, о 3 - 5 жилкахъ; пленка неразвитаго цвѣтка б. ч. о 5 жилкахъ . . . . . (голая) пальчатка—*D. glabra* Röm. & Schult. <sup>1)</sup>.



(Рис. 666).



(Рис. 667).



(Рис. 668).

**156. Digraphis Trin.**—двукисточки. Стебель даетъ побѣги; листья широко-линейные, сизые, по краямъ шероховатые; язычекъ ихъ длинный, острый; обѣ наружныя чашечныя пленки въ колоскѣ ланцетныя, о 3 жилкахъ, вдоль жилокъ рѣсничныя (рис. 668); обѣ верхнія—маленькія, линейно-шиловидныя, волосистыя, много короче яйцевидной нижней цвѣточной пленки, лоснящейся, съ слабо-рѣсничнымъ килемъ. . . . . (тростниковый) двукисточникъ—*D. arundinacea* Trin



(Рис. 669).



(Рис. 670).

**157. Draba L.**—крупки.

а. Цвѣточные стебли покрыты мелкими и рѣдкими сидячими листьями; листья розетки яйцевидныя, суженныя къ основанію, зубчатые; лепестки (рис. 669, а) выемчатые, желтые; стручечки съ очень короткимъ столбикомъ (b), въ 2 - 3 раза короче плодоножекъ, почти горизонтальныхъ . . .

дубровная к.—*D. nemorosa* L.

б. Цвѣточные стрѣлки безлистные; листья розетки ланцетныя, цѣльные или зубчатые; лепестки (рис. 670, а) 2-раздѣльные, бѣлые; стручечки (b, c) отклоненныя отъ стебля . . . . . весенняя к.—*D. verna* L.

**158. Dracocérphalum L.**—змѣеголовники.

а. Мутовки на верхушкѣ стебля въ головчатомъ частомъ колосѣ; прицвѣтники яйцевидно-ланцетные; вѣнчикъ довольно крупный, п. к. м. вдвое

<sup>1)</sup> По прибрежнымъ пескамъ Клязьмы, Москвы рѣки, Оки.



длиниѣ чашечки (рис. 671. а); пыльники мохнатые; листья ланцетные, цѣльнокрайніе, съ свернутымъ краемъ, тупые, лоснящіеся, жесткіе . . .

Руишівъ з.—*D. Ruyschiana* L.


б. Мутовки въ пазухѣ верхнихъ листьевъ; прицвѣтники обратно-яйцевидные; вѣшникъ маленький; немного выдается изъ чашечки; пыльники голые; листья б. м. черешковые, мягкіе, пушистые; нижніе на длинныхъ черешкахъ, сердцевидные, крупно-городковые; стеблевые на короткихъ черешкахъ продолговато-ланцетные, нильчато-городковые; чашечка выше середины ссуженная и немного согнутая . . .

тимьяноцвѣтный з.—*D. thymiflorum* L.

### 159. *Drosera* L.—росянки.

а. Листья округлые, горизонтально отогнутые; стрѣлка втрое длиннѣ листьевъ (рис. 672). . . . . круглолистная р.—*D. rotundifolia* L. 1).

б. Листья продолговатые, мало отклоненные; стрѣлка вдвое длиннѣ листьевъ . . . . . англійская р.—*D. anglica* Huds. 2).



(Рис. 671).



(Рис. 672).



(Рис. 673).



(Рис. 674).

160. *Echinoclhoa* P. B. — иглицы. Голый сѣро-зеленый злакъ; листья безъ язычка; вѣтви колосовидной метелки и короткія цвѣтопожки остро-шероховатыя; колоски яйцевидно-эллиптическіе (рис. 673); нижняя чашечная пленка широко-яйцевидная, острая, о 3 жилкахъ; въ 2-3 раза короче второй продолговато-яйцевидной, заостренной, о 5 жилкахъ, и такой же третьей о 7 жилкахъ; цвѣточные пленки бѣловатыя, лоснящіеся . . . . .

иглица—*E. Crus galli* P. B.

161. *Echinops* L.—мордовники. Стебель и листья сверху съ липкимъ, железистымъ пушкомъ; листья снизу съ сѣрымъ войлокомъ: стеблевые—сидячіе, продолговатые, перисто-раздѣльные, съ 3-угольными колюче-зубчатыми долями; корневые ссужены въ черешокъ; верхніе—съ сердцевиднымъ основаніемъ стеблеобъемлющіе; внутреннія чешуйки оберточки каждаго цвѣтка железисто-пушистыя, вдвое длиннѣ наружныхъ чешуекъ, щетинисто-расщепленныхъ (рис. 674, а) . . . . .

(круглоголовый) мордовникъ—*E. sphaerocéphalus* L. 3).

162. *Echinospérmum* Sw.—липучки. Стебель и листья сѣро-зеленые съ жесткими волосками; нижние листья ссужены въ черешокъ, продолговато-ланцетные; верхніе—линейно-ланцетные; плодородная чашечка растопыренная

1) и 2) По торфянымъ болотамъ.

3) По Окъ, въ Серпуховскомъ и Коломенскомъ уѣздахъ.

(рис. 675, б), длиннѣ цветоножекъ, по отцвѣтаніи торчащихъ; орѣшки по краямъ съ 2 рядами щетинокъ, въ ширину орѣшковъ (б); вѣнчикъ свѣтло-голубой, немного длиннѣ чашечки, отгибъ его короче трубки (а) . . .

(репейная) липучка а—*E. Lappula* Lehm.


**163. Echiūm L.**—сипяки. Стебель и листья покрыты короткими волосками и рѣдкими длинными щетинками на бородавкахъ; листья обь 1 жилкѣ: корневые и нижніе продолговато-ланцетные, суженные въ черешокъ; стеблевые—узко-ланцетные, сидячіе широкимъ закругленнымъ основаніемъ; завитки односторонніе, узкіе, короткіе, скученные въ верхушечную метелку; вѣнчикъ ворончатый съ широкимъ отгибомъ; чашечка съ ланцетными долями (рис. 676); орѣшки острые; цвѣтки сначала розовые, потомъ голубые . . . (обыкновенный) сипякъ—*E. vulgare* L.




(Рис. 675).



(Рис. 676).



(Рис. 677).



(Рис. 678).

**164. \*Elaeagnus L.**—лохи. Молодые листья и вѣтви снизу съ ржавчинно бурными чешуйками; листья эллиптическіе, серебристые; цвѣтки по отцвѣтаніи отогнутые; ложная костянка округло-овальная, серебристая, съ мучнистою мякотью . . . (серебристый) лохъ—*E. argenteus* Pursh

**165. Elatine L.**—повойнички.

1. Листья мутовчатые, сидячіе: подводные, по 8 - 10, линейно-ланцетные, отогнутые; надводные—по 3 - 5, яйцевидные; цвѣтки 4-ные, о 8 тычинкахъ (рис. 677, а, б), зеленоватые; стебель толстый, сочный, полый, только внизу вѣтвистый; сѣмена слабо согнутыя . . .

мокришный п.—*E. Alsinastrum* L. 1).

Листья супротивные; стебель тонкій, нитевидный, ползучій, укореняющійся, очень вѣтвистый; цвѣтки розовые . . . 2.

2. Листья, по крайней мѣрѣ нижніе, съ черешкомъ не короче эллиптического отгиба; прилистники едва замѣтные; цвѣтки четверные, о 8 тычинкахъ; сѣмена подковообразныя . . .

водяной перецъ—*E. Hydro Piper* L. 2).

Листья почти сидячіе; прилистники яственные, зубчатые; сѣмена слегка согнутыя . . . 3.

3. Листья тусклые, темно-зеленые, волюнѣ цѣльпокрайніе; прилистники овально-ланцетные; чашечка 2-дольная, лепестковъ и тычинокъ 3 (рис. 678). . . . .

трехтычиночный п.—*E. triandra* Schk. 3).

Листья слегка лоснящіеся и просвѣчивающіе, ярко-зеленые, по краямъ и особенно на верхушкѣ слегка выемчатые; прилистники яйцевидные, острые; цвѣтки о 4 чашелистникахъ и 4 лепесткахъ, съ 4—6 тычинками . . .

болотниковый п.—*E. callitrichoides* Rupr. 4).

1) Подъ Москвою, близъ Воронцова, — за Калужской заставой.

2) 3) 4) Въ озерахъ—по низменнымъ, заливаемымъ берегамъ рѣкъ.

166. *Elodea* Rich. — болотницы. Листья въ мутовкахъ продолговатые или линейно-ланцетные, спереди суженные, заостренные, съ очень мелкими зубцами . . . (канадская) болотница—*E. canadensis* Rich. & Mich. <sup>1)</sup>.

167. † *Elshölzia* Willd.—шандры. Стебель и листья слегка пушистые; листья черешковые, яйцевидные, острые, къ основанію суженные, пильчато-городковые; ложные колосы метельчато скучены; 2-рядные прицвѣтные листья зеленые, широко-яйцевидные, шиповидно-заостренные, рѣсничные. . . (гребенчатая) шандра—† *E. cristata* Willd. <sup>2)</sup>.

168. *Epilobium* L.—кипрей.

1. Вѣнчикъ раскрытый, колесовидный, большой (рис. 679, а); лепестки на верхушкѣ почти цѣльные, малиновые, съ ноготкомъ; тычинки и столбикъ нагнутые; рыльца растопыренные; всѣ листья очередные, голые, снизу блѣднѣе, сѣтчатопервные, ланцетные; кисть длинная, вверху безлистная . . . Иванъ-чай—*E. angustifolium* L.

Вѣнчикъ ворончатый; лепестки на верхушкѣ 2-лопастные; тычинки и столбикъ торчащіе; нижніе листья супротивные, рѣдко мутовчатые; остальные очередные; кисть покрыта листьями. . . 2.

2. Листья стеблеобъемлющие, нѣсколько низбогающіе, продолговато-ланцетные, мохнатые, съ рѣдкими мелкими зубцами; стебель мохнатый, округлый, очень вѣтвистый, съ длинными оттопыренными волосками и короткими железистыми; цвѣтки крупные, темно-малиновые; рыльце звѣздчатое; чашечныя доли острые . . . мохнатый к.—*E. hirsutum* L.

Листья сидячіе или черешковые; цвѣтки мелкіе, розовые или бѣлые. . . 3.

3. Всѣ листья сидячіе, ланцетные или продолговатые, цѣльнокрайніе или рѣдко-зубчатые; стебель гладкій, мягко-пушистый . . . 4.

Всѣ или, по крайней мѣрѣ, нижніе листья черешковые, яйцевидные, остро-и неравно-зубчатые . . . 5.

4. Листья цѣльнокрайніе или слегка и рѣдко-зубчатые, ланцетные или линейно-ланцетные, съ клиновиднымъ основаніемъ, почти голые; рыльце булавовидное . . . болотный к.—*E. palustre* L.

Листья съ рѣдкими зазубринами, ланцетные или продолговатые, съ округленнымъ или суженнымъ основаніемъ, пушистые или коротко-мохнатые; рыльце звѣздчатое . . . мелкоцвѣтный к.—*E. parviflorum* Schreb. <sup>3)</sup>.

5. Стебель круглый, цилиндрический, съ прижатыми волосками; только нижніе листья коротко-черешковые; рыльце 4-раздѣльное; доли чашечки тупыя . . . горный к.—*E. montanum* L.

Стебель съ 2 или 4 выдающимися ребрышками; всѣ листья черешковые; рыльце булавовидное; доли чашечки острые . . .

розовый к.—*E. roseum* Schreb.


169. *Epipactis* Rich.—дремлики.

а. Корневище съ длинными междоузліями; нижніе листья продолговатые,

<sup>1)</sup> По заводамъ и прибрежнымъ озерамъ Оки; въ Сенежскомъ озерѣ.

<sup>2)</sup> Подъ Серпуховымъ (Владычный монастырь); прежде указывалось подъ Москвою.

<sup>3)</sup> Останкино—подъ Москвою.




(Рис. 679).

остальные — ланцетные; прицвѣтники короче цвѣтковь (рис. 680, а); губа почти такой же длины, какъ и остальные лепестки (а); передній членикъ ея плоскій, округлый, тупой, волнисто-городковый; задній — въ видѣ желобка, впереди съ 2 короткими 3-угольными лопастями (б) . . . . .


болотный д.—*E. palūstris* Crtz.

б. Корневище съ короткими междоузліями; нижніе листья широко-яйцевидные, верхніе яйцевидно-ланцетные; нижніе прицвѣтники не короче цвѣтка; губа короче остальныхъ лепестковъ: передній членикъ ея вогнутый, сердцевидно-яйцевидный, заостренный, съ отогнутымъ кончикомъ; задній — въ видѣ мѣшечка съ узкимъ устьемъ . . . . .

широколиственный д.—*E. latifolia* All.



(Рис. 680).



(Рис. 681).

## 170. Equisetum L.—хвощи.

1. Листовыя влагалища цилиндрическія, не длиннѣе своего поперечника, плотно охватываютъ сѣро-зеленый стебель, съ широкою полостью въ срединѣ; спороносный колосъ короткий, острый или заостренный, черный. . . . . 2.

Листовыя влагалища, ворончатые или колокольчатые, не плотно охватываютъ стебель (рис. 681, а), внутри съ узкою полостью; спороносный колосъ на верхушкѣ округленный или тупой (а) . . . . . 3.

2. Стебель шероховатый, глубоко-бороздчатый, зимующій, безъ вѣтвей; листовыя влагалища бѣловатыя, при основаніи съ чернымъ кольцомъ, только подъ самымъ колосомъ съ линейно-шиловидными зубцами; на остальномъ стеблѣ влагалища съ тупыми городками; колосъ остроконечный . . . . .

зимующій х.—*E. hiemale* L.

Стебель полосатый, часто вѣтвистый, не зимующій; всѣ влагалища зеленые, лоснящіеся, съ 15—30 треугольно-шиловидными черными зубцами, съ очень узкимъ бѣлымъ ободкомъ; колосъ заостренный, толстый и короткий . . . . . иловатый х.—*E. limosum* L.

3. Влагалища на стебляхъ, несущихъ колосъ, свѣтло-бурые, какъ и широкіе туповатые зубцы, въ числѣ 3—6; вѣтви, раздѣленные на боковыя вѣточки, очень тонкія, дугою отогнутыя внизъ, начинаютъ развиваться одновременно съ колосомъ . . . . . лѣсной х.—*E. silvaticum* L.

Влагалища на стебляхъ, несущихъ колосъ, зеленые или бѣловатыя, съ острыми или заостренными зубцами (рис. 681, а); вѣтви простыя, безъ боковыхъ вѣточекъ, или ихъ вовсе нѣтъ . . . . . 4.

4. Стебель глубоко-бороздчатый; зубцы влагалищъ зеленые, съ черными кончиками и широко-пленчатымъ бѣлымъ ободкомъ, въ числѣ 6—10;

вѣтви развиваются ранѣе колоса, черного, тонкаго, на длинной ножкѣ, внутри полой . . . . . болотный х.—*E. palustre* L.

Стебель гладкій или слегка бороздчатый; зубцы влагалищъ бурые, въ числѣ 12—20; вѣтви развиваются послѣ колоса бурого, толстаго, съ осью внутри не полой . . . . . 5.

5. Влагалища сине-зеленые, при основаніи зубцовъ съ темно-бурою поперечною полоскою, о 12—20 широко-ланцетныхъ, коротко-заостренныхъ зубцахъ, по краямъ свѣтло-бурыхъ, въ срединѣ съ темно-бурою полоскою; вѣтви развиваются послѣ колоса на томъ же стеблѣ . . . . .

луговой х.—*E. pratense* Ehrh

Влагалища двоякаго рода: на зеленыхъ вѣтвистыхъ стебляхъ, не несущихъ колоса, свѣтло-зеленыхъ, о 12—18 ланцетныхъ, острыхъ зубцахъ, черноватыхъ съ бѣлымъ ободкомъ; на красно-бурыхъ стебляхъ, несущихъ только колосъ, влагалища бѣловатыя, о 8—12 черновато-бурыхъ зубцахъ (рис. 681, а) . . . . . полевой х.—*E. arvense* L.

#### 171. *Erigeron* L.—мелколенестники.

а. Стебель и листья шершаво-пушистые; нижніе продолговатые, тупые, цѣльнокрайніе; корзинки средней величины; обертка съ прижатыми волосками; наружныя чешуйки ея вполне травянистыя; внутреннія по краямъ пленчатые; краевые цвѣтки внутреннего ряда трубчато-питевидные, — наружнаго ряда узко-язычковые; всѣ свѣтло-лиловые . . . . .

острый м.—*E. acer* L.

б. Стебель и листья жестко-щетиныстые; всѣ листья сужены къ верхушкѣ, щетинысто-рѣсничные; нижніе съ рѣдкими зубцами; корзинки очень мелкія, скученныя; обертка почти голая, чешуйки ея съ широкимъ пленчатымъ краемъ; всѣ краевые женскіе цвѣтки язычковые, бѣловатыя . . . . .

канадскій м.—*E. canadensis* L.

#### 172. *Eriophorum* L.—пушицы.

1. Только одинъ верхушечный, торчащій колосъ съ серебристо-сѣрыми переполчатыми, длинно-заостренными пленками; стебель вверху съ 1—2 вздутыми влагалищами безъ листового отгиба, внизу — съ пучкомъ питевидныхъ сѣро-зеленыхъ листьевъ, сверху желобчатыхъ, снизу—остро-килеватыхъ . . . . . влагалищная п.—*E. vaginatum* L. <sup>1)</sup>

Колосовъ нѣсколько, пучкомъ, подъ конецъ повислыхъ; всѣ стеблевые листья съ отгибомъ, ярко-или-желто-зеленые . . . . . 2.

2. Стебель округлый; ножки у 3—5 колосовъ гладкія; пленки яйцевидно-ланцетныя, острыя, обѣ 1 жилкѣ; листья узко-линейные, желобчато-килеватые; плодъ свѣтло-бурый, почти крылато 3-гранный, съ острымъ кончикомъ . . . . . узколистная п.—*E. angustifolium* Roth

Стебель 3-гранный; ножки у колосовъ шероховатыя; плодъ красно-бурый, тупо 3-гранный, безъ остраго кончика . . . . . 3.

3. Листья плоскіе, узко-ланцетные, заостренные; колосовъ 5—12; пленки продолговато-яйцевидныя, обѣ 1 жилкѣ . . . . .

широколистная п.—*E. latifolium* Hoppe

Листья 3-гранные, узко-линейные, слегка желобчатые; колосовъ 3—4; пленки яйцевидныя, внизу съ 5—7 жилками; стебель съ длинными ползучими побѣгами . . . . . тонкая п.—*E. gracile* Koch <sup>2)</sup>.

<sup>1) 2)</sup> По торфянымъ болотамъ.

173. *Erodium* L'Hérit.—аистники. Стебель и листья шершавые съ рѣдкими волосками; листочки перистыхъ листьевъ перисто-раздѣльные или надрѣзные, съ зубчатыми долями; чашелистики съ короткими остями (рис. 682); лепестки малиновые, неравные — 2 верхнихъ больше; тычинковыя нити, несущія пыльники, быстро расширены у основанія. . . . .

(веховый) аистникъ—*E. cicutarium* L'Hérit.

174. †*Erucastrum* Presl—жгучки. Стебель и листья слегка пушистые; листовыя доли продолговатыя, выемчато-зубчатыя, съ округленными зубцами; чашелистики отклоненные, плодоножки въ 3 - 4 раза короче стручковъ (рис. 683, а) . . (Полихѣева) жгучка—†*E. Pollichii* Sch. & Sp. 1).



(Рис. 682).



(Рис. 683).

175. *Ervum* L.—пашенницы.

а. Листья о 6 - 10 парахъ листочковъ продолговато-линейныхъ; кисть о 2 - 8 цвѣткахъ; чашечка пушистая, зубцы ея равны чашечной трубкѣ; бобъ пушистый, черноватый, продолговато-ромбическій, о 2 сѣменахъ . . .

шершавая п.—*E. hirsutum* L.

б. Листья о 3 - 5 парахъ листочковъ линейныхъ; кисть обь 1 - 2 цвѣткахъ; чашечка голая, зубцы ея короче трубки; бобъ голый, свѣтло-бурый, продолговато-линейный, о 4 сѣменахъ . . . . .

четырёхсѣменная п.—*E. tetraspermum* L.

176. *Eryngium* L.—синеголовники.

а. Стебель вверху вѣтвится щиткомъ, съ голубоватымъ налетомъ; корневые листья цѣльные, продолговато-овальные, сердцевидные, тупые, неравно-городчато-пильчатые; верхніе листья 3-5-раздѣльные, пальчатые, колюче-зубчатые; головки овальныя, съ оберткою не длиннѣе головки; листочки ея узко-ланцетные; лепестки голубые. . . . .

плосколиственный с.—*E. planum* L.

б. Стебель сильно вѣтвистый, сѣровато-зеленый; всѣ листья 3-чатыя, съ глубоко-перисто-раздѣльными, колюче-зубчатыми долями; цвѣточныя головки почти шаровидныя, съ оберткою вдвое превышающею головки; листочки ея линейно-ланцетные; лепестки бѣловатые . . . . .

равнинный с.—*E. campêtre* L. 2).

1) Встрѣчена одинъ только разъ въ Петровскомъ-Разумовскомъ.

2) Хранится въ одномъ изъ гербаріевъ прежняго времени.

**177. Erysimum L.**—желтушники.

а. Цвѣтоножки въ 2 - 3 раза длиннѣ чашечки; отгибъ лепестковъ округлый; стручки вдвое длиннѣ плодоножки, отклоненной отъ цвѣтоноса; листья продолговато-ланцетные, всѣ заостренные . . . . .

левкойный ж.—**E. cheiranthoides L.**

б. Цвѣтоножки одинаковой длины съ чашечкою; отгибъ лепестковъ клиновидно - обратно - яйцевидный; стручки во много разъ длиннѣ торчащей плодоножки; нижніе листья тупые, черешковые, продолговатые . . . . .


торчащій ж.—**E. strictum Gaertn. 1).**

**178. Erythraea Rich.**—золототысячники. Нижніе листья розеткою, тупые, продолговато-обратно-яйцевидные, сужены въ черешокъ; стеблевые—б. ч. ланцетные, острые; щитковидный полусонтикъ съ верхушечнымъ цвѣткомъ, почти сидячимъ; чашечка при распусканіи цвѣтка почти вдвое короче трубки вѣнчика; доли его плоскаго отгиба тупыя, овально-ланцетные (рис. 684, а) . . . . . золототысячникъ—**E. Centaurium Pers.**


**179. Eupatōrium L.**—посконники. Стебель и листья пушистые; пальчатые листья на короткихъ черешкахъ, съ ланцетными, острыми, пильчато-зубчатыми долями; сѣмянка короче хохолка . . . . .  
(конопляный) посконникъ—**E. cannabinum L.**



(Рис. 684).



(Рис. 685).



(Рис. 686).

**180. Euphōrbia L.**—молочай.

1. Листья ланцетные или линейно-ланцетные; сѣмена гладкія . . . . . 2.  
Листья обратно-яйцевидные, суженные въ черешокъ; сѣмена ячеистыя или ямчатыя (рис. 685): коробочка гладкая, не бородавчатая (а) . . . . . 4.

2. Прицвѣтники яйцевидно-ромбическіе или треугольные (рис. 686, а): ширина ихъ больше длины; медниковыя железки полудунныя, съ 2 длинными рожками; коробочка гладкая; листья всѣ и вполне цѣльнокрайніе, тусклые, голые, линейно-ланцетные, остроконечные; стебель съ пазушными вѣтками, на которыхъ листья линейные . . . . . лозный м.—**E. virgata W. & K.**

Прицвѣтники овальные: ширина ихъ меньше длины; медниковыя железки поперечно-овальные . . . . . 3.

3. Листья мелко-зубчатые, продолговато-ланцетные, молодые пушистые; коробочка гладкая . . . . . высокій м.—**E. prœcera M. B. 2).**

Листья цѣльнокрайніе, на главномъ стеблѣ, внутри поломъ, эллиптически-

1) Преимущественно по берегу Оки, въ Коломенскомъ уѣздѣ; подъ Москвою—на городскомъ валу.

2) По Окѣ, въ Коломенскомъ и Серпуховскомъ уѣздахъ.



ланцетные; на пазушных вѣткахъ — линейно-ланцетные, острые, съ рѣдкими зубцами; коробочка бородавчатая . . . . .

болотный м. — *E. palustris* L. <sup>1)</sup>.

4. Листья къ верхушкѣ пильчато-зубчатые, какъ и обратно-яйцевидные прицвѣтники; медниковыя железки спереди округленные (рис. 685, а); коробочки на спинкѣ округленные; сѣмена ячеисто-сѣтчатые . . . . .

солнцеглядь — *E. helioscopia* L. <sup>2)</sup>.

Листья вполнѣ цѣльнокрайніе, какъ и яйцевидные, колюче-острые прицвѣтники; медниковыя железки полулунныя съ длинными рожками; коробочки на спинкѣ съ 2 слегка крылатыми ребрышками; сѣмена 6-гранныя, ямчато-точечныя . . . . . отъняющій м. — *E. Réplus* L. <sup>3)</sup>.

181. *Euphrasia* L. — очанка. Стебель пушистый; листья яйцевидные, б. ч. о 5 острыхъ зазубринахъ съ каждой стороны; зазубрины на прицвѣтныхъ листьяхъ крупнѣе и острѣе; пазушныя цвѣтки въ прямой, простой колосовидной кисти; зубцы чашечки узко-ланцетные, тонко-заостренные (рис. 687, с); лопасти верхней губы вѣнчика спереди 2, 3-зубчатые (а); вѣнчикъ бѣлый съ лиловыми жилками и желтымъ пятномъ на нижней губѣ. . . . .


(лѣчебная) очанка — *E. officinalis* L.



(Рис. 687).



(Рис. 688).



(Рис. 689).

182. *Evonymus* L. — бересклеты.

а. Вѣтви цилиндрическія, съ частыми темными бородавками; лепестки (рис. 688) округлые, свѣтло-коричневые; сѣмена черныя, лоснящіеся, до половины облечены въ кожуру ярко-краснаго цвѣта; коробочка тѣлеснаго цвѣта . . . . . бородавчатый б. — *E. verrucosus* L.

б. Вѣтви 4-гранныя, гладкія; лепестки продолговатые, тупые, зеленоватые; сѣмена бѣлыя, цѣликомъ облечены въ кожуру оранжеваго цвѣта; коробочка розовая . . . . . европейскій б. — \* *E. europaeus* L.

183. \* *Fagopyrum* L. — гречиха. Стебель сочный, розовый; листья лоснящіеся, 3-угольно-сердцевидные, нѣсколько стрѣловидные, заостренные, длиною не превосходятъ ширины; верхніе коротко-черешковые; цвѣтки въ пазушныхъ ложныхъ кистяхъ, скученныхъ щиткомъ, съ розоватымъ околоцвѣтникомъ; орѣшки повислые, 3-гранныя, съ острыми, цѣльнокрайними ребрами (рис. 689, d) . . . . . (сѣдобная) гречиха — \* *F. esculentum* Mnch.

<sup>1)</sup> Указано въ Кунцевѣ.

<sup>2)</sup> По огородамъ.

<sup>3)</sup> Хранится въ одномъ изъ гербаріевъ прежняго времени.

184. *Festuca* L. — овсяницы.

1. Листья широко-линейные, плоские, въ почкосложении свернутые . . . 2.  
 Всѣ листья или, по крайней мѣрѣ, нижніе въ видѣ щетинокъ, въ почкосложении складчатые; нижняя цвѣточная пленка шпоровидная, съ остью длиннѣе половины пленки . . . 3.

2. Всѣ влагалища и листья гладкіе, какъ и стебель; метелка односторонняя, узкая, сжатая, только во время цвѣтенія растопыренная; нижнія вѣтви ея парныя, изъ нихъ одна очень короткая обѣ 1 - 2 колоскахъ; колоски продолговатые о 7 - 12 цвѣткахъ; чашечныя пленки и нижняя цвѣточная ланцетныя, вверху перепончатая; верхняя тупая, значительно длиннѣе нижней, нижняя цвѣточная пленка безъ ости или съ очень короткою остью и слабыми жилками . . . высокая ов. — *F. elatior* L.

Всѣ или, по крайней мѣрѣ, нижнія влагалища и края листьевъ шершаво-волосистые; листья сверху матовые, сѣро-зеленые, снизу лоснящіеся, зеленые; метелка большая, развѣсистая, подъ конецъ повислая; вѣтви ея тонкія; колоски о 3 - 9 цвѣткахъ; чашечныя пленки линейныя, заостренныя, очень неравныя; нижняя цвѣточная пленка ланцетная, о 5 жилкахъ, шероховатая . . . 3.

3. Нижняя цвѣточная пленка съ извилистою остью, вдвое длиннѣе самой пленки, о 5 слабыхъ жилкахъ, на концѣ перепончатой; чашечныя пленки почти сплошь перепончатая, верхняя — о 3 жилкахъ; завязь голая; листья снизу темно-зеленые; язычекъ короткій, усѣченный . . . рослая ов. — *F. gigantea* Vill.

Нижняя цвѣточная пленка безъ ости, шероховатая, о 5 жилкахъ, съ 3 выдающимися — среднею и краевыми; обѣ чашечныя пленки обѣ 1 жилкѣ; завязь вверху опушенная; листья снизу ярко-зеленые; язычекъ удлиненный, закругленный; стебель внизу съ бѣловатыми чешуйчатыми влагалищами . . .

лѣсная ов. — *F. silvatica* Vill. 1).

3. Всѣ листья въ видѣ щетинокъ, образуютъ густыя пучки дерна; вѣтви метелки торчащія . . . овечья ов. — *F. ovina* L.

Стеблевые листья узко-линейные, плоскіе; вѣтви метелки отклоненныя; стебель съ ползучими побѣгами . . . красная ов. — *F. rubra* L.

185. *Filago* L. — жабники. Небольшая травка, покрытая густымъ бѣлымъ войлокомъ; листья линейно-ланцетные; мелкія корзинки скучены пучками по 2 - 7 на верхушкѣ стебля и въ пазухѣ верхнихъ листьевъ въ короткіе колосы; чешуйки обертки линейно-ланцетныя, туповатая, безъ кля; наружныя линейныя, на верхушкѣ буроватая, при плодовозрѣваніи звѣздчато растопыренныя, и тогда на верхушкѣ голая . . .

(полевой) жабникъ — *F. arvensis* L.

186. *Filipendula* L. — таволги.

а. Стебель до верха покрытъ листьями 2 - 4-парно-перистыми, съ листочками яйцевидными, неравно 2-ко зубчатыми и съ большимъ верхушечнымъ листочкомъ, ланцетнымъ, 3 - 4-надрѣзнымъ; долей чашечки и лепестковъ 5; орѣшковъ до 10, спирально скрученныхъ (рис. 690), голыхъ . . .

вязолистная т. — *F. Ulmaria* Maxim.

б. Стебель вверху почти безлистный; листья много-парно-перистые, съ ли-

1) Въ Погонно-Лосиномъ островѣ, близъ Мытищъ.

сточками продолговатыми, перисто-разсеченными и зубчатыми, равными; долей чашечки и лепестковъ 6 (рис. 691, а); орѣшковъ до 12, прямыхъ (b), пушистыхъ; корни въ срединѣ утолщены веретеномъ . . . . .

земляные орѣхи—*F. hexarétala* Gilib. <sup>1)</sup>.

187. \* *Foeniculum* Adans. — фенхель. Стебель круглый, вѣтвистый; отгибъ верхнихъ листьевъ очень короткій; зонтикъ о многихъ лучахъ—до 20; плоды такой же длины, какъ и цвѣтоножки . . . . .

(лѣчебный) фенхель—\* *F. officinale* All.


188. *Fragaria* L.—клубники.

1. Волоски на цвѣточномъ стеблѣ и на листовыхъ черешкахъ горизонтально оттопыренные . . . . . 2.


Волоски на цвѣточномъ стеблѣ и на листовыхъ черешкахъ приподнятые; листочки на черешечкахъ, сверху почти голые; ложные плоды крупные . . . 4.

2. Волоски на цвѣтоножкахъ горизонтально оттопыренные; цвѣточный стебель длиннѣ листьевъ, листочки ихъ рѣдковолосые, всѣ на короткихъ черешечкахъ; плодовая чашечка раскрытая или отогнутая . . . . .


высокая к.—*F. elatior* Ehrh.



(Рис. 690).



(Рис. 691).



(Рис. 692).

Волоски на цвѣтоножкахъ прижатые или слегка приподнятые; цвѣточный стебель лишь немного длиннѣ листьевъ; боковые листочки ихъ сидячіе, съ шелковистыми волосками . . . . . 3.

3. Листочки съ обѣихъ сторонъ съ шелковистыми волосками, средний на короткомъ черешечкѣ; чашелистики прижаты къ плоду . . . . .

холмовая к.—*F. collina* Ehrh.

Листочки только снизу съ шелковистыми волосками, всѣ сидячіе; чашелистики отогнуты отъ плода (рис. 692, b.) . . . . .

земляника — *F. véscā* L.

4. Волоски на цвѣтоножкахъ приподнятые; листочки съ глубокими, крупными зубцами, темно-зеленые; чашелистики прижаты къ плоду; сѣмянки на поверхности красноватаго цвѣтоложа . . . . .

ананасная к.—\* *F. grandiflora* Ehrh.

Волоски на цвѣтоножкахъ прижатые; листочки остро-зубчатые, нѣсколько кожистые; чашечка у плода раскрытая; сѣмянки видны въ темно-красную мякоть цвѣтоложа . . . . .

виргинская к.—\* *F. virginiana* Mill.

189. *Fraxinus* L.—ясени.

а. Почки черныя; листочки непарно-перистаго листа сидячіе, въ числѣ 9—15, сверху ярко-зеленые, снизу блѣднѣе . . . . .

высокій я.—*F. excelsior* L.

<sup>1)</sup> Преимущественно по Окѣ; подъ Москвою рѣдко и разсѣянно.

в. Почки ржавчинно-сѣраго цвѣта; листочки черешковые, въ числѣ 7—9 темно-зеленые, лоснящиеся, снизу бѣловатые или чаще сѣро-зеленые.


американскій я.—\* *F. americana* L.

190. *Fritillaria* L.—рябчики. Нижніе и верхніе листья мутовчато сближены: нижніе—узко-линейные, тонко-заостренные; верхніе—почти нитевидные, на концѣ съ скрученнымъ усикомъ; цвѣтокъ темно-красный; столбикъ съ 3-лопастнымъ рыльцемъ; коробочка на отклоненной ножкѣ, крылато 6-гранная, сверху притупленная; луковица изъ 2 мясистыхъ чешуй, сросшихся только у основанія, съ пазушными луковичками

(русскій) рябчикъ—*F. ruthénica* Wickström <sup>1)</sup>.

191. *Fumaria* L.—дымницы. Доли листьевъ узко-ланцетные; прицвѣтники не длиннѣ отклоненныхъ цветоножекъ; чашелистики яйцевидно-ланцетные, зубчатые, вдвое короче малиноваго вѣнчика и уже его трубки (рис. 693 — с, b, a); наружные лепестки съ тупою темною верхушкою; орѣшекъ сплюснуто-шаровидный, поперекъ шире, вверху тупой, слегка выемчатый, бугорчато-морщинистый (e).

(лѣчебная) дымница—*F. officinalis* L.



(Рис. 693).



(Рис. 694).

192. *Gagea* Salisb.—гусятники.

1. Листочки околоцвѣтника линейно-ланцетные, заостренные (рис. 694); корневой листъ линейный, плоскій или слегка желобчатый; луковица состоитъ изъ двухъ луковокъ, между которыми выходитъ цвѣточный стебель и изъ которыхъ одна маленькая . . . . . мелкій г.—*G. minima* Schult.

Листочки околоцвѣтника продолговатые, притупленные; луковица простая . . . . . 2.

2. Корневой листъ широко-линейный, плоскій, стянутый на верхушкѣ колпачкомъ; листочки околоцвѣтника не сужены къ основанію; пыльники эллиптическіе . . . . . желтый г.—*G. lutea* Schult.

Корневой листъ узко-линейный, желобчатый; листочки околоцвѣтника къ основанію суженные; пыльники округлые.

крохотный г.—*G. pusilla* Schult.

193. *Galatella* Cass. — солонечники. Стебель и листья шероховатые; стебель вѣтвистый покрытъ частыми, линейно-ланцетными, острыми листьями;

<sup>1)</sup> По Окѣ, Серпуховскаго уѣзда, за Лужками.

множество мелкихъ корзинокъ въ щитковидной метелкѣ; обертка ихъ ко-  
пическая, съ прижатыми, ланцетными, острыми чешуйками, на краю плен-  
чатыми. . . . . (точечный) солонечникъ—*G. punctata* Lindl. 1).

194. *Galeobdolon* Huds. — зеленчукъ. Трава съ рѣд-  
кими волосками; стебель вѣтвистый; не цвѣтущія вѣтви  
стелющіяся и укоревающіяся; нижніе листья больше верх-  
нихъ на длинныхъ черешкахъ, округло-яйцевидные, съ  
косыми неравными городками; верхніе на короткихъ че-  
решкахъ овальные, острые; трубка вѣнчика кверху сог-  
нута и постепенно расширена въ зѣвъ (рис. 695); вѣн-  
чикъ желтый: средняя лопасть нижней губы и основаніе  
боковыхъ лопастей оранжевыя. . . . .



(Рис. 695).

(желтый) зеленчукъ—*G. luteum* Huds.

195. *Galeopsis* L.—пикульники.

1. Стебель не утолщенъ подъ узлами, съ мягкими волосками; листья лан-  
цетные, съ вдавленными сверху жилками; зубцы чашечки вдвое короче ея  
трубки; вѣнчикъ почти втрое длиннѣе чашечки; цвѣтки грязно-малиновые;  
основаніе нижней губы желтое, съ малиновыми крапинами. . . . .

жабрей—*G. Ladanum* L.

Стебель утолщенъ подъ узлами, съ жесткими щетинками; листья яйцевид-  
ные, безъ вдавленныхъ жилокъ; зубцы чашечки не короче ея трубки; сред-  
няя доля нижней губы почти 4-угольная. . . . . 2.

2. Трубка вѣнчика не длиннѣе чашечки; вѣнчикъ блѣдно-лиловый, на  
нижней губѣ съ желтымъ пятномъ въ срединѣ и малиновыми крапинами;  
средняя доля ея тупая или слегка выемчатая. . . . .

медовникъ — *G. Tetrahit* L.

Трубка вѣнчика вдвое длиннѣе чашечки; вѣнчикъ желтый съ лиловымъ  
пятномъ въ срединѣ нижней губы, съ округлою среднею лопастью и бѣло-  
ватыми боковыми. . . . . зябра—*G. versicolor* Curt.

196. *Galium* L.—подмаренники.

1. Цвѣтки въ рѣдкихъ пазушныхъ полузонтникахъ, простыхъ или ме-  
тельчатыхъ; стебель остро-шероховатый; листья обь 1 жилкѣ. . . . . 2.

Цвѣтки въ частыхъ верхушечныхъ полузонтникахъ, расположенныхъ ме-  
телкою; стебель голый или пушистый. . . . . 6.

2. Листья по краямъ и снизу вдоль жилки остро-шероховатые, остроко-  
нечные, по 6—8 въ мутовкѣ; плоды щетинистые или бугорчатые. . . . . 3.

Листья почти гладкіе, тупые, линейно-продолговатые, къ верхушкѣ шире,  
къ основанію сужены, по 4 въ мутовкѣ; плоды гладкіе. . . . . 5.

3. Стебель, края и жилка листа съ прямыми щетинками; листья про-  
долговато-эллиптическіе, тонко заостренные, по 6 въ мутовкѣ; плоды съ  
крючковатыми щетинками; цвѣтки зеленоватые. . . . .

трехцвѣтковый п.—*G. triflorum* Michx 2).

Стебель, края и жилка листа съ отогнутыми внизъ щетинками; листья  
линейно-ланцетные, по 6—8 въ мутовкѣ. . . . . 4.

4. Вѣнчикъ уже плода съ крючковатыми щетинками. . . . .

цѣпкій п.—*G. Aparine* L.

1) По Схѣ, за Лужками, Серпуховскаго уѣзда.

2) Въ сплошыхъ хвойныхъ лѣсахъ—Погонно-Лосинный островъ и другіе.

- Вѣнчикъ шире бугорчатого плода . . . . . болотистый п.—*G. uliginosum* L.
- 5 (2). Полузонтики метельчатые; вѣнчикъ б. ч. о 4 надрѣзахъ; плодоножки прямые, оттопыренные . . . . . болотный п.—*G. palustre* L.
- Полузонтики малоцвѣтныя, о 2 - 3 цвѣткахъ; вѣнчикъ о 3 надрѣзахъ; плодоножки отогнутыя, отклоненныя . . . . .
- трехнадрѣзный п.—*G. trifidum* L. 1).
- 6 (1). Листья по 4 въ мутовкѣ, о 3 жилкахъ, тупые . . . . . 7.
- Листья не менѣе 8 въ мутовкѣ объ 1 жилкѣ, съ острымъ кончикомъ . . . 8.
7. Цвѣтоножки немного длиннѣе плодовъ, съ короткими крючковатыми щетинками . . . . . сѣверный п.—*G. boreale* L.
- Цвѣтоножки вдвое длиннѣе плодовъ голыхъ или съ короткими волосками . . . . . мареновидный п.—*G. rubioides* L.
8. Листья линейные, съ сильно свернутымъ краемъ, снизу съ сѣрымъ пушкомъ, сверху—госнящиеся, темно-зеленые, по 8—12 въ мутовкѣ; стебель округлый или тупо 4-гранный, коротко-пушистый; метелка сжатая; цвѣтки ярко-желтые; плоды гладкіе . . . . . настоящий п.—*G. verum* L.
- Листья ланцетные, безъ пушка, по 8 въ мутовкѣ; метелка развѣсистая; цвѣтки бѣлые или желтоватые; плоды слегка морщинистые . . . . . 9.
9. Стебель 4-гранный, гладкій, листья къ верхушкѣ уширены, къ основанію сужены, съ обѣихъ сторонъ зеленые; надрѣзы вѣнчика тонко заостренные (рис. 696—а, б) . . . . . мягкій п.—*G. Mollugo* L.



(Рис. 696).



(Рис. 697).

Стебель округлый или тупо 4-гранный; листья тупые, сѣро-зеленые, на краю и снизу вдоль жилокъ съ щетинками, надрѣзы вѣнчика коротко заострены; цвѣтоножки очень тонкія, до разцвѣтанія поникшія . . . . .

лѣсной п.—*G. silvaticum* L.

**197. Genista L.**—дроги. Стебель бороздчатый, къ верхушкѣ пушистый, какъ и листья по краямъ, ланцетные или эллиптическіе, острые, съ маленькими шиловидными прилистниками; цвѣтки въ длинныхъ кистяхъ, въ пазухѣ верхнихъ листьевъ; вѣнчикъ и бобы голые . . . . .

(красильный) дрокъ—*G. tinctoria* L. 2).

**198. Gentiana L.**—горечавки.

1. Вѣнчикъ трубчатый, съ 4 - 5 слегка отогнутыми надрѣзами, безъ зубцовъ между ними; зѣвъ съ бахромчатыми чешуйками (рис. 697); чашечка до середины 5-раздѣльная, съ линейно-ланцетными долями; коробочка сидячая; корневые и нижніе стеблевые листья сужены въ черешокъ; остальные сидячіе, не влагалищные, но съ широкимъ основаніемъ . . . . .

стародубка—*G. Amarèlla* L.

1) Въ разрабатываемыхъ торфяныхъ болотахъ — Мытищи (Красниговское болото).

2) По Окѣ, подѣ Серпуховымъ, Лужки.

Вѣнчикъ колокольчатый, съ зубцами между его надрѣзами; зѣвъ голый; листья срослись внизу въ общее влагалище . . . . . 2.

2. Листья обь 1 жилкѣ; цвѣтки на ножкахъ, по одиночкѣ или по парно въ пазухѣ листьевъ и на верхушкѣ, въ видѣ кисти; 5 линейныхъ зубцовъ чашечки (рис. 698); вѣнчикъ крупный, ворончато-колокольчатый, о 5 прямыхъ надрѣзахъ, темно-синій, внутри крапчатый; пыльники слипшіеся; коробочки на длинной ножкѣ . . . синіе колокольчики—*G. Pneumonanthe* L.



(Рис. 698).



(Рис. 699).

Листья о 3 жилкахъ; цвѣтки почти сидячіе, скучены пучками въ пазухѣ верхнихъ листьевъ и на верхушкѣ; 4 зубца чашечки линейно-ланцетные; вѣнчикъ средней величины, булавовидно-колокольчатый, о 4 отогнутыхъ надрѣзахъ (рис. 699), снаружи сѣро-зеленоватый, внутри голубой; пыльники свободные; коробочка на короткой ножкѣ . . . . .

соколій перелетъ—*G. Cruciata* L.

### 199. *Geranium* L.—журавельники.

1. Листья 3-тые или 5-ные; листочки ихъ на черешечкахъ, съ перисто-раздѣльными долями; чашелистики торчащіе, прижатые къ плоду; лепестки въ  $1\frac{1}{2}$  раза длиннѣе ихъ, на верхушкѣ цѣльные, продолговатые, суженные въ длинный ноготокъ, розовые, съ 3 свѣтлыми полосками; сѣмянки сѣтчато-морщинистыя . . . . . Робертъ ж.—*G. Robertianum* L. <sup>1)</sup>

Листья пальчато 5 - 7 раздѣльные или надрѣзные; чашелистики расходящіеся, и чашечка раскрытая; лепестки съ очень короткимъ ноготкомъ . . 2.

2. Листья въ очертаніи угловатые, глубоко 5 - 7 раздѣльные, съ клиновидно-ромбическими долями, остро-надрѣзанными . . . . . 3.

Листья въ очертаніи почковидно-округлые . . . . . 7.

3. Лепестки на верхушкѣ выемчатые, обратно-сердцевидные, по краямъ рѣсничные, полосатые, немного длиннѣе чашелистиковъ съ длинною остью; стебель, листья и плоды пушистые . . . . . 4.

Лепестки на верхушкѣ цѣльные, безъ выемки, б. ч. вдвое длиннѣе чашечки; цвѣтоносы о 2 цвѣткахъ . . . . . 5.

<sup>1)</sup> Подъ Москвою—Воробьевы горы, Кунцево.



4. Цвѣтоносы обѣ 1 цвѣткѣ; лепестки лиловатые съ красными полосками; стебель и цвѣтоножки съ прижатыми, отогнутыми волосками . . . . . сибирскій ж.—*G. sibiricum* L. <sup>1)</sup>.

Цвѣтоносы о 2 цвѣткахъ; лепестки голубые съ лиловыми жилками; стебель и торчащія цвѣтоножки съ железистыми и оттопыренными волосками. . . . . богемскій ж.—*G. bohemicum* L. <sup>2)</sup>.

5. Стебель вверху и цвѣтоножки жестковолосые, съ отогнутыми, но не железистыми волосками; цвѣтоножки по отцвѣтаніи отогнуты книзу; цвѣтки лилово-красные . . . . . болотный ж.—*G. palustre* L.

Стебель вверху и цвѣтоножки пушистые, съ прямыми, железистыми волосками; цвѣтки лиловые, рѣдко бѣлые . . . . . 6.

6. Стебель внизу съ рѣдкими отогнутыми волосками; цвѣтоножки всегда торчащія; тычинковыя нити ланцетныя; цвѣтки чисто лиловые . . . . . лѣсной ж.—*G. silvaticum* L.

Стебель и листовые черешки съ короткими пушкомъ; цвѣтоножки по отцвѣтаніи отогнуты; плодоножки торчащія; тычинковыя нити линейныя, въ основаніи овально расширены; цвѣтки сине-лиловые . . . . . луговой ж.—*G. pratense* L.

7 (2). Листья глубоко 5-7 раздѣльные; доли ихъ линейныя, съ жесткими волосками, какъ и стебель; лепестки длиннѣе остистыхъ чашелистиковъ,—обратно-сердцевидные, выемчатые; цвѣтоножки очень длинныя . . . . . 8.

Листья не глубоко 3-7-надрѣзные, съ мягкими волосками; стебель вверху железисто-пушистый; цвѣтки мелкіе, чашелистики коротко-остроконецные; по 2 цвѣтка на цвѣтоносѣ . . . . . 9.

8. Цвѣтки б. ч. по 1 на цвѣтоносѣ, кровяно-красные; листья и стебель съ длинными, оттопыренными волосками; плоды волосистые . . . . . кровянокрасный ж.—*G. sanguineum* L. <sup>3)</sup>.

По 2 красноватыхъ цвѣтка на цвѣтоносѣ; листья и стебель съ прижатыми, бѣловатыми волосками; плоды голые, сѣмена сѣтчато-морщинистыя. . . . . голубиный ж.—*G. columbinum* L. <sup>4)</sup>.

9. Лепестки равны чашечкѣ или лишь немного длиннѣе ея, продолговато-обратно-сердцевидные, свѣтло-лиловые; листья съ клиновидными долями, спереди коротко 3-лопастными; плоды гладкіе, пушистые; сѣмена гладкія. . . . . низкій ж.—*G. pusillum* L. <sup>5)</sup>.

Лепестки много длиннѣе чашечки, розовые; листья съ обратно-яйцевидными долями, спереди надрѣзанно-городковыми . . . . . 10.

10. Лепестки обратно-сердцевидные, на верхушкѣ выемчатые; плоды голые, попереки морщинистые; сѣмена гладкія . . . . . 11.

мягкій ж.—*G. molle* L. <sup>6)</sup>.

Лепестки продолговато-клиновидные, на верхушкѣ цѣльные; плоды гладкіе, пушистые; сѣмена сѣтчато-и ямчато-морщинистыя. . . . . 12.

круглолистный ж.—*G. rotundifolium* L. <sup>7)</sup>.

1) Подъ Москвою разсыяно и очень рѣдко.

2) Указано въ последнее время на границѣ съ Владимірскою губерніею.

3) По Огъ, обыкновенно

4) Имѣется въ гербаріи Максимовича.

5) По садамъ, среди газона.

6) Сохранились въ гербаріяхъ прежняго времени.

**200. Géum L.—гравилаты.**

1. Цвѣтки поникшіе; плодносная чашечка съ торчащими долями, красновато-бурая; лепестки выемчатые, прямые, съ ноготкомъ, буроватые съ рѣзкими жилками; плодоложе на длинной ножкѣ, равной чашечкѣ; верхній членикъ плодового столбика до самой верхушки волосистый, почти такой же длины, какъ и нижній членикъ; прилистники маленькіе; стебель шершавый. . . . . ручейный г.—*G. rivale* L.

Цвѣтки торчащіе или наклоненные (рис. 700, а); плодносная чашечка раскрытая (b), зеленая; лепестки желтые или оранжевые, безъ жилокъ; плодоложе сидячее; верхній членикъ столбика въ 2-4 раза короче нижняго (с, b); прилистники большіе. . . . . 2.

2. Стебель и цвѣтоножки покрыты желтоватыми щетинками; лепестки округлые, оранжевые; плодоложе овальное; верхній членикъ столбика вдвое короче нижняго; доли чашечки отогнутыя. . . . .


торчащій г.—*G. strictum* Ait.

Стебель и цвѣтоножки покрыты мягкими волосками; лепестки обратно-яйцевидные; плодоложе шаровидное (рис. 700, b); верхній членикъ столбика въ 3-4 раза короче нижняго (с). . . . . 3.

3. Плодносная чашечка отогнутая (рис. 700, b); лепестки растопыренные (а), внизу клиновидные, безъ ноготка, свѣтло-желтые; верхній членикъ столбика только внизу волосистый, вчетверо короче нижняго, голаго. . . . .

городской г.—*G. urbànum* L.

Плодносная чашечка съ приподнятыми долями; лепестки прямостоячіе, слегка выемчатые, суженные въ короткій ноготокъ, оранжевые или снаружи слегка буроватые; верхній членикъ столбика только на верхушкѣ голый, втрое короче нижняго. . . . . средній г.—*G. intermédium* Ehrh.



(Рис. 700).

(Рис. 701).

(Рис. 702)

**201. Githago Desf.—куколи.** Сорная трава, покрытая сѣрыми, мягкими волосками; листья линейно-ланцетные, острые; чашечка трубчато-колокольчатая (рис. 701, b), кожистая, мохнатая; цвѣтки большіе (а), грязно-красные. . . . . (пивяная) куколь—*G. ségetum* Desf.

**202. Gladiolus L.—шпажники.** Оболочка клубнелуковицы волокнистая; волокна тонкія, частыя, параллельныя; нижніе листья туповатые; прицвѣтники заостренные, вдвое короче ярко-розоваго цвѣтка (рис. 702, а); коробочка обратно-яйцевидная, тупо 3-гранная, съ 3 не глубокими бороздками, внизу съ поперечными морщинками, сверху вдавленная. . . . .

(черепичатый) шпажникъ—*G. imbricatus* L.

**203. *Glechòma* L.**—будры. Листья и стебель рѣдковолосые; стебель съ ползучими, укореняющимися вѣтвями, цвѣтоносныя же вѣтви поднимающіяся; листья на длинныхъ черешкахъ, съ крупными городками, округлые; нижнiе почковидные, верхнiе сердцевидные; цвѣтки лиловые: плоская верхняя губа вѣнчика выемчатая, прямо вытянутая (рис. 703—а, б); средняя доля нижней губы плоская, округлая, попережь шире, выемчатая (б, а) . . . (плющевидная) будра—*G. hederàcea* L.

**204. *Glycèria* R. Br.**—манники.

а. Метелка однобокая, счень длинная и узкая, съ вѣтвями скатыми до и послѣ цвѣтенiя, а во время цвѣта — горизонтально отходящими; нижнiя вѣтви по 2 (3), изъ коихъ одна болѣе короткая обѣ 1 колоскѣ; колоски длинные, цилиндрическiе, рѣдкiе, прижаты къ вѣтвямъ, о 7 - 10 цвѣткахъ (рис. 704); нижняя цвѣточная пленка ихъ слегка заостренная; стебель восходящiй, листовыя влагалища сплюснуты; язычекъ длинный, острый, надрѣзанный . . . плавающiй м.—*G. fluitans* R. Br.


б. Метелка развѣсистая, большая, густая; вѣтви ея многоколосныя, во всѣ стороны расходящiяся; колоски продолговатые, сплюснутые съ боковъ, о 5 - 8 цвѣткахъ; нижняя цвѣточная пленка ихъ тупая; стебель прямой, высокiй, толстый; влагалища цилиндрическiя; язычекъ очень короткiй, тупой . . . пышный м.—*G. spectàbilis* M. & K.



(Рис. 703).



(Рис. 704).



(Рис. 705).

**205. *Gnaphàlium* L.**—супеницы.

а. Стебель простой; корзинки б. ч. по одиночкѣ въ пазухѣ листьевъ расположены колосомъ; листья сверху почти голые, снизу съ бѣлымъ войлокомъ, острые . . . лѣсная с.—*G. silvaticum* L.

б. Стебель съ основанiя вѣтвистый; корзинки въ головкахъ, окутанныхъ частыми листьями, на концѣ вѣтвей; листья съ обѣихъ сторонъ покрыты сѣрымъ войлокомъ, туповатые . . . болотистая с.—*G. uliginosum* L.

**206. *Goodyèra* R. Br.**—гудьера. Корневище, ползучее по землѣ, даетъ побѣги съ розеткою листьевъ, яйцевидныхъ, острыхъ, на длинномъ крылатомъ черешкѣ; 2 - 3 стеблевыхъ листа влагалищные; колосъ одноконечный, частый, съ мелкими зеленовато-бѣлыми цвѣтками: боковые наружные листочки околоцвѣтника расходящiеся (рис. 705, б); внутреннiе съ наружнымъ верхнимъ сходящiеся шлемомъ (а, б); губа сужена въ короткiй кончикъ и впереди отогнута (а) . . . (ползучая) гудьера—*G. répens* R. Br.


**207. *Gratiola* L.**—авраны. Корневище ползучее; стебель прямой, вверху 4-гранный; листья ланцетные, полустеблеобъемлющие, о 3 жилкахъ; сте-

блевые—острые съ рѣдкими зубцами; нижніе—тупые, почти цѣльнокрайніе; вѣнчикъ бѣлый или розовый съ желтоватою трубкою, внутри желто-мохнатый; коробочка яйцевидная, заостренная, не длиннѣе чашечки (рис. 706—а, с). . . . . (лѣчебный) авранъ—*G. officinalis* L.

**208. *Gymnadenia* R. Br.**—кокушники.

а. Колосъ длинный, цилиндрическій; прицвѣтники о 3 жилкахъ; листочки околоцвѣтника продолговатые, тупые (рис. 707); 3 верхнихъ сходятся шлемомъ, 2 боковыхъ расходятся; губа о 3 почти равныхъ тупыхъ лопастяхъ; шпорецъ нитевидный, раза въ 2 длиннѣ завязи; листья длинные, ланцетно линейные; клубни ланчатые; цвѣты пахучіе . . . . .

комаровый к.—*G. conopsea* R. Br.



(Рис. 706).



(Рис. 707).



(Рис. 708).

б. Колосъ односторонній, рѣдкій; прицвѣтники обѣ 1 жилкѣ; листочки околоцвѣтника узко-ланцетные, острые, всѣ собраны шлемомъ; губа 3-раздѣльная на линейныя лопасти; шпорецъ на концѣ утолщенъ, короче завязи; изъ двухъ корневыхъ, эллиптическихъ листьевъ одинъ тупой, другой острый; стеблевыхъ листьевъ 1-2, линейно-ланцетныхъ, длинно-заостренныхъ; клубни почти шаровидные . . . . . клубучковый к.—*G. cucullata* Rich.

**209. *Gypsophila* L.**—качимы.

а. Цвѣтоножки длинныя, обѣ 1 цвѣткѣ каждая; листья линейные, съуженные къ обоимъ концамъ; лепестки розовые, съ темными жилками, горюховые или выемчатые, клиновидно-обратно-яйцевидные (рис. 708, а). . . . .

стѣнной к.—*G. muralis* L.

б. Цвѣтоножки лишь въ 2-3 раза длиннѣ чашечки; цвѣтки въ очень большомъ числѣ; листья ланцетные, очень острые; лепестки бѣлые, цѣльнокрайніе, линейно-лопатчатые . . . . . метельчатый к.—*G. paniculata* L.

**210. *Heleöcharis* R. Br.**—водолубы.

1. Цвѣточныя стрѣлки 4-гранныя, бороздчатые; колосъ продолговато-овальный, острый; пленки его притупленныя, самая нижняя охватываетъ все основаніе колоса; рылецъ 3; околоцвѣтныхъ щетинокъ 2-4, опадающихъ, короче бороздчатого 3-граннаго плода, съ коническимъ носикомъ; маленькая травка, съ тонкими нитевидными стебельками и ползучимъ корневищемъ . . . . . игольчатый в.—*H. acicularis* R. Br.

Цвѣточныя стрѣлки цилиндрическія; самая нижняя пленка охватываетъ на половину основаніе колоса; рылецъ 2 (рис. 709—а, б); околоцвѣтныхъ щетинокъ 4-6 (б), остающихся, равныхъ гладкому сплюснутому плоду. . 2.


2. Колосъ острый, продолговато-ланцетный; нижнія пленки тупыя, верхнія—острыя (рис. 709, а); плодъ съ округленными краями и яйцевиднымъ носикомъ; стебли слегка сплюснутые, жесткіе, съ красно-бурыми вла-

галищами и ползучимъ корневищемъ . . . . . болотный в. — *H. palustris* R. Br.

Колосъ тупой, овальный; всѣ пленки тупыя, округленныя, широко-яйцевидныя; плодъ съ острыми ребрами, носикъ его 3-угольный; стебли слегка бороздчатые, мягкіе, съ свѣтло-бурыми влагалищами, густо-дернштые . .

овальный в. — *H. ovata* R. Br.

**211. Helianthemum** Tourm. — солнцевѣты. Полукустарникъ съ волосистымъ стеблемъ, стевающимъ или поднимающимся; листья черешковые, цѣлюнокрайніе, продолговатые, тупые, съ нѣскольکو свернутымъ краемъ, рѣбничные; цвѣтки съ линейными прицвѣтниками; лепестки лимонно-желтые, въ 3 - 4 раза длиннѣ чашелистиковъ (рис. 710, а); свободныхъ тычинокъ много (b); столбикъ въ 2 - 3 раза длиннѣ завязи; плодоножки отогнуты . . . . . (обыкновенный) солнцевѣтъ — *H. vulgare* Gaertn. <sup>1)</sup>.



(Рис. 709).



(Рис. 710).



(Рис. 711).

**212. Helianthus** L. — подсолнечники.

а. Стебель простой; всѣ листья очередные, верхніе — эллиптическіе; огромныя корзинки поникшія; чешуйки обертки яйцевидныя, заостренныя. . . . . подсолнечникъ — \* *H. annuus* L.

б. Стебель вѣтвистый; нижніе листья супротивные, верхніе — очередные, яйцевидные или ланцетные; большія корзинки торчащія; чешуйки обертки ланцетныя, острые; подземныя стебли съ продолговатыми клубнями. . . .

земляныя груши — \* *H. tuberosus* L.

**213. Helichrysum** DC. — цминны. Стебель простой; корневые листья продолговато-обратно-яйцевидные, тупые; верхніе — линейно-ланцетные, острые; корзинки почти шаровидныя, частымъ щиткомъ; чешуйки обертки тупыя, вогнутыя, не плотно прижатыя, подъ конецъ съ отогнутою верхушкою; цвѣтки свѣтло-желтые . . . . . (песчаный) цминъ — *H. arenarium* DC. <sup>2)</sup>.

**214. Nepetica** Dillen. — перелѣски. Цвѣточныя стрѣлки и листовые черешки съ оттопыренными волосками; лопасти листьевъ яйцевидныя, слегка острья, цѣлюнокрайнія, подъ конецъ только снизу пушистыя; сѣмянки съ короткимъ, остающимся столбикомъ на полушаровидномъ цвѣтоложѣ . . .

(трехлопастная) перелѣска — *H. triloba* Chaix <sup>3)</sup>.

**215. Heracleum** L. — борщевики. Стебель толстый, бороздчатый, вверху вѣтвистый; листочки съ широко-лопастными или перисто-раздѣльными долями; краевые цвѣтки зонтика не лучистые; завязь и плоды голые; плоды эллиптическіе, на верхушкѣ съ выемкою (рис. 711) . . . . .

(сибирскій) борщевикъ — *H. sibiricum* L.

<sup>1)</sup> Близъ Бердюковской пустыни, Богородскаго уѣзда.

<sup>2)</sup> Подъ Серпуховымъ.

<sup>3)</sup> Въ сѣверныхъ уѣздахъ, въ хвойныхъ лѣсахъ.

**216. *Herminium* R. Br.**—бровники. Стебель выше съ однимъ шаровиднымъ старымъ клубнемъ, молодой же клубень на длинной ножкѣ; у основанія стебля сближены 2 листа ланцетныхъ, острыхъ; около середины еще 1 меньшій, ланцетно-линейный; колосъ тонкій, плотный; околоцвѣтникъ поникшій (рис. 712, а); внутренніе лепестки его линейно-ланцетные, длинно-заостренные, спереди съ выемками (а); лопасти нижней губы продолговато-линейныя, —средняя вдвое длиннѣе боковыхъ (b, c).

(одноclubневый) бровникъ—*H. Monorchis* R. Br.

**217. *Herniaria* L.**—грыжники. Голая, желто-зеленая травка съ стелющимся, сильно вѣтвистымъ стеблемъ; листья мелкіе, эллиптическіе или продолговатые, нѣсколько острые, суженные въ черешокъ; доли чашечки голыя—безъ рѣсничекъ (рис. 713, а); рыльца почти сидячія (b); плодъ продолговатый выдается изъ чашечки (c).

(голый) грыжникъ—*H. glabra* L.

**218. *Hesperis* L.**—вечерницы. Стебель прямой, вверху вѣтвистый, покрытый вѣтвистыми или и железистыми волосками, какъ и листья: нижніе черешковые, яйцевидно-ланцетные, заостренные, зубчатые; верхніе—почти сидячіе, узко-ланцетные; стручки торчатъ на отклоненныхъ ножкахъ . . . вечерница—*H. matronalis* L.<sup>1)</sup>



(Рис. 712)



(Рис. 713).



(Рис. 714).

**219. *Hieracium* L.**—ястребинки.

1. Стебель до верху или выше середины покрытъ листьями, —нижніе не образуютъ розетки и всѣ или б. ч. рано отсыхаютъ; побѣговъ нѣтъ. . . 2.

Листья только въ нижней части стебля, —болѣе крупныя въ корневой розеткѣ, остающіеся; стеблевые мелкіе, —ихъ мало или вовсе нѣтъ, и тогда стрѣлка голая обѣ 1 или немногихъ корзинкахъ. . . 3.

2. Листья почти голыя, ланцетные, всѣ сидячіе или только нижніе сужены въ черешокъ; чешуйки обертки почти голыя, темнозеленыя, въ сухомъ видѣ черноватыя; наружныя съ отогнутыми концами (рис. 714), внутреннія шире — тупыя; корзинки крупныя метельчатымъ щиткомъ, верхнія развѣтвленія его зонтикомъ. . . зонтичная яс. — *H. umbellatum* L.

Листья, какъ и стебель, густо покрыты прижатыми, жесткими щетинками и по обѣ стороны звѣздчатымъ пушкомъ, вверху по стеблю замѣтно уменьшаются; обертка средней величины, отъ густаго звѣздчатаго пушка бѣлая, безъ железистыхъ волосковъ или съ немногими на верхушкѣ чешуекъ обертки; цвѣтки ярко-желтые. . . щетинистая яс. — *H. echioides* Lumn.<sup>2)</sup>

1) На песчаномъ островѣ р. Оки, противъ Карачеева—Коломенскаго уѣзда.

2) Хотѣвичи—Богородскаго уѣзда, при р. Нерской.

3. Листья крупно-или выемчато-зубчатые, съ болѣе крупными зубцами къ основанію листа; сѣмянки съ гладкимъ верхнимъ краемъ и хохолкомъ изъ 2 рядовъ неравныхъ волосковъ . . . . . 4.

Листья вполнѣ цѣльнокрайніе, только иногда съ выступающими по краю листа железками въ видѣ рѣдкихъ и очень мелкихъ зубцовъ; сѣмянки съ городчатымъ верхнимъ краемъ; хохолокъ изъ 1 ряда почти равныхъ волосковъ . . . . . 5.

4. Корневыхъ листьевъ много на довольно длинномъ черешкѣ; стеблевыхъ листьевъ 1 - 2, маленькихъ; корзинки на отклоненныхъ и дугою поднятыхъ цвѣтоножкахъ; обертка цилиндрично-колокольчатая; внутреннія чешуйки ея острые; хохолокъ почти бѣлый. . . . .

стѣнная яс.—*H. murorum* L. <sup>1)</sup>.

Корневыхъ листьевъ мало,—они сжаты къ основанію въ черешокъ; стеблевыхъ листьевъ 2 - 6; корзинки на прямыхъ, торчащихъ цвѣтоножкахъ; обертка коротко-колокольчатая; внутреннія чешуйки ея тупыя; хохолокъ грязно-бѣлый . . . . . обыкновенная яс.—*H. vulgatum* Fr. <sup>2)</sup>.

5. Цвѣточный стебель высокій, вѣтвистый, несетъ много мелкихъ корзинокъ (рис. 715), расположенныхъ метелкою или щиткомъ . . . . . 6.

Цвѣточная стрѣлка короткая, не выше  $\frac{1}{4}$  аршина, простая—объ одной крупной корзинкѣ,—или вильчато-раздѣльная о нѣсколькихъ корзинкахъ (2 - 5); корневище съ длинными надземными побѣгами. . . . . 9.



(Рис. 715).

6. Листья б. м. жесткіе, сѣро-или сине-зеленые, безъ железокъ по краямъ, съ обѣихъ сторонъ безъ звѣздчатого пушка, но часто съ длинными, разбросанными щетинками, какъ и на стеблѣ, узкіе, ланцетные или линейно-ланцетные, только нижніе нѣсколько лопатчатые; корзинки мелкія (рис. 715); обыкновенно въ большомъ числѣ, метельчатымъ щиткомъ . . . . . 7.

Листья б. м. мягкіе, свѣтло-или желто-зеленые, къ верхушкѣ съ железками по краямъ . . . . . 8.

7. Побѣговъ нѣтъ; железокъ на оберткѣ корзинокъ много. . . . . флорентійская яс.—*H. florentinum* All.

Побѣги всегда есть — длинные, подземные, твердые, тонкіе, съ маленькими, далеко разставленными листьями, б. ч. постепенно уменьшающимися къ верхушкѣ побѣга; железокъ на оберткѣ и на стеблѣ почти нѣтъ. . . . . мадьярская яс.—*H. magyàricum* N. & P.

8. Стебель б. ч. полый, сплюснутающийся, съ темными, б. ч. щетинистыми волосками, зеленый, какъ и листья, сверху голые, снизу съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ; щитокъ сжато-метельчатый, къ верхушкѣ б. ч. зонтичный; обертка темная; корзинки довольно крупныя; цвѣтки б. м. темно-желтые; побѣги очень ломкіе, либо подземные съ бѣлесоватыми чешуйками, либо надземные съ зелеными листьями, увеличивающимися къ верхушкѣ побѣга. . . . . холмовая яс.—*H. collinum* Gochn.

Стебель плотный, твердый, пушистый, желто-зеленый, какъ и листья, съ

<sup>1)</sup> Въ одномъ изъ гербаріевъ прежняго времени.

<sup>2)</sup> Въ Русскомъ уѣздѣ — между Свистуновымъ и Покровскимъ; въ Дмитровскомъ—близъ Качергина, въ казенномъ лѣсу (у верховьевъ Клязьмы).



обѣихъ сторонъ густо усѣянные звѣздчатымъ пушкомъ; щитокъ зонтичный о множествѣ мелкихъ корзинокъ; обертка маленькая, узкая, б. ч. свѣтлая; побѣговъ нѣтъ . . . . . полузонтичная яс.—*H. cymosum* L.

9 (5). Листья въ розеткѣ лоснящіеся, съ обѣихъ сторонъ голые, б. м. лопатчатые; побѣги съ листьями, постепенно возрастающими къ верхушкѣ побѣга; корзинокъ 2 - 5, б. ч. овальныхъ, съ обертками въ 6-8 мм. длиною; чешуйки ихъ тупыя, обыкновенно голыя. . . . .

ушковатая яс.—*H. Auricula* Lam. & DC. 1).

Листья въ розеткѣ тускые, съ звѣздчатымъ пушкомъ, по крайней мѣрѣ, на нижней сторонѣ,—ланцетные до обратно-яйцевидныхъ; побѣги съ листьями, обыкновенно уменьшающимися къ верхушкѣ побѣга; корзинокъ 1 - 2, рѣдко болѣе, съ обертками до 12 мм. длиною; чешуйки ихъ острые, б. м. волосистыя. . . . . 10.

10. Листья съ нижней стороны отъ скученнаго звѣздчатаго пушка бѣловатые или сѣроватые; стрѣлка обѣ одной, рѣдко о 2 корзинкахъ; обертка въ 10 - 12 мм. длиною, шаровидная или овальная, съ округленнымъ основаніемъ, густо покрыта звѣздчатымъ пушкомъ, какъ и стрѣлка; листья сверху тоже б. м. звѣздчато-пушистые. . . . .

волосистая яс.—*H. Pilosella* L.

Листья съ нижней стороны съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ; стрѣлка о 2 - 3 корзинкахъ, рѣдко обѣ 1; обертка въ 7 - 10 мм. длиною, яйцевидная или округлая, съ рѣдкимъ звѣздчатымъ пушкомъ, какъ и на стрѣлкѣ; листья сверху б. ч. голые. . . . .

ушковидная яс.—*H. auriculiforme* Fr 2).

220. *Hierochloa* Gmel. — лядники. Стебель съ побѣгами, только внизу съ листьями; отгибъ ихъ короткій, язычекъ длинный, острый; метелка яйцевидная, во время цвѣтенія растопыренная; цвѣтоносы извилистые, цвѣтоножки тонкія, гладкія и голыя, подъ колосками утолщенные; чашечныя пленки желтоватыя съ перепончатымъ краемъ; нижняя цвѣточная пленка темно-бурая, на краю рѣсичная: у мужскихъ цвѣтковъ подъ верхушкою съ короткою остью, у обоеполаго—безъ ости (рис. 716) . . . . .

(сѣверный) лядникъ—*H. borealis* Röm. & Schult.

221. \* *Hippophaë* L.—облѣпихи. Вѣтви кустарника темно-сѣрыя, морщинистыя; верхушки ихъ грязно-серебристыя, какъ и исподъ листьевъ, линейно-ланцетныхъ, суженныхъ въ короткій черешокъ; листочки мужскаго околоцвѣтника округло-эллиптическіе (рис. 717—b, a), спаружи грязно-серебристые, изнутри желтоватыя; плодъ овальный, оранжевый съ рѣдкими чешуйками . . . . . (крушинная) облѣпиха—\* *H. rhamnoides* L.

222. *Hippuris* L. — хвостники. Стебель простой, прямой, трубчатый, выступающій изъ воды, покрытъ частыми листьями, линейными, по 6 - 12 въ мутовкѣ (рис. 718, a); погруженные въ воду листья шире, мягкіе, отогнутые; цвѣтки очень мелкіе, сидячіе, зеленые (b, c) . . . . .

водяная сосенка—*H. vulgaris* L.

223. *Holcus* L. — бухарники. Дернистый злакъ, сѣро-зеленый, барха-

1) Близъ Петровскаго—Клинскаго уѣзда.


2) Подъ Москвою—разсыяно и рѣдко; въ Дмитровскомъ уѣздѣ — близъ Качергина, и въ Клинскомъ (Хмѣтьево) часто.

тисто-пушистый; листовой язычек продолговатый, расщепленный; метелка продолговатая, по отцветании сжатая, частая; ость мужского цветка не выступает из за блловатых чашечных пленок (рис. 719), точечно-бодравачатых, на килѣ рѣсничныхъ.


(шерстистый) бухарникъ—*H. lanatus* L. 1).



(Рис. 716).



(Рис. 717).



(Рис. 718).

#### 224. \* *Hordeum* L.—ячмени.

1. Колосъ сплюснутый, 2-рядный: плодучій средний колосокъ вверхъ торчащій съ торчащею остью: боковые же колоски на короткихъ ножкахъ— мужские, безъ ости . . . . . двурядный яч.—\* *H. distichum* L.

Колосъ не сплюснутый, изъ 6 рядовъ плодучихъ колосковъ: всѣ колоски сидячіе, остистые (рис. 720) . . . . . 2.

2. Средніе колоски прижатые, боковые сильнѣе выдаются, и потому колосъ 4-гранный . . . . . обыкновенный яч.—\* *H. vulgare* L.


Всѣ колоски одинаково выдаются, и потому колосъ 6-гранный . . . . . шестирядный яч.—\* *H. hexastichon* L.



(Рис. 719).



(Рис. 720).



(Рис. 721).

225. *Hottonia* L.—турчи. Погруженный въ воду стебель съ мутовчато сближенными листьями; листья съ линейными, острыми долями образуютъ плавающую розетку при основаніи цвѣтоноса, вверху железисто-пушистаго; цвѣтки 2-домно-многобрачные, съ почти линейными прицвѣтниками; чашечныя доли линейно-ланцетныя (рис. 721, b), одинаковой длины съ трубкою вѣнчика; доли его продолговатыя, тупыя (a) . . . . .

(болотная), турча—*H. palustris* L.

1) Подъ Москвою—Останкино, дача Студенецъ.


**226. Humulus L.**—хмѣли. Стебель, завивающійся направо, 4-гранный; листья на длинныхъ черешкахъ, сердцевидные, дланевидно 3-5-лопастные, съ заостренными, крупно-пильчатыми лопастями; верхніе листья на женскихъ растеніяхъ б. ч. цѣльные, 2-рядные; стебель и листья шероховатые; мужской околоцвѣтникъ бѣловатый; женскій—зеленый.

хмѣль—*H. Lupulus L.*


**227. Hydròcharis L.**—водокрасы. Стебель питевидный, плавающій, съ пучками листьевъ и корней; листья сердцевидно-почковидные, съ глубокимъ вырѣзомъ у черешка, цѣльнокрайніе; главныя жилки ихъ идутъ дугообразно отъ основанія пластинки по обѣ стороны средней жилки и пересѣкаются тонкими поперечными жилками.

(лягушечный) водокрасъ—*H. Morsus ranae L.*

**228. † Hyoscyamus L.**—белены. Стебель, листья и чашечка съ мягкимъ железистымъ, клейкимъ пушкомъ; нижніе листья черешковые, продолговатояйцевидные, выемчато-перисто-надрѣзные; стеблевые полустеблеобъемлющіе, яйцевидно-ланцетные, выемчато-крупно-зубчатые; цвѣтки почти сидячіе; плодоносная чашечка въ срединѣ перетянута, съ прямыми, колюче-острыми зубцами (рис. 722, b) . . . . . (черная) белена—† *H. niger L.*



(Рис. 722).



(Рис. 723).

**229. Hypericum L.**—звѣробой.

1. Стебель круглый, пушистый, какъ и листья на короткихъ черешкахъ, съ просвѣчивающими точечными железами; чашелистики съ железистыми рѣсничками, ланцетные, острые; цвѣтки блѣдно-желтые, въ пирамидальной метелкѣ; сѣмена бархатистыя. . . . . шершавый з.—*H. hirsutum L.*

Стебель ребристый, голый, какъ и сидячіе листья, съ черными точечками; чашелистики голые, цѣльнокрайніе; цвѣтки ярко-желтые въ щитковидной метелкѣ; сѣмена съ мелкими точечками. . . . . 2.

2. Стебель 4-гранный, полый, внизу съ красными побѣгами; листья вдоль края съ рядомъ черныхъ точекъ и рѣдкими просвѣчивающими железами; чашелистики тупые, широкіе, снизу съ черными точками, почти равны завязи. . . . . четырехгранный з.—*H. quadrangulum L.*

Стебель съ 2 острыми ребрышками, плотный; листья усажены частыми просвѣчивающими точечными железами; чашелистики острые, ланцетные, вдвое длиннѣ завязи; лепестки по краямъ съ рядомъ черныхъ точекъ (рис. 723, a) . . . . . лисколотый з.—*H. perforatum L.*

**230. Hyperitus Scop.**—подъельники. Мясистый стебель и густо покрывающіе его внизу чешуйчатые листья желтоватые или розоватые; листья яйцевидно-продолговатые, сидячіе, переходятъ въ прицвѣтники; кисть вначалѣ частая, поникшая; потомъ рѣдкая, выпрямленная; вѣтви цилин-

дично-колокольчатый (рис. 724): лепестки при основании съ выпуклостями, продолговатые, впереди расширенные и слегка зубчатые; рыльце ворончатое, темно-желтое, на краю пушистое . . . . .


(многоцвѣтковый) подѣльникъ—*H. multiflora* Scop.

231. \* *Hyssopus* L.—иссопъ. Кустистая трава съ короткими вѣтвями въ пазухѣхъ листьямъ линейно-ланцетныхъ на очень короткихъ черешкахъ, съ железистыми точечками; вѣнчикъ голубой . . . . .

(лѣчебный) иссопъ—\* *H. officinalis* L.



(Рис. 724).



(Рис. 725).

232. *Jasione* L.—букашники. Стебель и покрывающіе его внизу листья жестковолосые, вверху вытянуть въ длинный, голый, безлистный цвѣтоносъ обь одномъ головчатомъ зонтикѣ; листья по краямъ волнисто-курчавые: самые нижніе продолговато-обратно-яйцевидные, сужены въ черешокъ, тупые; остальные ланцетно-линейные, островатые; листочки цвѣточной обертки яйцевидные, заостренные, почти цѣльнокрайніе; вѣнчикъ голубой . . . . . (горный) буквашникъ—*I. montana* L.

233. *Impatiens* L.—недотроги.

а. Цвѣточные кисти короче листа и согнуты подъ нимъ; цвѣтки повислые, шпорецъ на концѣ загнутый (рис. 725, а); листья крупно-зубчатые; цвѣтки ярко-желтые, въ зѣвѣ съ красными крапинами . . . . .

прыгунъ—*I. noli tangere* L.

б. Цвѣточные кисти одинаковой длины съ листомъ или длиннѣе его, оттопыренные; цвѣтки торчащія; шпорецъ прямой; листья зазубренные; зубцы на концѣ железистые; цвѣтки свѣтло-желтые . . . . .

мелкоцвѣтная н.—† *I. parviflora* DC.

234. *Inula* L.—девясилы.

1. Наружныя чешуйки обертки яйцевидныя, листовидныя, снизу бархатистыя; внутреннія—лопатчатая, тупая; стеблевые листья продолговато-яйцевидные, сердцевидные, сидячіе, неравно-зубчатые, снизу бархатистые; корзинки большія; стебель высокій. . . . . подсолнечный д.—† *I. Helénium* L.

Всѣ чешуйки обертки ланцетныя или линейныя, на верхушкѣ зеленныя; внутреннія—заостренные; стеблевые листья ланцетные или продолговатые, зазубренные; корзинки среднихъ размѣровъ, стебель не высокій . . . . . 2.

2. Листья мягкіе, пушистые, какъ и стебель; нижніе сужены въ черешокъ, верхніе стеблеобъемлющіе съ сердцевиднымъ основаніемъ; всѣ чешуйки обертки линейныя, снаружи почти шелковистыя, одинаковой длины:

наружные не короче внутренних; сѣмянки пушистыя . . . . . британскій д.—*I. britannica* L.

Листья плотные, жесткіе, лоснящіеся, съ выдающимися снизу жилками; сѣмянки голыя . . . . . 3.

3. Листья съ обѣихъ сторонъ голые, ланцетные, острые, горизонтально оттопыренные отъ ломкаго, голаго стебля, съ сердцевиднымъ, объемлющимъ основаніемъ; наружныя чешуйки обертки ланцетныя, короче линейныхъ внутреннихъ, на верхушкѣ отогнутыя; корневище ползучее . . . . .

иволистный д.—*I. salicina* L.

Листья шершавые, рѣсничные, продолговатые, туповатые, сидячіе съуженнымъ или закругленнымъ основаніемъ на шершавомъ прямомъ стеблѣ; наружныя чешуйки обертки линейно-ланцетныя, торчащія, одинаковыя съ линейными внутренними . . . . . опушенный д.—*I. hirta* L. <sup>1)</sup>

### 235. *Iris* L.—касатики.

а. Стебель сплюснутый, плотный, о многихъ цвѣткахъ, немного длиннѣ нижнихъ широкихъ, линейно-ланцетныхъ листьевъ; околоцвѣтникъ желтый; внутреннія доли его едва выдаются, узкія, короче и уже рылецъ, наклоненныхъ къ наружнымъ долямъ; лопасти рыльца острыя; корневище толстое . . . . . желтый к.—*I. Pseudacorus* L.



(Рис. 726).

б. Стебель круглый, полый, обь 1—3 цвѣткахъ, много длиннѣ нижнихъ, узкихъ линейныхъ листьевъ; околоцвѣтникъ синий съ лиловыми жилками; внутреннія доли его выдающіяся, широкія, длиннѣ и шире рылецъ, прижатыхъ къ наружнымъ долямъ околоцвѣтника (рис. 726); лопасти рыльца тупыя; корневище тонкое, при основаніи стебля косматое . . . . . сибирскій к.—*I. sibirica* L.

### 236. \* *Juglans* L.—орѣшины.

а. Листочки сѣро-зеленые, сверху шерстистые, снизу съ сѣрымъ войлокомъ; плодъ яйцевидно-продолговатый, заостренный, съ кожурою, покрытою клейкими железистыми волосками, на длинной пушистой ножкѣ . . . . . сѣрая ор.—\* *J. cinerea* L.

б. Листочки зеленые, сверху голые, снизу съ рѣдкимъ тонкимъ пушкомъ; плодъ округло-шаровидный, съ кожурою, покрытою простыми волосками . . . . . черная ор.—\* *J. nigra* L.

### 237. *Juncus* L.—ситники.

1. Стебель съ одними только листовыми влагалищами при своемъ основаніи и съ прицвѣтнымъ листомъ, составляющимъ какъ бы его продолженіе; сбоку выходить пучекъ цвѣтковъ, въ видѣ метельчатаго или простаго ободка; листочки околоцвѣтника ланцетные, заостренные, не длиннѣ коробочки . . . . . 2.

Стебель съ 1 или нѣсколькими развитыми листьями и съ цвѣтками въ верхушечномъ ободкѣ, окруженномъ снизу прицвѣтными листьями . . . 5.

2. Ободокъ о немногихъ (3 - 7) цвѣткахъ, сжатый; стебель очень тонкій, нитевидный; тычинокъ 6; столбикъ очень короткій; шаровидная, тупая коробочка съ короткимъ, острымъ кончикомъ, свѣтло-желтая; околоцвѣтникъ зеленоватый; корневище нѣсколько ползучее . . . нитевидный с.—*J. filiformis* L.

<sup>1)</sup> По Окъ—Карапчеево, Коломенскаго уѣзда.

Ободокъ со множествомъ цвѣтковь; стебель болѣе толстый, дернистый. . . 3.

3. Стебель сизый, глубоко-бороздчатый, съ сердцевинною, раздѣленною поперечными перегородками на гнѣзда; листовыя влагалища чернобурья, лоснящіяся; ободокъ развѣсистый; тычинокъ 6; столбикъ явственный; коробочка темно-бурая, эллиптическая; съ острымъ кончикомъ . . . 4.

сизый с.—*J. glaucus* Ehrh. 1).

Стебель зеленый, тонко-бороздчатый, съ сплошною рыхлою сердцевинною; листовыя влагалища тускляя, свѣтло-бурья; тычинокъ 3; столбикъ едва замѣтный; коробочка буроватая, обратно-лицевидная. . . 4.

4. Ободокъ развѣсистый, съ длинными цвѣтоносами; коробочка на верхушкѣ вдавленная; съ бугоркомъ въ углубленіи . . . 4.

развѣсистый с.—*J. effusus* L.

Ободокъ скученный, почти головчатый, съ короткими цвѣтоносами; коробочка тупая, съ острымъ кончикомъ на верхушкѣ . . . 5.

скученный с.—*J. conglomeratus* L.

5 (1). Цвѣтки на послѣднихъ развѣтвленіяхъ ободка скучены головками; стеблевые листья цилиндрично-сплюснутые, узловатые, съ сильно выступающими поперечными жилками, а внутри трубчатые, съ поперечными перегородками; коробочка острая или заостренная, темно-бурая, длиннѣе бурого околоцвѣтника; корневище ползучее . . . 6.

Цвѣтки на послѣднихъ развѣтвленіяхъ ободка одиночные; стеблевые листья плотные, шиловидные или линейные, вверху или при основаніи желобчатые; коробочка тупая . . . 8.

6. Внутренніе листочки околоцвѣтника длиннѣе наружныхъ, къ концу слегка согнутые,—всѣ ланцетные, тонко и длинно-заостренные; коробочка тонко-заостренная . . . 7.

Всѣ листочки околоцвѣтника одинаковой длины, плоскіе: внутренніе тупые, округленные; наружные острые или съ острымъ кончикомъ; коробочка острая или коротко-заостренная . . . 7.

7. Вѣтви ободка расходящіяся или растопыренныя; наружные листочки околоцвѣтника острые; коробочка заострена короткимъ кончикомъ; листовыя влагалища на спинкѣ округляя . . . 8.

Вѣтви ободка вверху торчащія; наружные листочки околоцвѣтника округлые, съ короткимъ острымъ кончикомъ; коробочка острая; листовыя влагалища на спинкѣ съ острымъ ребромъ . . . 8.

альпійскій с.—*J. alpinus* Vilb.

8 (5). Листочки околоцвѣтника продолговато-яйцевидные, тупые, бурые, съ зеленою полоскою и бѣлымъ перепончатымъ краемъ, на треть короче почти шаровидной коробочки каштановаго цвѣта; корневище ползучее; стебель сплюснутый, около середины съ 1 стеблевымъ листомъ; нижніе листья узколинейные . . . 8.

Листочки околоцвѣтника ланцетные, шиловидно-заостренные (рис. 727—а, в), зеленоватые; внутренніе короче наружныхъ, длиннѣе эллиптической желто-бурой коробочки (в, с); стебель круглый, вѣтвистый, о 2-3 тонко-шиловидныхъ листьяхъ . . . 9.

238. *Juniperus* L.—можжевельники. Иглы сильно оттопыренныя, жесткія, сверху съ плоскимъ синеватымъ желобкомъ, снизу съ тупымъ килемъ;

1) и 2) Хранятся въ гербаріяхъ прежняго времени.

киль съ продольною бороздкою; ложная ягода шаровидно-йцевидная, черная съ сизымъ налетомъ, молодыя вѣтви красно-бурыя, (подъ листьями съ продольными полосками, изъ коихъ средняя толще).


(повсемѣстный) можжевельникъ—*I. communis* L.

**239. Knautia Coulter** — короставники. Стебель прямой,верху мало-лиственный, съ вѣтвями обь 1' корзинкѣ, сѣроватый, какъ и листья, отъ короткаго пущка и шершавый отъ длинныхъ жесткихъ волосковъ; листья продолговато-ланцетные или перисто-раздѣльные; корзинки полушаровидныя, листочки обертки треугольно-ланцетные, шершавые, съ неясными зубцами по краямъ; чашечный отгибъ вдвое короче плода.

(полевой) короставникъ—*K. arvensis* Coulter



(Рис. 727).



(Рис. 728).

**240. Koeleria Pers.** — келерія. Стебель тонкій, гладкій, вверху пушистый; листья узко-линейные, зеленые, плоскіе, впоследствии свернутые, на краю шероховатые, — нижніе по краямъ рѣсничные, коротко-пушистые, какъ и влагалища ихъ; колоски лоснящіеся, желтоватые.

(гребенчатая) келерія—*K. cristata* Pers.<sup>1)</sup>

**241. Lactuca**—салаты.

1. Стебель сѣро-зеленый, полый, мягкій; листья нѣжные, снизу сѣро-зеленые, суженные въ крылатый черешокъ, лировидные, съ долями угловатыми, крупно-зубчатыми и большою конечною 3-угольно-сердцевидною лопастью; метелка пирамидальная, рѣдкая, растопыренная; желтыхъ цвѣтковъ въ корзинкѣ по 5; сѣмянки голыя, чернобурыя, въ 2 - 3' раза длиннѣе свѣтло-бурого носика. . . . . стѣпной с.—*L. muralis* Less.<sup>2)</sup>

Стебель желтоватый, плотный, твердый; листья жесткіе, сидячіе, объемлющіе стебель; свѣтло-желтыхъ цвѣтковъ въ корзинкѣ 8 - 16 (рис 728, а); сѣмянки вверху съ короткими щетинками, буроватыя, почти такой же длины, какъ и бѣлый носикъ (b).

2. Метелка пирамидальная, сначала съ поникшими вѣтвями; листья повернуты на ребро, шиповато-зубчатые, съ стрѣловиднымъ основаніемъ: нижніе б. ч. струговидные, съ угловато-зубчатыми долями, верхніе — ланцетные, цѣльные. . . . . дикій с.—*L. Scariola* L.

Метелка щитковидная, съ вверху торчащими вѣтвями; листья плоскою стороною обращены къ стеблю, съ сердцевиднымъ основаніемъ, безъ шиповатыхъ зубцовъ по краямъ. . . . . полевая с.—*L. sativa* L.

1) По Окъ, въ Серпуховскомъ уездѣ.

2) Въ Можайскомъ уездѣ—Тропарево, Русино.



**242. *Lamium* L. — яснотки.**

1. Вѣнчикъ съ согнутою и снизу вздутою трубкою (рис. 729, а), подъ вздутиемъ съ перехватомъ, а внутри съ волосянымъ кольцомъ; шлемъ сверху по срединѣ плоскій; чашечные зубцы по отцвѣтаніи растопыренные; корневище съ ползучими стеблевыми побѣгами . . . . . 2.


Вѣнчикъ съ прямою трубкою, безъ вздутія; шлемъ по срединѣ выпуклый; корень тонкій, простой; цвѣтки малиновые . . . . . 3.

2. Шлемъ вѣнчика съ короткими рѣсничками; боковыя лопасти нижней губы съ 1 шиловиднымъ зубцомъ; трубка вѣнчика съ поперечнымъ перехватомъ и такимъ же волосянымъ кольцомъ, слегка вздутая надъ перехватомъ и постепенно расширенная въ зѣвъ; вѣнчикъ свѣтло-малиновый; нижняя губа съ темно-красными крапинами . . . . .

крапчатая я. — *L. maculatum* L.

Шлемъ вѣнчика съ длинными рѣсничками, мохнатый; боковыя лопасти нижней губы съ большимъ шиловиднымъ зубцомъ и 2 - 3 короткими (рис. 729—b, а); трубка вѣнчика съ косымъ перехватомъ и такимъ же волосянымъ кольцомъ, надъ перехватомъ быстро вздута бугромъ; вѣнчикъ изжелта-бѣлый, нижняя губа внизу съ свѣтло-зелеными крапинами . . . . .

глухая крапива — *L. album* L.



(Рис. 729).



(Рис. 730).

3. Верхніе листья на очень короткихъ черешкахъ, сердце-яйцевидные, съ неровными косыми городками; трубка вѣнчика съ поперечнымъ перехватомъ и кольцомъ, быстро расширена въ зѣвъ, немного длиннѣе чашечки; боковыя лопасти нижней губы съ 2 зубцами; зубцы чашечки немного длиннѣе ея трубки, по отцвѣтаніи растопыренные . . . . .

малиновая я. — *L. purpureum* L.

Верхніе листья сидячіе, полустеблеобъемлющіе, почковидные, надрѣзано-городковые; трубка вѣнчика безъ перехвата, внутри голая, почти втрое длиннѣе чашечки; боковыя лопасти нижней губы съ 1 зубцомъ; зубцы чашечки короче ея трубки, по отцвѣтаніи прямые или слегка сходящіеся . . . . .

стеблеобъемлющая я. — *L. amplexicaule* L.

**243. *Lampsana* L. — бородавники.** Листья пѣшныя, мягкіе, выемчато-зубчатые: нижніе на черешкахъ ланцетные, съ крупною верхушечною долею, округло-яйцевидною; верхніе—продолговато-ланцетные, острые, пѣльные; корзинки мелкія о немногихъ цвѣткахъ (рис. 730, а), въ рѣдкой щитковидной метелкѣ; чешуйки обертки продолговато-линейныя, тупыя, въ плодonoснхъ корзинкахъ торчащія (а) . . . . .

(повсемѣстный) бородавникъ — *L. communis* L.

244. *Larra Tougn.*—лопухи.

1. Только наружныя чешуйки обертки крючkovатыя; внутреннія тупыя, съ прямымъ, короткимъ, острымъ кончикомъ, покрашенныя; обертка съ густою паутиною, короче цвѣтковь; корзинки щиткомъ; сѣмянки съ слабыми поперечными морщинками . . . . . войлочный л.—*L. tomentosa* Lam.

Всѣ чешуйки обертки съ крючkovатымъ кончикомъ (рис. 731, а), голыя или съ рѣдкою паутиною . . . . . 2.

2. Корзинки на длинныхъ ножкахъ, щиткомъ; обертка голая, зеленая, длиннѣе цвѣтковь, сѣмянки вверху нѣсколько морщинистыя (рис. 731). . . . . крупноголовый л.—*L. major* Gaertn.


Корзинки на короткихъ ножкахъ, кистью, верхнія скученныя; обертка слегка паутинистая, короче цвѣтковь; внутреннія чешуйки обертки на концѣ красноватыя; сѣмянки при основаніи съ слабыми поперечными морщинками . . . . . мелкоголовый л.—*L. minor* DC.

245. \* *Làrix Tougn.*—лиственницы.


а. Женскія цвѣтушія шишки цилиндрическія, ярко-красныя; чешуйки зрѣлыхъ шишекъ голыя, на спинкѣ явственно бороздчатыя, слегка выпуклыя, почти плоскія, по краямъ волнистыя, не плотно прижатыя; иглы въ 1-3 см. длиною . . . . . европейская л.—\* *L. europaea* DC.

б. Женскія цвѣтушія шишки яйцевидныя, блѣдно-зеленыя; чешуйки зрѣлыхъ шишекъ на спинкѣ шерстистыя, неясно бороздчатыя, сильно выпуклыя, съ краемъ цѣльнымъ, загнутымъ внутрь, до вызрѣванія сѣмянъ плотно сомкнутыя; иглы въ 3-5 см. длиною . . . . .

сибирская л.—\* *L. sibirica* Ledb.



(Рис. 731).



(Рис. 732).

246. *Laserpitium* L.—гладыши. Стебель вверху вѣтвистый, внизу съ отогнутыми волосками; листья перисто 2-сложные; листовыя доли ланцетныя, по краямъ съ жесткими волосками; лепестки желтовато-бѣлые . . .

(прусскій) гладышъ—*L. prutenicum* L.

247. *Lathraea* L.—чешуйники. Корневище длинное, бѣлое, вѣтвистое, мясистое съ частыми, супротивными, толстыми, мясистыми чешуями; цвѣточный стебель вверху железисто-пушистый, красноватый; цвѣтки, съ малоповымъ налетомъ, на короткихъ ножкахъ, поникшіе, въ частой односторонней кисти, до разцвѣтанія согнутой; прицвѣтники очередные, округло-ромбическіе, 2-рядные; зубцы чашечки яйцевидныя, островатыя (рис. 732—а, с); пыльники волосистые (b) . . . . . Петровъ-крестъ—*L. Squamaria* L.

248. *Lathyrus* L.—чины.

1. Листья обь 1 парѣ листочковъ; цвѣточная кисть много длиннѣ листа . . . . . 2.

Листья о 2 - 5 парахъ листочковъ; цвѣточная кисть не длиннѣ или нѣсколько длиннѣ листа; стебель крылатый, листовые черешки окаймленные; 2 верхнихъ зубца чашечки отогнутые, короче нижнихъ . . . . . 4.

2. Стебель и листовые черешки широко-крылатые; крылья на листовомъ черешкѣ уже чѣмъ на стеблѣ; прилистники ланцетно-линейные; листья о 5 продольныхъ жилкахъ; цвѣтки пестрые: лодочка и парусъ снаружи зеленоватые; парусъ внутри розовый, крылышки малиновые; верхніе зубцы чашечки короче нижнихъ; рубчикъ окаймляетъ половину мелко-бугорчатого сѣмени . . . . . лѣсная ч.—*L. silvester* L.

Стебель ребристый, безъ крыльевъ; листовые черешки не крылатые . . 3.

3. Прилистники яйцевидно-ланцетные, съ 2 неравными придатками; листочки продолговато-ланцетные, о 3 продольныхъ жилкахъ; вѣничикъ желтый; всѣ зубцы чашечки ланцетно-шиловидные, почти равны ея трубчкѣ; бобъ линейный, сплюснутый, зрѣлый черныи; сѣмена сплюснутыя, гладкія, лоснящіяся, съ продолговатымъ рубчикомъ . . . . . луговая ч.—*L. pratensis* L.

Прилистники узко-ланцетные; листочки продолговато-эллиптические; вѣничикъ темно-розовый, душистый; верхніе зубцы чашечки 3-угольные, короче ея трубочки; бобъ почти цилиндрический, голый; сѣмена почти гладкія, съ небольшимъ рубчикомъ; тонкое вѣтвистое корневище съ клубневидно-утолщенными корнями . . . . . клубненосная ч.—*L. tuberosus* L. <sup>1)</sup>.

4. Листья о 2 - 3 парахъ продолговато-ланцетныхъ листочковъ; прилистники значительно меньше листочковъ, ланцетные, заостренные; кисть рѣдкая; вѣничикъ грязно-синій . . . . . болотная ч.—*L. paluster* L. <sup>2)</sup>.

Листья о 3 - 5 парахъ продолговато-овальныхъ листочковъ; прилистники не меньше листочковъ, почти яйцевидные, при основаніи неровно-зубчатые; кисть частая; вѣничикъ снаружи зеленоватый, внутри лилово-розовый . . .

гороховидная ч.—*L. pisiformis* L. <sup>3)</sup>.

249. *Lavatera* L.—хатымы. Стебель и листья сѣровато-войлочные; всѣ листья черешковые, городковые: нижніе угловато 5-лопастные; верхніе 3-лопастные, —средняя лопасть длиннѣ; цвѣтоножки торчащія, длиннѣ листового черешка; лепестки свѣтло-розовые, 2-лопастные, втрое длиннѣ чашелистиковъ; столбиковая подушечка коническая не прикрываетъ сверху гладкихъ сѣмянокъ . . . . . (тюрингенская) хатыма—*L. thuringiaca* L.

250. *Lédu*m L.—багульники. Молодые вѣтви, цвѣтоножки, листья снизу и коробочки покрыты ржавчинно-бурымъ войлокомъ; листья линейные, съ свернутыми краями; вѣничикъ бѣлый, короче тычинокъ (рис. 733, а); коробочка продолговатая, поникшая (b) . . . . .

(болотный) багульникъ—*L. palustre* L. <sup>4)</sup>.

251. *Léersia* Sol.—лерсія. Желто-зеленый, остро-шероховатый злакъ, съ пушистыми узлами и щетиноватыми влагалищами, листьями, цвѣтоносами и колосками; корневище ползучее съ длинными побѣгами; стебель колѣчатый

<sup>1)</sup> По р. Лопаснѣ, близъ Отрады, —Серпуховскаго уѣзда.

<sup>2)</sup> Раменское, Бронницкаго уѣзда.

<sup>3)</sup> По Окѣ, близъ Серпухова.

<sup>4)</sup> По торфянымъ болотамъ.

поднимающийся; листья длинные, съ короткимъ язычкомъ; колоски полу-  
овальные на сочлененныхъ цветоножкахъ (рис. 734) . . . . .  
дикій рисъ—*L. oryzoides* Sol.



(Рис. 733).



(Рис. 734).

**252. *Lemna* L.—ряски.**

1. Листецъ снизу съ пучкомъ корешковъ, красновато-лиловый, сверху зе-  
леный, съ выступающими дугообразными жилками (рис. 735, с), толстый,  
плавающий, округло-обратно-яйцевидный и съ 2 зачаточными, перепончатыми  
листочками; тычинковые нити кънизу сужены; сѣменопочекъ 4 - 6 . . . . .


многокорешковая р.—*L. polyrrhiza* L.

Листецъ снизу съ однимъ корешкомъ, съ обѣихъ сторонъ зеленый, съ  
слабо замѣтною 1 жилкою, безъ зачаточныхъ листочковъ; тычинковые нити  
цилиндрическія; сѣменопочка 1 . . . . . 2.


2. Листецъ не прозрачный, толстый, ярко-зеленый, плавающий, округло-  
обратно-яйцевидный, цѣльнокрайній, не суженный въ черешокъ (рис. 735, а)  
. . . . . мелкая р.—*L. minor* L.

Листецъ просвѣчивающій, тонкій, свѣтло-зеленый, погруженный въ воду  
и лишь во время цвѣтенія плавающій, продолговато-ланцетный (рис. 735, б),  
спереди зубчатый, суженный въ видѣ черешка . . . . .

трехдольная р.—*L. trisulca* L.



(Рис. 735).



(Рис. 736).

**253. \* *Lens* Tourm.—чечевицы.** Вѣтвистый стебель и листья пушистые;  
прилистники ланцетные, цѣльнокрайніе; листья о 5 - 7 паряхъ продолгова-  
тыхъ, тупыхъ листочковъ, обыкновенно съ простыми усиками; кисть не  
длиннѣе листа; голубовато-бѣлый вѣнчикъ не длиннѣе чашечки съ длин-  
ными шиловидными зубцами; бобъ голый (рис. 736, с) . . . . .

(сѣдобная) чечевица—\* *L. esculenta* Moench.

**254. Leontodon L.—кульбабы.**

а. Стрѣлка обыкновенно вильчато-развѣтвленная, о 2 - 4 корзинках; цвѣтоносы подѣ корзинками утолщенные, вверху со многими прицвѣтными чешуйками, всегда торчащіе; хохолокъ изъ однихъ перистыхъ волосковъ; волоски, покрывающіе иногда стебель и листья, всегда простые. . . . .

осенняя к.—*L. autumnalis* L.

б. Стрѣлка всегда простая, обѣ 1 корзинкѣ, безлистная или съ 1 - 2 чешуйчатыми прицвѣтниками, слегка утолщенная, до цвѣтораспусканія поникшая; наружные волоски хохолка простые, зазубренные, короче внутреннихъ, при основаніи пленчато-уширенныхъ (рис. 737); волоски, часто покрывающіе стебель и листья, 2 - 3 раздѣльные. . . . . копыelistная к.—*L. hastilis* L.


**255. Leonurus L.—пустырники.** Стебель пушистый; листья снизу сѣрые, сверху темнозеленые, на длинныхъ черешкахъ: нижніе округлые, сердцевидные, пальчато 5-раздѣльные; остальные продолговатые, при основаніи клиновидные, не глубоко 3-раздѣльные, съ надрѣзанными пальчатыми долями; прицвѣтные—цѣльные, острые; мутовки частыя, сидячія въ пазухахъ верхнихъ листьевъ, образуютъ длинный, прерывистый колосъ; цвѣтки мелкіе, съ линейными, колючими прицвѣтниками; розовый вѣнчикъ, съ верхнею губою малиною, мохнатою, вдвое длиннѣе чашечки, съ 2 нижними отогнутыми зубцами (рис. 738—а, б) . . . . . сердечникъ—*L. Cardia* L.




(Рис. 737).



(Рис. 738).



(Рис. 739)



(Рис. 740)

**256. Lepidium L.—жерухи.**

1. Стебель и листья голые; нижніе листья перисто-раздѣльные, съ узкими долями; верхніе сидячіе, линейные, цѣльно-крайніе; стручечки округло-овальные, съ очень короткимъ столбикомъ (рис. 740, а) . . . . . 2.

Стебель и листья пушистые; стеблевые листья продолговатые, выемчато-зубчатые; верхніе стеблеобъемлющіе съ стрѣловиднымъ основаніемъ; стручечки на горизонтально отклоненныхъ ножкахъ, съ замѣтнымъ столбикомъ. . . . . 3.

2. Лепестковъ нѣтъ (рис. 739, а); 2 тычинки (б); стручечки на длинныхъ, отклоненныхъ отъ цвѣтоноса ножкахъ, почти безкрылые (с); трава неприємно пахнущая. . . . . клоповникъ—*L. ruderale* L.

Вѣнчикъ есть; тычинокъ 6; стручечки на короткихъ, торчащихъ ножкахъ, прижатыхъ къ цвѣтоносу, къ верхушкѣ широко - крылатые (рис. 740, а); трава сизая. . . . . посѣвная ж.—\*†*L. sativum* L.

3. Нижніе листья обратно-яйцевидные; стеблевые нижніе тупые,—верхніе острые; стручечки яйцевидно-эллиптические, точечно-бородавчатые, къ верхушкѣ широко-крылатые, съ выемкою, изъ которой выдается столбикъ. . . . .

равнинная ж.—*L. campèstre* R. Br. ¹).

¹) Сохранилось въ гербаріяхъ прежняго времени.

Всѣ листья продолговатые, острые; стручечки сердцевидно-яйцевидные, нѣсколько вздутые, на верхушкѣ безъ выемки, острые, съ длиннымъ столбикомъ . . . . . крупчатая ж. — *L. Draba* L. <sup>1)</sup>.

**257. *Leucanthemum* Tourm.** — нивяники. Стебель вверхъ безлистный, обь 1 или немногихъ корзинкахъ; нижніе листья сужены въ длинный черешокъ, обратно-яйцевидно-лопатчатые, городковые, — стеблевые сидячіе, продолговатые, пильчатые, къ основанію надрѣзанные; сѣмянки о 10 ребрышкахъ.

(обыкновенный) нивяникъ — *L. vulgare* Lmk.

**258. \* *Levisticum* Koch** — зори. Стебель высокій, круглый, вверхъ вѣтвистый; листочки лоснящіеся, крупные, широкіе, къ основанію клиновидные, надрѣзанно-зубчатые . . . . . (лѣчебная) зоря — *L. officinale* Koch

**259. *Libanotis* Crtz** — порѣзники.

a. Нижніе листья перисто-2-сложные, верхніе перистосложные; листочки ихъ перисто-разрѣзные съ широко-ланцетными, острыми долями; цвѣтки бѣловатые . . . . . горный п. — *L. montana* All.

b. Всѣ листья перистые, съ широкими листочками, перисто-разсѣченными на крупныя, заостренныя доли; цвѣтки розоватые или желтоватые, особенно не распустившіеся . . . . . сибирскій п. — *L. sibirica* C. A. M.



(Рис. 741).



(Рис. 742).

**260. *Ligularia* Cass.** — бузульники. Стебель простой; корневые листья сердцевидно-треугольные, выемчато-зубчатые, снизу сѣровато-пушистые; стеблевыхъ листьевъ мало, — верхніе въ видѣ перепончатыхъ влагалищъ; корзинки съ желтыми цвѣтками, подъ конецъ поникшія, съ цвѣтоножками, прицвѣтниками и основаніемъ обертки пушистыми . . . . .

(сибирскій) бузульникъ — *L. sibirica* Cass. <sup>2)</sup>.

**261. *Lilium* L.** — лиліи. Стебель высокій, вверхъ пушистый, только въ срединѣ съ нѣсколькими мутовками о 5—6 листьяхъ, эллиптически-ланцетныхъ, заостренныхъ, суженныхъ въ короткій черешокъ; верхніе — очередные листья мельче; цвѣтки грязно-красноватые, съ темными крапинами, на длинныхъ поникшихъ цвѣтоножкахъ (рис. 741, а); луковица желтая. . . . .

царскія кудри — *L. Martagon* L. <sup>3)</sup>.

**262. *Limosella* L.** — лужники. Голая травка съ пазушными ползучими и укореняющимися побѣгами; листья толстоватые, продолговатые или линейно-лопатчатые; чашечные зубцы яйцевидные, острые (рис. 742); чашечка почти вдвое короче вѣнчика и округло-яйцевидной коробочки . . . . .

(водный) лужникъ — *L. aquatica* L.

1) Одичалое въ Александровскомъ саду, въ Москвѣ.

2) Большія Мытищи, въ торфяномъ болотѣ.


3) Одичалое близъ с. Екаториновскаго Звенигородскаго уѣзда.

263. *Linaria*—льнянки.

а. Стебель простой, покрытъ частыми, сидячими листьями, очередными, острыми, на краю свернутыми, о 3 жилкахъ, съ вдавленною сверху среднею жилкою; цвѣтки довольно крупныя, въ пазухѣ прицвѣтниковъ, образуютъ густую кисть; цвѣтоножки лишь немного длиннѣе голой чашечки; зубцы ея ланцетные, острые о 3 жилкахъ, вдвое короче коробочки (рис. 743, б); шпорецъ не короче свѣтло-желтаго вѣнчика съ оранжевымъ бугромъ, заслоняющимъ зѣву (а); сѣмена плоскія, съ широкимъ перепончатымъ ободкомъ, въ срединѣ бугорчато-шероховатыя (с) . . . . .

дикій ленъ—*L. vulgaris* Mill.

б. Стебель снизу вѣтвистый; листья сужены въ черешокъ, тупые; нижніе супротивные, остальные—очередные; цвѣтки мелкіе, въ пазухѣ стеблевыхъ листьевъ, образуютъ рѣдкую кисть; цвѣтоножки въ 3-4 раза длиннѣе железисто-пушистой чашечки; зубцы ея тупые, продолговато-линейные, нѣсколько длиннѣе железисто-пушистой коробочки; шпорецъ вдвое короче свѣтло-лиловаго вѣнчика съ блѣдно-желтымъ бугромъ, не заслоняющимъ зѣву; сѣмена продолговатыя, безъ перепончатого ободка, съ продольными бороздками . . . . . малая л.—*L. minor* Desf. <sup>1)</sup>



(Рис. 743).



(Рис. 744).

264. *Linnaea Gronovius*—линея. Листья черешковые, кругловатыя, кожистыя, вверху городковые, слегка пушистыя, какъ и молодые вѣтви; цвѣтки розоватыя съ малиновыми жилками внутри, повислыя, на длинныхъ ножкахъ (рис. 744), железисто-пушистыхъ, какъ и самый цвѣтоносъ . . .

(сѣверная) линея—*L. borealis* L. <sup>2)</sup>

265. *Linum* L.—льны.

1. Листья супротивные, на краю рѣснично-шероховатыя; стебель вильчато-развѣтвленный, нитевидный; цвѣтки полузонтикомъ; мелкіе чашелистики эллиптическіе, по краямъ железисто рѣсничные, вдвое короче бѣлыхъ лепестковъ, съ желтымъ пятномъ при основаніи . . . . .

слабительный л.—*L. catharticum* L.

Листья очередные, гладкіе; стебель мало вѣтвистый; цвѣтки въ развѣсистыхъ щиткахъ, довольно крупныя; чашечка втрое короче лепестковъ . . . 2.

2. Лепестки желтые; чашелистики ланцетные, по краямъ железисто-рѣсничные, немного длиннѣе коробочки; цвѣтоножки очень короткія; при осно-


<sup>1)</sup> Преимущественно по Окъ и Москвѣ рѣкѣ.

<sup>2)</sup> По хвойнымъ лѣсамъ.



ваніи листьевъ по 2 железки; стебель вверху ребристый. . . . .  
желтый л.—*L. flavum* L. <sup>1)</sup>.

Лепестки голубые; чашелистики яйцевидные, по краямъ коротко-рѣснич-  
ные, по безъ железокъ, не длиннѣе коробочки (рис. 745, с); цветоножки  
длинные; при основаніи листьевъ железокъ нѣтъ; стебель круглый . . .  
употребительный л.—*L. usitatissimum* L.



(Рис. 745).




(Рис. 746).


266. *Liparis* Rich. — лосняки. Желто-зеленая травка, съ цветоносомъ  
вверху 3-граннымъ и 2 продолговато-ланцетными листьями; кисть рѣдкая,  
о немногихъ цвѣткахъ; нижняя губа овальная, тупая, мелко-городковая, по  
бокамъ съ выемкою, не длиннѣе остальныхъ линейныхъ листковъ околоцвѣт-  
ника (рис. 746, а). . . . (Лозеліевъ) лоснякъ—*L. Loesélii* Rich. <sup>2)</sup>.

267. *Listera* R. Br.—тайпики.

а. Листья округло-яйцевидные; кисть длинная, со множествомъ цвѣтковъ;  
губа желтоватая, клиновидно-обратно-яйцевидная, съ 2 лопастями продол-  
говато-линейными, тупыми (рис. 747—а, б); остальные лепестки зеленые  
сходятся шлемомъ (а). . . . . овалъный т.—*L. ovata* R. Br.



(Рис. 747).



(Рис. 748).

б. Листья треугольно-сердцевидные; кисть короткая, о 6 - 12 цвѣткахъ;  
губа продолговато-линейная, съ 2 лопастями, ланцетными, острыми, а при  
основаніи съ каждой стороны по боковому зубцу; остальные лепестки рас-  
ходятся: наружные зеленые, внутренніе и губа изнутри красноватые. . .  
сердцевидный т.—*L. cordata* R. Br. <sup>3)</sup>.

268. *Lithospermum* L.—воробейники.

а. Листья сверху темно-зеленые, снизу свѣтло-зеленые, съ выдающимися  
боковыми жилками,—всѣ ланцетные, острые, часто-сидячіе по стеблю; вѣн-  
чикъ зеленоватый съ короткою трубкою (рис. 748, а) и маленькими по-

<sup>1)</sup> Сохранилось въ гербаріи прежняго времени.

<sup>2)</sup> Подъ Москвою—близъ сельца Богородскаго, въ торфяномъ болотѣ.

<sup>3)</sup> Хранится въ одномъ изъ гербаріевъ прежняго времени.

лыми чешуйками въ зѣвѣ (с); орѣшки гладкіе, лоснящіеся, бѣлые, яйцевидные, вверху округленные (b) . . . лѣчебный в.—*L. officinale* L. <sup>1)</sup>.

b. Листья свѣтло-зеленые, съ не выдающимися снизу боковыми жилками: нижніе тупые, суженные въ черешокъ,—остальные сидятъ рѣдко по стеблю; вѣнчикъ бѣловатый, съ длинною, тонкою трубкою и 5 выдающимися, продольными складками въ зѣвѣ; орѣшки бугорчатые, тусклые, буроватые, яйцевидно 3-угольные, островатые . . . полевой в.—*L. arvense* L. <sup>2)</sup>.


#### 269. *Lolium* L.—плевелы.

a. Чашечная пленка не короче колоска о 6 - 8 цвѣткахъ; нижняя цвѣточная пленка съ длинною остью, продолговатая, при основаніи хрящеватая (рис. 749); стебель прямой, высокій, довольно толстый, съ молодыми листьями въ почкосложеніи свернутыми . . . опьяняющій п.—*L. temulentum* L.

b. Чашечная пленка много короче колоска о 8 - 10 цвѣткахъ; нижняя цвѣточная пленка безъ ости, ланцетная, травянисто-перепончатая; стебель слабый, восходящій, дернистый; листья въ почкосложеніи вдоль складчатые . . . англійскій райграссъ—*L. perenne* L. <sup>3)</sup>.



(Рис. 749).



(Рис. 750).

#### 270. *Lonicera* L.—жимоласти.

1. Завязи парныхъ цвѣтковъ и черносинія ягоды вполнѣ сросшіяся; пушистый цвѣтоносъ много короче бѣловатаго вѣнчика; листья продолговато-эллиптическіе, снизу сизые, жилчатые, слегка пушистые . . . голубая ж.—\* *L. coerulea* L.

Завязи парныхъ цвѣтковъ и ягоды свободныя или сросшіяся лишь у самаго основанія; цвѣтоносъ не короче вѣнчика . . . 2.

2. Молодые вѣтви, листья, цвѣтоносы и вѣнчикъ пушистые; листья эллиптическіе, острые, снизу блѣднѣе; цвѣтоносъ длиною съ цвѣтокъ изжелта-бѣлый; ягоды темнокрасныя . . . волчьи ягоды—*L. Xylbsteum* L.

Молодые вѣтви, листья, цвѣтоносы и вѣнчикъ голые; листья сердцевидно-яйцевидные, тупые, снизу сизые; цвѣтоносъ длиннѣе цвѣтковъ розовыхъ или бѣлыхъ; ягоды оранжевыя . . . татарская ж.—\* *L. tatarica* L.

271. *Lotus* L.—лядвенцы. Стебель плотный, твердый, лежачій; листочки обратно-яйцевидные, въ нижней парѣ косые; зонтики о 2 - 5 цвѣткахъ на длинномъ цвѣтоносѣ; зубцы чашечки до распусканія сходящіеся, не длиннѣе ея трубочки (рис. 750 а, с); крылышки усѣченные, нѣсколько уже лодочки, согнутой подъ прямымъ угломъ и быстро заостренной въ носикъ (b); вѣп-

1) 2) По берегамъ рѣкъ—Москвы рѣки и Оки.

3) Спасское, Дмитровскаго уѣзда.


чикъ ярко-желтый, парусъ оранжевый, — сухой становится синезеленымъ; бобъ прямой, цилиндрической (с) . . . . .

(рогатый) лядвенецъ—*L. corniculatus* L.


**272. *Lunaria* L.**—лунники. Листья длинно-заостренные, пильовидно-зубчатые, съ короткими волосками, — верхніе съ округленнымъ основаніемъ; боковые чашелистики при основаніи съ выпуклинами; цвѣтки крупные, душистые; стручечки повислые, эллиптическіе, къ обоимъ концамъ острые (рис. 751, b); сѣмена почковидныя, въ ширину вдвое больше длины, съ перепончатымъ ободкомъ (с) и сѣменосцами, приросшими къ перегородкѣ стручечковъ. . . . . (многолѣтній) лунникъ—*L. rediviva* L. <sup>1)</sup>.

**273. *Luzula* DC.**—ожики.


а. Цвѣтки въ колоскахъ, расположенныхъ ободкомъ; листочки околоцвѣтника не короче коробочки (рис. 752, b); сѣмена при основаніи съ коническимъ придаткомъ (с); корневые листья линейные, короче цвѣтоноса . . . . . полевая ож.—*L. campestris* DC.



(Рис. 751).



(Рис. 752).



(Рис. 753).

б. Цвѣтки не въ колоскахъ, а по одиночкѣ на цвѣтоножкахъ, расположенныхъ ободкомъ; листочки околоцвѣтника короче коробочки; сѣмена на верхушкѣ съ серповиднымъ придаткомъ; корневые листья широко-линейные, во время цвѣтенія не короче главнаго цвѣтоноса; боковые цвѣтоносы по отцвѣтаніи оттопыренные или отогнутые . . . . .

волосистая ож.—*L. pilosa* Willd.

**274. *Lychnis* Tourp.**—горицвѣты. Стебель вверху вѣтвистый, съ короткими прижатыми волосками; нижніе листья продолговато-ланцетные, — верхніе линейно-ланцетные, острые; цвѣтки въ рѣдкихъ полузонтикахъ, расположенныхъ щитковидною метелкою; лепестки розовые, рѣдко бѣлые, съ 4 расходящимися линейными долями (рис. 753). . . . .

кукушкинъ цвѣтъ—*L. flos cuculi* L.

**275. \**Lycium* L.**—лиція. Кустъ съ длинными, тонкими вѣтвями; листья продолговато-ланцетные, суженные въ черешокъ; цвѣтки одиночные или по нѣскольку, пазушные; цвѣтоножки короче листа; лопасти вѣнчика про-

<sup>1)</sup> Воскресенскъ, Звенигородскаго уѣзда; близъ Серпухова.

долговатыя, такой же длины какъ его трубка (рис. 754); ягоды продолговатыя, ярко-красныя . . . . . (дикая) лиція—\* *L. barbarum* L.

**276. \* *Lycopersicum* Mill.**—баклажаны. Стебель и листья железисто-пушистые, съ длинными волосками; листья прерывисто-парноперистые, съ продолговато-яйцевидными, снизу сърыми листочками, надрѣзано-крупнозубчатыми; доли ташечки линейно-ланцетныя; вѣнчикъ желтый, съ ланцетными долями (рис. 755); ягода крупная, сплюснута-шаровидная, бороздчатая, лоснящаяся, яркокрасная . . . . .

(съѣдобный) баклажанъ—\* *L. esculentum* Mill.

**277. *Lycopodium* L.**—плауны.

1. Вѣтви сплюснутыя, съ 4 рядами мелкихъ, коротко-ланцетныхъ, свѣтлозеленыхъ листьевъ, попарно супротивныхъ: въ боковыхъ рядахъ килеватыхъ, въ двухъ другихъ безъ кия, приросшихъ; спорангии въ пазухѣ яйцевидныхъ, заостренныхъ листьевъ, собранныхъ въ колосья, по 2 - 6 на вильчатыхъ ножкахъ. . . . . сплюснутый п.—*L. complanatum* L.



(Рис. 754).



(Рис. 755).



(Рис. 756).

Вѣтви круглыя съ 5 и болѣе рядами листьевъ попеременно-ланцетныхъ, зеленыхъ. . . . . 2.

2. Листья вытянуты въ длинный тонкій бѣлый волосокъ, многорядные, пригнутые и плотно прилегающіе; колосковъ б. ч. 2 (3 - 4) на вильчатыхъ ножкахъ (рис. 756, а), покрытыхъ рѣдкими, желтоватыми, линейными, пильчатыми листочками; споролистикъ тоже съ длиннымъ, бѣлымъ волоскомъ (b). . . . . булавовидный п.—*L. clavatum* L.

Листья заостренные, колючіе, но не вытянуты въ волосокъ, въ 5 - 8 рядовъ. . . . . 3.

3. Стебель ползучій, длинный, съ вѣтвями разной длины; листья ярко-зеленые, горизонтально-оттопыренные или отогнутые, въ 5 рядовъ; спорангии въ пазухѣ яйцевидныхъ споролистиковъ, съ перепончатымъ, зубчатымъ краемъ, образующихъ на концѣ вѣтви сидячій, одиночный колосъ . . . . .

болотная можжуха—*L. annotinum* L.

Стебель прямой или восходящій, съ вѣтвями одинаковой высоты; листья темнозеленые, густо покрывающіе другъ друга въ 8 рядовъ; спорангии въ пазухѣ обыкновенныхъ среднихъ листьевъ вѣтвей . . . . .

баранецъ—*L. Selago* L.<sup>1)</sup>

**278. *Lycopsis* L.**—кривоцвѣты. Вѣтвистый стебель и листья густо усажены оттопыренными, жесткими щетинками на луковичкахъ; листья про-

1) Въ Погонно-Досинномъ Островѣ, близъ Малыхъ Мытищъ.

дологато-ланцетные, тупые, выемчато-зубчатые, на краю волнистые: нижние сужены в черешокъ, верхніе полустеблеобъемлющіе; цвѣточные вѣтви срослись внизу со стеблемъ; цвѣтоножки по отцвѣтаніи торчащія; доли чашечки ланцетныя; вѣнчикъ голубой, съ бѣлою трубкою, въ срединѣ согнутою (рис. 757). . . . . (полевой) кривоцвѣтъ—*L. arvensis* L.

**279. *Lycopus* L.—зюзники.**

а. Всѣ листья глубоко-перисто-раздѣльные, съ линейными долями: нижние и средніе въ очертаніи широко-яйцевидные, — верхніе ланцетные; зубцы чашечки не длиннѣе ея трубки; всѣ 3 лопасти нижней губы вѣнчика яйцевидныя, почти одинакія; орѣшекъ железисто-пушистый . . . . .

высокій з.—*L. exaltatus* L. fil. <sup>1)</sup>.

б. Только нижніе листья при основаніи перисто-надрѣзные; остальные надрѣзочно-зубчатые; всѣ продолговато-ланцетные; зубцы чашечки длиннѣе ея трубки; средняя лопасть нижней губы вѣнчика почти 4-угольная, вдвое шире боковыхъ; орѣшекъ пушистый, но безъ железокъ. . . . .


европейскій з.—*L. europaeus* L.



(Рис. 757).



(Рис. 758).



(Рис. 759).

**280. *Lysimachia* L.—вербейники.**

а. Стебель тонкій, лежачій, ползучій, укореняющійся; листья округлые, тупые, при основаніи слегка сердцевидные, съ бурыми точечками, голые; цвѣтки одиночные, въ пазухѣ стеблевыхъ листьевъ, на длинной цвѣтоножкѣ; доли чашечки яйцевидно-сердцевидныя, острыя (рис. 758, с); вѣнчикъ съ острыми долями (а, б) и бурыми железистыми точечками изнутри; тычинки спаяны только въ самомъ основаніи (а, б) . . . . .

луговой чай—*L. Nummularia* L.

б. Стебель прямой; корневище ползучее съ побѣгами; листья продолговато-ланцетные, острые, съ черными точечками, снизу блѣдно-зеленые, пушистые; цвѣтки, въ пазухѣ верхнихъ, почти линейныхъ листьевъ, собраны въ рѣдкую метельчатую верхушечную кисть; чашечныя доли ланцетныя, заостренныя, съ черными точечками, рѣсничныя; доли вѣнчика яйцевидныя, на краю голыя; тычинки срослись почти до средины въ кольцо и прикрываютъ имъ завязь . . . . . обыкновенный в.—*L. vulgaris* L.

**281. *Lythrum* L.—дербенники.** Листья ланцетные, съ сердцевиднымъ основаніемъ; цвѣтки на короткихъ ножкахъ, съ 2 рано опадающими прицвѣтниками; внутренніе зубцы чашечки вдвое крупнѣе наружныхъ (рис. 759, а)

плакунъ—*L. Salicaria* L.

<sup>1)</sup> По берегу Пахры, близъ Подольска; подъ Серпуховымъ.


**282. Majanthemum** Web.—майники. Корневище тонкое, ползучее, съ побѣгами; стебель внизу съ 2 - 3 листовыми влагалищами; оба стеблевые листа черешковые, глубоко-сердцевидно-яйцевидные, острые; цвѣтоножки съ мелкими перепончатыми прицвѣтниками; цвѣтки пахучіе; доли околоцвѣтника тупыя (рис. 760, а) . . (двулистный) майникъ—*M. bifolium* DC.

**283. Malachium** Fr.—мягковолосники. Стебель лежачій, при основаніи укореняющійся, съ короткими, не цвѣтущими стеблями, вверху железисто-пушистый; листья нѣжные, сердцевидно-яйцевидные, заостренные, сидячіе,—самые нижніе и на стебляхъ не цвѣтущихъ черешковые; полузонтикъ развѣсистый, 2-раздѣльный; чашелистики яйцевидные, тупые (рис. 761, б), короче бѣлыхъ лепестковъ, съ расходящимися лопастями (а) . . .

(водный) мягковолосникъ—*M. aquaticum* Fr.

**284. Malva** L.—просвирняки.

1. Цвѣтки очень крупныя, одиночныя въ пазухѣ листьевъ; только корневые листья лопатные, сердцевидно-округлые; стеблевые — глубоко-пальчато-раздѣльные, съ долями узко-ромбическими, перисто-надрѣзными и разсѣчно-зубчатыми; прямой стебель и листья шершавые отъ звѣздчатыхъ волосковъ; наружная чашечка продолговато-яйцевидная; розовыя лепестки слегка выемчатые; сѣмянки поперечно-морщинистыя, голыя, съ округленными краями . . . алтейный п.—† *M. Alcea* L.



(Рис. 760).



(Рис. 761).

Цвѣтки не крупныя, скупены пучкомъ въ пазухѣ листьевъ пальчато-лопатныхъ, съ тупыми, городковыми лопастями; стебель и листья безъ звѣздчатыхъ волосковъ . . . 2.

2. Цвѣтки средней величины, въ 3 - 4 раза длиннѣе чашечки, темно-красныя, съ темными жилками; листочки наружной чашечки широко-яйцевидныя; плодоножки торчащія или отклоненныя; сѣмянки сѣтчато-морщинистыя, съ острыми краями; стебель прямой, почти голый, какъ и листья; только листовые черешки сверху съ частымъ пушкомъ . . .

мавританскій п.—† *M. mauritiana* L.

Цвѣтки мелкіе, блѣдно-розовыя, почти бѣлыя; листочки наружной чашечки линейно-ланцетные; плодоножки отогнутыя; стебель б. ч. лежачій или приподнимающійся, шершавый, какъ и листья . . . 3.

3. Лепестки глубоко-выемчатые, обыкновенно втрое длиннѣе чашечки (рис. 762, а); доли внутренней чашечки продолговато 3-угольныя, съ плоскимъ краемъ и впередъ направленными волосками; сѣмянки гладкія, не морщинистыя, съ округленными краями . . .

невидный п. — *M. neglecta* Wallr.

Лепестки слегка выемчатые, не длиннѣе или короче чашечки; доли внутренней чашечки 3-угольныя, съ волнистыми краями и щетинистыми, отто-

пыренными волосками (рис. 762, с); сѣмянки сѣтчато-морщинистыя съ острыми краями (d) . . . . . сѣверный п.—*M. borealis* Wallm.


### 285. *Matricaria* L.—ромашки.

1. Корзинки на короткихъ ножкахъ, вверху утолщенныхъ, безъ краевыхъ язычковыхъ цвѣтковъ; вѣнчикъ срединныхъ цвѣтковъ 4-зубчатый; чешуйки обертки широко-эллиптическія, тупыя; сѣмянки цилиндрическія, съ внутренней стороны о 3 слабыхъ ребрышкахъ, по сторонамъ съ 2 смолистыми струйками и съ короткою коронкою; стебель распростерто-приподнимающійся, со скученными вѣтвями; листья съ линейно-ланцетными, сближенными долями . . . . . пахучая р.—† *M. discoidéa* B.C.


Корзинки на довольно длинныхъ ножкахъ, съ бѣлыми отогнутыми язычками, длиннѣе обертки (рис. 763, а),—срединные цвѣтки съ 5-зубчатымъ вѣнчикомъ; чешуйки обертки продолговато-линейныя . . . . . 2.

2. Стебель слабый и тонкій, поднимающійся; листья 1-2-перисто-раздѣльные съ узко-линейными, раздвинутыми долями; коническое цвѣтоложе внутри полое (рис. 763, б); сѣмянки съ внутренней стороны о 5 тонкихъ ребрышкахъ (с); сильно пахучая трава . . . . . дикая р.—*M. Chamomilla* L.

Стебель плотный и твердый, поднимающійся или прямой; листья 2-3-перисто-раздѣльные, съ очень узкими, линейно-нитевидными, острыми долями, снизу бороздчатыми; цвѣтоложе тупо-коническое, не полое; сѣмянки съ поперечными морщинками, съ 2 ребрышками по краямъ и однимъ съ внутренней стороны, снаружи выпуклыя, безъ бороздокъ . . . . . непахучая р.—*M. inodora* L.



(Рис. 762).



(Рис. 763).



(Рис. 764).

### 286. *Medicago* L.—медунки.

а. Прилистники овально-ланцетные, шиловидно-заостренные; нижніе—зубчатые; листочки верхнихъ листьевъ линейно-клиновидные, нижнихъ—обратно-яйцевидные; цвѣтки среднихъ раздѣловъ; бобъ согнутъ серпомъ или свернуть въ кольцо, съ сѣтчатыми жилками (рис. 764, а) . . . . . серповидная м.—*M. falcata* L.

б. Прилистники продолговато-яйцевидные, почти цѣлююкрайніе; всѣ листочки обратно-яйцевидные; цвѣтки мелкіе; бобъ почковидный, слегка вздутый, на верхушкѣ завитой, съ продольными дугообразными жилками (рис. 764, б) . . . . . хмѣлевая м.—*M. lupulina* L.



**287. Melampyrum L.**—марьяники.

1. Цвѣтки въ 4-гранномъ, частомъ, пушистомъ колосѣ; прицвѣтники вдоль сложенные, съ поднятыми краями, сердцевидно-округлые, заостренные, гребенчато-зубчатые; чашечная трубка по сторонамъ мохнатая; листья ланцетно-линейные, шероховатые.


нѣтушій гребешокъ—*M. cristatum* L. 1).

Цвѣтки въ рѣдкихъ, однобокихъ, колосовидныхъ кистяхъ, съ плоскими прицвѣтниками . . . . . 2.


2. Чашечка съ ланцетно-шиловидными, оттопыренными зубцами (рис. 765, b); прицвѣтники покрашенные — сине-лиловые, рѣдко малиновые или бѣлые, яйцевидно-ланцетные, при основаніи сердцевидные, гребенчато-зубчатые; вѣнчикъ вдвое длиннѣе чашечки, ярко-желтый, съ краснобурою трубкою; листья яйцевидно-ланцетные, заостренные.

Иванъ-да-Марья—*M. nemorosum* L.

Чашечка голая, съ линейно-шиловидными, вверхъ отогнутыми зубцами (рис. 765, a); прицвѣтники зеленые, при основаніи округленные или суженные, ланцетные, съ 1-2 шиловидно-линейными зубцами или безъ зубцовъ; вѣнчикъ почти втрое длиннѣе чашечки (a); листья ланцетно-линейные . . . . . луговой м.—*M. pratense* L.



(Рис. 765).



(Рис. 766).



(Рис. 767).

**288. Melandryum Roehl.**—щелкунцы.

а. Верхушка стебля съ верхними листьями, цвѣтоножки и чашечка железисто-пушистые; цвѣтки бѣлые, пахучіе; зубцы коробочки прямые; нижніе листья продолговатые, верхніе яйцевидно-ланцетные.

луговой щ.—*M. pratense* Roehl.

б. Железистаго пушка нѣтъ; цвѣтки свѣтло-малиновые, не пахучіе; зубцы коробочки закрученные (рис. 766, c); нижніе листья яйцевидные, верхніе яйцевидно-продолговатые. . . . . лѣсной щ.—*M. silvestre* Roehl.

**289. Melica L.**—перловники.

а. Метелка рѣдкая, въ видѣ кисти, о немногихъ колоскахъ; чашечная пленка почти ровная (рис. 767), красновато-лиловая,верху съ широкимъ, бѣлымъ перепончатымъ краемъ; нижняя цвѣточная пленка зеленоватая, къ верхушкѣ узко-перепончатая; зачатокъ верхняго цвѣтка булавовидный,верху закругленный (рис. 767); стебель тонкій; листья узкіе; язычекъ очень короткий, усѣченный. . . . . поникшій п.—*M. nutans* L.

1) По Окъ въ Серпуховскомъ уѣздѣ—за Дужками; подѣ Москвою очень рѣдко—между Шеленихой и Покровскимъ.

б. Метелка частая, колосовидная, сжатая, со множеством желтоватых колосков; верхняя чашечная пленка заметно длиннее нижней; нижняя цветочная пленка к верхушке широко-перепончатая; зачаток верхнего цветка грушевидный, заостренный; стебель толстый, высокий, с широкими листьями; язычек продолговатый . . . . . рослый в.—*M. altissima* L. <sup>1)</sup>.

**290. *Melilotus* Tourn.—донники.**

1. Кисть головчатая; цветки торчащие, голубые; бобы продолговато-яйцевидные, заостренные, с продольными жилками и короткими, прижатыми волосками; прилистники ланцетно-шиловидные, у нижних листьев книзу расширенные; крылья вепчика длиннее лодочки, но короче паруса . . . . . голубой д.—*M. coeruleus* Desr.

Кисть длинная; цветки повислые, желтые или белые; бобы яйцевидные, тупые, с острым кончиком, голые, б. ч. 1-семенные, сѣтчато-или почти поперечно-морщинистые; прилистники шиловидные, при основании цельно-крайние, слегка расширенные . . . . . 2.

2. Цветки белые: крылышки короче паруса и почти не длиннее лодочки; бобы сѣтчато-морщинистые, зрѣлые—чернобурые; стебель прямой . . . . . бѣлый д.—*M. albus* Desr.

Цветки желтые: крылышки почти не короче паруса и длиннее лодочки (рис. 768, а); бобы с поперечными морщинками, слабо сѣтчате; зрѣлые—желтобурые; стебель восходящий или лежачий . . . . . лѣчебный д.—*M. officinalis* Desr.



(Рис. 768).



(Рис. 769).

**291. *Mentha* L.—мяты.**

1. Цветочные мутовки в пазухе стеблевых листьев, которые много длиннее мутовок; верхушка стебля заканчивается пучком листьев; чашечка колокольчатая с короткими 3-угольными зубцами, такой же длины, как ширины (рис. 769),—в плодородной чашечке вытянутыми . . . . . полевая м.—*M. arvensis* L.

Цветочные мутовки скучены в пазухе маленьких прицветных листьев, которые не длиннее мутовок, на верхушке стебля и ветвей, в виде колосьев или головок; чашечные зубцы вытянутые, в длину много больше ширины . . . . . 2.

2. Листья сидячие или почти сидячие; мутовки в длинных, острых, непрерывных колосьях; чашечные зубцы линейно-шиловидные; плодородная чашечка слегка бороздчатая, вверху перетянута; зубцы ее несколько сходящиеся . . . . . лѣсная м.—*M. silvestris* L. <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> По Окъ—между Борисовымъ и Лужками Серп. узда, одинъ только разъ.

<sup>2)</sup> Подъ Москвою—Воробьевы горы; прежде—близъ Пзмайловскаго звѣринца.

Листья черешковые; мутовки въ короткихъ головчатыхъ, прерывныхъ колосьяхъ; чашечные зубцы ланцетно-шиловидные; плодоносная чашечка цилиндрично-ворончатая, бороздчатая, зубцы ея вытянутые. . . . .

водная м.—*M. aquatica* L. <sup>1)</sup>.

**292. *Menyanthes* L.**—вахты. Корневище длинное, ползучее, узловатое, чешуйчатое; тройчатые листья на длинныхъ черешкахъ, при основаніи влагалищные; листочки продолговато-обратно-яйцевидные, туповатые, голые; стрѣлка длинная; цвѣтки на длинныхъ ножкахъ, съ прицвѣтниками; доли чашечки яйцевидныя, тупыя; доли вѣнчика ланцетныя, острия (рис. 770). .

трилистникъ—*M. trifoliata* L.

**293. *Mercurialis* L.**—пролѣски. Корневище ползучее, съ подземными побѣгами; стебель простой, внизу безъ листьевъ, близъ верхушки стебля съ сближенными парами листьевъ, эллиптически-ланцетныхъ, коротко-заостренныхъ, пильчато-городковыхъ, черешковыхъ; цвѣтки въ пазушныхъ колосьяхъ: мужскіе цвѣтоносы такой же длины, какъ листья; женскіе обь 1-3 цвѣткахъ значительно короче листьевъ; цвѣтки зеленые; трава 2-домная. .

(многолѣтняя) пролѣска—*M. perennis* L.



(Рис. 770).



(Рис. 771).

**294. *Microstylis* Lindl.**—стагачки. Стебель вверх 3-гранный, внизу съ 1 листомъ, яйцевидно-продолговатымъ, при основаніи съ длиннымъ влагалищемъ; кисть длинная; прицвѣтники короче цвѣтоножекъ; наружные лепестки ланцетные, —внутренніе боковые линейные, длиннѣе губы, при основаніи вогнутой, яйцевидной, ланцетно заостренной (рис. 771—а, b). . . . .

(однолистная) стагачка—*M. monophylla* Lindl.

**295. *Milium* L.**—боры. Корневище съ короткими побѣгами; листья тесьмовидные, на краю остро-широковатые; язычекъ длинный; вѣтви метелки и чашечныя пленки гладкія; колоски свѣтло-зеленые. . . . .

(развѣсистый) боръ—*M. effusum* L.

**296. † *Mimulus* L.**—личиночники. Супротивные листья округлые или продолговато-яйцевидные, зубуренные или удвоенно-зубчатые: нижніе черешковые, —верхніе сидячіе или полустеблеобъемлющіе переходять въ прицвѣтные листья, которые короче цвѣтопожекъ; цвѣтки крупныя, чашечка по отцвѣтаніи вздутая, съ яйцевидными зубцами; желтый вѣнчикъ съ мелкими бурными крапинами въ зѣвѣ. . . . .

(желтый) личиночникъ—† *M. luteus* L. <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Въ одномъ изъ гербаріевъ прежняго времени.

<sup>2)</sup> Найдено одинъ только разъ занесеннымъ подъ Воскресенскимъ, на берегу Истры.

**297. Moehringia L.**—мерингія.

а. Лепестки короче чашелистиковъ, острыхъ (рис. 772), о 3 сближенныхъ жилкахъ, съ среднею утолщеною; цвѣтки въ полузонтикахъ на концахъ вѣтвей и въ развѣтвленіяхъ; листья яйцевидные, острые, о 3 - 5 жилкахъ, — нижніе черешковые . . . . . трехнервная м.—*M. trinervia* Clairv.

б. Лепестки почти вдвое длиннѣе чашелистиковъ, б. ч. тупыхъ, овальныхъ; цвѣтковъ по нѣскольку въ пазушныхъ полузонтикахъ, рѣже верхушечныхъ; всѣ листья тупые, сидячіе, обѣ 1 - 3 жилкахъ, овальные, — верхніе продолговатые . . . . . бокоцвѣтная м.—*M. lateriflora* Fenzl <sup>1)</sup>.


**298. Molinia Schrk.** — молинія. Дернистый злакъ, съ листьями почти корневыми, жесткими, по краямъ шероховатыми; язычекъ въ видѣ ряда восковокъ; голый стебель внизу или до середины покрытъ одними листовыми влагалищами; метелка узкая, сжатая, почти колосовидная, съ короткими прижатыми цвѣтопосами . . . . . (сѣнная) молинія—*M. coerulea* Misch.

**299. Mönese Salisb.** — одноцвѣтки. Листья округлые, нильчато-городковые; черешокъ не короче отгиба; вѣнчикъ довольно крупный, бѣлый, пахучій, звѣздчатый (рис. 773, а); доли чашечки яйцевидно-округлые, тупыя, рѣсничныя (б); рыльце 5-лопастное, почти звѣздчатое, втрое шире прямого столбика (б) . . . . .

(крупноцвѣтная) одноцвѣтка—*M. grandiflora* Salisb.



(Рис. 772)



(Рис. 773).



(Рис. 774).

**300. Montia L.** — монція. Стебель лежачій или плавающий, вильчато-вѣтвистый; нижніе листья лопатчатые, сужены въ черешокъ, — верхніе линейно-продолговатые; цвѣтки очень мелкіе, бѣлые, въ малоцвѣтныхъ, б. ч. пазушныхъ, кистистыхъ полузонтикахъ; сѣмена мелко-точечныя, лоснящіеся . . . . . (ручейная) монція—*M. rivularis* Gmel. <sup>2)</sup>.

**301. Myosotis L.** — незабудки.  
1. Чашечка 5-зубчатая или 5-надрѣзная, съ прижатыми волосками (рис. 774, с); плодносная—раскрытая, на горизонтально отклоненной цвѣтоножкѣ; отгибъ вѣнчика плоскій (а) . . . . . 2.

Чашечка глубоко 5-раздѣльная, книзу съ оттопыренными волосками, къ верхушкѣ съ крючковатыми . . . . . 3.

2. Столбикъ доходитъ до верхушки чашечки; зубцы ея короче трубочки (рис. 774, с); отгибъ вѣнчика длиннѣе его трубочки (б); завитки вовсе безъ листьевъ; стебель ребристый; верхніе листья слегка острые . . . . .

болотная н.—*M. palustris* With.

<sup>1)</sup> По Окъ, въ Серпуховскомъ уездѣ—между Лужками и Зибровымъ.

<sup>2)</sup> Подъ Москвою, близъ селца Богородскаго—въ Поганно Лосинномъ островѣ; въ прежнее время въ Перовѣ и Измайловѣ.

Столбикъ много короче чашечки; зубцы ея одинаковой длины съ трубчатою; отгибъ вѣнчика не длиннѣе его трубочки; завитки внизу прикрыты листьями; стебель округлый, слегка бороздчатый; всѣ листья тупые . . . дернистая н.—*M. caespitosa* Schultz

3. Плодоносная чашечка сомкнутая, со сходящимися зубцами; отгибъ вѣнчика вогнутый; трубка его короче чашечки; корневые листья розеткою . . . 4.

Плодоносная чашечка раскрытая, съ прямыми или отогнутыми зубцами; отгибъ вѣнчика плоскій; плодоножки не короче или длиннѣе чашечки . . . 5.

4. Завитки книзу прикрыты листьями и начинаются почти отъ основанія стебля; цвѣтоножки торчащія, короче чашечки; цвѣтки очень мелкіе, свѣтло-голубые . . . торчащая н.—*M. stricta* Lk

Завитки безъ листьевъ, короче стебля подъ завиткомъ, о многихъ цвѣткахъ; плодоножки горизонтально отклоненныя, почти вдвое длиннѣе чашечки; цвѣтки крупнѣе, ярко голубые . . . средняя н.—*M. intermedia* Lk

5. Завитки книзу почти до половины покрыты листьями, о немногихъ и рѣдкихъ цвѣткахъ—мелкихъ, свѣтло-голубыхъ; плодоножки во много разъ длиннѣе чашечки, нижнія—отогнутыя, поникшія; трубка вѣнчика короче чашечки, а отгибъ вѣнчика короче трубочки; стебель слабый, съ волосками отогнутыми; листья нѣжные, тонкіе . . . рѣдкоцвѣтная н.—*M. sparsiflora* Mikan

Завитки безъ листьевъ, частые; цвѣтки болѣе крупныя, ярко-голубые; плодоножки не длиннѣе или лишь немного длиннѣе чашечки, горизонтально оттопыренныя; трубка вѣнчика равна чашечкѣ; стебель съ оттопыренными волосками . . . лѣсная н.—*M. silvatica* Hoffm.

**302. Myosûrus L.**—мышехвостники. Узкіе листья розетки короче голый стрѣлки; цвѣтокъ маленькій, блѣдно-зеленоватый . . . (мелкій) мышехвостникъ—*M. minimus* L.

**303. Myriophyllum L.**—урути.

a. Всѣ прицвѣтники перисто-раздѣльные, не длиннѣе или короче цвѣточныхъ мутовокъ; листовыя мутовки о 5 - 6 листьяхъ . . . мутовчатый ур.—*M. verticillatum* L.

b. Только нижніе прицвѣтники перисто-раздѣленные, не короче или длиннѣе цвѣточныхъ мутовокъ; остальные цѣльнокрайніе, короче мутовокъ; листовыя мутовки б. ч. о 4 листьяхъ . . . колосистый ур.—*M. spicatum* L.

**304. Nârdus L.**—бѣлоусы. Сѣро-зеленые листья, пучками при основаніи тонкаго въ видѣ щетинки стебля, образуютъ утолщеніе въ видѣ луговицы; язычекъ ихъ довольно длинный; колоски грязно-лиловые; нижняя цвѣточная пленка съ 3 коротко-рѣсничными жилками . . . (торчащій) бѣлоусъ—*N. stricta* L.

**305. Nasturtium R. Br.**—жерухи.

1. Вѣнчикъ блѣдно-желтый, не длиннѣе чашечки; стручечекъ продолговатый, слегка вздутый, немного короче плодоножки и во много разъ длиннѣе очень короткаго столбика; верхніе листья перисто-раздѣльные, нижніе ланцетные; всѣ съ ушками при основаніи и съ продолговатыми зубчатыми долями . . . болотная ж.—*N. palustre* DC.

Вѣнчикъ ярко-желтый, длиннѣе чашечки . . . 2.

2. Всѣ или, по крайней мѣрѣ, верхніе листья надрѣзочно-зубчатые или

перисто-надрѣзные; стручечекъ линейный или продолговатый, не болѣе чѣмъ вдвое короче плодоножки (рис. 775—с, d) . . . . . 3.

Всѣ или, по крайней мѣрѣ, верхніе листья цѣльные, пильчато-зубчатые; стручечекъ шаровидный или овальный, въ нѣсколько или во много разъ короче плодоножки (рис. 775—а, b) . . . . . 4.

3. Стручечекъ линейный, сплюснутый, лишь немного длиннѣе или немного короче плодоножки (рис. 775, d); листья очень разнообразны: отъ надрѣзанныхъ до почти перистыхъ . . . . . лѣсная ж.—*N. silvestre* R. Br.


Стручечекъ продолговатый, слегка вздутый, обыкновенно вдвое короче плодоножки (рис. 775, c); нижніе листья лировидные, съ большою верхушечною лопастью . . . . . сомнительная ж.—*N. anceps* Rehb.

4. Стручечекъ овальный или почти шаровидный, въ 2 - 3 раза короче плодоножки и въ 2 - 3 раза длиннѣе столбика (рис. 775, b); верхніе листья сужены къ основанію; нижніе черешковые—очень разнообразные: отъ зубчатыхъ до гребенчато-перисто-разсѣченныхъ; стебель внизу ползучій, съ побѣгами, укореняющійся, б. ч. трубчатый . . . . .

земноводная ж.—*N. amphibium* R. Br.

Стручечекъ шаровидный, очень мелкій, во много разъ короче плодоножки и не короче столбика (рис. 775, а); стеблевые листья съ глубоко-сердцевиднымъ основаніемъ, снизу нѣсколько пушистые; нижніе сужены въ крылатый черешокъ, всѣ—зубчато-пильчатые; стебель прямой, плотный . . .

австрійская ж.—*N. austriacum* Crtz <sup>1)</sup>.



(Рис. 775).



(Рис. 776).



(Рис. 777).

**306. Naumburgia Moench** — кизляки. Корневище ползучее, съ побѣгами; стебель прямой, книзу съ рѣдкими и мелкими чешуйчатыми листьями, вверху — мохнато - пушистый, какъ и листья снизу, — узко - ланцетные, острые, съ стеблеобъемлющимъ основаніемъ; кисть продолговато-яйцевидная, въ пазухѣ среднихъ листьевъ, значительно короче ихъ; доли чашечки линейныя, островатыя (рис. 776, b); доли вѣнчика линейно-ланцетныя, тупыя (b); тычинковыя нити срослись только въ самомъ основаніи въ очень короткое кольцо . . . . . (кистецвѣтный) кизлякъ—*N. thyrsiflora* Rehb.

**307. Neottia L.** — глѣздовки. Корневище горизонтальное, толстое, съ клубкомъ толстыхъ корней; стебель толстый, съ 4 - 5 буроватыми чешуйчатыми листьями; кисть о многихъ цвѣткахъ, книзу рѣдкая, вверху плотная; прицвѣтники короче цвѣтковъ, доходятъ до середины завязи (рис. 777, а); околоцвѣтникъ чашевидный; лепестки и лопасти губы продолговатые, тупые; послѣднія растопырены и загигаются вверху и кнаружи (а, b) . . . . . глѣздовка—*N. Nidus avis* Rich.

<sup>1)</sup> Указано бливъ Серпухова, по заливнымъ лугамъ Оки.

**308. Nèpeta L.**—котовики.

а. Стебель и листья снизу съ сѣрымъ, частымъ пушкомъ; листья сверху зеленые, черешковые, острые, при основаніи сердцевидные, съ крупными городками; нижніе листья почти треугольные, —остальные продолговато-яйцевидные; цвѣточные пучки частые, скучены въ короткую колосовидную кисть; плодоносная чашечка съ косымъ зѣвомъ, слегка согнутая; зубцы ея ланцетно-шиловидные, заостренные, —верхніе длиннѣе (рис. 778); трубка вѣнчика не выдается изъ чашечки; орѣшки гладкіе, голые; вѣничекъ блѣдно-розовый; нижняя губа съ малиновыми крапинами.

кошачій к.—*N. Catària L.*

б. Стебель и листья почти голые; листья почти сидячіе—на очень короткихъ черешкахъ, —нижніе тупые, при основаніи слегка сердцевидные, съ мелкими городками, продолговато-ланцетные; верхніе слегка острые; цвѣточные пучки рѣдкіе, въ длинныхъ кистяхъ, б. ч. метельчато-расположенныхъ; плодоносная чашечка съ горизонтальнымъ зѣвомъ, прямая; зубцы ея линейно-шиловидные, острые, почти ровные; трубка вѣнчика немного выдается изъ чашечки; орѣшки вверху бородавчатые, съ пушкомъ; вѣничекъ бѣлый


голый к.—*N. nuda L.* <sup>1)</sup>.

**309. Nèslea Desv.** — несlea. Стебель и листья покрыты вѣтвистыми, 3-раздѣльными волосками; листья продолговато-ланцетные, съ рѣдкими зубцами, —нижніе сужены въ черешокъ; цвѣтки мелкіе; орѣшекъ сѣтчатоморщинистый (рис. 779, а), во много разъ короче длиной, отклоненной отъ цвѣтоноса ножки; кисти подъ конецъ очень длинныя.


(метельчатая) несlea—*N. paniculata Desv.*



(Рис. 778).



(Рис. 779).



(Рис. 780).

**310. † Nicàndra Adans.**—никандра. Стебель вильчатый съ ребристыми вѣтвями; листья яйцевидные, выемчато-зубчатые, суживающіеся б. ч. клиповиднымъ основаніемъ въ черешокъ; цвѣтки довольно крупныя, одиночныя, верхушечныя и въ развилкахъ стебля, супротивныя листьямъ; плодовая чашечка поникшая, почти 5-крылая, перепончатая, съ сѣтчатыми жилками; сухая ягода почти шаровидная; вѣничекъ снѣговатый, трубка бѣлая.

(можжуховидная) никандра—† *N. physaloides Gaertn.* <sup>2)</sup>.

**311. Nònnea Med.**—поннея. Стебель и листья сѣрозеленые, съ щетинистыми и рѣдкими железистыми волосками; листья ланцетные: нижніе сужены въ черешокъ, —остальные сидячіе, полустеблеобъемлющіе; прицвѣтники превышаютъ цвѣтки; цвѣтоножки короткія, по отцвѣтаніи отогнутыя, поникшія; чашечка колокольчатая (рис. 780, а), по отцвѣтаніи вздутая (б);

<sup>1)</sup> По Окѣ—въ Серпуховскомъ и Коломенскомъ уѣздахъ.

<sup>2)</sup> Найдено было въ одномъ экземплярѣ близъ Аннина, Богородскаго уѣзда.



зубцы ея треугольно-ланцетные, заостренные (а, б); орѣшки косо-яйцевидные. . . . . (темноцвѣтная) ноннея—*N. pùlla* DC.

**312. *Nùphar* Sm.—кубышки.**

а. Чашелистики и лепестки желтые; пыльники продолговато-линейные; рыльце вогнуто воронкою, цѣлюкрайнее (рис. 781), о 10 - 20 лучахъ. не доходящихъ до его краевъ. . . . . желтая к.—*N. lùteum* Sm.


б. Чашелистики снаружи зеленые; лепестки оранжевые; пыльники почти квадратные; рыльце выпуклое, съ зубчатымъ краемъ (рис. 782), о 8 - 10 лучахъ. . . . . карликовая к.—*N. pùmìlum* Sm.

**313. *Nymphaea* L.—кувшинки.** Цвѣтки очень крупные, бѣлые; наружные лепестки длиннѣ зеленыхъ чашелистиковъ; листья округло-овальные, цѣлюкрайние, съ глубокою и узкою сердцевидною выемкою; перепончатые прилистники при основаніи листовыхъ черешковъ ланцетные. . . . .


(бѣлая) кувшинка—*N. àlba* L.



(Рис. 781).



(Рис. 782).



(Рис. 783).

**314. *Odontites* Hall.—зубчатки.** Стебель и листья пушистые; листья ланцетные или линейно-ланцетные, съ рѣдкими, короткими зазубринами; пазушные цвѣтки въ длинныхъ однобокихъ, колосовидныхъ кистяхъ, согнутыхъ на верхушкѣ и часто вѣтвистыхъ, съ грязнорозовымъ вѣнчикомъ, снаружи пушистымъ; зубцы чашечки яйцевидно-ланцетные, почти равны ея трубкѣ (рис. 783, а). . . . . (красная) зубчатка—*O. rubra* Pers.

**315. *Oenànthè* L.—омежники.** Корни нитевидные, мутовчатые; стебель сильно вѣтвистый; листья перисто 2 - 3-сложные: у подводныхъ листочки съ многораздѣльными линейными, нитевидными долями; у надводныхъ—съ мелкими, перисто-надрѣзными, ланцетными или яйцевидно-ланцетными долями; зонтики о 7 - 10 короткихъ лучахъ; обвертки изъ короткихъ нитевидныхъ листочковъ; цвѣтки бѣлые. . . . .

конскій укропъ — *Oe. Phellàndrium* Lam.


**316. *Oenothèra* L.—ослиники.** Стебель и листья пушистые; обыкновенно простой стебель густо покрытъ листьями: корневые розеткою, черешковые, тупые, съ остроконечіемъ, эллиптическіе; нижніе стеблевые широко-ланцетные; остальные клиновидно сужены въ короткій черешокъ, продолговато-ланцетные, мелко зубчатые; крупные пазушные цвѣтки собраны длинною кистью; доли отцвѣтшей чашечки отвороченныя, ланцетныя, съ длиннымъ остроконечіемъ (рис. 784, а, б); лепестки выемчатые (а). . .

(двулѣтній) ослиникъ—*O. biennis* L. <sup>1)</sup>.

1) По берегамъ рѣкъ—Москвы и Оки.

**317. Omphalodes Moench.**—пупочки. Стебель слабый, лежачий, вѣтвистый; листья нѣжные, шероховатые, —самые нижніе черешковые, лопатчатые, плотные; нижніе стеблевые продолговато-обратно-яйцевидные, супротивные; верхніе — продолговато-ланцетные, очередные; завитки покрыты листьями; голубые, мелкіе цвѣтки на длинныхъ ножкахъ, по отцвѣтаніи отогнутыхъ.


(завитой) пупочникъ—**O. scorpioides Schrk** <sup>1)</sup>.  
**318. Onobrychis Tourn.**—эспарсеть. Корень толстый деревянистый; листья о 13 - 25 листочкахъ—отъ овальныхъ до почти линейныхъ, снизу слегка шелковистыхъ; кисти частыя, колосовидныя, длинныя, въ нѣсколько разъ превышаютъ листья; цвѣтки на очень короткихъ ножкахъ; чашечные зубцы вдвое длиннѣе трубочки (рис. 785, b); крылышки длиннѣе трубки чашечки, но короче ея зубцовъ; орѣшекъ округлый, пушистый, на краю и по морщинкамъ съ шишковатыми зубцами (b).  
 (посѣвный) эспарсеть—**O. sativa Lmk** <sup>2)</sup>.



(Рис. 784).



(Рис. 785).



(Рис. 786).

**319. Onoclea Sw.**—разнолистники. Толстое корневище съ ползучими подземными побѣгами; листья на короткомъ черешкѣ, сверху съ глубокимъ и широкимъ желобкомъ; черешокъ и средняя жилка съ бурымъ войлокомъ, на старыхъ листьяхъ исчезающемъ; не несущіе споръ листья въ очертаніи продолговатые, сильно суженные къ основанію и быстро заостренные къ верхушкѣ; листочки ланцетно линейные, тонко-заостренные, глубоко-перисто-раздѣльные; доли ихъ продолговатыя, тупыя или усѣченные, почти цѣльнокрайнія (рис. 786, a); спороносные листья чернобурые, съ толстыми, цѣльными, почти цилиндрично-свернутыми, бугорчатыми листочками (b), зимующіе. . . . . черный папоротникъ—**O. Struthiopteris Hoffm.**

**320. Ononis L.**—стальники. Стебель и листья мохнатые и железисто-волосистые; листочки продолговатые, пальчато-зубчатые; цвѣтки попарно въ пазухѣ листьевъ, къ верхушкѣ стебля и вѣтвей скучены колосовидною кистью; цвѣтоножки и бобъ короче чашечки (рис. 787—с, a); бобъ железисто-волосистый, съ 2 - 4 бугорчатыми сѣменами. . . . .


(вонючій) стальникъ—**O. hircina Jacq.** <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Подъ Москвою—Кунцево; Боровскій курганъ, Бронницкаго уѣзда, Акатьево—Коломенскаго уѣзда.


<sup>2)</sup> По берегамъ рѣкъ—Москвы рѣки (Софьино), Оки (Серпуховъ, Коломна).

<sup>3)</sup> По Огтѣ—въ Серпуховскомъ и Коломенскомъ уѣздахъ.

**321. Onopordon L.** — татарники. Стебель высокий, вѣтвистый; листья и обертка паутинистые; листья продолговатые, заостренные, колючие: нижние при основаніи суженные, перисто-надрѣзные, — остальные крупно-выемчато-зубчатые, сильно изгибающіе по стеблю широкими, колюче-зубчатыми крыльями; корзинки крупныя, одиночныя, почти шаровидныя; чешуйки обертки внизу яйцевидныя, кверху линейно-шиловидныя, колючія; нижнія — сильно отогнутыя; вѣнчикъ лиловато-малиновый; хохолокъ вдвое длиннѣе сѣмянки . . . . . (колючій) татарникъ — *O. Acanthium* L. <sup>1)</sup>.



(Рис. 787).



(Рис. 788).

**322. Ophioglossum L.** — уховники. Короткій стебелекъ съ длинными, толстыми, горизонтальными корнями; не несущая споръ пластинка листа 1 (2) яйцевидная или продолговато-яйцевидная, тупая, желтоватая, лоснящаяся, слегка изгибающаяся и охватывающая ножку колоса; колосъ короче своей ножки, оканчивается острымъ кончикомъ (рис. 788—а, b) . . . . . (обыкновенный) уховникъ — *O. vulgatum* L. <sup>2)</sup>.

**323. Orchis L.** — ятрышники.

1. Прицвѣтники зеленые о 3 продольныхъ жилкахъ и съ поперечными сѣтчатыми жилками, длиннѣ завязи; только 3 лепестка (верхній наружный и оба внутреннихъ) сходятся шлемомъ, боковые же наружные оттопырены или отогнуты; клубни на концѣ лапчатые, о 2-4 лопастяхъ, вытянутыхъ въ цитевидные корни; околоцвѣтникъ лилово-малиновый, съ темнымъ рисункомъ на губѣ . . . . . 2.

Прицвѣтники перепончатые, окрашенные, о 1 жилкѣ и безъ сѣтчатыхъ жилокъ, не длиннѣ завязи; 5 лепестковъ сходятся шлемомъ; клубни цѣльные — не раздѣлены на лопасти, — округлые или продолговатые. . . . . 4.

2. Листья съ широкимъ основаніемъ постепенно сужены кверху; нижніе продолговато-или линейно-ланцетные, всѣ острые и обыкновенно безъ пятны; губа почти цѣльная или слегка выемчатая; стебель трубчатый, о 4-6 листьяхъ; самый верхній листъ заходитъ за основаніе колоса . . .

темнокрасный ят. — *O. incarnata* L.

<sup>1)</sup> Подъ Симоновымъ монастыремъ.

<sup>2)</sup> Подъ Москвою — Богородское, у рѣчки Сосенки, прежде Раменки; въ Верейскомъ (Шеланово) и Можайскомъ (Романцево, Бородино) уѣздахъ.

Листья сужены къ основанію, въ срединѣ шире; нижніе широко-ланцетные, тупые; верхніе—линейно-ланцетные, острые,—всѣ плоскіе, отклоненные отъ стебля и обыкновенно съ чернобурыми пятнами; губа 3-лопастная, съ ромбическими боковыми лопастями . . . . . 3.

3. Стебель, во время цвѣтенія, плотный, не полый, многолистный—до 10 листьевъ: верхніе очень короткіе, узкіе и острые, въ видѣ прицвѣтниковъ, и самый верхній не доходитъ до основанія колоса, при разцвѣтаніи коническаго; прицвѣтники короче цвѣтковь, кромѣ самыхъ нижнихъ. . . . . *кукушкины слезки*—*O. maculata* L.

Стебель всегда трубчатый, полый, о 4 - 6 листьяхъ, постепенно уменьшающихся къ верхушкѣ стебля; самый верхній заходитъ за основаніе колоса; нижніе и средніе прицвѣтники длиннѣе цвѣтковь,—верхніе не выдаются надъ колосомъ . . . . . широколистный ят.—*O. latifolia* L. <sup>1)</sup>.

4 (1). Стебель покрытъ до верху многими листьями, ланцетно-линейными, острыми; колосъ цилиндрической, вытянутой; губа 3-лопастная: боковыя лопасти ея почти ромбическія, на наружномъ краѣ слегка зубчатая; средняя лопасть цѣльная, продолговатая, на верхушкѣ заостренная; шпорецъ коническій, острый, согнутый, вдвое короче завязи; прицвѣтники длиною почти въ завязь; лепестки шлема сданы при основаніи, буровато-темно-малиновые, съ зелеными жилками; губа зеленая съ малиновыми жилками. . . . . вонючій ят.—*O. coriophora* L. <sup>2)</sup>.

Верхніе листья въ видѣ влагалищъ охватываютъ стебель; нижніе—широко-ланцетные, скучены при основаніи стебля; губа 3-раздѣльная, свѣтло-розовая, съ малиновыми крапинами; боковыя доли ея линейныя или продолговатыя . . . . . 5.

5. Прицвѣтники во много разъ короче завязи, въ видѣ пленокъ; губа съ линейными боковыми долями и широкою среднею долею, впереди быстро расширенною и расходящеюся на 2 продолговатыя лопасти, съ короткимъ зубцомъ въ выемкѣ; наружныя листочки шлема яйцевидно-ланцетные, острые, розовые; шпорецъ цилиндрической, въ 2 - 3 раза короче завязи. . . . . шлемовидный ят.—*O. militaris* L.

Прицвѣтники почти такой же длины, какъ и завязь; губа съ продолговатыми боковыми долями и коротко 2-лопастною среднею долею; лопасти ея съ усѣченнымъ, зубчатымъ наружнымъ краемъ . . . . . 6.

6. Верхніе листья изъ однихъ влагалищъ охватываютъ до верху стебель; колосъ цилиндрической, плотный, только при основаніи съ отодвинутыми цвѣтками; шлемъ короткій, б. ч. тупой; средняя доля губы постепенно расширена къ концу, прямо усѣченная; шпорецъ коническій, тупой, въ 4 раза короче завязи. . . . . обожженный ят.—*O. ustulata* L. <sup>3)</sup>.

Верхніе листья отодвинуты отъ короткаго, сначала коническаго колоса; шлемъ продолговатый, острый или заостренный; средняя доля губы обратно-ййцевидная, быстро расширена и косо срѣзана; шпорецъ цилиндрической, длиннѣе половины завязи. . . . . пестрый ят.—*O. variegata* All. <sup>4)</sup>.

### 324. *Origanum* L.—душицы.

а. Колосья продолговатые, расположенные щитковидною метелкою; прицвѣт-

<sup>1)</sup> Подъ Москвою очень рѣдко — между Иванковымъ и Петровымъ.

<sup>2)</sup> Указано было одинъ только разъ.

<sup>3)</sup> Указано въ спискѣ Линдемана.

<sup>4)</sup> Хранится въ гербаріи Гофмана.

ники эллиптическіе или овальные, приостренные, безъ железокъ; чашечка о 5, почти равныхъ зубцахъ (рис. 789), по отцвѣтаніи закрыта въ зѣвъ вѣщомъ волоскомъ; вѣнчикъ свѣтло-малиновый, рѣдко бѣлый; стебель пушистый; листья снизу блѣдно-зеленые, съ просвѣчивающими точечками; нижніе тупые, верхніе острые . . . обыкновенная д.—*O. vulgare* L.

б. Колосья округло-овальные, расположенные кистистою метелкою; прицвѣтники попережь шире, при основаніи клиновидные, очень частые, черепчатые, спереди закругленные, покрыты сѣрымъ войлокомъ и железками; чашечка безъ зубцовъ, снизу расщепленная почти до основанія (рис. 790); вѣнчикъ свѣтло-розовый или бѣлый; стебель почти голый, буроватый; все листья тупые, съ сѣрымъ пушкомъ и железками. . . .

маіоранъ—\* *O. Majorana* L.

**325. Orobanchе** L. — заразихи. Стебель и чешуйчатые листья грязно-коричневые; стебель съ железистыми волосками; чашелистики почти втрое короче рыжевато-коричневого вѣнчика—снаружи съ железистымъ пушкомъ (рис. 791, а); тычинки выходятъ почти у основанія суженной тутъ трубки вѣнчика, кверху расширенной и согнутой; края губъ городковые: верхняя губа глубоко-выемчатая, съ отогнутыми краями (б, а); 3 лопасти нижней губы почти одинаковыя; тычиночныя нити внизу расширены и тутъ съ внутренней стороны волосистыя; столбикъ почти въ длину вѣнчика, на верхушкѣ согнутый; рыльце желто-коричневое, 2-надрѣзное. . . .

(порѣзниковая) заразиха—*O. Libanotidis* Rupr. <sup>1)</sup>.



(Рис. 789).



(Рис. 790).



(Рис. 791).

### 326. Orobus L.—сочевичники.

а. Листья о 2 - 4 парахъ листочковъ, длинно заостренныхъ, по краямъ рѣсничныхъ, лоснящихся, снизу ярко-зеленыхъ; прилистники яйцевидно-ланцетные, съ острымъ ушкомъ; кисть не превышаетъ листьевъ; вѣнчикъ малиновый, потомъ синій, подъ конецъ сине-зеленый . . . . .

весенній с.—*O. vernus* L.

б. Листья о 4 - 6 парахъ листочковъ, тупыхъ, снизу сине-зеленыхъ, тусклыхъ; прилистники узко-ланцетные съ шиловиднымъ зубцомъ; кисть немного превышаетъ листья; вѣнчикъ малиновый, потомъ голубой; сухая трава чернѣетъ . . . . . черный с.—*O. niger* L. <sup>2)</sup>.

**327. Ostericum** Hoffm.—маточники. Стебель вверху вѣтвистый; нижніе листья перисто 2 - 3 - сложные; листочки снизу шероховатые, яйцевидные, при основаніи слегка сердцевидные, острые, неравно-городчато-пильчатые;

<sup>1)</sup> Невѣрово—Коломенскаго уѣзда.

<sup>2)</sup> Красный станъ — Рузскаго уѣзда; Бѣлые Колодези — Коломенскаго; прежде указывалось подъ Москвою—въ Кунцевѣ.

немногіе стеблевые листья короткіе, мелкіе, — верхніе состоятъ почти изъ однихъ широкихъ влагалищъ; лепестки бѣлые . . . . .  
(болотный) маточникъ—*O. palustre* Bess. <sup>1)</sup>.

**328. Oxalis L.** — кислицы.

а. Всѣ листья корневые, короче голой стрѣлки, обѣ 1 цвѣткѣ, съ 2 прицвѣтниками выше ея середины; лепестки четверо длиннѣе чашечки, бѣлые съ розовыми жилками и внизу съ желтымъ пятномъ . . . . .  
заячья к.—*O. Acetosella* L.

б. Стебель вѣтвистый, покрытъ листьями, безъ прилистниковъ; цвѣтки по 1 - 5 въ пазухѣ листьевъ на цвѣтоножкахъ, по отцвѣтаніи торчащихъ; лепестки вдвое длиннѣе чашечки, свѣтло-желтые, округленные . . . . .  
торчащая к.—† *O. stricta* L. <sup>2)</sup>.


**329. Oxycoccus Tougn.** — клюквы. Молодыя вѣтви и цвѣтоножки пушистыя; листья мелкіе, эллиптическіе, острые, съ свернутыми краями, кожистые, зимующіе: сверху темно-зеленые, лоснящіеся, снизу — сѣроватые; цвѣтки на концѣ прошлогоднихъ вѣтвей по 2 - 4, поникшіе (рис. 792) на длинныхъ ножкахъ, съ 2 почти супротивными, маленькими прицвѣтниками выше середины, а внизу еще съ 1 бѣльшимъ; зубцы чашечки и тычиночныя нити рѣсничные; вѣнчикъ свѣтло-малиновый, цвѣтоножки темно-малиновыя; ягода шаровидная, темно-красная, бурѣющая . . . . .  
(болотная) клюква—*O. palustris* Pers. <sup>3)</sup>.



(Рис. 792).



(Рис. 793).



(Рис. 794).

**330. \* Panicum L.** — проса. Листья и особенно влагалища ихъ съ частыми, торчащими волосками; язычекъ короткій съ пояскомъ длинныхъ волосковъ; колоски на длинныхъ ножкахъ яйцевидно-эллиптическіе; чашечныя пленки яйцевидныя, заостренныя, со многими выдающимися жилками: нижняя чашечная пленка значительно короче верхней, почти одинаковой съ пленкою зачаточнаго цвѣтка (рис. 793, а) . . . . . просо—\* *P. miliaceum* L.

**331. †\* Papaver L.** — маки.

а. Стебель и листья голые, сине-зеленые; листья продолговатые, надрѣзано-зубчатые: верхніе стеблеобъемлющіе; нижніе къ основанію сужены; цвѣтоножки съ оттопыренными, жесткими волосками; тычиночныя нити вверху

<sup>1)</sup> Въ одномъ изъ гербаріевъ прежняго времени.

<sup>2)</sup> Найдено занесеннымъ подъ Серпуховымъ.

<sup>3)</sup> По торфянымъ болотамъ.

расширены; коробочка яйцевидная, почти шаровидная; городковое рыльце о 10—15 лучахх . . . . . сплотивший м.—\* *P. somniferum* L.


б. Стебель, листья и чашелистики съ жесткими, оттопыренными волосками (рис. 794, а); листья глубоко-перисто-раздѣльные, съ продолговатыми долями, надрѣзано-зубчатыми, не стеблеобъемлющие; тычиночные нити шиловидныя; коробочка обратно-яйцевидная, закругленная при основаніи (с); 8—12 лопастей рыльца накрываютъ другъ друга краями; въничикъ ярко-красный . . . . . самосѣйка—† *P. Rhoëas* L.

332. *Paris* L.—одноягодники. Корневище длинное, ползучее, съ влагалищными листьями; въ стеблевой мутовкѣ листья широко-эллиптическіе, коротко-заостренные, почти сидячіе, о 3 толстыхъ жилкахъ, съ сѣтчатыми жилками; околоцвѣтникъ раскрытый (рис. 795, а) . . . . .

вороній глазъ—*P. quadrifolia* L.



(Рис. 795).



(Рис. 796).

333. *Parnassia* L.—бѣлозоры. Стебель ребристый, ниже середины съ 1 стеблеобъемлющимъ листомъ; въ корневой розеткѣ листья на длинномъ черешкѣ, сердцевидно-яйцевидные; цвѣтокъ довольно крупный (рис. 796, а); лепестки бѣлые съ просвѣчивающими жилками; листочки коронки о 9—13 зеленовато-желтыхъ рѣсничкахъ (b) . . . . .

(болотный) бѣлозоръ — *P. palustris* L.

334. *Pastinaca* L.—пастернакъ. Стебель вверху вѣтвистый; листочки нижнихъ перистыхъ листьевъ продолговато-яйцевидные, часто лопастные, тупые, неравно-городчато-пильчатые; листочки стеблевыхъ листьевъ продолговатые или продолговато-ланцетные, острые, пильчатые; чашечныхъ зубцовъ не замѣтно . . . . . (посѣвный) пастернакъ—*P. sativa* L.

335. \* *Pavia* Boerh.—павія.

а. Ноготки красныхъ лепестковъ едва выступаютъ изъ чашечки; плодъ сжуженъ къ основанію; листовыя почки округло-овальные, почти такой же длины, какъ и ширины; листочки снизу и черешки почти голые . . . . .

красная п.—\* *P. rubra* Lmk

б. Ноготки желтыхъ лепестковъ замѣтно выступаютъ изъ чашечки; плодъ закругленъ къ основанію; листовыя почки продолговато-яйцевидныя; листочки снизу и черешокъ пушистые . . . . . желтая п.—\* *P. flava* DC.

336. *Pedicularis* L.—мытники.

1. Стебель вверху безлиственный; листья скучены внизу стебля и въ кор-



новой розеткѣ: доли ихъ продолговато - яйцевидныя, тупыя, съ неравными, тупыми зубцами; прицвѣтники яйцевидные, мелко-зубчатые; зѣвъ желтаго вѣличка закрытъ сходящимися губами, почти равными: нижняя спереди глянц-красная охватываетъ верхнюю съ боковъ; коробочка почти шаровидная; чашечка о 5 зеленыхъ пильовидно - зубчатыхъ лопастяхъ; цвѣтки крупныя въ рѣдкой колосовидной кисти.

царскій скипетръ—*P. Scèptrum Carolinum* L. <sup>1)</sup>.

Стебель до верху покрытъ листьями; доли ихъ ланцетныя до линейныхъ, перисто-раздѣльныя, съ бѣлыми, утолщенными хрящеватыми кончиками; всѣ или только нижніе прицвѣтники схожи съ стеблевыми листьями; зѣвъ вѣличка открытъ (рис. 797, а); нижняя губа отогнута, на краю рѣсничная; верхняя вытянута на концѣ въ короткій носикъ съ 2 острыми зубцами; коробочка косо-яйцевидная (с), съ боковъ сплюснутая . . . . . 2.

2. Цвѣтки въ частой, длинной колосовидной кисти; только нижніе прицвѣтники сходны съ листьями; верхніе линейно - ланцетные, цѣльные, къ верхушкѣ зубчатые; чашечка о 5 короткихъ и широкихъ, цѣльныхъ зубцахъ; вѣличекъ блѣдно-желтый: нижняя губа короче согнутой верхней; коринъ въ видѣ веретенообразныхъ клубней . . . хохлатый м.—*P. comòsa* L.

Цвѣтки въ пазухѣ верхнихъ стеблевыхъ листьевъ, и только верхніе колосовидно сгущены; чашечка 2-лопастная, съ зелеными, надрѣзано-зубчатыми курчавыми лопастями (рис. 797, б); вѣличекъ розовый съ губами почти одинаковой длины (а); верхняя губа съ тупымъ зубчикомъ по срединѣ боковыхъ краевъ . . . болотный м.—*P. palùstris* L.



(Рис. 797).



(Рис. 798).



(Рис. 799).

337. *Péplis* L. — окучники. Листья супротивные, обратно-яйцевидные или лопатчатые, при основаніи сужены въ короткій черешокъ; цвѣтки почти сидячіе, съ 2 маленькими прицвѣтниками (рис. 798, б); чашечка коротко-колокольчатая, съ заостренными зубцами, немного длиннѣе ея трубки (а); лепестки обратно - яйцевидные, не длиннѣе зубцовъ чашечки (с, б); столбикъ очень короткій, съ рыльцемъ въ видѣ кружка (d); шаровидная коробочка выдается изъ чашечной трубки (е) . . . . .

окучникъ — *P. Pòrtula* L.

338. *Peristylus* Blume — околостолбники. Клубни б. ч. раздвоенные; нижній листъ тупой, стянута въ короткій крылатый черешокъ; остальные острые, сидячіе; прицвѣтники не короче свѣтло-зеленыхъ цвѣтковъ; боковые внутренніе листки околостолбника линейные, острые; средній зубецъ линейной губы короче боковыхъ (рис. 799, б); гнѣзда пыльниковъ внизу расходятся . . . . . (зеленый) околостолбникъ—*P. viridis* Lindl. <sup>2)</sup>.

1) Подъ Москвою — Мытищи, Люберцы, Угрѣши; Кудаво — Серпуховскаго уѣзда.

2) Раменки — подъ Москвою; Варавино — Дмитровскаго уѣзда; Тропарево — Можайскаго.

**339. Petasites Gaertn.**—бѣлокопытники.

а. Листья округло-сердцевидные, по краямъ выемчато-угловатые, снизу съ сѣрымъ шерстистымъ пушкомъ; лопасти по бокамъ глубокой выемки у основанія листа округлыя, цѣльныя; вѣнчикъ грязно-красноватый; корзинки на очень короткихъ ножкахъ скучены въ продолговатую кисть . . . . .

лѣчебный б.—† *P. officinalis* Moench

б. Листья 3-угольно-сердцевидные, поперекъ шире, снизу съ чисто бѣлымъ войлокомъ, сверху съ рѣдкимъ ключевиднымъ войлокомъ; лопасти по бокамъ широкой выемки у основанія листа свернутыя, 2—3-долные; корзинки на длинныхъ ножкахъ: обоюдолюбы въ овальныхъ кистяхъ съ желтоватымъ вѣнчикомъ; женскія — щиткомъ съ бѣловатымъ вѣнчикомъ . . . . .

не настоящій б.—*P. spurius* Rehb. <sup>1)</sup>.

**340 \*Petroselinum Hoffm.**—петрушки. Листья въ очертаніи 3-угольные: нижніе 2-3-перисто-сложные, съ обратно-яйцевидными, клиновидными листочками, 3-надрѣзными и зубчатыми, сверху лоснящимися; верхніе листья 3-чатые, съ листочками узко-ланцетными, цѣльными или 3-надрѣзными . . . . .

(посѣвная) петрушка—\* *P. sativum* Hoffm.

**341. Peucedanum L.**—горичники.

1. Листочки цѣльные, пальчатые, остро-зубчатые, продолговато-яйцевидные, снизу сѣро-зеленые, жесткіе, почти кожистые; стеблевые листья мелкие, — верхніе въ видѣ однихъ влагалищъ; стебель круглый, полосатый. . . . .

олений г.—*P. Cervaria* Cuss. <sup>2)</sup>.

Листочки перисто-раздѣльные или надрѣзные, зеленые, съ продолговато- или линейно-ланцетными долями. . . . . 2.

2. Стебель круглый, полосатый; общіе листовые черешки отогнутые; частные—растопыренные; листочки надрѣзано-зубчатые или перисто-разсѣченные, лоснящіеся; доли ихъ продолговато-ланцетныя. . . . .

горная петрушка—*P. Oreoselinum* Moench <sup>3)</sup>.

Стебель ребристо-бороздчатый; листовые черешки не отогнутые и не растопыренные; листочки глубоко-перисто-раздѣльные; доли ихъ ланцетно-линейныя, съ бѣловатымъ острымъ кончикомъ. . . . .

болотный г.—*P. palustre* Moench

**342. †Phalaris L.**—канареечники. Многостебельный

злакъ съ довольно широкими листьями; верхнее листовое влагалище вздутое, длиною почти съ отгибъ; язычекъ довольно длинный, усѣченный; колоски желтовато-бѣлые, вдоль кия и близъ края темно-зеленые, —спереди слегка выпуклые, сзади вогнутые, эллиптическіе; обѣ наружныя чашечныя пленки ладьевидныя, коротко-заостренныя, съ цѣльнокрайнимъ килемъ и по краямъ обѣ 1 жилкѣ (рис. 800); нижняя цвѣточная пленка съ прижатыми волосками, вдвое длиннѣе обѣихъ узко-ланцетныхъ пленокъ зачаточныхъ цвѣтковъ . . . . . канареечное сѣмя—† *P. canariensis* L.



(Рис. 800).

**343. \*Phaseolus L.**—фасоль.

а. Кисти о немногихъ цвѣткахъ короче листьевъ, длинно-заостренныхъ;

<sup>1)</sup> По Окъ —подъ Лужками, Серпуховскаго уѣзда; на островѣ противъ Бачмина—Коломенскаго уѣзда.

<sup>2)</sup> Въ прѣжнее время близъ Вереи.

<sup>3)</sup> Въ прѣжнее время подъ Москвою—въ Останкинѣ и Алексѣевскомъ.

бобъ почти прямой, гладкій; вѣнчикъ и сѣмена бѣлые . . . . .  
обыкновенная ф.—\* *P. vulgaris* L.

b. Кисти о многихъ цвѣткахъ длиннѣ листьевъ, острыхъ или коротко заостренныхъ; бобъ серповидный, шероховатый; вѣнчикъ и сѣмена бѣлые или вѣнчикъ ярко-красный, а сѣмена темно-красныя съ темными пятнами. . . . .  
многочвѣтковая ф.—\* *P. multiflorus* Lmk

#### 344. *Phegopteris* Fée—буковичники.

a. Листья просто-перистые, съ глубоко-перисто-раздѣльными листочками, съ обѣихъ сторонъ, особенно снизу, покрыты волосками; листовой черешокъ и средняя жилка съ бурыми пленками; пластинка въ очертаніи сердцевидно-продолговатая, длинно и тонко-заостренная, темно-зеленая; нижняя пара листочковъ отогнута книзу отъ слѣдующей пары,—остальныя съ приподнятою верхушкою; нижнія доли обоеихъ листочковъ каждой пары, кромѣ нижней, сливаются въ четырехугольникъ, отъ котораго низбѣгаетъ узкая оторочка вдоль средней жилки; корневище довольно толстое. . . . .

многоножкой б.—\* *P. polypodioides* Fée

b. Листья тройчатые, съ перистыми листочками, голые; очень длинный листовой черешокъ только у самаго основанія съ нѣсколькими пленками; пластинка въ очертаніи широко 3-угольная, почти горизонтально отогнутая, нѣжная, ярко-зеленая; въ каждомъ перистомъ листочкѣ нижняя пара вторичныхъ листочковъ длиннѣ остальныхъ,—обѣ нижнія пары черешковые, слѣдующія сидячія, а самыя верхнія сливаются и низбѣгаютъ по средней жилкѣ; вторичныя листочки не острые; самыя нижнія перистораздѣльные, черешковые, — слѣдующіе надрѣзные, верхніе городковые; корневище тонкое, черное, лоснящееся. . . . . дуболистникъ—\* *P. Dryopteris* Fée

345. \* *Philadelphus* L.—чубушники. Кустарникъ съ листьями эллиптическими, заостренными, рѣдко-зубчатыми, о 3 жилкахъ, сверху голыми, а снизу только вдоль жилокъ пушистыми; цвѣтки въ верхушечныхъ полузонтикахъ, о 5—9 цвѣткахъ, съ желтовато-бѣлымъ, пахучимъ вѣнчикомъ; чашелистики коротко-заостренные, бѣловатые; столбики сросшіеся только при основаніи (рис. 801, b),—короче тычинокъ . . . . .  
дикій жасминъ—\* *P. coronarius* L.



(Рис. 801).



(Рис 802).

#### 346. *Phléum* L.—аржанцы.

a. Листья свѣтло-зеленые, съ язычкомъ продолговатымъ; колосовидная метелка вверху тупая; развѣтвленія ея внизу срослись съ цвѣточнымъ стержнемъ; чашечныя пленки линейно-продолговатыя, прямо усѣченные, съ прямымъ, длинно-рѣсничнымъ килемъ, и быстро заострены въ толстую жест-

кую ость (рис. 802), въ 2—3 раза длиннѣе цвѣточныхъ; колосокъ безъ зачаточнаго другаго цвѣтка . . . . . тимофеевка — *P. pratense* L.

b. Листья сѣро-зеленые, съ короткимъ, усѣченнымъ язычкомъ; колосовидная метелка вверху утоненная; развѣтвленія ея свободныя; чашечныя пленки ланцетныя, на верхушкѣ косо усѣченныя, съ согнутымъ шершавымъ килемъ, шиловидно-заостренныя, обыкновенно на треть длиннѣе цвѣточныхъ пленокъ; колоски съ зачаточнымъ 2 цвѣткомъ . . . . .

Бемеровъ а.—*P. Boehmeri* Wib. <sup>1)</sup>.

**347. Phlomis** L. — зопники. Длинные корни утолщены въ шаровидные клубни; листья горожковые, снизу пушистые; нижніе на длинныхъ черешкахъ 3-угльно-сердцевидные; стеблевые яйцевидно-ланцетные, при основаніи сердцевидные, черешковые; верхніе ланцетные, почти сидячіе; цвѣтки въ густыхъ мутовкахъ, далеко разставленныхъ; шиловидные прицвѣтники съ оттопыренными, жесткими волосками; чашечка голая; шиловидные зубы ея отогнуты и втрое короче трубочки (рис. 803); вѣнчикъ грязно-розовый, вдвое длиннѣе чашечки: верхняя губа спереди зубчатая и рѣсничная; средняя лопасть нижней губы лишь немного длиннѣе и шире боковыхъ; орѣшки на верхушкѣ пушистые . . . . .



(Рис. 803).

(клубненоносный) зопникъ—*P. tuberosa* L. <sup>2)</sup>.

**348. Phragmites** Trin. — тростники. Высокій злакъ съ толстымъ, прямымъ стеблемъ, покрытымъ до верху сѣро-зелеными, широкими линейно-ланцетными листьями, тонко и постепенно заостренными, по краямъ остро-шероховатыми, безъ язычка, но съ рядомъ волосковъ; метелка большая, густая, съ поникшею верхушкою, цвѣтущая — раскидистая, многоколосная; колоски темно-бурые съ фіолетовымъ налетомъ . . . . .

(новсемѣстный) тростникъ—*P. communis* Trin.

**349. \* Physocarpus** Cambess. — пузырчатники. Кустарникъ съ голыми вѣтвями и листьями на длинныхъ черешкахъ, въ очертаніи округло-яйцевидными, при основаніи клиновидными, снизу блѣдно-зелеными, съ тупыми лопастями, по краямъ съ неравными городками; цвѣтоножки длинныя, пушистыя; чашечка съ бѣлымъ войлокомъ, — плодоносная съ торчащими долями, почти вдвое короче голыхъ плодовъ; лепестки бѣлые . . . . .

(калинолистный) пузырчатникъ—*\* P. opulifolia* Maxim.

**350. † Phyteuma** L. — фитейма. Листья голые, съ неравными городками; нижніе на длинныхъ черешкахъ—яйцевидные, при основаніи сердцевидные; верхніе—ланцетные, почти сидячіе; колосъ сначала продолговатый, потомъ цилиндрическій, съ оберткою изъ линейныхъ листочковъ; вѣнчикъ темно-синій . . . . . (колосистая) фитейма—*† P. spicatum* L. <sup>3)</sup>.

**351. Picea** Lk. — ели.

a. Иглы темно-зеленныя, лоснящіяся, прямыя, съ короткимъ, острымъ кончикомъ; зрѣлыя шишки продолговато-цилиндрическія, крупныя (до 6" дли-

<sup>1)</sup> Подъ Москвою—Мякинино, Хорошово, Петровское-Разумовское; чаще по Окѣ.

<sup>2)</sup> По берегу Оки.

<sup>3)</sup> Одицалое въ Петровскомъ-Разумовскомъ.

ною); чешуйки ихъ широко-ромбическія (рис. 804 — b, c); сѣмена темно-бурыя, съ свѣтло-бурымъ крыломъ . . . . .

обыкновенная е. — *P. vulgaris* Lk.

б. Иглы сѣро-зеленыя, съ бѣлымъ налетомъ, слегка согнутыя, тупыя; зрѣлыя шишки продолговатыя, мелкія (въ  $1\frac{1}{2}$ —2" длиною); чешуйки ихъ обратно-ййцевидныя, клиновидныя; сѣмена черныя, съ тонкимъ, желтоватымъ крыломъ. . . . . бѣлая е. — \* *P. alba* Lk.

**352. Picris L.**—горчаки. Вѣтвистый стебель и листья покрыты жесткими, оттопыренными, отчасти крючковатыми волосками; нижніе листья узко-ланцетные, выемчато-крупно-зубчатые, сужены въ черешокъ; стеблевые — продолговато-ланцетные, зубчатые, полустеблеобъемлющіе; корзинки довольно крупныя съ ярко-желтыми вѣничками; чешуйки обертки ланцетныя, туповатая, вдоль спинки съ жесткими волосками, по краямъ голыя, темно-зеленыя, какъ и листья; болѣе короткія наружныя чешуйки отклоненныя; сѣмянки съ тонкими поперечными морщинками, къ верхушкѣ суженныя (рис. 805) . . . . . (ястребинковый) горчакъ — *P. hieracioides* L.



(Рис. 804).



(Рис. 805).



(Рис. 806).

**353. Pimpinella L.**—бедренцы. Стебель округлый, полосатый; листочки корневыхъ листьевъ зубчатые, надрѣзанные или раздѣльные; самые верхніе листья съ длиннымъ влагалищемъ и короткою пластинкою; столбики отогнуты; плоды голые. . . (камнеломковый) бедренецъ — *P. saxifraga* L.

**354. Pinus L.**—сосны.

1. Иглы сидятъ попарно въ длинномъ, вначалѣ бѣломъ, потомъ буромъ, остающемся влагалищѣ, — на наружной сторонѣ темно-зеленыя, на внутренней сине-зеленая, гладкія; мужскія шишки на короткихъ ножкахъ; гребень связника слегка зубчатый; женскія шишки висячія на довольно длинныхъ ножкахъ, согнутыхъ крючкомъ; зеленая — коническія, острыя; зрѣлыя — сѣро-бурыя, овальныя, тусклыя; чешуйки ихъ лопатчатыя, съ ромбическимъ утолщеніемъ, на верхушкѣ съ бугоркомъ (рис. 806); крыло втрое длиннѣе сѣмени . . . . . лиственая е. — *P. silvestris* L.

Иглы сидятъ по 5 въ короткомъ, опадающемъ влагалищѣ . . . . . 2.

2. Иглы темно-зеленыя, толстыя и жесткія, шероховатая; мужскія шишки сидятъ; гребень связника обратно-сердцевидный, мелко-зубчатый; женскія шишки почти сидятъ, торчація, ййцевидныя; чешуйки съ узкимъ полу-ромбическимъ утолщеніемъ и слегка отогнутою верхушкою; сѣмена безкрылыя, крупныя; молодыя вѣтви пушистыя . . . . .

сибирскій кедръ — \* *P. cembra* L.


Листья на наружной сторонѣ свѣтло-зеленыя, на внутренней сизоватыя, тонкія, гибкія, мягкія; мужскія шишки на ножкахъ; гребень связника 2-раздѣльный, съ шиловидными долями; женскія шишки на ножкахъ, висячія, цилиндрично-веретенообразныя, слегка согнутыя; чешуйки продолговатыя, слабо утолщенныя къ верхушкѣ, съ тупымъ бугоркомъ; сѣмена мелкія, съ узкимъ, согнутымъ, очень длиннымъ крыломъ; молодыя вѣтви голыя, гладкія . . . . . Веймута с.—\* *P. Strobus* L.

### 355. *Pirola* L.—грушанки.

1. Вѣничекъ раскрыто-колокольчатый, съ расходящимися лепестками; тычинки приподняты (рис. 807, а); столбикъ отогнуть, на верхушкѣ утолщенъ въ кольцо подъ бугорчатымъ рыльцемъ (b, a) . . . 2.

Вѣничекъ шаровидно-колокольчатый; тычинки сходятся; столбикъ прямой или почти прямой . . . 3.

2. Кисть о многихъ цвѣткахъ на тупо-ребристомъ цвѣтоносѣ, съ 1—2 продолговатыми влагалищными чешуями; прицвѣтники не короче цвѣтоножекъ (рис. 807, а); доли чашечки яйцевидно-ланцетныя, съ отогнутою верхушкою; вдвое короче бѣлыхъ лепестковъ; столбикъ длиннѣе вѣничка (а); листовые черешки длиннѣе отгиба . . .



(Рис. 807).

круглолистная г.—*P. rotundifolia* L.

Кисть о немногихъ (3 - 7) цвѣткахъ на темно-красномъ цвѣтоносѣ, внизу остро-ребристомъ, съ 1—2 линейными чешуями; прицвѣтники короче цвѣтоножекъ; доли чашечки широко-яйцевидныя, острыя, прижатые, вчетверо короче зеленоватыхъ лепестковъ; столбикъ такой же длины, какъ вѣничекъ; листовые черешки въ 2 - 3 раза длиннѣе маленькаго отгиба . . .

зеленоцвѣтная г.—*P. chlorantha* Sw. <sup>1)</sup>.

3. Столбикъ выдается изъ полураскрытаго вѣничка, нѣсколько согнуть и на верхушкѣ утолщенъ въ кольцо, болѣе широкое, чѣмъ 5-лопастное рыльце; чашечныя доли яйцевидно-ланцетныя, съ нѣсколько отогнутою верхушкою; цвѣтки средней величины . . . . . средняя г.—*P. média* Sw.

Столбикъ не выдается изъ шаровиднаго, почти сомкнутаго вѣничка, короче прямой завязи, съ широкимъ 5-лопастнымъ, почти звѣздчатымъ рыльцемъ, но безъ расширеннаго кольца; чашечныя доли 3-угольно-яйцевидныя, прижатые; цвѣтки мелкіе . . . . . малая г.—*P. minor* L.

### 356. *Pirus* L.—груши.

1. Листья кожистые, сверху лоснящіеся, темно-зеленыя, на длинныхъ черешкахъ, равныхъ отгибу; цвѣтки на длинныхъ ножкахъ съ малиновыми пыльниками, по опыленіи чернѣющими, и съ свободными столбиками; плодъ грушевидный, при основаніи суженный въ длинный черешокъ; плодовые гнѣзда съ наружной стороны округлены; почки голыя . . . . .

груша—*P. communis* L. <sup>2)</sup>.

Листья не кожистые, тусклыя; цвѣтки съ желтыми пыльниками и спаянными внизу столбиками; плодъ шаровидный или овальный, при основаніи со впадиной; плодовые гнѣзда съ наружной стороны съ острымъ ребромъ . . . 2.

2. Цвѣты и плоды на короткихъ ножкахъ; лепестки снаружи розовые,

<sup>1)</sup> Погонно-Лосинный островъ; Усово, Денисьево на Москвѣ рѣкѣ—Звенигородскаго уѣзда, въ хвойныхъ лѣсахъ.

<sup>2)</sup> Дико только по Окѣ.

внутри бѣлые; плоды крупные; листья темно-зеленые, плотные; черешокъ вдвое короче отгиба; почки пушистыя . . . . . яблоня—*P. Malus* L. 1).

Цвѣтки и плоды на длинныхъ ножкахъ; лепестки бѣлые; плоды мелкіе, — съ крупную вишню; листья ярко-зеленые, тонкіе на длинныхъ черешкахъ; доли чашечки линейныя . . . . . 3.

3. Столбики внизу съ бѣлымъ пушкомъ; доли чашечки съ внутренней стороны пушистыя, остающіяся; молодые листья слегка пушистыя, взрослые — голые . . . . . китайская яблоня — \**P. prunifolia* Willd.

Столбики, сросшіеся только при самомъ основаніи, голые; доли чашечки тоже голыя, по отцвѣтаніи опадающія . . . . .

сибирская яблоня — \**P. baccata* L.

**357. \* *Pisum* L.**—горохи. Листья о 2 - 3 парахъ овальныхъ, цѣльно-крайнихъ листочковъ, съ вѣтвистымъ усикомъ; прилистники яйцевидно-полусердцевидные, съ ушкомъ неравно-зубчатымъ; цвѣтки крупные, по 1—2 въ кисти на короткомъ цвѣтоносі; зубцы чашечки 3-угольно-ланцетные, длиною съ трубочку; вѣничикъ обыкновенно бѣлый; сѣмена шаровидныя, желтоватыя . . . . . (посѣвный) горохъ—\**P. sativum* L.

**358. *Plantago* L.**—подорожники.

1. Листья ланцетные, съ жилками почти параллельными, сужены въ длинный желобчатый черешокъ; цвѣточная стрѣлка ребристо-бороздчатая, въ нѣсколько разъ длиннѣ листьевъ; колосъ частый, короткій; прицвѣтники тонко-заостренные, почти совсѣмъ перепончатые; переднія 2 доли чашечки сросшіяся, — 3 заднихъ ладьевидныя, коротко-остроконечныя и вдоль кия пушистыя; доли вѣничка острыя, буроватыя; пыльники и нити свѣтло-желтые; тычинки вчетверо длиннѣ вѣничка; коробочка о 2 сѣменахъ. . . .

ланцетный п. — *P. lanceolata* L.

Листья яйцевидные или эллиптическіе, дугонервные; цвѣточная стрѣлка округлая, слабо-бороздчатая; колосъ длинный, цилиндрической; прицвѣтники туповатыя, съ зеленымъ килемъ и широко-перепончатымъ краемъ; доли чашечки свободныя, тупыя, широко-перепончатыя; лопасти вѣничка не острыя. . 2.

2. Листья пушистыя прижаты къ землѣ, сужены въ короткій, широкій черешокъ; цвѣточная стрѣлка въ нѣсколько разъ длиннѣ листьевъ; колосъ очень частый, продолговато-цилиндрической; тычинки почти вчетверо длиннѣ трубки бѣдно-розоваго вѣничка; пыльники желтые; нити свѣтло-лиловыя; коробка б. ч. о 4 сѣменахъ. . . . . средній п. — *P. media* L.

Листья б. ч. голые, растопыренные, быстро сужены въ довольно длинный, широкій черешокъ; цвѣточная стрѣлка не длиннѣ листьевъ; колосъ при основаніи болѣе рѣдкій, удлиненно-цилиндрической; тычинки вдвое длиннѣ трубки буроватаго вѣничка; пыльники лиловые; нити ихъ бѣлыя; коробочка о 8 - 16 сѣменахъ . . . . . большой п. — *P. major* L.

**359. *Platanthera* Rich.**—любки.

а. Шпорецъ тонкій, нитевидный, острый (рис. 808, а); гнѣзда пыльниковъ почти параллельныя (а); связникъ узкій; отростокъ носика немного замѣтный; край рыльца толстый, вздутый; околоцвѣтникъ бѣловатый; концы лепестковъ и шпорца, кромѣ отогнутыхъ наружныхъ—зеленоватыя; цвѣтки сильно пахучіе . . . . . ночная фіалка—*P. bifolia* Rehb.

1) Дякою найдено въ уѣздахъ: Богородскомъ, Рузскомъ, Коломенскомъ и Клинскомъ (за Дидиревымъ).



б. Шпорецъ на концѣ булавовидно утолщенъ; гнѣзда пыльниковъ книзу расходятся; связникъ широкій; отростокъ носика не замѣтный; край рыльца узкій; околоцвѣтникъ желтоватый; концы губы и шпорца зеленые; цвѣтки безъ запаха. . . . .

зеленоцвѣтная л.—*P. chlorantha* Cust. <sup>1)</sup>.

### 360. *Poa* L.—мятлики.

1. Стебель внизу утолщенъ расширенными влагалищами листьевъ въ луковицу; листья узкіе, подъ конецъ свернутые, заостренные; вѣтви метелки, по 2—3, короткія, сжатые, только во время цвѣтенія отклоненныя; чашечныя пленки почти равныя о 3 жилкахъ, — цвѣточныя превращаются въ луковку; стебель густо-дернистый; верхній листъ очень короткій. . . . . луковичный м.—*P. bulbosa* L. <sup>2)</sup>.



(Рис. 808).

Стебель не утолщенъ внизу въ видѣ луковицы, листья не свернутые, плоскіе. . . . . 2.

2. Листья гладкіе, мягкіе, тонкіе, плоскіе; вѣтви метелки гладкія, оттопыренныя и подъ конецъ отогнутыя, обыкновенно наклоненныя въ одну сторону; нижнія—парныя; нижняя чашечная пленка обѣ 1 жилкѣ много короче верхней о 3 жилкахъ; нижняя цвѣточная пленка тупая; многостебельный, густо-дернистый злакъ; стебель восходящій или внизу лежащій. . . . .

однолѣтній м.—*P. annua* L.

Листья шероховатые или жесткіе; вѣтви метелки шероховатыя; нижнія обыкновенно по 5 (1 - 3) . . . . . 3.

3. Стебель и листовыя влагалища остро-шероховатые; нижняя цвѣточная пленка ланцетная, острая, съ сильно выдающимися 5 жилками; верхній листъ короче своего влагалища; чашечныя пленки длинныя, неравныя, острые; нижняя чашечная пленка обѣ 1, верхняя о 3 жилкахъ. . . . . 4.

Стебель и листовыя влагалища гладкіе (иногда кромѣ нижнихъ). . . . . 5.

4. Стебель и влагалища сплюснутые, килеватые; листья широко-линейные, вверху приостренные или стянутые колпачкомъ, при основаніи стебля 2-рядно скученные; язычекъ короткій, тупой. . . . .

судетскій м.—*P. sudetica* Haenke <sup>3)</sup>.

Стебель и влагалища округлые; листья узко-линейные, заостренные; язычекъ длинный, острый. . . . . заурядный м.—*P. trivialis* L.

5. Верхній листъ во много разъ короче своего влагалища; стебель съ длинными побѣгами; чашечныя пленки почти равныя. . . . . 6.

Верхній листъ длиннѣе или лишь нѣсколько короче своего влагалища; вѣтви метелки длинныя и тонкія; обѣ чашечныя пленки о 3 жилкахъ, нижняя короче; нижняя цвѣточная пленка съ слабыми жилками, тупая. . . . . 7.

6. Стебель и влагалища сплюснутые, килеватые; листья сѣро-зеленые; влагалища короче междоузлій; вѣтви метелки короткія; нижняя цвѣточная пленка ланцетная, тупая, съ неясными жилками; обѣ чашечныя пленки о 3 жилкахъ. . . . . сплюснутый м.—*P. compressa* L.

Стебель округлый, при основаніи съ короткими вѣтвями; листья зеленые;

1) Подъ Москвою—Кунцево, Богородское, Петровское-Разумовское.

2) Подъ Симоновымъ монастыремъ; прежде указывалось въ Кунцовѣ и на Воробьевыхъ горахъ.


3) Погонно-Лосинный островъ; въ прежнее время въ Горенкахъ.

вѣтви метелки длинныя, тонкія, отклоненныя; нижняя цвѣточная пленка продолговатая, острая, съ сильно выдающимися жилками; нижняя чашечная пленка обѣ 1, верхняя о 3 жилкахъ. . . . . луговой м.—*P. pratensis* L.

7. Листья узкіе, съ очень короткимъ, усѣченнымъ, тупымъ язычкомъ; верхній листъ длиннѣе своего влагалища, которое не доходитъ до узла стебля. . . . . дубровный м.—*P. nemoralis* L.

Листья довольно широкіе, съ длиннымъ острымъ язычкомъ; верхній листъ не длиннѣе своего влагалища, изъ котораго не выступаетъ верхній узелъ стебля; стебель при основаніи съ вѣточками въ узлахъ. . . . . поздній м.—*P. serotina* Ehrh. <sup>1)</sup>.

**361. Polemonium** L.—синюхи. Стебель высокій, многолистный; нижніе листья черешковые, верхніе сидячіе: листочки ихъ многочисленные, яйцевидно-ланцетные, острые, —3 верхніе у верхнихъ листьевъ внизу сдвинуты; цвѣтоносы метелки железисто-пушисты; доли чашечки яйцевидныя (рис. 809, d); вѣнчикъ раскрыто-колокольчатый (a), голубой, рѣдко бѣлый, длиннѣе чашечки; корбочка яйцевидная (e). . . . . синюха—*P. coeruleum* L.



(Рис. 809).

**362. Polygala** L.—истоды.

1. Нижніе листья въ розеткѣ крупнѣе остальныхъ, продолговато-клиновидныхъ; боковыя жилки крыловидныхъ чашелистиковъ не соединены на верхушкѣ съ среднею жилкою; наружныя ихъ развѣтвленія безъ сѣтчатыхъ сплетеній; боковые прицвѣтники короче цвѣтоножки; средній—одинаковой съ нею длины и не превышаетъ цвѣточныхъ почекъ; цвѣтки ярко-синіе. . . . . горькій ис.—*P. amara* L.

Нижніе листья не образуютъ розетки, короче остальныхъ, линейно-ланцетныхъ, острыхъ; боковыя жилки на крыловидныхъ чашелистикахъ соединены на верхушкѣ косою жилкою съ среднею; наружныя ихъ развѣтвленія съ сѣтчатыми сплетеніями. . . . . 2

2. Длинная, частая кисть заканчивается хохломъ изъ среднихъ прицвѣтниковъ, превышающихъ цвѣточные почки и цвѣтоножки распустившихся цвѣтковъ; боковые прицвѣтники одинаковой съ ними длины; наружныя развѣтвленія боковыхъ жилокъ на крыловидныхъ чашелистикахъ съ рѣдкими сѣтчатыми сплетеніями; вѣнчикъ обыкновенно сине-лиловый или грязно-малиновый. . . . . хохлатый ис.—*P. comosa* Schk.

Кисть заканчивается цвѣточными почками, которыхъ не превышаютъ средніе прилистники, одинакой длины съ цвѣтоножкой распустившихся цвѣтковъ; боковые прицвѣтники вдвое ея короче; наружныя развѣтвленія боковыхъ жилокъ на крыловидныхъ чашелистикахъ съ частыми сѣтчатыми сплетеніями; вѣнчикъ синій. . . . . обыкновенный ис.—*P. vulgaris* L. <sup>2)</sup>.

**363. Polygonatum** Tourn.—купены.

a. Стебель ребристый, съ листьями полустеблеобъемлющими и 1-2 ниж-


<sup>1)</sup> Подъ Москвою—Иванково, Кусково.

<sup>2)</sup> Подъ Москвою—Иванково, Владычино.

ними чешуйчатыми, скоро опадающими; цвѣтки по 1 - 2; околоцвѣтникъ цилиндрической, къ устью слегка расширенъ (рис. 810, а); зубцы его и тычиночныя нити голыя (b); ягода синева-черная.

лѣчебная к.—*P. officinale* All.

б. Стебель круглый, гладкій, съ листьями сидячими или на короткихъ черешкахъ, безъ чешуйчатыхъ нижнихъ листьевъ; цвѣтки по 3 - 5 въ короткихъ кистяхъ; околоцвѣтникъ суженъ повыше основанія, къ устью ворончато расширенъ; концы зубцовъ и тычиночныя нити пушистыя; ягода зеленова-черная . . . . . многоцвѣтковая к.—*P. multiflorum* All.



(Рис. 810).



(Рис. 811).

### 364. *Polygonum* L.—горцы.

1. Цвѣтки по 3 - 5 пучками въ пазухѣ верхнихъ листьевъ (рис. 811, а), и только внизу стебля и вѣтвей бываютъ скучены въ рѣдкія, прерывистыя ложныя кисти; тычинокъ 8, безъ околопестичнаго кольца; рыльца очень маленькія; сѣмянки крылатыя . . . . . 2.

Цвѣтки скучены въ верхушечные колосья или колосовидныя кисти; тычинки съ околопестичнымъ железистымъ кольцомъ . . . . . 4.

2. Стебель не вьющійся, лежачій; листья только сужены въ очень короткій черешокъ, мелкіе, съ явственными боковыми жилками (рис. 811, а); раструбы книзу бурые, вверху перепончатые, блестяще-бѣлые, 2-раздѣльные; всѣ цвѣтки пучками въ пазухѣ листьевъ; цвѣтоножки короче околоцвѣтника; плодоножки одинаковой съ нимъ длины; 3 очень короткихъ столбика; сѣмянки матовыя, морщинисто-бороздчатые . . . . . спорышъ—*P. aviculare* L.

Стебель вьющійся; листья черешковые, сердцевидно-стрѣловидные, заостренные; раструбы цѣльные, не рѣсничные; нижніе пучки цвѣтковыхъ въ пазушныхъ прерывистыхъ, рѣдкихъ кистяхъ; околоцвѣтникъ разрастается вокругъ плода; 3 наружныя доли его вогнутыя, съ килемъ на спинкѣ; столбикъ короткій, цѣльный; сѣмянки повислыя . . . . . 3.

3. Стебель угловато-бороздчатый, слегка пушистый; какъ и листья; плодоножка короче околоцвѣтника и сочленена подъ нимъ; наружныя доли его съ тупымъ килемъ на спинкѣ; сѣмянки тусклыя, съ морщинистыми полосками . . . . . повилычній г.—*P. convolvulus* L.

Стебель слабо-бороздчатый, голый, какъ и листья; плодоножка одинакой длины съ околоцвѣтникомъ и сочленена ниже ея середины; наружныя доли околоцвѣтника съ бѣловато-перепончатымъ крыломъ, вверху закругленнымъ, книзу изгибающимся на плодоножку; сѣмянки лоснящіяся, гладкія . . . . . прикустарный г.—*P. dumetorum* L.

4 (1). Колосъ одинъ, частый, на верхушкѣ простаго, не развѣтвленнаго стебля, выходящаго изъ корневища; листья плотные, полукожистые . . . 5.

Колосевъ нѣсколько на концахъ вѣтвистаго стебля, съ мочковатыми корнями; столбиковъ 2 (3), до половины сросшихся (рис. 812); рыльца большія; сѣмянки чечевицеобразныя; листья на краю рѣсничные . . . 6.

5. Стебель съ немногими листьями различной формы: нижніе крупнѣе, при основаніи усѣченные или почти сердцевидные, низбѣгаютъ въ длинный крылатый черешокъ, продолговато-ланцетные, нѣсколько волнистые; верхніе мелкіе, сидячіе, линейно-ланцетные; тычинокъ 8; столбиковъ свободныхъ 3, съ маленькими рыльцами; сѣмянки 3-гранныя, лопящіяся; корневище червеобразно-изогнутое, деревянистое. . . . . змѣевикъ—*P. Bistorta* L.

Стебель покрытъ частыми и одинаковыхъ размѣровъ листьями: отъ продолговатыхъ до линейно-ланцетныхъ; тычинокъ 5; столбиковъ 2, на половину сросшихся; рыльца длинныя; сѣмянки чечевицеобразно-сплюснутыя; корневище ползучее, вѣтвистое . . . земноводный г.—*P. amphibium* L.

6. Колосья частые, довольно толстые; тычинокъ 6 (рис. 812) . . . 7.

Колосья рѣдкіе, тонкіе, нитевидные . . . 8.



(Рис. 812).



(Рис. 813).

7. Раструбы широкіе, почти голые, съ короткими, тонкими рѣсничками; околоцвѣтникъ и цвѣтоножки съ железками (рис. 812); сѣмянки съ обѣихъ сторонъ выпуклыя . . . щавелелистный г.—*P. lapathifolium* L.

Раструбы узкіе, плотно охватываютъ стебель, съ жесткими, прижатыми волосками и длинными рѣсничками (рис. 813); околоцвѣтникъ и цвѣтоножки безъ железокъ; сѣмянки съ обѣихъ сторонъ плоскія или съ одной—вогнутыя . . . почечуйная трава—*P. Persicaria* L.

8. Раструбы почти голые, съ короткими рѣсничками; околоцвѣтникъ съ железистыми точечками, 4 (3-5)-раздѣльный; тычинокъ 6 (8); сѣмянки съ одной стороны выпуклыя, съ другой почти плоскія, тусклыя, бугорчато-шероховатыя; трава острая на вкусъ, какъ перецъ . . .

собачій перецъ—*P. Hydropiper* L.

Раструбы пушистые, съ длинными рѣсничками; околоцвѣтникъ безъ железокъ, 5-раздѣльный; тычинокъ 5 . . . 9.

9. Стебель прямой; листья узко-ланцетные, къ обоимъ концамъ суженные; колосъ съ слегка поникшею верхушкою; сѣмянки нѣсколько тусклыя, ямчато-точечныя, съ одной стороны сильно выпуклыя, съ другой—почти плоскія . . . прѣсный г.—*P. mite* Schrk.

Стебель почти лежачій; листья ланцетно-линейные, съ округленнымъ или едва суженнымъ основаніемъ, до середины одинаковой ширины и постепенно

сбуженные къ верхушкѣ; колосъ обыкновенно торчащій; сѣмянки лоснящіяся, съ обѣихъ сторонъ выпуклыя . . . мелкій г.—*P. minus* Huds.

**365. *Populus* L.—тополя.**

1. Молодые листья и вѣтви пушистые; прицвѣтныя чешуйки мохнатыя (рис. 814, b); тычинокъ (a) 4 - 8 (15); вѣтви толстыя, короткія. . . 2.

Листья и вѣтви голые; тычинокъ 15 - 30; почки голыя, смолисто-липкія, какъ и молодые вѣтви. . . 3.

2. Молодые вѣтви, почки, черешки и низъ листа войлочные; черешокъ листа цилиндрическій; листья сверху лоснящіяся, темнозеленыя, на концахъ вѣтвей округло-яйцевидныя, при основаніи слегка сердцевидныя, выемчато-ланчатые, угловато-крупно-зубчатые; прицвѣтныя чешуйки неравно-зубчатые, ржаво-красныя, слегка мохнатыя; завязь продолговатая, съ желтыми рыльцами. . . серебристый т.—\* *P. alba* L.

Молодые листья снизу шелковисто-пушистые, — взрослые голые; черешокъ длинный, сплюснутый съ боковъ; почки голыя, нѣсколько клейкія; листья сверху тускло-зеленыя, снизу сѣро-зеленыя, на укороченныхъ вѣтвяхъ округлые, выемчато-зубчатые, или городковые; прицвѣтныя чешуйки бахромчато-надрѣзныя, съ длинными, густыми, сѣрыми волосками (рис. 814), темно-бурья; завязь коническая, острая, съ малиновыми рыльцами; пыльники малиновыя. . . осина—*P. tremula* L. (Рис. 814).



3. Листовые черешки округлые, сверху желобчатые; листья снизу блѣдно-зеленыя, съ выступающею сѣткою жилокъ, острые или заостренные, отъ эллиптическихъ до ланцетныхъ; вѣтви короткія, толстыя; завязь на половину заключена въ желтый, голый бокальчатый медникъ. . . бальзамическій т.—\* *P. balsamifera* L.

Листовые черешки сплюснутые съ боковъ; листья съ обѣихъ сторонъ зеленые, дельтовидныя или почти ромбическія до яйцевидныхъ; вѣтви длинныя, гибкія, лоснящіяся. . . 4.

4. Листья при основаніи клиновидныя, зубчатые; черешокъ листа короче пластинки; завязь о 4 бороздкахъ, почти вполнѣ заключена въ бокальчатый медникъ. . . осокоре—† \* *P. nigra* L.

Листья при основаніи слегка сердцевидныя, округло-зубчатые или городковые; черешокъ листа длиннѣ пластинки; завязь о 6 бороздкахъ, на половину заключена въ медникъ. . . канадскій т.—\* *P. canadensis* Desf.

**366. \* *Portulaca* L.—портулакъ.** Стебель очень вѣтвистый, распростертый, голый, какъ и листья обратно-яйцевидныя, тупые; доли чашечки съ тупымъ килемъ. . . (огородный) портулакъ.—\* *P. oleracea* L.

**367. *Potamogeton* L.—рдесты.**

1. Листья вполнѣ линейныя, сидячіе на вѣтвистомъ стеблѣ, прозрачныя, погруженные въ воду. . . 2.

Листья не линейныя, по крайней мѣрѣ верхніе, отъ узко-ланцетныхъ до овальныхъ. . . 6.

2. Стебель сильно сплюснутый, почти 2-крылый, такой же ширины вверху, какъ и листья, — туповатые, остроконечные, со множествомъ поперечныхъ жилокъ, при основаніи безъ бугорковъ; цвѣтоносъ въ 2 - 3 раза длиннѣ плотнаго колоса о 10 - 15 цвѣткахъ; костянки косо-эллиптическія. . .

сплюснутый р.—*P. compressus* L.

Стебель слегка сплюснутый, 4-гранный, или круглый, тонкий; листья съ рѣдкими поперечными жилками или безъ нихъ; колосъ рѣдкій или короткій... 3.

3. Стебель замѣтно сплюснутый; листья плоско-линейные о 3 - 5 жилкахъ, съ рѣдкими и тонкими поперечными жилками и съ 2 явственными бугорками при основаніи; колосъ короткій о 4 - 8 цвѣткахъ; костянки съ короткимъ прямымъ носикомъ, спереди съ тупымъ килемъ... 4.

Стебель округлый, цилиндрическій; листья узко-линейные обѣ 1 - 3 жилкахъ; колосъ рѣдкій на длинномъ, штевидномъ цвѣтоносѣ... 5.

4. Цвѣтоносъ не длиннѣе плотнаго, сжатого колоса, къ верхушкѣ не утолщенъ; костянки снаружы слегка бугорчатые и съ 2 выступающими полосками возлѣ тупаго кия; листья о 3 (5) жилкахъ, б. м. тупые съ острыми кончиками... туполистный р.—*P. obtusifolius* M. & K.

Цвѣтоносъ въ 2 - 3 раза длиннѣе рѣдкаго колоса, вверху нѣсколько утолщенъ; костянки гладкія; листья о 5 (3) жилкахъ, туповатые или островатые... острокопечный р.—*P. mucronatus* Schrad.

5. Листья короткіе, свѣтло-зеленые, заостренные, безъ поперечныхъ жилокъ, отходятъ у основанія прозрачнаго влагалища, съ 2 бугорками по сторонамъ; цвѣтоносъ въ 2 - 3 раза длиннѣе короткаго колоса о 4 - 8 цвѣткахъ; костянки косо-овальные... крохотный р.—*P. pusillus* L.

Листья длинныя, темно-зеленые, острые, съ явственными поперечными жилками, отходятъ близъ верхняго конца длиннаго, зеленога влагалища; цвѣтоносъ очень длинный; колосъ длинный, прерывистый; костянки почти полукруглыя, съ внутреннимъ краемъ прямымъ, вытянутымъ въ прямой носикъ... гребенчатый р.—*P. pectinatus* L.

6 (1). Всѣ листья на длинныхъ черешкахъ, кожистые, цѣлюкрайніе, дуговервные, овальные или продолговатые, при основаніи слегка сердцевидные, плавающіе; отъ погруженныхъ листьевъ на цвѣтоносномъ стеблѣ остаются одни, немного желобчатые сверху, черешки; стебель простой, не вѣтвистый... плавающий р.—*P. natans* L.

Листья, иногда кромѣ верхнихъ подъ цвѣтоносомъ, прозрачныя, погруженные, сидячіе или на короткомъ черешкѣ... 7.

7. Листья сужены при основаніи или на короткомъ черешкѣ... 8.

Листья съ округленнымъ или стеблеобъемлющимъ основаніемъ,—всѣ прозрачныя, погруженные, тупые, на вѣтвистомъ стеблѣ... 10.

8. Стебель не вѣтвистый; листья цѣлюкрайніе, по краямъ гладкіе, тупые, сидячіе; погруженные—ланцетные; плавающіе—кожистые, длинно-обратно-йцевидные или продолговато-лопатчатые, суженные въ черешокъ; цвѣтоносъ къ верхушкѣ не утолщенъ; костянки съ острымъ килемъ снаружы; верхушка стебля съ листьями буроватая... буроватый р.—*P. rufescens* Schrad.

Стебель вѣтвистый; листья на краю шероховатые, острые; цвѣтоносъ къ верхушкѣ утолщенъ; костянки съ тупымъ килемъ... 9.

9. Всѣ листья на короткихъ черешкахъ, погруженные, колюче-острые, большіе, ярко-зеленые, лоснящіеся; сѣтка жилокъ возлѣ срединнаго нерва не явственная... лоснящійся р.—*P. lucens* L.

Листья, кромѣ самыхъ верхнихъ, сидячіе, острые,—верхніе на черешкахъ, часто плавающіе; сѣтка жилокъ возлѣ срединнаго нерва явственная... значный р.—*P. gramineus* L. 1).

1) У Тростенскаго озера (Анофриево)—Рузскаго уезда.

10 (7). Листья, сидячіе округленнымъ основаніемъ на сплюснуто 4-гранномъ стеблѣ; ланцетные до линейно-ланцетныхъ, мелко-зубчатые, волнистые; колосъ короткий, о немногихъ цвѣткахъ; костянки при основаніи сросшіяся, съ длиннымъ согнутымъ носикомъ. (рис. 815).

курчавый р.—*P. crispus* L.

Листья стеблеобъемлющіе, — охватываютъ широкимъ основаніемъ круглый стебель; костянки свободныя, не сросшіяся, съ прямымъ носикомъ . . . 11.

11. Листья при основаніи глубоко-сердцевидные, по краямъ мелко-зубчатые, шероховатые, округлые или продолговато-яйцевидные, плоскіе; сѣтка жилокъ близъ срединнаго нерва не явственная; колосъ короткий; костянки съ тупою спинкою. . . . . сквознолистный р.—*P. perfoliatus* L.

Листья при основаніи округленные, слегка сердцевидные, цѣльнокрайніе, по краямъ гладкіе, продолговато или линейно-ланцетные, на верхушкѣ стянуты колпачкомъ; сѣтка жилокъ близъ срединнаго нерва явственная; колосъ и особенно цвѣтоносъ длинные; костянки съ острымъ килемъ; стебель съ колѣнчато-изогнутыми междоузліями . . . . .

длинный р.—*P. praelongus* Wulfen. <sup>1)</sup>

### 368. *Potentilla* L.—лапчатки.

1. Вѣтвистый кустарникъ съ листьями перистыми, пальчато-сближенными, листочки цѣльнокрайніе, острые, продолговатые, снизу съ шелковистымъ пушкомъ; прилистники ланцетные, длинно-заостренные, стеблеобъемлющіе; цвѣтки крупныя, ярко-желтыя, въ рѣдкихъ щиткахъ; лепестки округлыя, длиннѣе чашечки; сѣмянки щетинистыя . . . кустарная л.—\**P. fruticosa* L.

Травы съ листьями пальчатыми или перистыми; листочки ближе къ верхушкѣ или и по бокамъ надрѣзано-зубчатые, къ основанію клиновидныя . . . 2.

2. Цвѣтки одиночныя, пазушныя или супротивныя листьямъ на длинныхъ цвѣтоножкахъ—длиннѣе листа . . . . . 3.

Цвѣтки расположены въ верхушечныхъ щиткахъ или полузонтикахъ . . . 5.

3. Стебель прямой, восходящій; стеблевые листья 3-чатыя, сидячіе, съ большими, широкими, 3-5-раздѣльными прилистниками,—нижніе 5-ные, черешковые; листочки и стебель съ прижатыми волосками; цвѣтки обыкновенно 4-ные; корневище толстое, короткое, деревянистое

узикъ—*P. Tormentilla* Schrk.

Цвѣтоносныя стебли ползучіе, не развѣтвленные, штевидные, укореняющіеся въ узлахъ; цвѣтки обыкновенно 5-ные . . . . . 4.

4. Листья прерывисто-перистые о многихъ (13-21) продолговатыхъ листочкахъ, снизу или и сверху шелковистыхъ; верхніе прилистники влагалищныя, многораздѣльныя; лепестки вдвое длиннѣе долей чашечки . . . . .

гусиная лапка—*P. anserina* L.

Листья пальчатые, 5-ные (7-ные, 3-чатыя), черешковые; листочки съ крупными овальными городками почти съ самаго основанія,—снизу съ рѣдкими, прижатыми волосками; прилистники яйцевидно-ланцетные; лепестки обратно-сердцевидные, нѣсколько длиннѣе долей чашечки . . . . .

ползучая л.—*P. reptans* L.



(Рис. 815).

<sup>1)</sup> Въ р. Свтуни, близъ Давыдова—подъ Москвою; прежде въ Люблинѣ.



5 (2). Листья перистые, о 3-5 парахъ листочковъ опушенныхъ, клиновидно-продолговатыхъ; прилистники ланцетные; цветоножки короче листьевъ, по отцвѣтаніи согнутыя; свѣтло-желтые лепестки не длиннѣ долей чашечки; сѣмянки морщинистыя; приподнимающійся или лежачій стебель безъ пучка корневыхъ листьевъ, съ тонкимъ однолѣтнимъ корнемъ . . . . .

лежачая л. — *P. supina* L. <sup>1)</sup>.

Листья пальчатые, о 3, 5, 7 и иногда 9 листочкахъ . . . . . 6.

6. Цвѣтоносные стебли высокіе, б. м. толстые, длинные; во много разъ длиннѣ нижнихъ листьевъ; цвѣтковъ много въ плотномъ или развѣсистомъ полузонтикѣ. . . . . 7.

Цвѣтоносные стебли низкіе, тонкіе, поднимающіеся, обыкновенно немного длиннѣ пучка развитыхъ корневыхъ листьевъ; цвѣтковъ мало—по 2-4 въ рѣдкомъ полузонтикѣ на очень тонкихъ цвѣтоножкахъ; корневище длинное, вѣтвистое . . . . . 12.

7. Стебель съ короткими, торчащими щетинками и съ длинными, оттопыренными, жесткими волосками на луковкахъ,—прямой или у основанія слегка согнутый; сѣмянки складчато-морщинистыя, съ крылатымъ килемъ; лепестки свѣтло-желтые; цвѣтки на короткихъ, толстыхъ цвѣтоножкахъ, въ сжатыхъ полузонтикахъ . . . . . прямая л. — *P. recta* L. <sup>2)</sup>.

Стебель безъ щетинистыхъ короткихъ волосковъ, но шерстистый или войлочный или же съ простыми, б. м. длинными волосками; сѣмянки безъ кия. . . . . 8.

8. Вѣнчикъ не длиннѣ или короче чашечки; лепестки блѣдно-желтые; цвѣтки на короткихъ, толстыхъ цвѣтоножкахъ; стебли прямые или у основанія слегка согнутые . . . . . 9.

Вѣнчикъ длиннѣ чашечки; лепестки ярко-или темно-желтые . . . . . 10.

9. Стебель, черешки и листочки съ оттопыренными, жесткими волосками; листья не образуютъ корневой розетки,—всѣ 3-чатые или нижніе иногда перисто-пальчатые о 5 листочкахъ, съ ланцетными прилистниками; корень тонкій, однолѣтній; сѣмянки морщинистыя. . . . .

порвежская л. — *P. norvégica* L.

Стебель, черешки и листочки съ приподнятыми, почти прижатыми волосками; листья въ корневой розеткѣ и нижніе стеблевые 5-ные, только верхніе 3-чатые; листочки обратно-яйцевидные, надрѣзочно-зубчатые, о 5-10 расходящихся зубцахъ съ каждой стороны; сѣмянки слегка морщинистыя. . . . .

средняя л. — *P. intermedia* L.

10. Стебель и цвѣтоножки, чашечка и исподъ листьевъ съ б. м. длинными волосками, но не шерстистые и не войлочные; восходящіе дугою стебли поднимаются вокругъ пучка корневыхъ листьевъ; лепестки темно-желтые, широко-сердцевидные, значительно длиннѣ чашечки; цвѣтки на длинныхъ и тонкихъ цвѣтоножкахъ въ развѣсистыхъ, рѣдкихъ полузонтикахъ; стебель и черешки листьевъ съ оттопыренными волосками; листочки продолговато-обратно-яйцевидные, зазубренные, о 9-12 овальныхъ зубцахъ съ каждой стороны . . . . . семилисточковая л. — *P. heptaphylla* Mill.

Верхъ стебля, цвѣтоножки, чашечка и исподъ листьевъ покрыты сѣрымъ или бѣлымъ войлокомъ; лепестки ярко-желтые . . . . . 11.

<sup>1)</sup> По берегу Москвы рѣки, близъ Угрѣшскаго монастыря.

<sup>2)</sup> Въ прежнее время найдено въ Сокольникахъ.

11. Листочки снизу съ бѣлымъ войлокомъ, безъ волосковъ вдоль жилокъ, о 2 - 3 большихъ зубцахъ по сторонамъ, къ основанію цѣльные, къ верхушкѣ 3-надрѣзные; надрѣзы перавные, раскрытые, острые, съ завернутымъ краемъ; верхніе листочки продолговато-линейные, впереди надрѣзаннызубчатые, почти перисто-лопастные; цвѣтоножки по отцвѣтаніи прямыя.

серебристая л.—*P. argentea* L.

Листочки снизу съ сѣрымъ войлокомъ и съ длинными волосками вдоль жилокъ и по краямъ, о многихъ зубцахъ по сторонамъ, съ плоскими краями; стебли дугою поднимаются и расходятся кружкомъ, въ срединѣ съ пучкомъ корневыхъ листьевъ; листочки продолговато-обратно-яйцевидные, съ ровными, тупыми зубцами по сторонамъ; цвѣтоножки по отцвѣтаніи согнутыя. . . . . холмовая л.—*P. collina* Wib. <sup>1)</sup>.

12 (6). Листочки только спереди съ мелкими, прижатыми вверхъ зубцами, продолговато-ланцетные, сверху голые, зеленые, снизу и по краямъ шелковистые, какъ и листовые черешки, цвѣточные стебли и чашечки; лепестки бѣлые; волоски на цвѣтоложѣ длиннѣе мохнатыхъ при основаніи сѣмянокъ. . . . . бѣлая л.—*P. alba* L. <sup>2)</sup>.

Листочки спереди и по бокамъ съ крупными зубцами, обратно-яйцевидные или продолговатые, снизу пушистые; лепестки желтые; сѣмянки голыя, слегка морщинистыя. . . . . 13.

13. Листочки снизу съ густымъ сѣрымъ войлокомъ и сверху сѣрые отъ звѣздчатыхъ волосковъ, о 4 зубцахъ съ каждой стороны; прилистники корневыхъ листьевъ линейные. . . . . пепельная л.—*P. cinerea* Chaix <sup>3)</sup>.

Листочки снизу съ длинными волосками, сверху безъ звѣздчатыхъ волосковъ; прилистники корневыхъ листьевъ яйцевидно-ланцетные; красноватые стебельки и черешки листьевъ мохнатые отъ длинныхъ, оттопыренныхъ волосковъ; плодonoжки отогнутыя. . . . . тусклая г.—*P. opaca* L. <sup>4)</sup>.

**369. Poterium L.**—черноголовки. Стебель ребристый, прямой, верху вѣтвистый, съ рѣдкими листьями; листочковъ много, кругловатыхъ или овальныхъ, при основаніи сердцевидныхъ или усѣченныхъ, съ глубокими, пильчатыми зубцами; колосья округлые: верхніе цвѣтки въ колосѣ пестичные съ малиновымъ рыльцемъ; нижніе — тычинковые; средніе обоюполые; чашечка зеленоватая; плодовая чашечная трубка 4-гранная, сѣтчато-морщинистая. . . . (кровохлебковая) черноголовка—*P. Sanguisorba* L. <sup>5)</sup>.

**370. Primula L.**—скороспѣлки. Листья яйцевидные или продолговатые, тупые, волнисто-городковые, много короче цвѣтоноса;—снизу съ бархатистымъ пушкомъ, какъ цвѣтоносъ съ цвѣтоножками и чашечка; прицвѣтники ланцетно-шиловидные; чашечка немного вздутая, 5-гранная, —вся бѣловатая, съ яйцевидными, заостренными зубцами (рис. 816, а); вѣтчикъ съ вогнутымъ отгибомъ, въ звѣз съ 5 оранжевыми пятнами; коробочка яйцевидная, короче широкой чашечки (d, e) . . . . .

(лѣбечная) скороспѣлка—*P. officinalis* Jacq.

<sup>1)</sup> На Окѣ—между Серпуховымъ и Лужками.

<sup>2)</sup> По Окѣ—село Озеры, Коломенскаго уѣзда, за Лужками—Серпуховскаго; Дубровицы за р. Десною, Подольскаго уѣзда; ранѣе—близъ Новаго Коптева.

<sup>3)</sup> По Окѣ—Лужки Серпуховскаго уѣзда; подъ Москвою — Серебряный боръ (близъ Хорошова).

<sup>4)</sup> Указано по Окѣ, близъ Серпухова.


<sup>5)</sup> Близъ Серпухова—подъ Владычинимъ монастыремъ.

**371. Prunus L.**—сливы.

1. Цвѣтки мелкіе, въ кистяхъ, распускаются послѣ листьевъ; листья тонкіе, вдоль складчатые; черешокъ съ железками у основанія; костянки мелкія, круглыя, съ круглою косточкой. . . 2.

Цвѣтки крупныя, по 1 или по нѣскольку (2 - 5) пучкомъ на укороченныхъ боковыхъ вѣткахъ, распускаются раньше листьевъ или въ одно время съ ними; черешокъ безъ железокъ у основанія пластинки. . . 3.

2. Цвѣточныя кисти длинныя, рѣдкія, висячія; лепестки обратно-яйцевидныя; листья слегка морщинистые, тусклые, голые, эллиптическіе, съ растопыренными пальчатыми зубцами; черешокъ листа о 2 железкахъ; костянка черная съ морщинистою косточкой. . .



(Рис. 816).

черемуха — *P. Padus* L.

Цвѣточныя кисти короткія, плотныя, торчащія; лепестки округлые; листья гладкіе, овальные, съ прижатыми тонкими зубцами, снизу въ углахъ жилокъ б. ч. волосистые; черешокъ листа о 3 - 4 железкахъ; костянка красная съ гладкою косточкой. . . виргинская черемуха—\* *P. virginiana* L.

3. Цвѣтки пучками, по 2 - 5 вмѣстѣ, на длинныхъ цвѣтоножкахъ, распускаются въ одно время съ листьями; не развернувшіеся листья вдоль складчатые, — взрослые почти кожистые, гладкіе, лоснящіеся; костянка сплюснута-шаровидная, безъ налета, съ косточкою почти шаровидною. . . 4.

Цвѣтки по одиночкѣ или попарно, на короткихъ цвѣтоножкахъ, распускаются ранѣе листьевъ; не развернувшіеся листья свернуты трубкою; взрослые плотные, сверху темно-зеленые; костянка продолговатая или округлая съ сизымъ налетомъ и сплюснутою, продолговатою, шероховатою косточкою. . . 5.

4. Листья на концахъ молодыхъ вѣтвей эллиптическіе или ланцетные, заостренные; всѣ остальные — обратно-яйцевидные, тупые и округленные, съ мелкими ровными городками; цвѣтки по 2 - 3 въ пучкѣ; костянка красная; невысокій кустарникъ. . . дикая вишня—*P. Chamaecerasus* Jacq.

Всѣ листья одинаковые, эллиптическіе, заостренные, съ неравными, округленными зубцами; цвѣтки обыкновенно по 3 - 5 въ пучкѣ; костянка темно-лиловая или темно-красная; большой высокій-кустъ. . .

садовая вишня—\* *P. Cerasus* L.

5. Цвѣтоножки пушистыя; цвѣтки обыкновенно попарно; костянка яйцевидно-продолговатая, висячая, обыкновенно темно-синяя; дерево безъ колючекъ. . . слива—\* *P. domestica* L.

Цвѣтоножки голыя; цвѣтки по одиночкѣ; костянка округлая, синяя, торчитъ на короткой ножкѣ; низкій вѣтвистый кустарникъ съ оттопыренными, колючими вѣтвями. . . тернъ—*P. spinosa* L. <sup>1)</sup>


**372. Psilonema C. A. Mey.** — голонитники. Стебель вѣтвистый, при основаніи съ приподнимающимися вѣтвями; нижніе листья продолговато-

<sup>1)</sup> По Окъ—Бѣлые Колодези, Коломенскаго уѣзда.

обратно-яйцевидные; остальные—продолговато-ланцетные, всё—къ основанію сужены; плодовые кисти удлинены; стручки съ звѣздчатыми волосками, округлые, съ небольшою выемкою и очень короткимъ столбикомъ (рис. 817, а) . . . (чашечный) голонитникъ—*P. calycinum* C. A. Mey. <sup>1)</sup>.

**373. *Pteridium* Gleditch** — орляки. Корневище несетъ 1 листь, перегнутой дугою, почти горизонтально-распростертой, въ очертаніи 3-угольно-яйцевидный, на длинномъ черешкѣ, вверху слегка желобчатомъ; листь плотный, кожистый, свѣтло-зеленый; вторичные листочки ланцетные, глубоко-перисто-раздѣльные, супротивные, заостренные, — нижніе черешковые; доли ихъ косыя, тупыя, широко-ланцетныя (рис. 818), — верхнія слившіяся; края листочковъ, несущихъ спорангіи, рѣсничные. . . . .

орлякъ—*P. aquilinum* Kuhn.



(Рис. 817)



(Рис. 819).



(Рис. 818).

**374. *Pulmonaria* L.**—медуницы.

а. Стеблевые листья продолговатые: верхніе — продолговато-яйцевидные; нижніе — продолговато-лопатчатые, къ основанію суженные; корневые листья яйцевидные, къ основанію быстро сужены въ длинный, окаймленный черешокъ, — изъ нихъ самыя нижніе съ сердцевиднымъ основаніемъ; плодоносная чашечка вверху шире, чѣмъ внизу; орѣшки съ острымъ килемъ и острою верхушкою; вѣничикъ сначала розовый, потомъ сине-лиловый и наконецъ синий. . . . . лѣчебная м.—*P. officinalis* L.

б. Стеблевые листья ланцетные или линейно-ланцетные: верхніе полустеблеобъемлющіе, немного изгибающіе, — нижніе слегка сужены къ основанію; корневые листья эллиптически-ланцетные или просто ланцетные, постепенно суженные въ широкій крылатый черешокъ; плодоносная чашечка внизу и вверху одинаковой ширины; орѣшки вверху закругленные; вѣничикъ сначала красноватый, потомъ ярко-голубой . . . . .

узколистная м.—*P. angustifolia* L. <sup>2)</sup>.

**375. *Pulsatilla* Tourn.**—прострѣлы. Стрѣлка обь 1 цвѣткѣ, съ розеткою корневыхъ листьевъ на длинныхъ черешкахъ; листья 3-чатые; листочки ихъ пальчато-раздѣльные на клиновидныя доли о 2-3 зубцахъ на вер-

<sup>1)</sup> Сохранилось въ одномъ изъ гербаріевъ прежняго времени.

<sup>2)</sup> Подъ Москвою рѣдко—Серебряный боръ близъ Хорошова, Троицкое-Бутурлино; чаще по Огъ, въ Серпуховскомъ и Коломенскомъ уѣздахъ.


хушкѣ; цвѣтокъ крупный, о 6 листкахъ, свѣтло-лиловый, снаружи густо покрытъ шелковистыми волосками, вмѣстѣ съ оберткою и стеблемъ,—широко-колобопытый, вначалѣ поникшій, потомъ почти торчащій и раскрытый (рис. 819) . . . . . сонъ-трава—*P. patens* Mill.

**376. *Pyrethrum* Gaertn.** — поповники. Стебель и листья снизу слегка пушистые; листья въ очертаніи продолговатые,—нижніе на длинныхъ черешкахъ; стеблевые сидячіе, перисто-разсѣченные, съ яйцевидно-ланцетными долями и такими же острыми хрящеватыми зубцами; корзинки съ лучевыми цвѣтками бѣлыми; сѣмянки 5-гранныя, многореберныя, съ высокою зубчатую коронкою . . . . . щитковый п.—*P. corymbosum* Willd. 1).


**377. *Quercus* L.** — дубы. Листья продолговато-обратно-яйцевидные, выемчато-лопастные, съ тупыми, округлыми лопастями и очень короткимъ черешкомъ, — взрослые голые; женскій ложный колосъ очень рѣдкій на короткомъ цвѣтоносѣ, который обыкновенно длиннѣе листового черешка; околоцвѣтникъ мужскаго цвѣтка зеленоватый . . . . . (черешчатый) дубъ—*Q. pedunculata* Ehrh.



(Рис. 820).



(Рис. 821).



(Рис. 822).

**378. *Ranischia* Opiz.** — боровинки. Листья свѣтло-зеленые, яйцевидные, б. ч. острые, длиннѣе черешка, съ мелкими городчатыми зазубринами; цвѣтки мелкіе (рис. 820, а), желто-зеленоватые; зубцы чашечки 3-угольные, островатые, зазубренные; тычиночныя нити шиловидныя, не согнутыя; столбики нѣсколько отогнуть къверху, безъ кольца, съ расширеннымъ рыльцемъ, вдвое шире столбика (b); коробочки повислыя; края створокъ связаны волокнами . . . . . (однобокая) боровинка—*R. secunda* Grek.

**379. *Ranunculus* L.** — лютики.

1. Листья вильчато-много-раздѣльные на нитевидныя, растопыренныя доли (рис. 821, d); цвѣтоножки длинныя, супротивныя листьямъ; плодоножки согнутыя; лепестки бѣлые съ желтымъ ноготкомъ и медниковою впадинкою, не прикрытою чешуйкою (b); тычинки длиннѣе пестичной головки; сѣмянки не окаймленныя, часто слегка волосистыя, поперечно-морщинистыя (c); водяныя травы . . . . . 2.

Листья цѣльные, пальчато-раздѣльные или пальчатые; плодоножки торчащія; лепестки желтые . . . . . 3.

2. Листья въ нѣсколько разъ короче междоузлій, въ очертаніи почти округлые, съ повторно 2-раздѣльными, короткими, жесткими, въ кружокъ

1) Въ недавнее время под Москвою—въ Петровскомъ-Разумовскомъ; отъ прежняго времени хранится въ гербаріи Максимовича.

растопыренными долями (рис. 821, d), въ воды не спадающими; цветоножки много длиннѣ листьевъ . . . . .

растопыренный л.—*R. divaricatus* Schrad.

Листья немного короче междоузлій, въ очертаніи продолговатые, съ повторно 3-раздѣльными, длинными, мягкими въ видѣ волосъ долями, расходящимися во всѣ стороны, въ воды спадающими въ видѣ кисти; цветоножки немного длиннѣ листьевъ . . . . . обвислый л.—*R. flaccidus* Pers.

3. Всѣ листья цѣльные, нераздѣльные: цѣльнокрайніе или слегка зубчатые . . . . . 4.

Всѣ листья, иногда кромѣ корневыхъ, глубоко-пальчато-раздѣльные или пальчатые . . . . . 7.

4. Листья мутовчатые, длинные, нитевидные, состоящіе изъ однихъ листовыхъ черешковъ, безъ пластинки; цвѣтки очень мелкіе на оттопыренныхъ цвѣтоножкахъ; сѣмянки почти шаровидныя, гладкія, не окаймленныя, съ короткимъ, прямымъ носикомъ; водяная травка съ вѣтвистымъ стеблемъ, съ нижними вѣтвями супротивными или 3-чато-мутовчатыми . . . . .

многолистный л.—*R. polyphyllus* Kit. 1).

Листья очередные; сѣмянки б. м. окаймленныя . . . . . 5.

5. Листья округло-сердцевидные, лоснящіеся; нижніе — выемчато-городковые, на длинныхъ черешкахъ; верхніе — угловатые, на короткихъ; чашечка о 3 листочкахъ; вѣничикъ о 8—10 лепесткахъ (рис. 822, a); пушистыя сѣмянки завязываются рѣдко; стебель приподнимающійся, съ пучкомъ корней, утолщенныхъ въ видѣ клубней . . . . . чистякъ—*R. Ficaria* L.

Листья ланцетные, постепенно суженные въ черешокъ, не лоснящіеся; чашечка 5-листная, вѣничикъ 5-лепестный; клубневидныхъ корней нѣтъ . . . 6.

6. Стебель приподнимающійся или лежачій, слабый; нижніе листья на длинныхъ черешкахъ болѣе широкіе; цвѣтки небольшіе, свѣтло-желтые; сѣмянки слегка окаймленныя, съ короткимъ, почти прямымъ носикомъ . . . . .

прыщинецъ—*R. Flammula* L.

Стебель прямой, высокій, толстый, полый, слегка волосистый, какъ и всѣ листья, — узко-ланцетные, сидячіе, заостренные; цвѣтки крупныя, ярко-желтыя; сѣмянки явственно окаймленныя, съ широкимъ, сплюснутымъ и согнутымъ носикомъ . . . . . язычковый л.—*R. Lingua* L.

7. Цвѣтоложе продолговатое; плодоложе цилиндрическое; цвѣтки мелкіе, свѣтло-желтыя; медниковая впадинка не прикрыта чешуйкою; сѣмянки морщинистыя, не окаймленныя; чашелистики отогнутые; стебель вѣтвистый, полый, голый; листья лоснящіеся, нѣсколько мясистые; нижніе пальчато-3-раздѣльные, съ продолговатыми городчато-надрѣзанными долями; верхніе — 3-чато-разсѣченные на линейныя, почти цѣльнокрайнія доли; цветоножки пушистыя, безъ бороздокъ; сѣмянокъ, очень мелкихъ, много . . . . .

ядовитый л.—*R. sceleratus* L.


Цвѣтоложе полушаровидное или овальное, не разрастающееся (рис. 824, d); цвѣтки крупныя, ярко-желтыя, сверху лоснящіеся; медниковая впадинка прикрыта мясистою чешуйкою (с); сѣмянки гладкія, скаймленныя . . . . . 8.

8. Чашелистики отогнутые, прижатые къ цвѣтоножкѣ (рис. 823, a); стеблевые листья 3-чато-разсѣченные; основаніе стебля или корней утолщено . . . 9.


1) Хранится въ гербаріи Анненкова.

Чашелистики не отогнутые; стебель и корни не утолщены . . . . . 10.

9. Стебель въ нижней части и черешки листьевъ съ оттопыренными волосками, въ верхней части—съ прижатыми; средняя доля листа на довольно длинномъ черешечкѣ; доли нижнихъ листьевъ 2 - 3 раздѣльные и надрѣзано-зубчатыя; сѣмянки съ короткимъ, согнутымъ носикомъ (рис. 823, б); основаніе стебля утолщено луковицею . . луковичный л.—*P. bulbosus* L. <sup>1)</sup>.



(Рис. 823).



(Рис. 824).

Стебель, листья и чашелистики шелковисто-мохнатые; самые нижніе листья цѣльные; стеблевые съ линейно-ланцетными долями, часто 3-раздѣльными; цвѣтоложе цилиндрическое; сѣмянки съ длиннымъ носикомъ; пучки корней утолщены въ продолговатая шишки (клубни) . . . . .

илирійскій л.—*R. illyricus* L. <sup>2)</sup>.

10. Одинъ или нѣсколько корневыхъ листьевъ цѣльныхъ — нераздѣльныхъ или 3 - 5 - лопастныхъ, округло-почковидныхъ; верхніе стеблевые листья глубоко-пальчато-раздѣльные, какъ бы мучовчатые, сидячіе, съ линейными или линейно-ланцетными долями, цѣльными, рѣже надрѣзано-пальчатыми; сѣмянки бархатистыя, съ согнутымъ носикомъ. . . . . 11.

Всѣ корневые листья глубоко-пальчато-раздѣльные; стеблевые не раздѣлены на линейныя или линейно-ланцетныя доли; сѣмянки голыя . . . 12.

11. Корневыхъ листьевъ нѣсколько; изъ нихъ 1 (2) всегда надрѣзной, — всѣ голыя; стеблевые листья съ линейными, цѣльными долями, или узко-линейными, надрѣзано-пальчатыми; цвѣтоложе круглое; носикъ у сѣмянки съ самаго основанія согнуть крючкомъ. . . . .

золотистый л.—*R. auricomus* L.

Только 1 большой округлый листъ и нѣсколько пленчатыхъ влагалищъ при основаніи стебля, покрытаго вѣтвѣ съ листомъ короткими волосками; доли стеблевыхъ листьевъ ланцетныя или ромбически-ланцетныя, зубчатыя; цвѣтоложе продолговатое; носикъ у сѣмянки согнуть только на самомъ концѣ крючкомъ . . . . .

кассубскій л.—*R. cassubicus* L.

12. Нижніе или всѣ листья 3-чатыя, съ листочками на черешечкахъ—средній на длинномъ черешечкѣ; листочки ихъ 3 - раздѣльные, съ надрѣзано-зубчатыми долями; цвѣтоножки глубоко-бороздчатыя; стебель съ ползучими и укореняющимися побѣгами въ узлахъ, пушистый; листочки у

<sup>1)</sup> Подъ Москвою—Останкино.

<sup>2)</sup> Близъ Москвы рѣки,—подъ Шеленихой.



верхнихъ листьевъ нераздѣльные; сѣмянки съ прямымъ носикомъ, усеяны точечками . . . . . ползучій л.—*R. répens* L.

Всѣ листья пальчато-раздѣльные; стебель прямой, безъ ползучихъ побѣговъ . . . . . 13.

13. Цвѣтоножки глубоко-бороздчаты; плодоложе щетинистое; чашелистики, особенно въ почкахъ, волосистые; листья, черешки и низъ стебля съ оттопыренными волосками; верхъ стебля, съ прижатыми волосками. . . 14.

Цвѣтоножки гладкія или слабо-бороздчаты; плодоложе голое (рис. 824, d) . . . . . 15.

14. Нижніе листья съ линейными, глубоко-раздѣльными долями; сѣмянки съ короткимъ, широкимъ, сплюснутымъ, согнутымъ носикомъ


многоцвѣточный л.—*R. polyanthemus* L.

Нижніе листья съ широкими, почти ромбическими, 3-5 зубчатыми долями; сѣмянки съ длиннымъ, тонкимъ и на верхушкѣ завитымъ или сильно согнутымъ носикомъ . . . . . дубровный л.—*R. nemoròsus* L.

15. Вся трава съ короткими, прижатыми волосками; нижніе листья въ очертаніи 5-угольные, съ долями почти ромбическими, глубоко-надрѣзными, и съ ланцетными, остро-зубчатыми надрѣзами; верхніе листья съ линейными долями; сѣмянки съ короткимъ, прямымъ носикомъ (рис. 824, d) . . . .

ѣдкій л.—*R. acer* L.

Вся трава мохнатая, съ длинными волосками; нижніе листья съ широкими округло-обратно-яйцевидными долями, спереди надрѣзанными, снизу съ шелковистыми мягкими волосками; верхніе листья съ продолговато-обратно-яйцевидными долями; сѣмянки съ длиннымъ крючковатымъ, завитымъ носикомъ . . . . . мохнатый л.—*R. lanuginòsus* L. 1).



(Рис. 825).



(Рис. 826).

380. *Raphanistrum* Tourp. — рѣдечники. Стебель внизу и листья съ жесткими, торчащими волосками; листья лировидные, глубоко-раздѣльные, съ продолговато-яйцевидными, неравно-зубчатыми долями; чашечка прижатая къ вѣнчику; носикъ много длиннѣе верхняго членка стручка, перетянутого между членками (рис. 825—а, b); свѣтло-желтые лепестки съ желтыми или лиловыми жилками; корень тонкій . . . дикая рѣдька—*R. innòcium* Medic.

381. \* *Raphanus* L. — рѣдьки. Стебель внизу и листья съ жесткими, рѣд-

1) Хранится въ одномъ изъ гербаріевъ прежняго времени; указывалось въ Перовѣ и Кунцовѣ.

кими волосками; листья ланцетные, глубоко-раздельные, съ продолговато-яйцевидными боковыми долями и яйцевидною верхнею, неравно-зубчатою; чашечка прижатая къ вѣичику; стручекъ веретенообразный, вздутый, неровно перетянутый, съ длиннымъ носикомъ (рис. 826—а, б); лепестки бѣлые или лиловые съ темно-лиловыми жилками; корень толстый, мясистый; стебель внизу полый . . . . . съ янная р.—\* *R. sativus* L.


### 382. *Rhamnus* L.—крушины.

а. Листья супротивные—какъ и вѣтви,—на крестъ расположенные, зазубренные, о 3 дугообразныхъ жилкахъ по бокамъ главной, почти голые; цвѣтки многобрачно-2-домные, 4-ные (рис. 827); доли чашечки широко-ланцетныя, острыя, у мужскихъ цвѣтковъ отогнутыя, по отцвѣтаніи отпадаютъ кольцомъ; лепестки безъ ноготковъ, зеленоватыя; столбикъ 2-4 раздѣльный; костянки черныя; сѣмена къ наружной сторонѣ плода съ глубокою бороздкою; вѣтви на концахъ переходятъ въ шипы; почки съ чешуйками . . . . . жесерь—*R. cathartica* L.<sup>1)</sup>


б. Листья очередные—какъ и вѣтви,—цѣлюкрайніе, съ каждой стороны о 6-8 косыхъ параллельныхъ жилкахъ, снизу вдоль жилокъ волосистые; цвѣтки обоеполые, 5-ные (рис. 828); доли чашечки продолговатыя, нѣсколько острыя, прямыя; лепестки съ ноготкомъ, внутри бѣлые, снаружи зеленоватыя; столбикъ цѣльный, съ головчатымъ рыльцемъ; костянки незрѣлыя—красныя; зрѣлыя—черныя; сѣмена плоскія, чечевицеобразно-3-гранныя; кусты безъ шиповъ; почки безъ чешуекъ; верхушка вѣтвей, цвѣтоножки и черешки пушистыя . . . . . ломкая к.—*R. Frangula* L.



(Рис. 827).



(Рис. 828).



(Рис. 829).

383. \* *Rheum* L.—ревени. Стебель высокій; нижніе листья яйцевидные, по краямъ сильно-волнистые, снизу вдоль жилокъ слегка волосистые; черешки снизу безъ бороздки; верхніе листья продолговато-яйцевидные на короткихъ черешкахъ; метелка внизу покрыта листьями; плодоножки внизу сочлененныя, длиною съ яйцевидный плодъ, кверху суженный, по сторонамъ выемчатый (рис. 829, б) . . . . .

волнистый р.—\* *R. undulatum* L.

384. *Rhinanthus* L.—погремки. Супротивные листья сидячіе на стеблѣ, обыкновенно простомъ, узко-ланцетные или линейные, съ широкимъ основаніемъ, пальчатые, съ хрящеватою оторочкою зазубринъ; цвѣтки въ односторонней кисти на короткихъ ножкахъ въ пазухѣ надрѣзано-пальчатыхъ прицвѣтниковъ, яйцевидныхъ или яйцевидно-ланцетныхъ; вѣичикъ желтый; верхняя губа съ лиловыми зубцами . . . . .

пѣтушій гребень—*R. Crista galli* L.

<sup>1)</sup> На известняхъ—по берегамъ Оки, Пахры, Москвы рѣки.

**385. Rhynchospora Vahl.**—очеретники. Стебель тонкій, нитевидный, 3-гранный, съ листьями узколинейными, желобчатыми, на краю шероховатыми; колосья скучены на верхушкѣ пучкомъ, продолговатые, овально-конические (рис. 830, а), не длиннѣ верхушечнаго листа; цвѣточные пленки яйцевидно-ланцетныя, острия (а), бѣловатыя, потомъ буроватыя; околоцвѣтныя щетинки внизъ зазубренныя, не длиннѣ орѣшка, числомъ 9 - 13 (б) . . . . . (бѣлый) очеретникъ—*R. alba* Vahl. <sup>1)</sup>.

**386. Ribes L.**—смородины.

1. Вѣтви колючія, съ простыми или 3-раздѣльными шипами; листья съ короткими черешками на очень короткихъ боковыхъ вѣточкахъ, округлые, 3 - 5 лопастные, снизу пушистые; кисть обь 1 - 3 цвѣткахъ, съ 2 - 3 прицвѣтниками; чашечка колокольчатая съ долями тупыми, продолговатыми, отогнутыми; лепестки обратно-яйцевидные, зеленые или грязно-красные, какъ и продолговатыя ягоды . . . . . крыжовникъ—*R. Grossullaria* L.



(Рис. 830).



(Рис. 831).

Вѣтви безъ шиповъ; кисть о многихъ цвѣткахъ, рѣдко о 2 - 3 . . . 2.

2. Кисти поникшія, потомъ повислыя; прицвѣтники много короче цвѣтоножекъ; листья 3 - 5 лопастные, при основаніи сердцевидные . . . . . 3.

Кисти торчащія; прицвѣтники длиннѣ цвѣтоножекъ . . . . . 4.

3. Листья почти голые, пахучіе, снизу съ желтыми точечными железами, какъ на чашечкѣ и на ягодахъ; черешки, цвѣтоносы, цвѣтоножки и чашечка пушистые; кисть рѣдкая, о немногихъ цвѣткахъ; прицвѣтники шиловидные; чашечка колокольчатая, съ продолговатыми, отвернутыми долями, втрое длиннѣ продолговатыхъ лепестковъ, внутри красноватыхъ; ягоды черныя . . . . . черная с.—*R. nigrum* L.

Листья снизу и черешки ихъ пушистые, безъ железокъ и безъ запаха; цвѣтоносы, цвѣтоножки и чашечка голые; кисть рѣдкая, о многихъ цвѣткахъ; прицвѣтники яйцевидные; чашечка блюдчатая, съ долями лопатчатыми, отвороченными (рис. 831, а), много длиннѣ клиновидныхъ лепестковъ (б), желтовато-зеленыхъ; ягоды красныя или желтовато-бѣлыя: . .

красная с.—*R. rubrum* L.

4. Кустъ, съ листьями глубоко - 3 - 5 лопастными, сверху лоснящимися, въ молодости складчатыми, не вполнѣ 2-домный: мужскія цвѣточные кисти густыя, длинныя, о 20 - 30 цвѣткахъ; женскія—о 2 - 3 цвѣткахъ; черешки

<sup>1)</sup> Косино, на топкомъ берегу Святаго озера.

листьевъ, цвѣтоносы и цвѣтоножки железисто-пушистые; прицвѣтники перепончатые, ланцетные; чашечка блюдчатая, голая, съ долями яйцевидными, вчетверо длиннѣе лопатчатыхъ зеленовато-желтыхъ лепестковъ; ягоды красныя . . . . . глухая с. — \* *R. alpinum* L.

Кусты съ листьями 3-лопастными, въ молодости свернутыми, и съ цвѣтками обоеполыми; кисти рѣдкія, голыя; прицвѣтники зеленые; чашечка съ длинною, цилиндрическою трубкою, яркожелтая, съ долями продолговатыми, отклоненными, вдвое длиннѣе усѣченныхъ, зазубренныхъ лепестковъ, спереди оранжевыхъ; ягоды оранжевыя . . . . .

золотистая с. — \* *R. aureum* Pursh

### 387. *Rosa* L.—розы.


1. Шипы прямые, шиловидные, на молодыхъ, не цвѣтущихъ вѣтвяхъ вѣстѣ съ щетинками; цвѣтоносы не окружены листовыми прилистниками; всѣ прилистники узкіе, линейно-клиновидные; завязи почти сидячія или на короткой ножкѣ; ложныя ягоды приплюснuto-шаровидныя. . . . . 2.

Шипы согнутыя серпомъ; цвѣтоносы окружены прилистниками короткихъ цвѣтущихъ вѣтокъ; прилистники широкіе; цвѣтки и ложныя ягоды красныя . . . . . 3.


2. Листочки съ обѣихъ сторонъ зеленые; доли чашечки надрѣзныя, съ перистыми придатками, на оранжево-красной ложной ягодѣ оттопыренные или отогнутыя; лепестки желтые. . . . . желтая р. — \* *R. lutea* Mill.

Листочки снизу сизые, мелкіе; доли чашечки цѣльныя, на ложной ягодѣ, почти черной, сходящіяся; лепестки бѣлые. . . . .

бедренечная р. — \* *R. pimpinellifolia* L.



(Рис. 832).



(Рис. 833).

3. Доли чашечки перисто-надрѣзныя, съ узкою на концѣ лопастью, отогнутыя (рис. 832), на ягодѣ опадающія; завязи сидячія; прилистники на цвѣтущихъ и безцвѣтныхъ вѣтвяхъ почти одинакіе; молодыя, не цвѣтушія вѣтви съ частыми железистыми щетинками, какъ и цвѣтоносы, и чашечка (рис. 832); листочки пальчато-городковые. . . . . 4.

Доли чашечки цѣльныя или надрѣзныя (рис. 833); завязи на ножкахъ; прилистники на цвѣтущихъ вѣтвяхъ шире остальныхъ; молодыя вѣтви безъ железистыхъ щетинокъ; листочки остро-зубчатые. . . . . 5.

4. Цвѣтки торчащіе, ярко-красные, съ лепестками раскрытыми; доли чашечки яйцевидныя на шаровидной ложной ягодѣ; молодыя, не цвѣтушія вѣтви со слабыми, слегка согнутыми шипами. . . . . французская р. — \* *R. gallica* L.

Цвѣтки поникшіе, розовые, махровые, со множествомъ смыкающихся лепестковъ; доли чашечки яйцевидно-ланцетныя, на яйцевидной ложной ягодѣ (рис. 832); молодыя, нецвѣтущія вѣтви съ твердыми серповидными шипами . . . . . столбчатая р.—\* *R. centifolia* L.

5. Листочки снизу голубоватые или сѣроватые, съ прямыми зубцами; прилистники на цвѣтущихъ вѣтвяхъ съ яйцевидными, свободными концами; на нецвѣтущихъ—линейно-продолговатые, съ свернутыми въ трубку краями и охватывающими вѣтвь; подъ ними по 2 согнутыхъ шипа; доли чашечки цѣльныя, съ ланцетною верхушкою, на ложномъ плодѣ сходящіяся, не опадающія; завязи слишкомъ вдвое длиннѣе ножки; вѣтви коричневыя, — молодыя, не цвѣтущія съ большими шиповидными шипами и короткими щетинками . . . . . шиповникъ—*R. cinnamomea* L.

Листочки снизу зеленые, съ зубцами пригнутыми къ верхушкѣ; прилистники согнутые, со многими шипами подъ ними; доли чашечки надрѣзныя, съ 2 боковыми придатками внизу и расширенною верхушкою, на ложномъ плодѣ отогнутыя (рис. 833), подъ конецъ опадающія; завязи длиною съ ножку; молодыя, не цвѣтущія вѣтви съ крѣпкими, внизу сплюснутыми и сильно согнутыми шипами . . . . . дикая р.—\* *R. canina* L.

### 388. *Rubus* L.—малины.

1. Травы съ простымъ, не вѣтвистымъ, прямымъ стеблемъ, съ ползучимъ деревянистымъ корневищемъ и верхушечными цвѣтками; прилистники яйцевидные, свободные, не приросшіе къ листовому черешку; цвѣтоложе плоское; лепестки бѣлые . . . . . 2.

Полукустарники съ вѣтвистымъ стеблемъ и пазушными цвѣтками, рѣдко тоже и верхушечными; прилистники линейные, приросшіе къ листовому черешку; цвѣтоложе коническое (рис. 834, б) . . . . . 3.

2. Цвѣтокъ одинъ на верхушкѣ тонкаго, густо пушистаго, бороздчатого стебля о 2 - 3 листьяхъ, внизу съ стеблеобъемлющими пленчатыми чешуями; листья сердце-почковидные, 5-лопастные, съ округлыми лопастями; цвѣтки однополые (2-домная трава); лепестки обратно-яйцевидные, вдвое длиннѣе яйцевидныхъ тупыхъ чашелистиковъ; ложная ягода красноватая, зрѣлая желтоватая . . . . . морозка—*R. Chamaemorus* L. <sup>1)</sup>.

Цвѣтковъ 3 - 6, щиткомъ на верхушкѣ ребристаго, пушистаго стебля, съ рѣдкими, тонкими шипами, внизу съ яйцевидно-округлыми, бурными чешуйками и длинными стелющимися побѣгами; листья 3-чатыя, на длинныхъ черешкахъ, съ яйцевидно-ромбическими острыми и остро-зубчатыми листочками; цвѣтки обоополые; лепестки узкіе, линейно-продолговатые, мелкіе, не длиннѣе ланцетныхъ, шиповидно-заостренныхъ чашелистиковъ, на плодѣ отогнутыхъ; плодъ о немногихъ, крупныхъ красныхъ костянкахъ . . . . .

костяника—*R. saxatilis* L.


3. Всѣ листья простые, сердцевидно-5-лопастные, съ острыми удвоенно-пильчатыми лопастями; стебли безъ шиповъ, съ железистыми волосками, какъ на черешкахъ и на цвѣтоножкахъ; прилистники почти свободные; лепестки округлые, растопыренные, ярко-малиновые, пахучіе, большіе, длиннѣе чашечки . . . . . душистая м.—\* *R. odoratus* L.

Всѣ листья, кромѣ самыхъ верхнихъ, сложные: пальчатые или перистые; стебли и отрасли ихъ съ шипами, безъ железистыхъ волосковъ; прилист-

<sup>1)</sup> Въ сѣверныхъ уздахъ губерніи, —рѣдко, на торфянымъ болотамъ.

ники вполне приросшие основаніемъ къ листовому черешку; лепестки бѣлые, не пахучіе . . . . . 4.

4. Лепестки короче чашечки, торчащіе, обратно-яйцевидные (рис. 834, а); листья снизу съ тонкимъ бѣлымъ войлокомъ; нижніе перистые—5, 7-ные; верхніе 3-чатые, съ яйцевидными, заостренными листочками и сидячими боковыми; цвѣтки въ верхушечныхъ и пазушныхъ рѣдкихъ соцвѣтіяхъ; костянки красныя или желтыя, бархатистыя, легко отдѣляющіяся отъ плодоложа; ланцетные заостренные чашелистики отогнутые (рис. 834, а—б); нецвѣтущія отрасли прямыя, круглыя, съ сизымъ налетомъ и внизу съ тонкими колючими щетинками (шипамі) . . . . . малина—*R. idaeus* L.



(Рис. 834).

Лепестки длиннѣе чашечки, растопыренные; листья снизу безъ бѣлаго войлока; всѣ 3-чатые или нижніе 5-7 пальчатые; костянки темныя, гладкія, плотно прикрѣпленныя къ плодоложу . . . . . 5.

Стебель и отрасли лежачіе, съ сизымъ налетомъ, съ неодинаковыми, тонкими шипами; листья почти всегда 3-чатые, съ ромбическими, яйцевидными листочками, снизу слегка пушистыми; чашечка прижатая къ плоду; костянки его тусклыя, черныя; съ сизымъ налетомъ; лепестки продолговатыя, выемчатые . . . . . ежевика—*R. caesius* L.

Стебель и отрасли прямыя, безъ налета, съ одинаковыми, тонкими шипами; листья на цвѣтущихъ вѣтвяхъ 3-чатые, съ сидячими боковыми листочками; самые верхніе простые; листья на отрасляхъ о 5-7 листочкахъ, съ верхушечнымъ и средними листочками черешковыми; листочки яйцевидные, коротко-заостренные, снизу б. ч. пушистыя; плодовая чашечка отогнутая; костянки темно-малиновыя, лоснящіяся, безъ налета; лепестки обратно-яйцевидные . . . . . куманика—*R. fruticosus* L.

### 389. *Rumex* L.—щавели.

1. Листья копьевидные или стрѣловидные; раструбы ихъ бахромчато надрѣзные; цвѣтки однополые; столбики приросли къ ребрамъ завязи; 2-домныя травы съ цвѣточными мутовками въ негустыхъ, метельчатыхъ, безлистныхъ кистяхъ . . . . . 2.

Листья къ основанію суженные, округленные или сердцевидные; цвѣтки б. ч. обоеполые; столбики свободные . . . . . 3.

2. Наружныя доли околоцвѣтника отогнутыя, вдвое короче внутреннихъ, перепончатыхъ, разрастающихся вокругъ плода, съ маленькимъ, свисшимъ желвакомъ, округлымъ или почти 4-угольнымъ, въ видѣ чешуйки; листья у основанія обыкновенно стрѣловидные; нижніе на длинныхъ черешкахъ, яйцевидно-продолговатыя, б. ч. тупые; стеблевые почти сидячіе, острые, ланцетные . . . . . кислый щ.—*R. Acetosa* L.

Наружныя доли околоцвѣтника прижатыя, — внутреннія зеленныя, не разрастающіяся вокругъ плода и не длиннѣе его, безъ желвака; листья копьевидные, съ расходящимися или приподнятыми лопастями: нижніе ланцетные; верхніе линейные, — всѣ черешковые . . . . .

кисловатый щ. — *R. Acetosella* L.

3. Внутреннія доли околоцвѣтника съ желвакомъ (рис. 835—b, d). . . 4.  
Внутреннія доли околоцвѣтника безъ желвака, широкія, яйцевидно-сердцевидныя, цѣльнокрайнія или слегка зубчатые при основаніи . . . 8.

4. Края внутреннихъ долей околоцвѣтника съ длинными, острыми зубцами и вытянутою верхушкою . . . 5.

Края внутреннихъ долей околоцвѣтника цѣльные или только при основаніи слегка зубчатые, съ закругленною верхушкою (рис. 835 — b, d) листья волнистые . . . 6.

5. Цвѣточный мутовки частыя, — верхнія сливаются въ непрерывную кисть, до верху покрытую листьями; листья ланцетные или линейно-ланцетные; нижніе сужены въ довольно длинный черешокъ, — остальные въ короткій; внутреннія доли околоцвѣтника продолговато-ромбическія, на концѣ острые, почти вдвое длиннѣе ширины, по краямъ съ 2 (3, 4) длинными зубцами, въ видѣ щетинокъ, которые не уже долей околоцвѣтника. . .

морской щ.—*R. maritimus* L.

Цвѣточные мутовки рѣдкія, раздвинутыя, въ прерывистыхъ метельчатыхъ кистяхъ, сильно оттопыренныхъ, вверху безлистныхъ, только книзу съ листьями; нижніе листья на очень длинныхъ черешкахъ, сердцевидно-яйцевидные; верхніе продолговато-ланцетные или ланцетные, къ основанію суженные, острые; внутреннія доли околоцвѣтника продолговато 3-угольныя, на верхушкѣ ланцетныя, тупыя, о 3-5 треугольно-шиловидныхъ зубахъ по краямъ . . . туполистный щ.—*R. obtusifolius* L.

6. Листья снизу вдоль жилокъ пушистые, какъ и листовые черешки, — сверху желобчатые; нижніе листья сердцевидно-яйцевидные, тупые, — верхніе яйцевидно-ланцетные, у основанія тупые или слегка сердцевидные; внутреннія доли околоцвѣтника округло-сердцевидныя, туповатыя, часто шире длины своей, съ неясными тупыми зубчиками, и съ однимъ только желвакомъ на одной изъ долей . . . конскій щ.—*R. confertus* Willd.


Листья и черешки голые; черешки плоскіе; пластинки острые; нижніе листья у основанія тупые, слегка сердцевидные или немного суженные. . . 7.

7. Листья плотные, почти кожистые, по краямъ сильно волнистые, продолговато-ланцетные; ложныя кисти узкія; внутреннія доли околоцвѣтника округло-яйцевидныя, слегка сердцевидныя (рис. 835, d) . . . курчавый щ.—*R. crispus* L.

Листья довольно тонкіе, по краямъ слегка волнистые; корневыя очень крупныя, яйцевидно-продолговатыя, при основаніи часто косые; верхніе ланцетные; листовою черешокъ съ ребристыми краями; ложныя кисти толстыя, плотныя; внутреннія доли околоцвѣтника почти 3-угольно-сердцевидныя. . . огромный щ.—*R. maximus* Schreb.

8 (3). Нижніе листья очень большіе, продолговато-яйцевидные, къ основанію глубоко-сердцевидные съ желобчатымъ черешкомъ; остальные листья продолговатые или ланцетные . . . водяной щ.—*R. aquaticus* L.

Нижніе листья широко-ланцетные, продолговатые или линейно-продолговатые, при основаніи округлые или слегка сердцевидные; верхніе — узко лан-



(Рис. 835).



цетные, сгуженные къ основанію; черешки сверху плоскіе . . . . .  
домашній щ.—*R. domesticus* Hartm.

**390. \* Sabina Spach**—саби́на. Ку́сть съ лежачимъ ство́ломъ и торчащими вѣтвями: на однихъ — листья ромбическіе, прижатые; на другихъ — ланцетные, заостренные, слегка отклоненные; ложная ягода черная съ сизымъ налетомъ, шаровидная, висячая на короткой согнутой ножкѣ . . . . .  
казацій можжевелъникъ—\**S. officinalis* Grek.



(Рис. 836).



(Рис. 837).

**391. Sagina L.**—мшанки.

**а.** Цвѣтокъ 4-ной; чашечка много длиннѣе лепестковъ (рис. 836, а); цвѣтоножки очень длинныя, —отцвѣтшія согнуты на верхушкѣ крючкомъ; плодоножки выпрямляются; листья линейные, остроконечные; стебелекъ очень вѣтвистый, съ укореняющимися вѣтвями. . . . . лежачая м.—*S. procumbens* L.

**б.** Цвѣтокъ 5-ной, о 10 тычинкахъ; лепестки вдвое длиннѣе чашечки (рис. 836, б); цвѣтоножки не длинныя, всегда торчащія; листья ланцетные, коротко-остроконечные; корневые длинныя; стебелекъ короткіе, въ пазухахъ съ укороченными вѣтвями, въ видѣ пучка листьевъ . . . . .

узловатая м.—*S. nodosa* Fenzl

**392. Sagittaria L.**—стрѣлолисты. Цвѣточная стрѣлка 3-гранная; цвѣтоножки по 3 въ мутовкѣ: у женскихъ цвѣтковъ (рис. 837, б) въ 3-4 раза короче мужскихъ (а); лепестки бѣлые съ малиновымъ ноготкомъ; тычиночныя нити одинаковой длины съ пыльникомъ; сѣмянки косо-обратнояйцевидныя, съ короткимъ носикомъ (рис. 837); листья съ длинными черешками и длинными, острыми стрѣловидными лопастями; въ водѣ листья лентовидные, сидячіе, плавающіе . . . . .

водяная стрѣла — *S. sagittifolia* L.

**393. Salix L.**—ивы.

**1.** Цвѣтуція сережки на боковыхъ вѣточкахъ, покрытыхъ развернувшимися листьями; листовые черешки вверху съ железистыми бородавочками; прицвѣтныя чешуйки одноцвѣтныя—желто-зеленныя; мужскіе цвѣтки съ 2 усѣченными медниковыми железами—переднею и заднею, короткою; завязь голая; столбикъ короткій; рыльца довольно толстыя, желтыя. . . . . 2.

Цвѣтуція сережки сидячія, безъ листьевъ, или на короткихъ ножкахъ, съ только что развертывающимися листьями; листовой черешокъ безъ железистыхъ бородавочекъ; прицвѣтныя чешуйки 2-цвѣтныя: у основанія свѣтлѣе, къ верхушкѣ черноватая или ржаво-бурая, остающіяся; всѣ цвѣтки только съ 1 заднею медниковою железою. . . . . 5.

**2.** Деревья; весенніе и молодые листья шелковистые; взрослые—продолговато-ланцетные, въ 4-6 разъ длиннѣе ширины; мужскіе цвѣтки о 2 тычинкахъ; сережки цилиндричныя, довольно толстыя . . . . . 3.

Кусты; молодые листья голые или къ верхушкѣ слегка мохнатые; взрослые листья голые, сверху лоснящіеся; мужскіе цвѣтки о 3 и болѣе тычинкахъ . . . . . 4.

3. Почкі и новыя вѣтви шелковисто-бѣлыя; взрослые листья снизу, а иногда и сверху шелковистые, заостренные; прилистники ланцетные; женскіе цвѣтки съ 1 заднею железкою; ножка завязи короче железки; вѣтви не ломкія . . . . . вѣтла—*S. alba* L.

Почкі и новыя вѣтви голыя; взрослые листья съ обѣихъ сторонъ голые, длинно-заостренные; прилистники полусердцевидные или почковидные; женскіе цвѣтки съ переднею и заднею железками; ножка завязи въ 2 - 3 раза длиннѣ задней железки; вѣтви при основаніи хрупкія . . . . .

ломкая и.—*S. fragilis* L.

4. Серезки тонкія, рѣдкоцвѣтныя; прицвѣтныя чешуйки остаются до созрѣванія плодовъ; мужскіе цвѣтки о 3 тычинкахъ, — женскіе только съ 1 заднею железкою; ножка завязи въ 3 - 5 разъ длиннѣ железки; листья равнобокіе, продолговатые до ланцетныхъ, въ 3 - 8 разъ длиннѣ ширины, пильчатые, не линкіе; прилистники полусердцевидные . . . . .

бѣлоталь—*S. triandra* L.

Серезки толстыя, цилиндричныя; прицвѣтныя чешуйки опадаютъ до досозрѣванія; мужскіе цвѣтки о 5 - 12 тычинкахъ, — женскіе съ переднею и заднею железками; листья часто неравнобокіе, молодые липкіе, — всѣ железисто пильчатые, яйцевидно-эллиптическіе, длиною не превышаютъ  $2\frac{1}{2}$  разъ ширины, коротко-заостренные, снизу блѣдно-зеленые; железистыхъ бородавокъ на листовомъ черешкѣ много; прилистники продолговато-яйцевидные; вѣтви при основаніи легко отламываются . . . . .

черноталь — *S. pentandra* L.

5 (1). Новыя вѣтви и взрослые листья голые, снизу сизые; весенніе молодые листья слегка пушистые или съ рѣдкими шелковистыми волосками, или же голые. . . . . 6.

Новыя вѣтви и взрослые листья пушистые; весенніе молодые листья сильно пушистые или сплошь шелковистые . . . . . 10.

6. Взрослые листья ланцетные, снизу съ тонкими и слабо выдающимися боковыми жилками; серезки цвѣтутъ до распусканія листьевъ; вѣтви желтыя или красновато-бурыя, съ внутреннею корою лимонно-желтою, гибкія, вязкія . . . . . 7.

Взрослые листья обратно - яйцевидные, эллиптическіе или овальные; серезки цвѣтутъ въ одно время съ распусканіемъ листьевъ, маленькія, короткія, тонкія, рѣдкоцвѣтныя . . . . . 8.

7. Листья обратно-ланцетные—къ верхушкѣ шире, коротко-заостренные, сверху темно-зеленые, слабо лоснящіеся; серезки цилиндричныя, съ короткими медниковыми железками; тычиночныя нити сросшіяся до верху; пыльники шаровидные, вначалѣ красноватые, по опыленіи чернѣющіе; рыльца яйцевидныя, чернѣющія, почти сидячія; завязь шерстистая; коробочка яйцевидная; створки ея не закручиваются. . . . .

желтолозникъ — *S. purpurea* L.

Листья ланцетные—въ среднѣ шире, длинно-заостренные, сверху лоснящіеся; серезки продолговато-яйцевидныя, очень крупныя; медниковыя железки удлинненныя, б. ч. линейныя; тычинки свободныя; пыльники по опыленіи желтые; завязь голая, съ яйцевиднымъ основаніемъ, ссужена въ длин-

лый столбикъ; рыльца нитевидныя, желтыя; створки коробочки скручиваются; высокіе кусты или деревья съ тонкими вѣтвями, б. ч. съ сизымъ налетомъ. . . . . верба—*S. pruinosa* Wendland <sup>1)</sup>.

8. Листья снизу съ слабо выступающими боковыми жилками, — сверху лоснящиеся; почки съ рѣдкими, короткими волосками, линейныя, тупыя, желтыя; завязь покрыта сѣроватымъ войлокомъ, овально-коническая, на ножкѣ, которая нѣсколько короче продолговатой, усѣченной железки; столбикъ довольно длинный; рыльца обратно-овальныя. . . . .

Вейгеліева и.—*S. Weigelianae* Willd. <sup>2)</sup>.

Листья снизу съ выдающимися сѣтчатыми жилками, сверху темно-зеленые; почки голыя; завязь съ очень короткимъ столбикомъ; рыльца короткія, растопыренныя; мелкіе кустарники. . . . . 9.

9. Листья овальныя, — молодые просвѣчивающіе, блѣдные; почки съ прямымъ носикомъ, полуовальныя, ржаво-бурныя; прилистники на всѣхъ вѣтвяхъ полуовальныя, островатыя, у основанія съ 2 крупными зубцами; завязь на ножкѣ цилиндрическая, тупая, сѣро-шелковистая; рыльца лимонно-желтыя, потомъ бурѣющія; пыльники желтые; чешуйки блѣдно-желтыя, на самой верхушкѣ красноватая, съ густымъ пушкомъ. . . . .

блѣдная и.—*S. livida* Wahlenb.

Листья эллиптическіе; почки тупыя, овальныя; прилистники бываютъ рѣдко; завязь на длинной ножкѣ, шиловидная, при основаніи вздутая, голая, съ сизымъ налетомъ; рыльца красноватая, овальныя; пыльники по опыленіи чернѣютъ; чешуйки блѣдно-ржавыя или желтоватая, впереди красноватая, на спинкѣ слегка мохнатыя. . . . .

черничная и.—*S. myrtilloides* L.

10 (5). Листья снизу или же съ обѣихъ сторонъ покрыты тусклою шерстью, — молодые съ обѣихъ сторонъ пушистыя; завязь покрыта сѣрымъ или бѣлымъ войлокомъ. . . . . 11.

Листья снизу съ шелковистыми или бархатистыми лоснящимися волосками, рѣже голыя, — молодые съ шелковистыми волосками. . . . . 14.

11. Листья снизу съ бѣлымъ войлокомъ, сверху съ прижатыми волосками, сѣро-зеленые, продолговатыя до овальныхъ, заостренные или остро-конечные, съ краями совершенно цѣльными и свернутыми; прилистники очень рѣдкіе; почки голыя, тупыя, овальныя; прицвѣтныя чешуйки съ густыми, шелковистыми волосками, буро-черныя; тычиночныя нити толстыя; пыльники продолговатыя, по опыленіи ржавые; завязь почти сидячая, при основаніи вздутая, коническая или овально-коническая, почти тупая; столбикъ длинный, тонкій, книзу пушистый, не короче половины завязи; рыльца нитевидныя, 2-раздѣльныя; медникъ длинный, линейно-продолговатый, доходить до вздутія завязи. . . . . лапландская и.—*S. Lappinum* L. <sup>3)</sup>.

Листья снизу съ сѣроватымъ пушкомъ или войлокомъ, съ выдающеюся сѣткою жилокъ, вдавленныхъ сверху; прилистники полусердцевидные или почковидные; прицвѣтныя чешуйки волосистыя, но не шелковистыя; пыльники по опыленіи желтые; завязь на длинной ножкѣ, съ очень короткимъ столбикомъ; рыльца толстыя, продолговатыя или яйцевидныя, желтыя, почти

<sup>1)</sup> На берегу Клязьмы—Павловскій посадъ, и рѣки Оки—Карапчеево.

<sup>2)</sup> Петровское-Разумовское. Сенжское озеро.

<sup>3)</sup> По торянымъ болотамъ.

сидячая; медникъ толстый, короткій, усѣченный, во много разъ короче ножки завязи . . . . . 12.

12. Почки и годовалыя вѣтви голыя; листья сверху голые, чисто-зеленые, нѣсколько лоснящіеся, снизу сѣроватые, б. ч. бархатисто-пушистые. широко-овальные — отъ округлыхъ до эллиптическихъ; пети голыя, пыльники эллиптические; завязь шиловидная, со вздутымъ основаніемъ; б. ч. дерево съ толстыми вѣтвями . . . . . бредина—*S. caprea* L.

Почки пушистыя, тупыя, клеватыя; листья продолговато-обратно-яйцевидные, волнисто-зубчатые, сверху мутно-зеленые, тусклые, коротко-волосистые, снизу съ сѣрымъ пушкомъ или войлокомъ; нити при основаніи волосистыя; пыльники почти шаровидныя; завязь коническая . . . . . 13.

13. Годовалыя вѣтви бархатистыя, толстыя; почки бурныя, снаружи вздутыя, съ внутренней стороны плоскія; длина листьевъ втрое болѣе ширины; завязь подъ конецъ шиловидная; столбикъ б. ч. такой же длины, какъ рыльца . . . . . пепельная и.—*S. cinerea* L.

Годовалыя вѣтви голыя, тонкія; почки красноватыя, овальныя, короткія; листья вдвое длиннѣе ширины, сверху сильно морщинистые, къ верхушкѣ стянуты въ согнутый кончикъ; завязь подъ конецъ конически-цилиндричная, тупая; столбика нѣтъ . . . . . ушастая и.—*S. aurita* L.

14 (10). Листья пальчатые, сверху темно-зеленые, слегка лоснящіеся, снизу съ выдающимися боковыми жилками, голые или коротко-пушистые. — отъ округло-яйцевидныхъ до продолговато-ланцетныхъ; сухіе чернѣютъ; почки и молодыя вѣтви коротко-пушистыя; нити тычинокъ волосистыя; завязь коническая, голая или волосистая, на длинной ножкѣ, немного короче самой завязи и въ нѣсколько разъ длиннѣе короткой железки; столбикъ длинный; рыльца толстыя, выемчатая или 2-раздѣльная . . . . .

черноватая и.—*S. nigricans* Smith.

Листья по краямъ цѣльные, сверху съ прижатыми волосками или тусклые, — снизу б. ч. шелковистые; завязь покрыта густыми волосками . . . . . 15.

15. Мелкіе кустарники съ толстымъ подземнымъ стеблемъ и приподнимающимися тонкими, голыми вѣтвями; почки и молодыя вѣтви шелковистыя; листья мелкіе—отъ овальныхъ до линейно-ланцетныхъ, коротко-заостренные, сверху съ прижатыми волосками, снизу серебристо-шелковистые, съ мало замѣтными боковыми жилками; прилистники ланцетные; сережки мелкія: мужскія коротко-овальныя; тычинки съ голыми нитями и чернѣющими пыльниками; женскія черешки часто почти шаровидныя; завязь на длинной ножкѣ, которая въ 2 - 3 раза длиннѣе железки, коротко и узко-коническая, съ густымъ войлокомъ, рѣдко голая; столбикъ очень короткій; рыльца продолговатыя, б. ч. малиновыя . . . . . ползучая и.—*S. repens* L. 1)

Крупные кусты съ прямыми, толстыми, мягкими, пушистыми вѣтвями; почки и молодыя вѣтви бархатистыя; листья очень длинные и сравнительно съ длиною узкіе, съ болѣе или менѣе свернутыми боковыми краями и съ боковыми жилками, сверху вдавленными; сережки толстыя, плотныя, продолговато-овальныя, потомъ удлинненно-цилиндрическія; завязь на короткой ножкѣ или сидячая, коническая; столбикъ и рыльца длинные; медникъ продолговатый, согнутый . . . . . 16.

16. Листья продолговато- или линейно-ланцетные, снизу съ короткими

1) По торфянымъ болотамъ.

прижатыми волосками, блѣло - шелковистые или серебристые, сверху голые; завязь сидячая — безъ явственной ножки, съ блѣлымъ или серебристымъ войлокомъ . . . . . лоза—*S. viminalis* L. <sup>1)</sup>.


Листья широко - ланцетные, длинно - заостренные, съ слегка извилистыми краями, сверху слегка пушистые, снизу сѣро-пепельные, тусклые или слегка лоснящиеся; завязь на короткой ножкѣ . . . . . длиннолистная и.—*S. longifolia* Hosl. <sup>2)</sup>.

### 394. *Salvia* L.—шалфей.

1. Мутовки о многихъ (20 и болѣе) цвѣткахъ, въ пазухѣ маленькихъ прицвѣтничковъ, яйцевидно-заостренныхъ, не длиннѣ цвѣтоножекъ, по отцвѣтаниі поникшихъ; чашечка трубчато - колокольчатая, б. ч. окрашенная, съ верхнею губою о 3 зубцахъ; вѣнчикъ сине-лиловый, вдвое длиннѣ чашечки; трубка его съ волосистымъ кольцомъ; нижнія короткія колѣна связника острыя, въ видѣ зуба или шила, обращены назадъ и не спаяны между собою; корневище ползучее; трава коротко-шершавая; стеблевые листья треугольно-сердцевидные, острые, верхніе почти сидячіе; нижніе продолговато-яйцевидные, тупые, съ 2 ушками, на длинныхъ черешкахъ, — всѣ неровно-городчато-зубчатые . . . . . мутовчатый ш.—*S. verticillata* L. <sup>3)</sup>.



(Рис. 838).



(Рис. 839).

Мутовки о немногихъ (5 - 6) цвѣткахъ, сидячія . . . . . 2.

2. Верхушка цвѣтоноснаго стебля съ железистыми волосками; вѣнчикъ втрое длиннѣ трубчатой чашечки съ сильно согнутою впередъ верхнею губою (рис. 838, а); трубка его безъ волосистаго кольца; короткія колѣна связника склеены между собою расширенными концами . . . . . 3.

Железистыхъ волосковъ нѣтъ; стебель съ короткимъ, сѣрымъ или блѣловатымъ пушкомъ; листья морщинистые; вѣнчикъ вдвое длиннѣ чашечки, съ верхнею губою почти прямою (рис. 839, а) . . . . . 4.

3. Листья плоскіе, мягкіе, пушистые, при основаніи сердце-копьевидные, заостренные; верхняя губа чашечки цѣльнокрайняя, съ загнутымъ краемъ

<sup>1)</sup> По берегамъ рѣкъ—Москвы рѣки и Оки.

<sup>2)</sup> Владыкино, Ховрино, Воробьевы горы—подъ Москвою.

<sup>3)</sup> Преимущественно по Октя.

(рис. 838, а); вѣнчикъ свѣтло-желтый съ буро-красными крапинами; короткія колѣна связниковъ головчато утолщены и обращены впередъ (b) . . . . .

клейкій ш.—*S. glutinosa* L. <sup>1)</sup>).

Листья морщинистые, сверху голые, снизу сѣровато-пушистые, при основаніи сердцевидные, слегка острые; верхняя губа чашечки о 3 короткихъ зубцахъ; вѣнчикъ темно-синій; короткія колѣна связниковъ съ лопатчатыми концами и обращены назадъ . . . . . луговой ш.—*S. pratensis* L. <sup>2)</sup>).

4. Листья сверху голые, снизу съ короткимъ, сѣроватымъ или бѣловатымъ пушкомъ; прицвѣтники яйцевидные, длинно-заостренные, стеблеобъемлющіе, рѣсничные, окрашенные, до разцвѣтанія черепичато накрываютъ другъ друга, подъ конецъ горизонтально оттопырены; верхняя губа чашечки о 3 короткихъ зубцахъ; трубка вѣнчика безъ волосистаго кольца; короткія колѣна связниковъ на концѣ лопатчатыя и обращены назадъ . . . . .

лѣсной ш.—*S. silvestris* L. <sup>3)</sup>).

Листья покрыты съ обѣихъ сторонъ короткимъ сѣрымъ пушкомъ,—молодые листья бѣловатые; прицвѣтники подъ конецъ опадаютъ; верхняя губа чашечки съ 3 остистыми зубцами (рис. 839, а); трубка вѣнчика съ волосистымъ кольцомъ (b); короткія колѣна связниковъ несутъ по недоразвитому гнѣзду пыльника и обращены впередъ (b); полукустарникъ . . . . .

лѣчебный ш.—\**S. officinalis* L.

### 395. *Sambucus* L.—бузины.

1. Травянистый бороздчатый стебель, съ зелеными ланцетными, пильчатыми прилистниками и продолговато-ланцетными листочками; цвѣтки бѣлые, снаружи розовые,—всѣ на ножкахъ, въ плоскомъ торчащемъ щиткѣ, съ 3 вторичными цвѣтоносами; пыльники красноватые; ягоды черныя . . . . .

зеленикъ—†*S. Ebulus* L. <sup>4)</sup>).

Кусты, съ мелкими прилистниками въ видѣ бородавокъ или вовсе безъ прилистниковъ; цвѣтки щиткомъ или метелкою съ 5 вторичными цвѣтоносами; лепестки желтовато-бѣлые; пыльники желтые . . . . . 2.

2. Цвѣтки въ торчащей яйцевидной метелкѣ, всѣ съ пушистыми цвѣтоножками; ягоды ярко-красныя; листочки продолговато-овальные; сердцевина вѣтокъ буроватая . . . . . красная б.—*S. racemosa* L.

Цвѣтки въ плоскомъ щиткѣ, по отцвѣтаніи поникшемъ; боковые цвѣтки на послѣднихъ его развѣтвленіяхъ сидячіе,—остальные на ножкахъ съ рѣдкими волосками; ягоды лилово-черныя; листочки яйцевидные или продолговато-яйцевидные; сердцевина вѣтокъ бѣлая . . . . .

черная б.—\*†*S. nigra* L. <sup>5)</sup>).

396. *Sanguisorba* L.—кровохлебки. Корневище деревянистое, толстое, горизонтальное; стебель ребристый, вверху вѣтвистый, съ рѣдкими непарноперистыми листьями и косыми прилистниками, приросшими къ основанію черешка; листочки, въ числѣ 7—13, черешковые, обыкновенно съ прилистниками, продолговатые, при основаніи сердцевидные, зубчатые, снизу сизые; колосы продолговатые, на длинныхъ ножкахъ; цвѣтки темно-малиновые, съ

<sup>1)</sup> Въ западныхъ и южныхъ уѣздахъ. Невѣрово, Коломенскаго уѣзда.

<sup>2)</sup> Преимущественно по Окѣ — Протопопово, Бѣлые Колодези—Коломенскаго уѣзда; Дракино—Серпуховскаго.

<sup>3)</sup> Протопопово—Коломенскаго уѣзда, на Окѣ.

<sup>4)</sup> <sup>5)</sup> Въ прежнее время встрѣчалось на Воробьевыхъ горахъ одичалымъ.

прицвѣтниками ланцетными. рѣсничными, не длиннѣ цвѣтка . . . . .  
(лѣчебная) крохотка—*S. officinalis* L. <sup>1)</sup>.

**397. Sanicula** L. — подлѣсники. Корневые ланцетные листья на длинных черешкахъ, сверху лоснящіеся, глубоко 5 - раздѣльные на 2-3 неравные обратно-яйцевидныя, пальчатые доли; немногіе стеблевые листья мелкие, сидячіе; зонтикъ съ неравными лучами и головчатыми зонтичками, съ оберточками изъ многихъ маленькихъ линейныхъ листочковъ; зубцы чашечки ланцетные; лепестки блѣдно-розовые . . . . .


(европейскій) подлѣсникъ—*S. europaea* L.

**398. Saponaria** L. — мыльнянки. Корневище ползущее, вѣтвистое; листья продолговато-эллиптические, острые, голые, по краямъ остро-шероховатые, о 3 жилкахъ; цвѣтки скучены по 3-7 пучками на концѣ стебля или вѣтвей; трубка чашечки съ рѣдкими волосками, зубцы ея остроконечные; лепестки бѣлые или розоватыя, слегка пахучіе . . . . .


(лѣчебная) мыльнянка—*S. officinalis* L. <sup>2)</sup>.

**399. \* Saturėja** L. — чабры. Стебель вѣтвистый, коротко-пушистый; листья узко-ланцетные, острые, коротко-черешковые, съ точечными железками, рѣсничные, мягкіе, тусклые; вѣнчикъ блѣдно-лиловый съ малиновыми крапинами въ зѣвѣ, немного длиннѣ ланцетныхъ зубцовъ чашечки . . .

(садовый) чаберъ—*S. hortensis* L.



(Рис. 840).



(Рис. 841).

**400. Saxifraga** L. — камнеломки. Корневище съ длинными, тонкими, ползучими побѣгами, покрытыми листьями; цвѣточный стебель вверху съ рыжеватыми волосками покрытъ частыми листьями, ланцетными, цѣльпо-крайними, туповатыми, по краямъ рѣсничными; нижніе листья сужены въ черешокъ; цвѣтки ярко-желтые, внизу съ оранжевыми крапинами и при основаніи съ 2 бородавками, въ 3-4 раза длиннѣ яйцевидныхъ, при отцвѣтаніи отогнутыхъ долей чашечки; тычинки короче лепестковъ (рис. 840) . . . . .

царскія очи—*S. hirculus* L. <sup>3)</sup>.

**401. Scabiosa** L. — скабіоза. Стебель и листья съ прижатыми волосками; листья на не цвѣтущихъ стебляхъ, а также нижніе стеблевые, продолговатые, тупые, городчатые или лировидные, сужены въ черешокъ; остальные стеблевые глубоко-перисто-раздѣльные, съ линейными долями, — на нижнихъ листьяхъ перисто-надрѣзнымъ, на верхнихъ—цѣльными; щетинки внутренней чашечки рыжеватые, въ 3-4 раза длиннѣ наружной чашечки (рис.

<sup>1)</sup> Преимущественно по Окѣ, въ Серпуховскомъ уѣздѣ; указано также въ Богородскомъ уѣздѣ.

<sup>2)</sup> Преимущественно по берегамъ Москвы рѣки.

<sup>3)</sup> По торфянымъ бодотамъ—Б. Мытищи, Выхино, Рѣшетниково.



841, с); ширина перепончатого края ее вдвое больше длины ее трубочки (с); листочки обертки ланцетно-линейные и меньше ширины корзины; плодовые корзинки яйцевидные . . (желтоватая) скабіоза—*S. ochroleuca* L. <sup>1)</sup>.

**402. Scheuchzeria** L.—шейхцерія. Корневище ползучее, членистое, косое, покрыто влагалищами отживших листьев; листья узколинейные, желобчатые, с длинными влагалищами, — нижние сближенные, верхние разставленные, короче; цветоножки торчащие, неравные: нижняя длиннее верхних. сближенных; цветки с прицветниками, зеленовато-желтые, с листочками продолговатыми, острыми, плоскими, отогнутыми, короче тычинок (рис. 842, а); плоды косо-яйцевидные (b), желто-зеленые . . . . .

(болотная) шейхцерія—*S. palustris* L. <sup>2)</sup>.

**403. Scilla** L.—пролѣски. Луковица выгоняет 1—3 стрѣлки, сплюснутые, с одной стороны плоские, с другой выпуклые, б. ч. длиннее 2—4 широко-линейных листьев, стянутых на островатой верхушке колпачком; цветки поникшие, широко-колокольчатые, от 1 до 4, с короткими прицветниками и на коротких цветоножках, меньше поперечника цветка; семена без придатков . . подснежник—*S. cernua* Redutė



(Рис. 842).



(Рис. 843).

#### 404. Scirpus L.—камыши.

1. Колосья крупные, коричневые, продолговатые или яйцевидные, скупены в простые пучки; из них средние — сидячие, головчатые; боковые на ножках; прицветные пленки на верхушке выемчатые, с остроконечием в выемке; околоцветные щетинки вниз зазубренные . . . . . 2.

Колосья мелкие, темносѣрые, в метельчатом ползонтитѣ, окруженном 3—4 длинными, плоскими листьями обертки; прицветные пленки на верхушке цельные, без выемки (рис. 843); стебель тупо 3-гранный, многolistный; листья широко-линейные, плоские, слегка желобчатые, на ребре и по краям шероховатые . . . . . 3.

2. Стебель круглый, толстый, безлистный, только внизу с красно-бурыми влагалищами, а сверху с 1—2 прицветными листьями обертки, из коих 1 значительно длиннее, шиловидный, у основания желобчатый, часто торчащий и отклоняющийся в бок цветочные пучки; прицветные пленки овальные или обратно-яйцевидные; орешек сплюснуто-3-гранный, грязно-бѣлый; корневище ползучее, толстое . . . . . озерный к.—*S. lacustris* L.

Стебель 3-гранный, покрыт узко-линейными листьями и сверху обыкновенно с 3 большими одинаковыми, плоскими линейными прицветными листь-

1) По Окс—Лужки, Серпуховского уезда; Карапчеево—Коломенского

2) По торфяным болотам: Косино, Зыково и др.

ями обертки; прицветныя пленки яйцевидныя; орѣшекъ плоско-выпуклый, коричневыя, лоснящійся; стебель съ ползучими подземными побѣгами, на концѣ утолщенными въ шаровидные клубни. . . морской к.—*S. maritimus* L.<sup>1)</sup>


3. Колосья яйцевидныя, б. ч. скученныя по 3—5 пучками, изъ конхъ срединныя сидячіе, — боковыя и наружныя по ножкахъ; прицветныя пленки слабо-килеватыя, съ остроконечіемъ; околоцветныя щетинки прямыя, внизъ зазубренныя, длиною съ округло-3-гранный орѣшекъ (рис. 843); стебель съ подземными ползучими побѣгами и короткими вѣтвями, несущими пучки листьевъ . . . лѣсной к.—*S. silvaticus* L.

Колосья продолговато-ланцетныя, почти всею одиночныя, кромѣ срединныхъ на ножкахъ; прицветныя пленки безъ кия и безъ остроконечія; околоцветныя щетинки извилистыя, гладкія, въ 2—3 раза длиннѣе обратно-яйцевидныхъ орѣшковъ; боковыя вѣтви пригибаются дугою къ землѣ и укореняются верхушкою . . . укореняющійся к.—*S. radicans* Schk.

405. *Scleranthus* L. — дивалы. Стебель очень вѣтвистый, вильчатый, слегка пушистый; цвѣтки въ развилинахъ стебля и въ подузонтникахъ на концахъ вѣтвей; доли чашечки острыя, яйцевидно-ланцетныя (рис. 844), съ узкою, бѣлою перепончатою каймою; плодоносная чашечка открытая. . . (однолѣтняя) дивала—*S. annuus* S.



(Рис. 844).



(Рис. 845).

406. *Scolochloa* Lk. — трезубки. Корневище съ ползучими, длинными побѣгами; стебель высокій, вверху со многими вѣтвями; листья широкіе, свѣтлозеленыя, длинно-заостренныя, жесткіе, по краямъ очень шероховатыя; язычекъ продолговатый, притупленный; развѣтвленія метелки торчащія, остро-шероховатыя—нижнія по 4—5; колоски продолговатыя, зеленоватыя о 3—4 цвѣткахъ (рис. 845, а); чашечныя пленки продолговатыя, острыя; верхняя почти равна нижнему цвѣтку; завязь на верхушкѣ шершаво-волосистая. . . (овсяничья) трезубка—*S. festucae* Lk.<sup>2)</sup>

407. *Scorzonera* S. — козельцы.

1. У основанія стебля волокнистый пучекъ отжившихъ листьевъ; листья узколинейныя, — стеблевые при основаніи нѣсколько шире; цвѣтки лилово-розовыя; язычекъ вѣличка вдвое длиннѣе его трубки, вверху опушенной; все чешуйки обертки тупыя; ребрышки сѣмяннокъ гладкія . . . розовый к.—*S. purpurea* L.<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Красный прудъ, Стунъ около Давыдова, Быково—по озерамъ.


<sup>2)</sup> Въ озерахъ Серебрянаго бора подъ Хорошовымъ и подъ Новодѣвичьимъ монастыремъ.

<sup>3)</sup> Одинъ только разъ на Окѣ между Лужками и Зибровымъ, Серпуховскаго уѣзда.


У основанія стебля пленчатая влагалища отжившихъ листьевъ; листья ланцетные до линейно-ланцетныхъ; цвѣтки желтые; язычекъ вѣнчика не длиннѣе или немного длиннѣе его трубки.

2. Стеблевые листья сидячіе, — верхніе линейные, въ числѣ 2 - 3; чешуйки обертки заостренныя, на верхушкѣ туповатая (рис. 846, а); язычекъ вѣнчика не длиннѣе его волосистой трубки; сѣмянки съ гладкими ребрышками (b) . . . . . приземистый к. — *S. humilis* L. <sup>1)</sup>.

Стеблевые листья стеблеобъемлющіе, — верхніе шиловидные; чешуйки обертки острые, по краямъ нѣсколько пушистыя; язычекъ вѣнчика нѣсколько длиннѣе почти голой его трубки; сѣмянки съ ребрышками остро-бугорчатыми . . . . . сладкій корень — \* *S. hispànica* L.



(Рис. 846).



(Рис. 847).

#### 408. *Scrophularia* L. — норичники.

1. Цвѣтки простымъ полузонтикомъ въ пазухѣ стеблевыхъ листьевъ; цвѣтоножки короче или не длиннѣе чашечки; доли ея продолговатыя, безъ перепончатой каймы; вѣнчикъ зеленовато-желтый; трубка его кувшинчатая, подъ зѣвомъ сильно стянута; лопасти вѣнчика почти одинакія; тычинки подъ конецъ выдаются изъ вѣнчика, безъ зачаточной 5-ой тычинки (безъ стаминодія); стебель простой, 4-гранный; листья округло-сердцевидные, надрѣзано-удвоенно-пильчатые, очень тонкіе, коробочка немного длиннѣе чашечки; трава железисто-пушистая . . . весенній н. — † *S. vernàlis* L. <sup>2)</sup>.

Полузонтики въ пазухѣ верхнихъ листьевъ образуютъ верхушечную метелку; цвѣтоножки длиннѣе чашечки; доли ея съ перепончатою каймою; вѣнчикъ зеленовато-бурый; трубка его вздутая; верхнія лопасти крупнѣе нижнихъ (рис. 847, а); тычинки не выдаются изъ вѣнчика, съ зачаточною 5 тычинкою (съ стаминодіемъ, b); коробочка въ 3 - 4 раза длиннѣе чашечки; все р. голое или вверху съ рѣдкими железистыми волосками; листья продолговато-яйцевидные . . . . . 2.

2. Стебель крылато 4-гранный; листья съ простыми зазубринами; нижніе зубцы меньше остальныхъ; доли чашечки почти округлая, съ широкою перепончатою каймою; стаминодій сверху слегка 2-лопастной, съ расходящимися лопастями; вѣнчикъ зеленовато-краснобурый . . . . .

крылатый н. — *S. alata* Gilib. <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> По Окъ: Бѣлые Колодези—Коломенскаго уѣзда; Борисово, Никифорово—Серпуховскаго.

<sup>2)</sup> Въ прежнее время найдено въ Кусковѣ.

<sup>3)</sup> По Окъ—Тарбушево, Коломенскаго уѣзда.

Стебель остро-4-гранный; листья съ двойными зазубринами; нижніе зубцы длиннѣе и острѣе остальныхъ; доли чашечки округло-яйцевидныя (рис. 847, а), съ узкою перепончатою каймою; стаминодій сверху цѣльный, часто вдавленный (б); вѣтчикъ зеленовато-грязно-бурый; корневище мясистое, клубневидно-утолщенное и дающее побѣги . . . шишковатый п.—*S. nodosa* L.

**409. *Scutellaria* L.—шлемники.**

а. Чашечка безъ железистыхъ волосковъ; цвѣтки б. ч. въ пазухѣ стеблевыхъ листьевъ, короче ихъ и отодвинуты одинъ отъ другаго; листья усѣченно-сердцевидные, продолговато-ланцетные, книзу съ рѣдкими городками . . . щитовка—*S. galericulata* L.

б. Чашечка железисто-пушистая; цвѣтки въ пазухѣ верхнихъ прицвѣтныхъ листьевъ, длиннѣе ихъ и собраны кистью; нижніе листья яйцевидные, округло-тупые, —средніе ланцетные, копьевидные, съ расходящимися въ бока лопастями, цѣльнокрайніе . . . копьевидный ш.—*S. hastifolia* L.<sup>1)</sup>

**410. \**Secale* L.—ржи.** Стебель, листья и колосъ сѣрозеленые; колосъ длинный, линейный, поникшій; зрѣлый—желтоватый; чашечныя пленки съ шероховатымъ килемъ объ 1 жилкѣ, безъ ости, короче цвѣточныхъ пленокъ (рис. 848); нижняя цвѣточная пленка ланцетная, съ очень длинною остью, о 3 жилкахъ, вдоль киля и на наружномъ краю щетинисто-рѣсничная; верхняя цвѣточная пленка коротко и жестко-рѣсничная . . . рожь—\**S. cereale* L.



(Рис. 848).



(Рис. 849).

**411. *Sedum* L.—очитки.**

1. Корневище тонкое, съ лежащими, не цвѣтущими стеблями, черепичатопокрытыми 6 рядами листьевъ, яйцевидно-цилиндрическихъ, мелкихъ, съ тупымъ основаніемъ и выпуклою спинкою; лепестки желтые, линейно-ланцетные, острые, вдвое длиннѣе долей чашечки . . . бѣлый оч.—*S. acre* L.

Корни утолщены въ видѣ клубней, б. ч. веретенообразныхъ; листья плоскіе, широкіе, не черепичатые . . . 2.

2. Листья къ основанію цѣльнокрайніе, клиновидно-суженные въ короткій черешокъ, по краямъ зубчатые, всѣ очередные, сизые; внутренніе тычинки выходятъ въ разстояніи  $\frac{1}{3}$  отъ основанія лепестковъ; лепестки кроваво-красные, оттопыренные, на верхушкѣ плоскіе, слегка желобчатые и слабо-остроконечные . . . бобовый оч.—*S. Fabaria* Koch

Верхніе листья сидячіе, съ округленнымъ или сердцевиднымъ основаніемъ,

<sup>1)</sup> По Окъ—Бѣлые Колодези, Коломенскаго уѣзда; за Лужками—между Прилугами и Кошелевкою, Серпуховскаго уѣзда.

неравно-зубчатые, б. ч. супротивные или по 3, зеленые; внутреннія тычинки выходятъ близъ основанія или у самаго основанія лепестковъ (рис. 849, а) . 3.

3. Нижніе листья сидятъ широкимъ ушатымъ основаніемъ,—прочіе нѣсколько охватываютъ стебель слегка сердцевиднымъ основаніемъ; лепестки прямые, оттопыренные, у верхушки желобчатые и оканчиваются остроконечіемъ; внутреннія тычинки выходятъ у самаго основанія лепестковъ; желтовато-зеленыхъ, рѣже розовыхъ съ темными крапичками . . . . .


заячья капуста—*S. maximum* Suter

Нижніе листья постепенно сужены въ короткій, широкій черешокъ,—верхніе сидятъ округленнымъ основаніемъ; лепестки съ середины отогнуты (рис. 849); почти плоскіе, на верхушкѣ слабо-желобчатые, съ мало замѣтнымъ остроконечіемъ (а); внутреннія тычинки выходятъ въ разстояніи  $\frac{1}{6}$  отъ основанія лепестковъ, розовыхъ или малиновыхъ . . . . .

малиновый оч.—*S. purpureum* Link

412. *Selinum* L.—гирчи. Стебель глубоко-бороздчатый, остро-ребристый; листочки 2-3 перистыхъ листьевъ перисто-раздѣльные; доли ихъ отъ яйцевидно-ланцетныхъ до продолговато-линейныхъ, съ острымъ бѣловатымъ кончикомъ; лучи зонтика почти гладкіе, только при основаніи шероховатые; цвѣтки бѣлые. . . . . (тмнolistная) гирча—*S. Carvifolia* L.

413. *Sempervivum* L.—молодицы. Листья и чашелистики голые, по краямъ рѣсничные (рис. 850, а); вѣтчикъ колокольчатый (с), блѣдно-желтоватый; лепестки линейно-продолговатые, бахромчато-рѣсничные, много длиннѣе чашечки (а, с); цвѣточный стебель волосатый; листья на немъ продолговатые до яйцевидныхъ, при основаніи округлые или слегка сердцевидные, вверху заостренные; листья въ розеткахъ продолговато-клиновидные, острые; розетки въ видѣ шаровидныхъ луковичъ развиваютъ въ пазухѣ листьевъ новыя розетки на длинныхъ питевидныхъ отрассахъ, подъ конецъ отдѣляющихся. . . . .



(Рис. 850).

(отрассистый) молодиль—*S. soboliferum* Sims

414. *Senecio* L.—крестовники.

1. Листья цѣльные, по краямъ пильчато-зубчатые, къ основанію суженные, не охватываютъ стебля; язычки краевыхъ цвѣтковъ плоскіе, раскрытые; сѣмянки голыя. Корневище ползучее; стебель прямой, высокій, простой, вверху пушистый . . . . . 2.

Листья перисто-раздѣльные или выемчато-зубчатые, иногда кромѣ нижнихъ; нижніе черешковые; верхніе б. ч. объемлющіе основаніемъ своимъ стебель, съ ушками. . . . . 3.

2. Листья широко-ланцетные, почти голые, острые, рѣсничные, съ неравными пильчатыми зазубринами, загнутыми къ верхушкѣ листа; обертка цилиндрично-колокольчатая о 10-12 чешуйкахъ,—3-5 наружныхъ линейно-ланцетныхъ, длиною съ обертку или немного короче ея; лучевыхъ цвѣтковъ 6—8 . . . . . сарацинскій к.—*S. sarracenicus* L.

Листья линейно-ланцетные, снизу съ бѣлымъ или сѣрымъ пушкомъ, къ верхушкѣ тонко-заостренные, съ острыми пильчатыми зазубринами; обертка колокольчато-шаровидная о 18—20 чешуйкахъ; 8—10 паружныхъ линейныхъ, вдвое короче внутреннихъ, ланцетно-линейныхъ, тонко-заостренныхъ; луче-

выхъ цвѣтковь около 12, въ  $1\frac{1}{2}$  раза длиннѣе обертки . . . . .  
болотный к.—*S. paludosus* L. <sup>1)</sup>.

3. Язычки лучевыхъ цвѣтковь плоскіе, вытянутые, прямые, не свернутые, ярко-желтые, такой же длины, какъ и колокольчатая обертка (рис. 851); чешуйки ея обратно-яйцевидныя до ланцетныхъ, не окрашенныя; промежутки между долями перисто-раздѣльныхъ листьевъ цѣльнокрайніе . . . . . 4.


Язычки лучевыхъ цвѣтковь короткіе и свернутые (рис. 852, б), свѣтло-желтые, или ихъ вовсе нѣтъ (а); обертка цилиндрическая; чешуйки ея линейныя, острыя; промежутки между долями перистораздѣльныхъ листьевъ и самыя доли неравнозубчатые . . . . . 6.

4. Стебель железисто-мохнатый, толстый, полый, густо покрытъ листьями: нижніе розеткою, черешковые, продолговато-ланцетные, глубоко-выемчато-зубчатые; стеблевые—ланцетные, полустеблеобъемлющіе, крупно-зубчатые; корзинки скучены въ вѣтвистомъ щиткѣ; обертка ихъ простая, однорядная, безъ прицвѣтныхъ чешуекъ (рис. 851); чешуйки обертки линейныя, острыя, сѣмянки голыя съ выступающими ребрышками . . . . .

выпадошная трава—*S. paluster* DC. <sup>2)</sup>.



(Рис. 851).



(Рис. 852).

Стебель не пушистый и безъ железистыхъ волосковъ; обертка при основаніи съ прицвѣтными чешуйками; всѣ сѣмянки, или по крайней мѣрѣ срединныя, пушистыя . . . . . 5.

5. Стеблевые листья съ продолговатыми долями, на верхушкѣ тупыми, 2—3 расщепленными или перисто-надрѣзными; боковыя доли оттопырены почти подъ прямымъ угломъ; нижніе листья цѣльные или ланцетно надрѣзано-зубчатые, съ яйцевидною конечною лопастью; корневище короткое, толстое; наружныя 2—3 чешуйки обертки въ 3—4 раза короче продолговато-ланцетныхъ внутренннихъ; краевыя сѣмянки голыя, съ рѣдкимъ, скоро опадающимъ хохолкомъ; срединныя пушистыя, съ густымъ, остающимся хохолкомъ . . . . . желтуха—*S. jacobaea* L.

Всѣ листья глубоко-перисто-раздѣльные, снизу нѣсколько пушистыя; доли ихъ линейныя, острыя, обращены къ верхушкѣ листа; верхніе листья почти 2-перисто-раздѣльные, при основаніи нижнихъ долей съ ушками; корневище ползучее; наружныя (4—6) чешуйки обертки вдвое короче обратно-яйцевидныхъ внутренннихъ; всѣ сѣмянки пушистыя, съ одинаковымъ, остающимся хохолкомъ . . . . . желтозеле—*S. erucifolius* L. <sup>3)</sup>.

6. (3). Стебель, листья и чешуйки обертки съ железистыми волосками; корзинки колокольчато-цилиндрическія въ рѣдкомъ щиткѣ; наружныя чешуйки

<sup>1)</sup> Въ одномъ изъ гербаріевъ прежняго времени.

<sup>2)</sup> Хранится въ гербаріи Гозмана.

<sup>3)</sup> Очень рѣдко; въ Раменкахъ—подъ Москвою.

обвертки только на концах темныя, въ 2-3 раза короче внутреннихъ; сѣмянки подъ конецъ голыя. . . . . клейкій к.—*S. viscosus* L. <sup>1)</sup>.

Железистыхъ волосковъ нѣтъ; наружныя чешуйки обвертки очень короткія—по крайней мѣрѣ, въ 4 раза короче внутреннихъ (рис. 852); сѣмянки пушистыя. . . . . 7.

7. Язычковыхъ цвѣтковъ вовсе нѣтъ (рис. 852, а); корзинки въ довольно частомъ щиткѣ; наружныя чешуйки обвертки (8-10) почти до половины черныя; доли выемчато-перисто-надрѣзныхъ стеблевыхъ листьевъ яйцевидныя или продолговато-яйцевидныя, постепенно уменьшаются къ основанію листа; нижніе листья продолговато-лопатчатые, зубчатые. . . . .

обыкновенный к.—*S. vulgaris* L.

Язычекъ лучевыхъ цвѣтковъ короткій, свернутый (рис. 852, б), свѣтло-желтый; корзинки въ рѣдкомъ щиткѣ; наружныя чешуйки обвертки на верхушкѣ не темныя; всѣ листья прерывисто-глубоко-перисто-раздѣльные, паутинисто-шерстистые; доли ихъ продолговаты до линейныхъ. . . . .

лѣсной к.—*S. silvaticus* L. <sup>2)</sup>.

#### 415. *Serratula* L.—серпухи.

а. Корзинки однополыя: мужскія продолговаты; женскія продолговато-яйцевидныя; наружныя чешуйки обвертки съ колючимъ острокопечіемъ; внутреннія ланцетныя, на верхушкѣ лиловыя; листья съ обѣихъ сторонъ или снизу шероховатые, жесткіе, по краямъ съ мелкими и частыми острыми зазубринами; стеблевые листья ланцетно-перисто-раздѣльные, съ болѣе крупною верхушечною лопастью; нижніе листья продолговато-яйцевидные, цѣльные, лировидные, съ 2-4 боковыми долями. . . . .

красильная с.—*S. tinctoria* L. <sup>3)</sup>.

б. Корзинки обоеполыя, яйцевидно-шаровидныя: краевые цвѣтки женскіе выдаются надъ срединными, съ 3-4-надрѣзнымъ вѣнчикомъ и 3-4 недоразвитыми тычинками; наружныя чешуйки обвертки яйцевидно-ланцетныя, съ короткимъ острокопечіемъ,—внутреннія линейно-ланцетныя, удлиненныя; листья гладкіе или снизу слегка шероховатые,—всѣ глубоко-перисто-раздѣльные, съ яйцевидными или ланцетными долями; доли съ рѣдкими и крупными пальчатыми зазубринами и съ частыми щетинистыми зубчиками. . . . .

вѣщечносная с.—*S. coronata* L. <sup>4)</sup>.

416. *Seseli* L. жабрицы. Корневище волокнистое; стебель простой или вверху съ короткими, прямо вверхъ торчащими вѣтвями, часто извилистый, до верху покрытъ листьями, б. ч. сизыми, съ черешкомъ сверху желобчатымъ; нижніе и корневые листья въ очертаніи продолговато-яйцевидные, 3-чато-перистые, съ линейными листочками и долями; зонтики о 20-30 лучахъ; цвѣтки бѣлые или до распусканія красноватые; молодые плоды и ребристые лучи сверху покрыты пушкомъ. . . . .

(покрашенная) жабрица—*S. coloratum* Ehrh. <sup>5)</sup>.

#### 417. *Setaria* P. B.—щетинники.

а. Листья, колоски и щетинки зеленые; стебель подъ колосовидною ме-

<sup>1)</sup> Хранится въ гербаріи Максимовича.

<sup>2)</sup> Шеламо-Вереysкаго уѣзда; Мислениково болото—за Б. Мытищами.

<sup>3)</sup> По Окѣ въ Серпуховскомъ уѣздѣ—Лужки и между Лужками и Зибровымъ; Бѣлые Колодези—Коломенскаго уѣзда.

<sup>4)</sup> По Окѣ—подъ Серпуховымъ, и Бѣлые Колодези—Коломенскаго уѣзда.

<sup>5)</sup> По берегу Оки и Москвы рѣки (Невѣрово—Коломенскаго уѣзда).



телкою шероховатый; кайма у основанія листьевъ съ короткими, вверхъ торчащими волосками; колоски довольно мелкіе, продолговато-эллиптическіе; цвѣточные пленки гладкія (рис. 853), одинаковой длины съ пленкою безплолаго цвѣтка; нижняя чашечная пленка вдвое короче верхней и пленки безплолаго цвѣтка . . . . . *зеленый щ.*—*S. viridis* P. B.

**b.** Листья сизые; колоски и щетинки подъ конецъ желтые или буроватые; стебель подъ колосовидною метелкою почти гладкій; кайма у основанія листьевъ съ длинными горизонтальными волосками; колоски яйцевидные, крупные; цвѣточные пленки съ явственными поперечными морщинками, — вдвое длиннѣе пленки безплолаго цвѣтка; нижняя чашечная пленка вдвое короче колоска; верхняя яйцевидная немного длиннѣе половины колоска, тупая, о 3 жилкахъ . . . . . *сизый щ.*—*S. glauca* P. B.

**418.** † *Sherardia* L.—шерардія. Стебель вѣтвистый, лежащій; ребра его и края листьевъ шероховатые; листья колюче-острые, — нижніе по 4, лопастные, — верхніе по 6, ланцетные; вѣнчикъ лиловый, рѣдко бѣлый . . . . . (полевая) шерардія.—† *S. arvensis* L. <sup>1)</sup>



(Рис. 853).



(Рис. 854).

**419. Silène** L.—смолевки.

1. Цвѣтки одиночные—верхушечные и пазушные, или въ рѣдкомъ малочвѣтномъ полузонтикѣ . . . . . <sup>2.</sup>

Цвѣтки въ супротивныхъ полузонтикахъ, расположенныхъ метелкою или кистью . . . . . <sup>4.</sup>

2. Все растеніе голое; чашечка о 20 жилкахъ, сѣтчато-развѣтвленныхъ, пузырчато-вздутая, яйцевидная, голая, съ 3-углольно-овальными острыми зубцами (рис. 854, a); вѣнчикъ безъ коронки; цвѣтки многобранно-2-домные, бѣлые, рѣже розовые; ножка коробочки длинная (b); листья ланцетные или яйцевидные . . . . . *хлопушки*—*S. inflata* Sm.

Стебель, листья и чашечка волосистые; чашечка о 10 простыхъ жилкахъ; вѣнчикъ съ коронкою; цвѣтки обоеполые . . . . . <sup>3.</sup>

3. Стебель, листья и чашечка съ рѣдкимъ, жесткимъ пушкомъ; чашечка вздутая, колокольчато-цилиндрическая, съ овальными тупыми зубцами; лепестки коротко-2-лопастные; цвѣтоножки короче цвѣтка съ бѣлымъ вѣнчикомъ; ножка у завязи одинаковой съ нею длины; стебель лежащій; листья ланцетные . . . . . *лежащая с.*—*S. procumbens* Murr. <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Найдено занесеннымъ одинъ только разъ на огородъ въ Новой Слободѣ.

<sup>2)</sup> По берегамъ рѣкъ: Москвы рѣки и Оки.

Стебель вверху, цвѣтоножки и чашечка железисто-пушистые; чашечка трубчатая; вверху суженная, немного вздутая при основаніи, съ длинными, тонкими, шпильчатыми зубцами; лепестки глубоко-2-раздѣльные; цвѣтки грязно-бѣлые или розовые; ножка коробочки въ 8 разъ ея короче; нижніе листья продолговатые, — верхніе ланцетные . . . . .

почецвѣтная с. — *S. noctiflora* L. <sup>1)</sup>.

4 (1). Лепестки цѣльные, нераздѣльные, лопатчато линейные, безъ коронки; чашечка голая, колокольчатая, съ тупыми зубцами; цвѣтки на длинныхъ цвѣтоножкахъ, мелкіе, желтовато-зеленые, однополые; коробочка почти сидячая; цвѣтоносные стебли простые, клизу пушистые, какъ и листья: нижніе листья лопатчатые, — верхніе линейные . . . . .

ушковая с. — *S. Otites* L. <sup>2)</sup>.

Лепестки 2-раздѣльные; чашечка трубчатая, цилиндрично-булавовидная; цвѣтки обоополые; коробочка въ 2 - 4 раза длиннѣ своей ножки; цвѣтоносные стебли пушистые или мохнатые . . . . . 5.

5. Трава железисто-мохнатая, клейкая; чашечка съ тупыми зубцами; вѣнчикъ чисто бѣлый, безъ коронки; ножка коробочки въ 2 - 3 раза ея короче; 1 - 3 цвѣтные полузонтики въ удлиненной, торчащей, всесторонней метелкѣ; листья по краямъ волнистые: нижніе — продолговатые, къ основанію суженные; верхніе — ланцетные, у основанія немного сросшіеся . . . . .

клейкая с. — *S. viscosa* Pers. <sup>3)</sup>.

Травы пушистыя, только вверху железисто-волосистыя или клейкія; чашечка съ острыми яйцевидными зубцами; вѣнчикъ не чисто бѣлый; ножка коробочки вчетверо ея короче; полузонтики въ метелкѣ однобочныя . . . 6.

6. Чашечка пушистая; вѣнчикъ съ коронкою; лепестки съ линейными долями, грязно-бѣлые; цвѣтки по 3 - 7 въ полузонтикахъ, расположенныхъ рѣдкою, продолговатою метелкою, передъ разцвѣтаніемъ поникшею, во время цвѣтенія колѣнчато-изогнутою; цвѣтоносные стебли вверху железисто-волосистые; корневые листья лопатчатые, на длинныхъ черешкахъ, — верхніе ланцетные, черешковые, — всѣ пушистые . . . . . поникшая с. — *S. nutans* L.

Чашечка голая; вѣнчикъ безъ коронки; лепестки съ продолговато-линейными долями, зеленовато-бѣлые; цвѣтки во время цвѣтенія поникшіе, на торчащихъ ножкахъ, по 1 - 3 въ полузонтикахъ, расположенныхъ прямою, узкою, длинною, кистевидною метелкою; стебель при основаніи деревянистый; цвѣтоносные въ видѣ прутьевъ, шершаво-пушистые, вверху часто клейкіе, съ укороченными вѣтвями въ видѣ пучковъ листьевъ; всѣ листья одинаковые — ланцетные или лопатчатые, по краямъ шершавые . . . . .

татарская с. — *S. tatarica* Pers.

420. † *Silybum* Vaill. — лягушечники. Стебель прямой, вѣтвистый, безъ крыльевъ; листья голые, по краямъ съ желтоватыми, толстыми шинами; нижніе — выемчато-перисто-надрѣзные, съ округлыми долями, къ основанію суженные; верхніе листья цѣльные, стеблеобъемлющіе; корзинки крупныя, одиночныя, съ малиновыми цвѣтками; обертка шаровидная, при основаніи вдавленная; наружныя чешуйки ея при основаніи яйцевидныя, вверху съ длиннымъ ланцетнымъ, отогнутымъ, колючимъ отросткомъ (рис. 855); внизу

1) Бородино и Романцево, Можайскаго уезда.

2) Указано В. Я. Цингеромъ и приведено въ спискѣ Линдемана.

3) Подъ Москвою — Ключики (близъ Перова).

тренія чешуйки прижатя, линейно-ланцетныя, цѣльныя . . . . . остро-пестро — † *S. Mariànum* Gaertn.

**421. Sinàpis L.** — горчицы.


а. Листья неравно-выемчато-зубчатые, яйцевидные или продолговатые, черешковые; самые нижние — почти ланцетные, — верхние при основаніи съ 1 - 2 ушками; стручки обыкновенно торчащіе, съ коническимъ опадающимъ носикомъ, по краямъ острымъ (рис. 856); сѣмена черныя, гладкія . . . . .

полевая г. — *S. arvensis* L.

б. Листья глубоко-перисто-раздѣльные, съ неравно-крупно-зубчатыми долями, часто надрѣзанными, и съ болѣе крупною верхушечною долею, спадающею съ верхними боковыми; стручки оттопыренные, со сплюснутымъ, часто согнутымъ, остающимся носикомъ; сѣмена желтоватая, ямчато-точечныя. . . . . бѣлая г. — \* † *S. àlba* L.

**422. \* Siphisia Rafn.** — сифонники. Листья на длинныхъ черешкахъ, яйцевидные, коротко-заостренные, глубоко-округло-сердцевидные, снизу свѣтлѣе, слегка пушистые, какъ и черешки; цвѣтки крупныя, по 1 - 2 въ пазухѣ листьевъ, на длинной ножкѣ, при основаніи ея съ маленькимъ и узкимъ прицвѣтникомъ, а ниже середины ея съ другимъ прицвѣтникомъ, сходящимъ со стеблевымъ листомъ; околоцвѣтникъ съ грязно-темно-малиновымъ отгибомъ, снаружи зеленовато-бурый . . . . .

(крупнолистный) сифонникъ — \* *S. macrophylla* Aschs.



(Рис. 855). . . . . (Рис. 856). . . . . (Рис. 857) . . . . . (Рис. 858): . . . . . (Рис. 859).

**423. Sisymbrium L.** — гулявники.

1. Листья зубчатые или выемчато-зубчатые, съ почковиднымъ или клиновиднымъ основаніемъ; цвѣтки бѣлые . . . . . 2.

Листья перисто-разсѣченные или перисто раздѣльные, и тогда струговидные съ копьевиднымъ основаніемъ; цвѣтки желтые . . . . . 3.

2. Листья черешковые: корневые почковидные, выемчатые, — стеблевые яйцевидные, выемчато-зубчатые; стручки торчащіе, толстые, округло-4-гранные (рис. 857, б), съ 1 толстою и 2 тонкими жилками (с), на короткихъ ножкахъ, почти такой же толщины, какъ и стручки; сѣмена продольно-бороздчатые . . . . . чесночный г. — *S. Alliària* Scop.<sup>1)</sup>

Листья сидячіе, продолговатые, рѣдко-зубчатые; корневые — розеткою, стеблевые мелкіе; стручки немного сплюснутые, согнутые (рис. 858, а), на столь же длинныхъ, очень тонкихъ, отклоненныхъ плодоножкахъ . . . . .

Талиевъ г. — *S. Thaliànum* Gay & Mon.

<sup>1)</sup> Подъ Москвою — Елизаветино; въ Москвѣ — Дворцовый садъ.

3. Всѣ листья глубоко 2-3 перисто-разсѣченные: доли у нижнихъ листьевъ узко-ланцетныя, у верхнихъ — линейныя; цвѣтоножки въ 2-3 раза длиннѣе оттопыренной чашечки; лепестки не длиннѣе ея; плодоносная кисть вытянутая; стручки торчащіе, бугорчатые, немного согнутые, почти въ  $1\frac{1}{2}$  раза длиннѣе горизонтально оттопыренныхъ ножекъ; перегородка стручковъ съ жилками; вся трава сѣрозеленая, коротко-пушистая.

струйчатый г. — *S. Sòphia* L.

Листья, по крайней мѣрѣ нижніе, струговидно-перисто-раздѣльные, съ продолговатыми, надрѣзочно-зубчатыми долями и крупною верхушечною лопастью; перегородки стручковъ безъ жилокъ.

4. Вся трава коротко-пушистая; пушистые стручки на короткихъ и толстыхъ ножкахъ, въ длинной безлистной кисти, прижаты къ цвѣтоносу, къ верхушкѣ сужены — шиловидные (рис. 859, а); перегородка ихъ тонкая (б); верхніе листья копьевидные.

лѣчебный г. — *S. officinale* Scop.

Травы въ нижней части жестко-волосыя; стручки на оттопыренныхъ ножкахъ, цилиндрическіе; чашечка растопыренная и цвѣтоножки отклоненныя.

5. Верхніе листья сидячіе, перисто-разсѣченные, съ узко-линейными, цѣльнокрайними долями; доли среднихъ стеблевыхъ листьевъ линейно-ланцетныя, съ большимъ зубцомъ при основаніи ихъ, въ видѣ ушка; цвѣтки грязножелтые; стручки очень длинныя на короткой ножкѣ, почти столь же толстой, какъ и стручекъ; перегородка зубчатая, съ ямками для сѣмянъ.

паннонскій г. — *S. pannonicum* Jacq. <sup>1)</sup>

Всѣ листья струговидно-перисто-раздѣльные, — верхніе съ ланцетными боковыми долями; стеблевые безъ ушковъ; цвѣтки яркожелтые; стручки вдвое длиннѣе ножки и толще ея, не превышаютъ верхушки кисти; перегородка стручковъ плоская.

Лозелиевъ г. — *S. Loesèlii* L.

424. *Sium* L. — поручейники. Корневище съ пучками тонкихъ, нитевидныхъ корней; стебель ребристо-бороздчатый; листочки погруженныхъ въ воду листьевъ перисто-2-сложные, съ линейными или нитевидными долями; подводные листья просто-перистые; обертка 5-6 листовая; обвертки 5-8 листовыя; зубцы чашечки ясно замѣтные, неодинаковые.

(широколистый) поручейникъ — *S. latifolium* L. <sup>2)</sup>

425. *Solanum* L. — паслены.

1. Листья прерывисто-непарно-перистые, коротко-пушистые, снизу сѣроватые, о 7-11 яйцевидныхъ листочкахъ, при основаніи косыхъ, часто сердцевидныхъ; цвѣтки въ верхушечномъ раздвоенномъ полузонтикѣ на длинномъ цвѣтоножѣ; вѣнчикъ 5-угольный, бѣловатый или голубоватый, вдвое длиннѣе чашечки; плодоножки не утолщенныя; ягоды шаровидныя, зеленныя; корневище съ клубневидными подземными побѣгами.

картофель — \* *S. tuberosum* L.

Листья, по крайней мѣрѣ нижніе, цѣльные, голые или слегка пушистые; цвѣтки во вѣтвистыхъ полузонтикахъ; вѣнчикъ 5-раздѣльный (рис. 860, а); плодоножки къ верхушкѣ утолщенныя.

2. Травы съ листьями яйцевидными, суженными въ короткій черешокъ,


<sup>1)</sup> Въ прежнее время въ Москвѣ и под Москвою (Бусково), а также въ Серпуховѣ. Позднѣе указано въ Люберцахъ.

<sup>2)</sup> По берегамъ Москвы рѣки (Николо-Угрѣшскій монастырь) и Оки (Серпуховъ).

по краямъ выемчато-угловатыми или почти цѣльнокрайними; цвѣтки въ ложныхъ зонтикахъ на короткомъ цвѣтоносѣ; вѣнчикъ бѣлый, вдвое длиннѣ чашечки, съ долями широко-яйцевидными (рис. 860—а, d); ягоды шаровидныя, лоснящіяся, обыкновенно черныя, рѣдко зеленоватыя или желтоватыя; плодоножки отогнутыя.

черный п. — *S. nigrum* L.

Полукустарникъ, съ ползучимъ деревянистымъ корневищемъ; листья черешковые, продолговато-яйцевидные, цѣльнокрайніе, при основаніи почти сердцевидные; верхніе — копьевидные или при основаніи съ 2 небольшими долями; полузонтики въ видѣ поникшихъ кистей на длинномъ цвѣтоносѣ; вѣнчикъ лиловый; на каждой отвороченной долѣ съ 2 зелеными крапинами, окруженными бѣлымъ ободкомъ, чашечка маленькая, блюдчатая, 5-зубчатая; ягоды яйцевидныя, яркокрасныя, повислыя; плодоножки слегка поникшія . . . . . сладкогорькій п. — *S. Dulcamàra* L.



(Рис. 860).

#### 426. *Solidago* L. — золотарники.

а. Корзинки средней величины въ прямыхъ, не однобокихъ кистяхъ, расположенныхъ скученною метелкою; язычки краевыхъ цвѣтковъ продолговато-линейные, длиннѣ обертки; чешуйки ея линейно-ланцетныя, по краямъ перепончатая; корневые листья сужены въ длинный крылатый черешокъ, овальные, тупые; нижніе стеблевые — черешковые, продолговато-эллиптические, острые; пальчатые; верхніе — почти сидячіе, ланцетные, почти цѣльнокрайніе . . . . . золотая розга — *S. virga aurea* L.

б. Корзинки мелкія, въ густыхъ, однобокихъ, согнутыхъ кистяхъ, расположенныхъ широкою метелкою; язычекъ краевыхъ цвѣтковъ очень короткій, не длиннѣ срединныхъ — трубчатыхъ; чешуйки обертки ланцетныя, туповатыя; всѣ листья узко-ланцетные, заостренные, остропальчатые . . . канадскій з. — *S. canadensis* L.

#### 427. *Sonchus* L. — осоты.

1. Стебель внизу простой; корзинки крупныя, съ ярко-желтыми вѣнчиками; сѣмянки темнобурія, о многихъ ребрышкахъ, съ поперечными морщинками, явственно сплюснутыя, кверху суженныя; листья довольно жесткіе, часто сине-зеленые, обыкновенно струговидные, съ неравными шиповидными зубцами . . . . . полевой ос. — *S. arvensis* L.

Стебель вѣтвистый; корзинки почти вдвое мельче, съ свѣтло-желтыми вѣнчиками; сѣмянки желто-бурія, о 3 нитевидныхъ ребрышкахъ съ каждой стороны, кверху нѣсколько уже . . . . . 2.

2. Листья мягкіе, обыкновенно тусклые, струговидные или перисто-раздѣльные, съ острыми, почти рѣсничными зубцами, при основаніи почти стрѣловидные, съ острыми ушками; сѣмянки съ тонкими поперечными морщинками . . . . . огородный ос. — *S. oleraceus* L.

Листья нѣсколько жесткіе, лоснящіяся, обыкновенно цѣльные или выемчато-надрѣзные, съ острыми колючими зубцами, при основаніи сердцевидные, съ округлыми ушками; сѣмянки безъ поперечныхъ морщинокъ . . . . . шероховатый ос. — *S. asper* Vill.

428. \* *Sorbària*. A. Br. — рябинники. Кусты съ непарно-перистыми листьями, ланцетными прилистниками и бѣлыми цвѣтками въ густой пира-

мидалевой метелки; листочки продолговато-ланцетные, сильно заостренные, к основанию удвоенно-пильчатые, — нижние мельче остальных; цветки мелкие; тычинки вдвое длиннее лепестков; плодники продолговато-цилиндрические, торчащие, с неясною жилкою на спинке и с звездчатым пушком; верхушечный столбик согнутый . . . . .

рябинник — \* *Sorbiifolia* A. Br.

#### 429. *Sorbus* L. — рябины.

1. Дерево с листьями непарно-перистыми, о 5—11 парях листочков, с железкою при основании каждой пары; листочки продолговато-ланцетные, неравно-остро-пильчатые; молодые пушистые; взрослые голые; почки шерстистые; столбиков 3 (2—4); ложная ягода шаровидная, ярко-красная; цветки белые . . . . . простая рябина — *S. aucuparia* L.

Листья не перистые, снизу покрыты густым серым войлоком; кусты или дерева . . . . . 2.

2. Листья продолговато-эллиптические, к основанию клиновидные или округленные, сверху голые, лоснящиеся, по бокам лопастные; лопасти неравно-пильчатые, почти параллельные; нижние — глубже надрезные и до середины листа довольно ровные; верхние мельче; столбиков 2; ложная ягода овальная, оранжевая . . . . . шведская р. — \* *S. scandica* L.

Листья в очертании яйцевидные или продолговатые, к основанию перисто-раздельные, с продолговато-ланцетными долями, спереди неравно-пильчатыми, — сверху перисто-надрезно-лопастные, с лопастями быстро уменьшающимися к верхушке; ложная ягода шаровидно-овальная, красная . . . . . пенная р. — \* *S. hybrida* L.

#### 430. *Sparganium* L. — ежеголовки.

1. Листья плоские, без жил, узколинейные: верхние короткие, — остальные просвечивающие, очень длинные; мужских головок на верхушке простого цветоноса 1—2; под ними 3—4 женских; рыльце короткое, линейно-коническое; плоды тусклые, остро 3-гранные, яйцевидные, вверху заостренные в короткий носик; корневище ползучее с побегими; остро 3-гранный, слабый и изгибистый стебель вместе с листьями погружен в воду . . . . .

мелкая еж. — *S. minimum* Fr.

Листья килеватые, при основании 3-гранные, б. м. широко-линейные, плотные, торчащие; верхних — мужских головок не менее 3, — обыкновенно больше; рыльце длинное (рис. 861—а, б) . . . . . 2.

2. Цветонос простой — головки расположены простым колосом; женских головок 2—4; мужских 3—6; плоды на ножках продолговато-эллиптические, сужены в такой же длины шиловидный носик . . . . .

простая еж. — *S. simplex* Huds.

Цветонос ветвистый: на каждой ветви его по 1—2 женской головки и много мужских; плоды сидячие, обратно-пирамидальные, с коротким носиком (рис. 861, в) . . . . . ветвистая еж. — *S. ramosum* Huds.

431. *Spergula* L. — торцы. Травка слегка опушенная; стебель с основания ветвистый, с лежащими или приподнимающимися ветвями; листья сверху выпуклые, снизу с продольною бороздкою, тупые; лепестки яйце-



(Рис. 861).

видные, тупые (рис. 862); съмена съ узкою, гладкою каймою . . . . .  
(полевая) торичника—*S. arvensis* L.

**432. *Spergularia* Pers.**—торичники. Травка вверху железисто-пушистая; листья съ обѣихъ сторонъ плоскіе, остроконечные; прилистники яйцевидно-ланцетные, серебристые, б. ч. расщепленные; прицвѣтники почти не короче стеблевыхъ листьевъ; цвѣтоножки во время цвѣтѣнія почти равны чашечкѣ, по отцвѣтаніи въ 2 - 3 раза длиннѣе ея; чашелистики ланцетные, тупые, съ широкимъ перепончатымъ краемъ, немного длиннѣе обратно-яйцевидныхъ лепестковъ (рис. 863, а); коробочка почти равна чашечкѣ (б) . . . . .  
(красный) торичникъ—*S. rubra* Pers.



(Рис. 862).



(Рис. 863).


**433. \* *Spinacia* L.**—шпинаты.

а. Верхніе листья продолговатые, при основаніи клиновидные; околоцвѣтникъ вокругъ плода округлый, почти шаровидный, съ зубцами не колючими . . . . . гладкій ш.—\* *S. inermis* Mueh.

б. Верхніе листья треугольные, при основаніи копьевидные или съ 1 - 2 зубцами съ каждаго бока; околоцвѣтникъ вокругъ плода почти 3-гранный, съ 2 - 4 растопыренными, твердыми шипами (рис. 864). . . . . колючій ш.—\* *S. spinosa* Mueh.



(Рис. 864).



(Рис. 865).

**434. \* *Spiraea* L.**—спирей.

1. Цвѣтки въ густыхъ верхушечныхъ метелкахъ, удлинѣнныхъ или пирамидальныхъ; цвѣтоножки длиною съ цвѣтокъ; доли чашечки торчащія; мѣшечки расходятся верхушками, съ отогнутыми столбиками (рис. 865, б); листья съ выдающеюся снизу сѣтью жилокъ, продолговато-ланцетные до обратно-яйцевидныхъ, остро-пильчатые почти съ основанія; цвѣтки б. ч. розовые . . . . . дволлистная с.—\* *S. salicifolia* L.

Цвѣтки въ щиткахъ, бѣлые . . . . . 2.



2. Листья сѣро-зеленые о 3 жилкахъ; цвѣтоносныя вѣтви очень короткія, съ листьями цѣльнокрайними, которые много меньше обыкновенно пильчатыхъ листьевъ на молодыхъ вѣтвяхъ; плодосныя чашечки съ торчащими долями; вѣтви округлыя . . . . . 3.

Листья зеленые, съ 3 - 4 боковыми жилками съ каждой стороны главной, — всѣ пильчатые или городковые; цвѣтоносныя вѣтви длинныя, покрытыя листьями, почти одинаковыми съ листьями на молодыхъ вѣтвяхъ; доли чашечки отогнутыя . . . . . 4.

3. Листья на молодыхъ вѣтвяхъ съ середины пильчатые или къ верхушкѣ городковые, продолговатые или округло-эллиптическіе; щитковидныя кисти на вѣтвяхъ, покрытыхъ листьями; цвѣтоножки вдвое длиннѣе цвѣтка; мѣшечки заключены въ чашечку; столбики прямые . . . . .

городковая с. — \* *S. crenifolia* C. A. Mey.

Листья на молодыхъ вѣтвяхъ цѣльнокрайніе и къ верхушкѣ слегка городковые, тупо-обратно-яйцевидные или линейно-ланцетные; зонтичный щитокъ на вѣтвяхъ безъ листьевъ; цвѣтоножки, по крайней мѣрѣ, въ 4 раза длиннѣе цвѣтка; мѣшечки выдаются изъ чашечки; столбики отогнуты наружу . . . . . звѣробоелистная с. — \* *S. hypericifolia* Lam.

4. Вѣтви угловатая, согнутыя дугою; листья почти до основанія надрѣзочно-пильчатые; мѣшечки выдаются изъ чашечки, снаружи выпуклые, изнутри съ прямымъ верхушечнымъ столбикомъ . . . . .

дубрововлистная с. — \* *S. chamaedrifolia* L.

Вѣтви округлыя, почти торчащія; листья цѣльнокрайніе или къ верхушкѣ съ немногими, крупными зубцами; мѣшечки изнутри выпуклые, снаружи со столбикомъ отогнутымъ, какъ бы боковымъ . . . . . средняя с. — \* *S. media* L.

#### 435. *Stachys* L. — чистецы.

1. Нижніе и средніе листья съ сердцевиднымъ основаніемъ; вѣнчикъ малиновый; нижняя губа съ извилистыми бѣлыми полосками (рис. 866); травы съ подземными побѣгами . . . . . 2.

Всѣ листья съ округленнымъ или суженнымъ основаніемъ, иногда кромѣ нижнихъ продолговато-ланцетные, — нижніе тупые; остальные острые; вѣнчикъ желтый; нижняя губа съ красноватыми крапинами . . . . . 3.

2. Стебель съ жесткими волосами, внизъ отогнутыми; листья коротковолосые, продолговато-ланцетные, слабо-сердцевидные, острые, съ частыми, мелкими городками: нижніе — на очень короткихъ черешкахъ; верхніе — сидячіе, полустеблеобъемлющіе; прицвѣтные сходны съ стеблевыми; мутовки б. м. сближенныя, о 6 - 10 цвѣткахъ; вѣнчикъ грязно-розовый, съ темными крапинами; трубка его кверху расширена; подземные побѣги на концѣ булавовидно утолщены . . . . . болотный ч. — \* *S. palustris* L.

Стебель шершавый, вверху железистый, клейкій; листья мягкіе, пушистые; темно-зеленые, продолговато-яйцевидные, глубоко-сердцевидные, заостренные, на длинныхъ черешкахъ, кромѣ верхнихъ листьевъ, почти сидячихъ, — всѣ крупно-городчато-пильчатые; прицвѣтные — почти ланцетные; мутовки разобщенныя, о 4 - 6 цвѣткахъ; вѣнчикъ грязно-темно-малиновый; трубка его не расширена (рис. 866) . . . . . лѣсной ч. — \* *S. silvatica* L.

3. Листья черешковые, голые, только верхніе сидячіе, — нижніе продолговато-овальные, городковые, — остальные продолговато-ланцетные, пильчатые;



(Рис. 866).

прицветные листья короткіе — ланцетные или линейные; зубцы чашечки ланцетные, съ колючимъ остріемъ, покрытымъ почти до верху волосами, короче трубки вѣнчика . . . . . однолѣтній ч. — *S. annua* L.

Нижніе листья на очень короткихъ черешкахъ; остальные сидячіе, — всѣ продолговато-ланцетные или ланцетные, съ разбѣянными волосами, городчато-пильчатые; прицветные листья яйцевидно-ланцетные; зубцы чашечки треугольные, съ голою колючкою, длиною съ трубку вѣнчика. . . . . прямой ч. — *S. recta* L. <sup>1)</sup>.

#### 436. *Stellaria* L. — звѣздчатка.

1. Стебель круглый; нижніе листья черешковые; самые верхніе — сидячіе; чашелистики тупые, ланцетные, съ жилками неясвенными; прицветники зеленые; коробочка продолговатая, длиннѣе чашечки. . . . . 2.

Стебель 4-гранный или ребристый; всѣ листья сидячіе; чашелистики острые, продолговатые . . . . . 3.

2. Стебель съ 1 рядомъ волосковъ; листья яйцевидные, коротко-заостренные; лепестки не длиннѣе чашелистиковъ, иногда вовсе безъ вѣнчика; тычинокъ 3, 5 (10); коробочка съ очень короткимъ сѣменосомъ . . . . .

мокрица — *S. media* Vill.

Стебель, особенно вверху, мохнатый; листья сердце-яйцевидные, заостренные, — верхніе продолговато-яйцевидные; лепестки вдвое длиннѣе чашелистиковъ; коробочка съ удлинненнымъ сѣменосомъ . . . . .

дубровная з. — *S. nemorum* L.

3. Листья длинные и узкіе: линейные или ланцетные; завязь и чашечка внизу округлая . . . . . 4.

Листья короткіе — продолговатые или овально-ланцетные; завязь книзу ссужена и чашечка при основаніи ворончатая . . . . . 7.

4. Листья на краю и снизу вдоль жилки остро-шероховатые; чашелистики съ неясными жилками. . . . . 5.

Листья гладкіе; чашелистики съ явственными 3 жилками; прицветники пленчатые . . . . . 6.

5. Прицветники зеленые; лепестки 2-надрѣзные, вдвое длиннѣе чашечки; коробочка шаровидная не длиннѣе чашечки; стебель и листья жесткіе, — послѣдніе длинно-заостренные . . . . . жестколистная з. — *S. Holostea* L.

Прицветники пленчатые; лепестки 2-раздѣльные, не длиннѣе чашечки; коробочка яйцевидно-продолговатая, почти вдвое длиннѣе чашечки; стебель вверху остро-шероховатый, сильно вѣтвистый, слабый, съ вѣточками въ пазухъ всѣхъ листьевъ . . . . . длиннолистная з. — *S. longifolia* Muhl. <sup>2)</sup>.

6. Листья, часто и прицветники, при основаніи по краямъ рѣсничные; цвѣтки въ развѣсистомъ полузонтикѣ; лепестки б. ч. не длиннѣе чашечки; коробочка продолговатая, длиннѣе чашечки . . . . .

злачная з. — *S. graminea* L.

Листья и прицветники по краямъ голые, безъ рѣсничекъ; цвѣтки въ рѣдномъ полузонтикѣ; лепестки б. ч. вдвое длиннѣе чашечки; коробочка яйцевидно-продолговатая, равна чашечкѣ; стебель б. ч. простой; листья чаще сизые. . . . . сизая з. — *S. glauca* With.

7. Листья при основаніи рѣсничные; цвѣтки въ ложно-боковыхъ полу-

<sup>1)</sup> Указано В. Я. Цингеромъ и приведено въ списокъ Максимовича.

<sup>2)</sup> Аннино, близъ границы Богородскаго и Бронницкаго уѣздовъ.

зонтикахъ; прицвѣтники б. ч. пленчатые; чашелистики о 3 явственныхъ жилкахъ, длиннѣ лепестковъ и равны корбочкѣ . . . . .

болотистая з.—*S. uliginosa* Murr. <sup>1)</sup>).

Листья по краямъ голые, нѣсколько мясистые; цвѣтки одиночные въ вильчатыхъ развѣтленьяхъ стебля; прицвѣтники зеленые; чашелистики съ неясными жилками, короче лепестковъ и корбочки . . . . .

толстолистная з.—*S. crassifolia* Ehrh. <sup>2)</sup>).

**437. Stipa L.** — ковыли. Сѣро-зеленый злакъ, образующій густой дернъ; листья узкіе, жесткіе, по краямъ шероховатые; язычекъ верхнихъ листьевъ длинный, острый; низъ узкой, прямой метелки окутанъ верхнимъ листовымъ влагалищемъ; колоски крупныя, зеленые; чашечныя пленки ланцетно-шиловидныя, о 3-5 жилкахъ, длинно-заостренныя, втрое длиннѣ цвѣточныхъ; нижняя цвѣточная пленка линейно-ланцетная, книзу б. ч. о 5 рядахъ шелковистыхъ волосковъ,верху голая; ость ея до верхняго колѣна твердая и толстая, скрученная влѣво, голая; верхнее колѣно очень длинное, тонкое, повислое, усажено мелкими волосками, вначалѣ прижатыми, потомъ перисто-расходящимися . . . . .

(перистый) ковыль—*S. pennata* L. <sup>3)</sup>).

**438. Stratiotes L.** — тѣлорѣзы Листья розетокъ темно-зеленыя, жесткіе, заостренныя, книзу слегка желобчатые, по краямъ съ колючими, острыми зубцами; цвѣто-расположеніе пазушное: цвѣтоносъ и обертка сплюснутые,—листья ея килеватые; цвѣтки съ тонко-пленчатыми прицвѣтниками; лепестки округло-обратно-яйцевидные (рис. 867) . . . . .

(сабуровидный) тѣлорѣзъ — *S. Aloides* L.

**439. Succisa Vahl.** — сивцы. Корневище отвѣсное, короткое, усѣченное; стебель о 2-3. расдвинутыхъ парахъ листьевъ, простой или съ цвѣтоносными вѣтвями обѣ 1 корзинкѣ каждая,—покрытъ жесткими волосками, внизу отогнутыми, вверху прижатыми, подъ корзинками густо-волосистый; корневые листья продолговатые или эллиптическіе, цѣльно-крайніе, книзу вытянуты въ черешокъ; стеблевые — ланцетные, обыкновенно крупно-пильчатые и по краямъ рѣсничные, со сросшимися въ короткое влагалище черешками; верхніе листья сидячіе; корзинки полушаровидныя, въ плодахъ шаровидныя; чешуйки обертки ланцетныя; наружная чашечка мохнатая. . . . . (луговой) сивецъ — *S. pratensis* Moench

**440. \* Symphoricarpos Dillen.** — плододучники. Кустарникъ съ листьями округло-яйцевидными, на короткихъ черешкахъ, снизу сине-зелеными, голыми или слегка пушистыми, цѣльнокрайними, на краю часто волнистыми . . . . . сѣбная ягода — \* *S. racemosus* Michx

**441. Symphytum L.** — окопники.

а. Стебель и листья усажены жесткими волосками на бородавочкахъ; всѣ листья длинно-пизбѣгающіе, довольно жесткіе: нижніе крупныя яйцевидно-или продолговато-ланцетные, сужены въ крылатый черешокъ; доли ча-



(Рис. 867).

1) Въ Сокольникахъ, на берегу пруда.

2) На торфяной почвѣ — Большія Мытищи, Погонно-Лосинный стровъ.

3) По Окъ, за Никифоровымъ — Серпуховскаго уезда.

щечки ланцетные, заостренные (рис. 868, а); вѣничекъ грязно-лиловый, рѣже бѣловатый; зубцы его отогнутые; орѣшки гладкіе, лоснящіеся, черные . . . . . лѣчебный ок.—*S. officinale* L. <sup>1)</sup>.

б. Стебель усаженъ колючими, слегка загнутыми щетинками; листья довольно нѣжные, продолговато-яйцевидные, вдоль жилокъ снизу съ рѣдкими щетинками; нижніе—на короткихъ черешкахъ, полунизбѣгающіе вдоль черешка, но не по стеблю; верхніе—не низбѣгающіе; доли чашечки линейно-ланцетные, тупые, щетинистыя; вѣничекъ вначалѣ красноватый, потомъ голубой, на краю бѣлый; зубцы его прямые; орѣшки морщинистые, съ мелкими бугорками . . . . . колючеострый ок.—*S. asperrimum* Sims



(Рис. 868).



(Рис. 869).

#### 442. \* *Syringa* L.—спиреи.

а. Листья на длинныхъ черешкахъ, при основаніи сердцевидные, заостренные, съ обѣихъ сторонъ зеленые, снизу нѣсколько свѣтлѣе; цвѣтки въ густыхъ, длинныхъ пирамидкахъ, лиловые или бѣлые, душистые; вѣничекъ трубчато-гвоздевидный, съ нѣсколько вогнутымъ отгибомъ (рис. 869—а, б); . . . . . обыкновенная с.—\* *S. vulgaris* L.

б. Листья на короткихъ черешкахъ, суженные при основаніи, острые, сверху темно-зеленые, снизу блѣдно-зеленые; цвѣтки въ рѣдкихъ, прерывистыхъ пирамидкахъ, лиловые, трубчато-булавовидные . . . . . венгерская с.—\* *S. josikaëa* Jacq.

#### 443. *Tanacetum* L.—пижмы.

а. Листья почти голые, перисто-разсѣченные, съ продолговато-ланцетными, туповатыми долями, на нижнихъ черешковыхъ листьяхъ перисто-надрѣзанными, на верхнихъ сидячихъ—надрѣзано-пальчатыми; короткое, вѣтвистое корневище . . . . . дикая рябинка—*T. vulgare* L.

б. Листья прижато-волосистые, цѣльные, эллиптические, тупые, городчатопильчатые, при основаніи съ ушками; корневище ползучее . . . . . колуферъ—\* *T. Balsamita* L.

444. *Taraxacum* Juss. — одуванчики. Корневище толстое, вѣтвистое; листья въ розеткѣ ланцетные или продолговато-ланцетные, суженные въ черешокъ, струговидные, перисто-раздѣльные или надрѣзные, рѣже зубчатые или почти цѣльнокрайніе, въ молодости слегка паутинистые, какъ верхняя часть стрѣлки и низъ обвертки; сѣмянки продолговато-клиновидныя, реб-

<sup>1)</sup> На Огѣ—за Дракинымъ, Серпуховскаго уѣзда; Карапчеево—Коломенскаго.

ристия, быстро суженныя въ коническое основаніе носика (рис. 870, b); ребрышки наружныхъ сѣмянокъ съ основанія бородавчато-морщинистыя; у внутреннихъ—при основаніи гладкія . . . . .

(лѣчебный) одуванчикъ—*T. officinale* Wigg.


**445. † *Telékia* Baumg.** — телекія. Стебель высокій, бороздчатый, особенно вверху коротко-пушистый; листья снизу зеленые, коротко-волосистые, острые; нижніе—сердцевидно-яйцевидные, черешковые, удвоенно-пильчато-зубчатые; верхніе — сидячіе, яйцевидные съ колючеострыми зубцами; корзинки въ рѣдкихъ щиткахъ; чешуйки обертки яйцевидныя, колючеострыя; язычекъ краевыхъ цвѣтковъ линейный, много длиннѣе обертки . . . . .

(красивая) телекія — † *T. speciosa* Baumg. <sup>1)</sup>

**446. *Thalictrum* L.**—василистники.

1. Тычиночныя нити булабовидно утолщены къ верхушкѣ, обыкновенно блѣдно-лиловыя; сѣмянки на длинныхъ ножкахъ, повислыя, перепончато-крылатые, 4-гранныя, обратно-яйцевидныя; рыльце очень маленькое, овальное, узкое; листья съ прилистниками, голые, съ округлыми или обратно-яйцевидными, надрѣзанными-городчатыми листочками; цвѣтки въ щитковидной метелкѣ, торчащіе, зеленоватые . . . . .

водосборолистный в. — *T. aquilegifolium* L.



(Рис. 870).



(Рис. 871).

Тычинки съ нитями тонкими, не утолщенными къ верхушкѣ (рис. 871, a); сѣмянки сидячія, яйцевидныя, продольно-бороздчатые (b) . . . . . 2.

2. Листочки снизу съ простыми волосками, продолговатые до линейныхъ; листья безъ прилистниковъ; цвѣтки, какъ и тычиночныя нити, желтоватые, — торчащіе, скупены въ густой щитковидной метелкѣ; рыльце очень маленькое; корешки снаружи желтоватые . . . . .

узколистный в. — *T. angustifolium* L.

Листочки голые или железистые; листья б. ч. съ прилистниками. . . 3.

3. Стебель обыкновенно простой; листья 2-перистые, сближенные; листочки клиновидные, эллиптическіе или продолговатые; цвѣтки часто повислые (рис. 871, a); тычиночныя нити красноватые; рыльце крылатое, при основаніи стрѣловидное; корешки снаружи желтоватые . . . . .

простой в. — *T. simplex* L.


1) Одичалое подѣ Москвою—Свирлово.

Стебель вѣтвистый; листья 3 - 4 (2) перистые . . . . . 4.

4. Цвѣтки повислые, какъ и тычинки, не скучены пучками, въ пирамидальной раскидистой, широкой метелкѣ; рыльце обыкновенно расширенно-3-угольное, съ краями гладкими или бахромчатыми; листья 3, 4-перистые; листочки округлые или клиновидно-обратно-яйцевидные; корешки снаружи сѣроватые . . . . . малый в.—*T. minus* L.

Цвѣтки торчащіе, скученные пучками, въ щитковидной густой метелкѣ; рыльце овальное, маленькое, бѣловатое, съ цѣльнымъ краемъ (рис. 871, b); листья 2-3-перистые; листочки крупные, часто плотные, жестковатые, округло-обратно-яйцевидные или продолговато-клиновидные; корешки снаружи желтоватые . . . . . желтый в.—*T. flavum* L.

447. *Thesium* L.—льнянки. Корневище ползучее съ подземными побѣгами; стебель обыкновенно простой; линейные листья о 3 слабыхъ жилкахъ; цвѣтки въ простой кисти; каждый изъ нихъ прикрытъ листомъ на отклоненной отъ стебля вѣточкѣ (рис. 872—а, с); верхніе листья безъ цвѣтковъ образуютъ хохолокъ; околоцвѣтникъ внутри желтоватый, не длиннѣе овальнаго орѣшка, съ явственными боковыми жилками (с) . . . . . (безприцвѣтная) льнянка—*T. ebracteatum* Hayne <sup>1)</sup>.



(Рис. 872).



(Рис. 873).



(Рис. 874).

448. *Thlaspi* L.—ярутки. Желто-зеленая, голая трава; корневые листья обратно-яйцевидные, суженные въ черешокъ; стеблевые — продолговатые. цѣльные или зубчатые, сидячіе, съ стрѣловиднымъ основаніемъ; цвѣтки мелкіе съ бѣлыми лепестками; плодonoсная кисть вытянутая; стручечки крупные, округло-овальные, длиною съ плодonoжкой, со столбикомъ очень короткимъ въ узкой выемкѣ стручечка (рис. 873, а); гнѣзда о 6 - 7 сѣменахъ (b), косо-морщинистыхъ . . . . . (полевая) ярутка—*T. arvense* L.

449. \* *Thuja* Torr. — туя. Кустъ съ вѣтвями оттопыренными, горизонтально-разставленными; листья на ребрахъ вѣтвей килеватые, — на плоской сторонѣ вѣтвей съ железистыми бугорками на спинкѣ; мужскіе цвѣтки чернобурые; женскіе — въ продолговатой шишечкѣ, о 10 - 12 чешуйкахъ, почти кожистыхъ, желто-бурыхъ, безъ придатковъ (рис. 874, b); нижніе чешуйки съ отогнутою верхушкою; сѣмена крылатая (с) . . . . .

божье дерево—\* *T. occidentalis* L.

450. *Thymus* L.—тимьяны.

а. Листья сужены въ короткій черешокъ, съ слабо свернутыми внизъ

<sup>1)</sup> По Окъ—Лужки Серпуховскаго уѣзда.

краями, при основаніи рёсничные; 3 верхнихъ зубца чашечки 3-угольно-ланцетные (рис. 875, б); вѣнчикъ розовый, рѣже бѣлый; полукустарникъ съ очень вѣтвистымъ, пушистымъ, стелющимся стеблемъ, при основаніи укореняющимся . . . . . богородская трава.—*T. Serpyllum* L.

б. Листья сидячіе, продолговатые или линейные, съ сильно свернутыми внизъ краями, железисто-точечные, съ явственными боковыми жилками и съ укороченными вѣтвями, въ видѣ пучковъ листьевъ, въ пазухахъ; 3 верхнихъ зубца чашечки ланцетные; вѣнчикъ свѣтло-розовый; кустарникъ съ сѣрыми короткими волосками; очень вѣтвистый стебель никогда не укореняется . . . . . обыкновенный т.—\**T. vulgaris* L.

#### 451. *Tilia* L.—липы.

а. Листья съ обѣихъ сторонъ голые, снизу блѣдно-или сѣро-зеленые, только въ углахъ жилокъ бородатые; щитковидные полужонтики о 5 - 7 цвѣткахъ, обращены вверхъ; лопасти рыльца по отцвѣтаніи растопырены; орѣшки съ 4 - 5 неясными ребрышками и тонкою шелухой; почки голыя . . . . . мелколистная л.—*T. parvifolia* Ehrh.

б. Листья покрыты мягкимъ и короткимъ пушкомъ и въ углахъ жилокъ бородатые, снизу зеленые; щитковидные полужонтики о 2 - 3 цвѣткахъ, повислые; лопасти рыльца торчащія; орѣшки о 4 - 5 ребрышкахъ, съ твердою и толстою скорлупою; почки мохнатыя,—молодые вѣтви и листовые черешки волосистые . . . широколистная л.—\**T. platyphylla* Scop.



(Рис. 875)



(Рис. 876).

452. *Torilis* Adans.—пунырники. Стебель очень вѣтвистый, шершавый, какъ и листья, отъ короткихъ, пригнутыхъ книзу щетинокъ; листья въ очертаніи треугольные, удвоенно-перистые, съ ланцетными, перисто-раздѣльными или надрѣзано-пильчатыми листочками, изъ коихъ верхній сильно вытянутъ; лучи зонтика вытянутые; цвѣтки бѣлые или розовые; иглы на плодахъ не загнуты на верхушкѣ крючкомъ (рис. 876—а, б) . . . . .

пунырникъ—*T. Anthriscus* Gmel. <sup>1)</sup>.

#### 453. *Tragopogon* L.—козлородники.

а. Цвѣтоножки почти не утолщены подъ корзинкою; вѣнчикъ ярко-желтый; сѣмянки бугорчатая: краевыя почти не короче нитевиднаго носика; листья линейные, съ расширеннымъ влагалищнымъ основаніемъ, съ топко и длинно-заостренною верхушкою . . . . . луговой к.—*T. pratensis* L.

б. Цвѣтоножки сверху булабовидно-утолщенные, полые; вѣнчикъ лиловый; краевыя сѣмянки быстро стянуты въ носикъ, вверху гладкій; листья линейно-ланцетные, прямые . . . . . овсяный корень—\**T. porrifolius* L.

<sup>1)</sup> Подъ Москвою — близъ Братцева (Борисовская мельница); на Окѣ — Бѣлые Колодези, Коломенскаго уѣзда.



**454. Trapa L.**—рогульники. Водная трава съ ползучимъ при основаніи, вѣтвистымъ стеблемъ; подводные листья рѣдкіе, парные, линейные, быстро опадающіе; у основанія ихъ развиваются перисто-раздѣльно вѣтвистые корни; надводные листья у верхушки стебля розеткою, плавающіе, цѣльные, почти ромбическіе, неравно-выемчато-зубчатые, кожистые, на длинныхъ черешкахъ, часто въ срединѣ вздутыхъ (рис. 877, d); пазушные цвѣтки мелкіе, бѣлые; лепестки длиннѣе зубцовъ чашечки (a); рогатый орѣхъ (c) черный . . . . . водяные орѣхи—*T. natans* L. <sup>1)</sup>.



(Рис. 877).



(Рис. 878).

**455. Trientalis L.**—седмичники. Стебель тонкій, не высокій, простой, съ длинными нитевидными подземными побѣгами, на концѣ утолщенными въ видѣ клубней, внизу съ рѣдкими и мелкими чешуйчатыми листьями; нижніе листья маленькіе, очередные, раздвинутые, обратно-яйцевидные, тупые; верхніе листья крупнѣе, скучены мутовкою вверху стебля—продолговато-эллиптическіе, коротко-заостренные, очень неровные; въ пазухѣ ихъ выходятъ довольно крупныя цвѣтки на длинныхъ и тонкихъ ножкахъ, по 2 - 5, зонтикомъ; доли чашечки почти линейныя; доли вѣнчика эллиптическія, острые, длиннѣе чашечки и тычинокъ (рис. 878, a); вѣнчикъ бѣлый съ желтымъ дномъ . . . (европейскій) седмичникъ—*T. europaea* L.

**456. Trifolium L.**—трилистники.

1. Цвѣтки вполнѣ сидячіе въ головкѣ или колосѣ, безъ прицвѣтничковъ; зѣвъ чашечки внутри съ волосянымъ кольцомъ; всѣ лепестки срослись внизу въ трубку (рис. 879—b, a); столбикъ крючкомъ; бобъ 1 сѣменный, не длиннѣе чашечки (d) . . . . . 2.

Цвѣтки на ножкахъ, въ головчатыхъ зонтикахъ или сжатыхъ кистяхъ; зѣвъ чашечки внутри голый; отцвѣтшій вѣнчикъ поникшій, непадающій, сухой, пленчатый; столбикъ не согнутъ на концѣ крючкомъ . . . . . 6.

2. Вѣнчикъ тѣлеснаго цвѣта, короче мохнатой чашечки съ ея тонкими, шиловидно-щетинистыми, равными зубцами, длинно опушенными; стебель прямой, тонкій, развѣстистый, мохнато-пушистый, какъ и листья—линейно-продолговатые, слегка зубчатые; свободная часть прилистничковъ нижнихъ листьевъ ланцетно-шиловидная, верхнихъ—яйцевидная, шиловидно-заостренная; колосья продолговато-цилиндрическіе . . . . .

полевой т. — *T. arvense* L.

Вѣнчикъ обыкновенно малиновый, вдвое длиннѣе чашечки (рис. 879, a); нижній зубецъ ея длиннѣе 4 верхнихъ, равныхъ трубокъ чашечки (a, c) . . . 3.

<sup>1)</sup> Тростенское озеро, Рузскаго уѣзда; прежде указывалось въ Архангельскомъ—Звенигор. уѣзда.

3. Трубка чашечки снаружи голая, съ нитевидными зубцами, длинно-рѣсничными; стебель съ рѣдкими, прижатыми волосками, поднимающийся, вѣтвистый, часто изгибистый; прилистники узко-ланцетные, острые; листочки продолговато-эллиптические, почти цѣльнокрайніе . . . — *T. médium* L.

средній т. — *T. médium* L.

Трубка чашечки снаружи волосистая или мохнатая . . . . . 4.

4. Колосъ цилиндрическій, не окутанъ снизу прицвѣтными листьями; зубцы чашечки ланцетно-шиловидные, о 3 жилкахъ; стебель прямой, простой съ рѣдкими листьями, мохнатыми, какъ и стебель; прилистники яйцевидные, зубчатые; листочки обратно-яйцевидные, спереди зубчатые . . . . .

инкарнатъ — \* *T. incarnatum* L.

Головки шаровидныя или яйцевидныя, окутаны снизу прицвѣтными листьями въ видѣ обертки; зубцы чашечки нитевидные (рис. 879, а) . . . 5.

5. Листочки эллиптическіе или продолговатые, почти цѣльнокрайніе; свободная часть прилистниковъ треугольно-яйцевидная, широкая, остисто-заостренная; главный стебель укороченный, съ корневыми листьями, изъ пазухи коихъ выходятъ приподнимающиеся цвѣточные стебли; чашечная трубка о 10 жилкахъ . . . . . дятлина — *T. pratense* L.

Листочки продолговато-ланцетные, по всему краю мелко-зубчатые; свободная часть прилистниковъ ланцетно-шиловидная; главный стебель прямой, б. ч. простой; чашечная трубка о 20 жилкахъ . . . . . альпійскій т. — *T. alpestre* L. 1).


6 (1). Цвѣтки бѣлые или розовые, съ мелкими прицвѣтничками; всѣ лепестки сросшіеся; чашечка о 10 жилкахъ; зубцы ея равные или 2 верхнихъ длиннѣе; бобъ не выдается изъ чашечки, 2 - 4 сѣменной . . . . . 7.

Цвѣтки желтые, — отцвѣтающіе буроватые; флагъ свободный, не сросшійся съ остальными лепестками; чашечка о 5 жилкахъ: 2 верхнихъ зубца ея треугольные, короче нижнихъ, линейныхъ; бобъ на ножкѣ выдается изъ чашечки, 1-сѣменный . . . . . 9.

7. Стебель, листья снизу и чашечка съ короткими волосками; цвѣтонось не длиннѣе листьевъ; цвѣтоножки очень короткія — въ 3 раза короче трубки чашечки, съ почти равными, ланцетно-шиловидными зубцами; главный стебель укороченный, съ корневыми листьями, изъ пазухи коихъ выходятъ обыкновенно прямые цвѣточные стебли; листья эллиптическіе, мелко и остро-зубчатые, по краю со множествомъ утолщенныхъ жилокъ; прилистники яйцевидно-ланцетные, шиловидно-заостренные; вѣнчикъ бѣлый . . . бѣлоголовка — *T. montanum* L.

Стебель, листья и трубка чашечки голые; цвѣтонось длиннѣе листьевъ; цвѣтоножки среднихъ цвѣтковъ не короче трубки чашечки: 2 верхнихъ зубца ея длиннѣе прочихъ; листочки обратно-яйцевидные, мелко-пильчатые . . . . . 8.

8. Стебель стелющийся, съ ползучими, укореняющимися побѣгами; при-



(Рис. 879).

1) По Окъ, въ Коломенскомъ и Серпуховскомъ уѣздахъ.

листья плечатые, яйцевидные, быстро заостренные въ ость; цветоножки среднихъ цвѣтковь длиною съ трубку чашечки; зубцы ея ланцетные; лепестки бѣлые, часто тѣлесные . . . . . ползучій т.—*T. repens* L.

Стебель не стелющийся и безъ укореняющихся побѣговъ; прилистники яйцевидно-ланцетные, постепенно заостренные; цветоножки среднихъ цвѣтковь въ 2 - 3 раза длиннѣе трубки чашечки, съ шиловидными зубцами; лепестки сначала бѣлые, потомъ розовые . . . . .

пенастый т.—*T. hybridum* L.

9 (6). Колосовидныя кисти продолговато - цилиндрическія, по 1 - 2 на цвѣтоносѣ, который вдвое длиннѣе листьевъ; въячикъ сперва темно - желтый, потомъ темно-бурый; флагъ согнутый шлемомъ съ самаго основанія; крылья вытянуты впередъ; столбикъ вчетверо короче боба; стебель всегда прямой; прилистники продолговато - ланцетные, острые; листочки обратно-яйцевидные или эллиптическіе . . . . . каштановый т.—*T. spadiceum* L.


Головчатые зонтики шаровидные или овальные, по многу на цвѣтоносѣ, который нѣсколько длиннѣе листьевъ; въячикъ свѣтло-желтый, потомъ свѣтло-бурый; флагъ при основаніи сжатый съ боковъ, спереди расширенный ложкою; крылья расходящіяся въ сторону . . . . . 10.

10. Всѣ черешки продолговато-обратно-яйцевидныхъ листочковъ равные; прилистники продолговато-ланцетные; столбикъ почти такой же длины, какъ бобъ . . . . . пашенный т.—*T. agrarium* L.

Средній листокъ на болѣе длинномъ черешкѣ; листочки ромбически-обратно-яйцевидные; прилистники яйцевидные; столбикъ во много разъ короче боба . . . . . лежачій т.—*T. procumbens* L. <sup>1)</sup>

#### 457. *Triglochin* L.—трюстреники.

а. Кисть рѣдкая, б. ч. съ верхушечнымъ цвѣткомъ; плоды линейно-булавовидные, книзу суженные, прижатые къ цвѣтоносу, распадаются на 3 мѣшечка (рис. 880, d); листья узко-линейные, полукруглые . . . . . болотный т.—*T. palustris* L.



(Рис. 880).



(Рис. 881).

б. Кисть густая, длинная, б. ч. безъ верхушечнаго цвѣтка; плоды яйцевидные, подъ верхушкою перетянутые, отходятъ отъ цвѣтоноса и распадаются на 6 мѣшечковъ; листья вверху желобчатые . . . . .

морской т.—*T. maritima* L. <sup>2)</sup>

#### 458. *Triticum* L.—пшеницы.

1. Колосъ 4-гранный, плотный, черепичатый, на гибкомъ цвѣтоносѣ; колоски вздутые (рис. 881): чашечныя пленки и нижняя цвѣточная широко-

<sup>1)</sup> Хатвичи на р. Нерской, Богородскаго уѣзда; Карачеево на Окѣ — Коломенскаго.

<sup>2)</sup> Тростенское озеро Рузскаго уѣзда.

яйцевидныя, неравнобокія, на спинкѣ закругленныя, притупленныя и остро-килеватыя, съ слабо выступающими жилками, къ верхушкѣ не сходящимися; зерновки свободныя, не облечены въ пленки . . . . .

обыкновенная п.—\* *T. vulgare* Vill.

Колосъ 2-рядный, довольно рѣдкій; колоски не вздутые, б. ч. о 5 цвѣткахъ; чашечныя пленки и нижняя цвѣточная ланцетныя или продолговатыя, безъ киля, о многихъ жилкахъ; жилки нижней цвѣточной пленки сходятся къ верхушкѣ . . . . . 2.

2. Чашечныя пленки продолговатыя, очень тупыя или широко-усѣченныя, о 7 - 9 жилкахъ, неравнобокія, вдвое короче нижней цвѣточной пленки, тоже очень тупой и безъ всякой ости; листья жесткіе, шиловидно свернутые, по краямъ и сверху шероховатыя. . . . .

жесткая п.—*T. rigidum* Schrad. 1).

Чашечныя пленки ланцетныя; заостренныя въ короткую ость, равнобокія, о 3 - 7 жилкахъ; нижняя цвѣточная пленка тоже ланцетная, о 5 - 7 жилкахъ. . . . . 3.

3. Колосъ длинный и тонкій, съ поникшею верхушкою; нижняя цвѣточная пленка всегда заостренная; остистая: ость ея тонкая, слегка извилистая, длиннѣе самой пленки; листья съ обѣихъ сторонъ шероховатые: сверху сѣро-зеленые, тусклые, —спизу темно-зеленые, лоснящіеся; корень волокнистый . . . . . дикая п.—*T. caninum* Schreb.

Колосъ прямой, торчащій; нижняя цвѣточная пленка заостренная или туповатая, съ остью или безъ ости, но ость всегда короче пленки; листья только сверху остро-шероховатые; корневище ползучее, съ длинными подземными побѣгами . . . . . пырей—*T. repens* L.


**459. Tröllius L.**—купальницы. Стебель обыкновенно простой, съ 1 верхушечнымъ крупнымъ шаровиднымъ цвѣткомъ (рис. 882, а); листья ланцато 5-разсѣченные, съ ромбическими долями, остро-зубчато-надрѣзанными; чашелистики (а) свѣтло-желтые; лепестки (с) оранжевые . . . . . (европейская)

купальница—*T. europaeus* L.

**460. Tulipa L.**—тюльпаны. Стебель съ 2 - 3 ланцетно-линейными, острыми листьями, плоскими, голыми, слегка синеватыми; цвѣтокъ крупный, желтый, до распусканія поникшій; листочки околоцвѣтника заостренные, у верхушки пушистые: наружные эллиптически-ланцетные, книзу голые, короче внутреннихъ, эллиптическихъ; на краю при основаніи пушистыхъ; тычиночныя нити внизу мохнатыя; коробочка продолговатая, остроконечная, вдвое длиннѣе своей ширины . . . . .

лѣсной т.—*T. silvestris* L. 2).

**461. Turrītis L.**—вяжечки. Стебель внизу и корневые листья шершавые отъ 3-раздѣльныхъ волосковъ, при основаніи суженные, ланцетные, выемчато или надрѣзано-крупно-зубчатые; стеблевые листья яйцевидно-лан-



(Рис. 882).

1) По Окъ—между Серпуховымъ и Лужками; Карапчеево, Коломенскаго уѣзда.

2) По Окъ—между Никифоровымъ и Прилуками, Серпуховскаго уѣзда.

цветные, острые, цѣлюнокрайніе, охватываютъ стебель глубоко-сердце-стрѣловиднымъ основаніемъ; цвѣтки очень мелкіе: лепестки вдвое длиннѣе чашелистиковъ; стручки вытянутые, въ 6 - 8 разъ длиннѣе плодоножки, — зрѣлые наклонены въ одну сторону . . . . .

(голая) вяжечка — *T. glabra* L.

**462. *Tussilago* L.**—подбѣлы. Мясистое ползучее, вѣтвистое корневище вначалѣ пускаетъ стрѣлки объ одной корзинкѣ, покрытыя ключевидными шерстистыми волосками и чешуйчатыми буроватыми листьями, яйцевидно-ланцетными, острыми; по отцвѣтаніи развиваются розетки корневыхъ листьевъ округло-сердцевидныхъ, угловато-неравно-зубчатыхъ, плотныхъ, сверху голыхъ, снизу съ бѣлымъ войлокомъ; корзинка до цвѣтенія и по отцвѣтаніи поникшая; обертка ея цилиндрическая . . . . .

мать и мачеха — *T. Farsara* L.

**463. *Typha* L.**—рогозы.


**a.** Мужской початокъ сближенъ съ женскимъ: женскій толсто-цилиндрический, чернобурый отъ цвѣта ромбически-ланцетныхъ рылецъ; прицвѣтничковъ нѣтъ; листья широко-линейные, почти плоскіе . . . . .

широколиственный р. — *T. latifolia* L.

**b.** Мужской початокъ разобщенъ отъ женскаго: женскій узко-цилиндрический, краснобурый отъ цвѣта линейныхъ рылецъ; каждый цвѣтокъ съ шпигельнымъ, на верхушкѣ лопатчатымъ прицвѣтничкомъ; листья узко-линейные, внизу желобчатые. . . . . узколиственный р. — *T. angustifolia* L. <sup>1)</sup>.

**464. *Ulmus* L.**—вязы.

**a.** Молодые вѣтви лоснящіеся, гладкія, тонкія, свѣтло-бурыя; почки голыя, острыя, коричневыя, съ темно-бурыми краями чешуекъ; листья сверху голые, снизу шершавые, при основаніи неравнобокіе; цвѣтки повислые на длинныхъ ножкахъ (рис. 883, — a, b), въ рѣдкихъ раскидистыхъ пучкахъ; тычинокъ 6 - 8 (a, b); крылатки повислыя, мелкія, мохнато-рѣсничныя; верхушка крыла до орѣшка не длиннѣе орѣшка (d) . . . . .



(Рис. 883).

черешчатый в. — *U. pedunculata* Foug.

**b.** Молодые вѣтви густо-пушистыя, толстыя, темнобурыя; почки съ ржаво-бурыми волосками, тупыя; листья сверху остро-шероховатые, снизу вдоль всѣхъ жилокъ пушистыя, при основаніи слегка неравнобокіе; цвѣтки на очень короткихъ ножкахъ, въ большихъ пучкахъ; тычинокъ 5 - 6; крылатки почти сидячія, крупныя, голыя; верхушка крыла до орѣшка вдвое длиннѣе орѣшка . . . . . горный в. — † \* *U. montana* With.

**465. *Urtica* L.**—кропивы.

**a.** Колосья не длиннѣе листовыхъ черешковъ; однодомная трава съ одними жгучими, жесткими волосками; стебель обыкновенно вѣтвистый; листья яйцевидно-эллиптические, острые, надрѣзано-остро-пильчатые; верхушечный зубецъ ихъ не крупнѣе боковыхъ . . . . . жгучая к. — *U. urens* L.

**b.** Колосья длиннѣе листовыхъ черешковъ; двудомная трава съ жесткими,

<sup>1)</sup> По Окъ, въ Серпуховскомъ уѣздѣ (къ Лужкамъ, за Владычнымъ монастыремъ, Дракино); Кудиново, Богородскаго уѣзда.

жгучими волосками и короткими простыми; стебель б. ч. простой; листья сердцевидно-продолговатые, заостренные, крупно-пильчатые, длиннее черешка; мужские колосья торчащие; женские—по отцветании поникшие . . .

двудомная к.—*U. dioica* L.

#### 466. *Utricularia* L.—пузырчатки.

1. Пузырьки на листьях особых ветвей; листья 2-рядные, 3-раздельные, повторно-вильчатые, с линейно-шиловидными, щетинисто-рѣсничными долями, в очертании почковидные, безъ пузырьковъ; верхняя губа чашечки заостренная,—нижняя выемчатая у верхушки; вѣнчикъ свѣтло-желтый съ оранжевыми жилками: верхняя губа его нераздельная, вдвое длиннее горба нижней губы, плоской и закругленной; шпорецъ шиловидный, острый, пригнутъ къ нижней губѣ почти такой же длины; плодonoжки торчащія . . .


средняя п.—*U. intermedia* Hayne <sup>1)</sup>.

Пузырьки на всѣхъ листьяхъ, расходящихся во всѣ стороны; плодonoжки согнуты . . . 2.

2. Листья 2-3-перисто-многораздельные, с тонкими, какъ волосъ, рѣсничными долями (рис. 884, е); верхняя губа чашечки яйцевидная, тупая; нижняя—выемчатая; вѣнчикъ ярко-желтый, съ оранжевыми жилками: верхняя губа его округло-яйцевидная, на верхушкѣ слегка 3-лопастная (b), почти такой же длины какъ 2-лопастной горбъ притупленной нижней губы, съ отвороченными краями (a); шпорецъ удлинненно-коническій, во много разъ длиннее толщины (a); зѣвъ закрытъ выпуклымъ горбомъ (a) . . .

обыкновенная п.—*U. vulgaris* L.

Листья вильчато-многораздельные съ узко-линейными, цѣльнокрайними, голыми долями; губы чашечки округлы, заостренные; вѣнчикъ блѣдно-желтый, съ красно-бурыми полосками, мелкій: верхняя губа его выемчатая такой же длины, какъ сплюснутый горбъ и значительно короче овальной нижней губы, съ краями подъ конецъ отвороченными; шпорецъ въ видѣ короткаго, тупаго бугорка, длиною не превышаетъ ширины; зѣвъ не закрытъ горбомъ . . . мелкая п.—*U. minor* L. <sup>2)</sup>.



(Рис. 884).



(Рис. 885).

467. *Vaccaria* Med.—тысячеголовы. Стебель очень вѣтвистый; листья сизые: нижние продолговатые, суженные къ основанію, — стеблевые ланцетные острые, сидячіе, къ основанію немного сердцевидные, сросшіеся; цвѣтки въ рѣдкомъ щиткѣ; лепестки (рис. 885, a) обратно-яйцевидные,

<sup>1)</sup> По торфянымъ болотамъ: Большая Мытищи, Черное озеро подъ Косинымъ и пр.

<sup>2)</sup> По торфянымъ болотамъ: Петровское-Разумовское, Тростенское озеро и пр.

мелко-городковые, блѣдно-розовые . . . . .  
(обыкновенный) тысячеголовъ—*V. vulgàris* Host

**468. *Vaccinium* L.—брусники.**


1. Листья толстые, кожистые, зимующіе, со свернутымъ, почти цѣльнымъ краемъ, обратно-яйцевидные, тупые, сверху темно-зеленые, лоснящіеся, — снизу блѣдно-зеленые, съ неясными жилками и темными железистыми ямками; цвѣтки поникшіе съ 2 прицвѣтниками скучены верхушечною кистью на концахъ прошлогоднихъ вѣтвей, округлыхъ и коротко-пушистыхъ; вѣнчикъ колокольчатый, розоватый, съ 4 отвороченными яйцевидными зубцами; чашечка съ 4 короткими, 3 - угольными, острыми зубцами; тычиночныя нити на краю волосистыя; пыльники безъ щетинокъ на спинкѣ; ягоды шаровидныя, ярко-красныя.

брусника — *V. Vitis idaëa* L.


Листья не кожистые, опадающіе на зиму, снизу съ сѣтчатыми жилками, но безъ железистыхъ ямокъ; цвѣтки одиночные или парные, безъ развитыхъ прицвѣтниковъ, б. ч. 5 - ные, съ кувшинчатымъ вѣнчикомъ (рис. 886, а); пыльники на спинкѣ съ 2 щетинками (с); тычиночныя нити голыя; ягоды черныя или черно-синія; вѣтви голыя, заканчиваются мягкимъ остроконечіемъ. . . . . 2.

2. Вѣтви округлыя; листья обратно-яйцевидные, тупые, цѣльнокрайніе, тусклые, сверху темно-зеленые, снизу сизые; чашечка о 5 короткихъ зубцахъ (рис. 886, а); вѣнчикъ яйцевидно-кувшинчатый (а, б), бѣлый или розоватый; ягоды овальныя, внутри зеленоватыя . . . . .

голубика — *V. uliginòsum* L.



(Рис. 886).



(Рис. 887).

Вѣтви острогранныя; листья яйцевидные, острые, мелко-городчато-пильчатые, свѣтло-зеленые съ обѣихъ сторонъ; отгиб чашечки цѣльный; вѣнчикъ шаровидно-кувшинчатый (рис. 887), зеленоватый съ красноватымъ налетомъ; ягоды шаровидныя, внутри темно-красныя . . . . .

черника—*V. Myrtillus* L.

**469. *Valeriana* L.** — мауны. Стебель бороздчатый, полый, съ листьями непарно-перистыми о 9—21 листочкахъ яйцевидно-ланцетныхъ до ланцетныхъ, крупно-пильчатыхъ, или линейныхъ, и тогда цѣльнокрайнихъ; обоеполые цвѣтки въ крупныхъ, вѣтвистыхъ полузонтикахъ, съ блѣдно-розовымъ вѣнчикомъ . . . . . (лѣчебный) мауны—*V. officinàlis* L.

**470. *Veràtrum* L.** — чемерицы.

а. Околоцвѣтникъ зеленоватый, много длиннѣе цвѣтопожerkъ, которыя



короче эллиптически - продолговатых прицветниковъ; метельчатая кисть и нижняя сторона листьевъ пушистыя; верхніе листья ланцетные. . . . .

бѣлая ч.—*V. album* L. <sup>2)</sup>.

б. Околоцветникъ темно-малиновый, почти такой же длины, какъ цветоножки, которые обыкновенно длиннѣ линейно-продолговатыхъ прицветниковъ; метельчатая кисть шерстисто-войлочная; листья голые, — верхніе линейно-ланцетные. . . . . черная ч.—*V. nigrum* L. <sup>2)</sup>.

**471. *Verbascum* L.—коровяки.**

1. Листья б. м. низбегающіе, съ густымъ желтоватымъ или сѣроватымъ войлокомъ, какъ и на стеблѣ; цветоножки во время цвѣтенія короче чашечки или не длиннѣ ея. . . . . 2.

Верхніе листья сидячіе; нижніе черешковые, — сверху всѣ съ рѣдкими волосками или почти голые, снизу съ тонкимъ войлокомъ; цветоножки вдвое длиннѣ чашечки; всѣ тычинки одинаковыя, съ мохнатыми нитями и почковидными пыльниками (рис. 888). . . . . 5.

2. Стеблевые листья низбегающіе отъ листа до листа, продолговато-эллиптически; 3 верхнія тычинки съ бѣло-мохнатыми нитями и почковидными пыльниками; 2 нижнихъ длиннѣ, съ голыми нитями и косыми пыльниками, б. м. низбегающими. . . . . 3.

Стеблевые листья коротко-низбегающіе, острые, городковые. . . . . 4.

4. Вѣчикъ ворончато-углубленный; 2 болѣе длинныя тычинки почти вчетверо длиннѣ своихъ коротко-низбегающихъ пыльниковъ; рыльце головчатое, не низбегающее. . . . . медвѣжье ухо — *V. Thapsus* L.

Вѣчикъ колесовидный, съ плоскимъ отгибомъ; 2 болѣе длинныя тычинки въ 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—2 раза длиннѣ пыльниковъ; сильно низбегающихъ; рыльце косое, низбегающее на столбикъ. . . . .

царскій скипетръ—*V. thapsiforme* Schrad. <sup>3)</sup>.

4. Цветоножки короче чашечки; 3 верхнія тычинки съ бѣло-мохнатыми нитями и почковидными пыльниками; 2 нижнихъ длиннѣ, съ голыми нитями и косыми пыльниками; рыльце косое, низбегающее; нижніе листья эллиптически-ланцетные, къ основанію постепенно суженные; средніе продолговато-яйцевидные, сидячіе, съ округлымъ или слегка сердцевиднымъ основаніемъ. . . . . золотниковый к.—*V. phlomoides* L. <sup>4)</sup>.

Цветоножки при разцвѣтаніи равны чашечкѣ; всѣ тычинки одинаковыя, съ малиново-мохнатыми нитями и почковидными пыльниками; рыльце головчатое; листья продолговатые. . . . .

холмовой к. — *V. collinum* Schrad. <sup>5)</sup>

5 (1). Стебель сверху и цветоносы округлые; всѣ листья городковые, снизу слегка шерстистые; верхніе почти сердцевидные; средніе яйцевидные, коротко-черешковые; нижніе—яйцевидно-продолговатые, суженные въ черешокъ, при основаніи тупые или слегка сердцевидные. . . . .

восточный к.—*V. orientale* M. B. <sup>6)</sup>.

1) По Окъ—Серпуховъ, Лужки; прежде указывалось подъ Москвою.

2) По Окъ—между Лужками и Зибровымъ Серпуховскаго уѣзда; Бѣлые Колодези—Коломенскаго.

3) Въ прежнее время въ Рузскомъ уѣздѣ.

4) Отъ прежняго времени въ гербаріи Максимовича.

5) Подъ Москвою—между Никольскимъ и Елизаветинымъ.

6) На берегу Протвы—Протвинскій хуторъ, Можайскаго уѣзда.

Стебель вверх и цветоносы остро-ребристые, съ короткимъ сѣрымъ войлокомъ, какъ и на листьяхъ снизу, перовно-городчато-пильчатыхъ . . 6.

6. Продолговатая кисть не вѣтвистая; тычинки съ малиново-мохнатыми нитями; рыльце полулунное (рис. 888); листья продолговато-яйцевидные, темно-зеленые: нижніе съ довольно длинными черешками и сердцевиднымъ основаніемъ; верхніе съ округлымъ основаніемъ . . . . .

черный к.—*V. nigrum* L.

Кисть метельчато-вѣтвистая; тычинки съ бѣло-мохнатыми нитями; рыльце головчатое; нижніе листья продолговато-эллиптическіе, сужены въ черешокъ; верхніе съ немного суженнымъ основаніемъ, яйцевидно-ланцетные.

свѣтильничный к.—*V. Lychnitis* L. <sup>1)</sup>.



(Рис. 888).



(Рис. 889).

#### 472. *Veronica* L.—вероника.

1. Цвѣтки въ пазухѣ мелкихъ прицвѣтничковъ, рѣзко отличныхъ по формѣ и величинѣ отъ стеблевыхъ листьевъ, сучены въ настоящія или колосовидныя кисти на длинныхъ, обособленныхъ цветоносахъ . . . . . 2.

Цвѣтки въ пазухѣ верхнихъ листьевъ, постепенно переходящихъ въ стеблевые листья, не образуютъ настоящей кисти; вѣничикъ маленький, колесовидный, съ трубкою очень короткою—короче ея поперечника; мелкія травки . . . . . 13.

2. Кисти пазушныя; вѣничикъ колесовидный,—трубка вѣника очень короткая (рис. 889, а) . . . . . 3.

Кисть верхушечная или кромѣ того нѣсколько пазушныхъ; трубка вѣника длиннѣе ея ширины, почти съ чашечку; коробочка округло-овальная, слегка выемчатая и немного вздутая . . . . . 10.

3. Чашечка 4-раздѣльная . . . . . 4.

Чашечка 5-раздѣльная, съ короткою верхнею (заднею) долею; вѣничикъ вдвое крупнѣе чашечки; коробочка округло-обратно-яйцевидная, остро-выемчатая; стебель и листья пушистые; кисти частыя, со множествомъ цвѣтковъ, выходятъ всегда около верхушки стебля . . . . . 8.

4. Стебель и листья голые или только вверхъ слегка железисто-пушистые . . . . . 5.

Стебель и листья опушенные мягкими, частыми и короткими волосками; коробочка 3-угловая, къ основанію сужена, одинаковой длины и ширины (рис. 889, б) . . . . . 7.

5. Кисти только въ пазухѣ одного изъ супротивныхъ листьевъ, рѣдкія; стебель тонкій, гибкій, стелющийся или приподнимающийся; вѣничикъ вдвое крупнѣе чашечки, съ эллиптическими долями; коробочка сильно сплюснутая,

<sup>1)</sup> По Окъ—въ Серпуховскомъ и Коломенскомъ уѣздахъ.

шире длины, глубоко-выемчатая, 2-лопастная, книзу округленная; цветоножки очень тонкія, нитевидныя, во много разъ длиннѣе прицвѣтничковъ и чашечки; листья узко-линейно-ланцетные, острые, сидячіе, съ раздвинутыми, мелкими, обратными зазубринами . . . . .

щитковая в.—*V. scutellata* L.

Кисти супротивныя, въ пазухѣ обоихъ супротивныхъ листьевъ; стебель толстый, полый, нѣсколько мясистый; вѣнчикъ немного длиннѣе чашечки; коробочки вздутыя, округлыя, слегка выемчатая, голыя, почти равныя чашечкѣ . . . . . 6.

6. Стебель почти 4-гранный; листья сидячіе, полустеблеобъемлющіе, острые, продолговато или линейно-ланцетные; цветоножки въ нѣсколько разъ длиннѣе линейныхъ прицвѣтничковъ и чашечки; вѣнчикъ блѣдно-голубой . . . . . украшающая в.—*V. Anagallis* L.

Стебель почти цилиндрической; листья сужены въ короткій черешокъ, тупые, округлыя или продолговато-овальныя; цветоножки не длиннѣе прицвѣтничковъ; вѣнчикъ голубой . . . . . ключевая в.—*V. Beccabunga* L.

7 (4). Стебель съ 2 рядами частыхъ волосковъ; листья сидячіе, только нижніе коротко-черешковые,—почти тупые, округлы или продолговато-яйцевидные, выемчато-городковые, нѣжныя; кисти супротивныя, довольно рѣдкія; цветоножки немного длиннѣе прицвѣтничковъ и чашечки; коробочка короче чашечки, на краю рѣсничная (рис. 889, b); обыкновенно голубой вѣнчикъ слишкомъ вдвое крупнѣе чашечки . . . дубровка—*V. Chamaedrys* L.

Стебель шершаво-пушистый, вверху слегка железисто-волосистый; листья коротко-черешковые, острые, эллиптическіе или продолговато-обратно-яйцевидные, городчато-пильчатые, нѣсколько жесткіе; кисти б. ч. въ пазухѣ одного только изъ супротивныхъ листьевъ, довольно частыя; цветоножки короче прицвѣтника и чашечки; коробочка немного длиннѣе чашечки, тупо-выемчатая, железисто-пушистая; вѣнчикъ блѣдно-голубой . . . . .

лѣчебная в.—*V. officinalis* L.

8 (3). Стебли тонкіе, приподнимающіеся, съ ланцетными или линейно-ланцетными листьями на короткихъ черешкахъ, съ рѣдкими, крупными зубцами, или же цѣльнокрайніе съ свернутымъ краемъ; покрытая листьями верхушка плодороднаго стебля вытягивается, разрастается и пригибается къ землѣ . . . . . распростертая в.—*V. prostrata* L. <sup>1)</sup>.

Стебли плотные, прямые или дугою восходящіе только у основанія, съ листьями сидячими или суженными въ короткій черешокъ . . . . . 9.

9. Листья сужены въ короткій черешокъ, перисто-раздѣльные и въ очертаніи ланцетные, или многораздѣльные и въ очертаніи яйцевидные, съ ланцетными или линейными долями; кисти довольно короткія . . . . .

австрійская в.—*V. austriaca* L. <sup>2)</sup>.

Стеблевые листья сидячіе, яйцевидные или продолговатые, при основаніи слегка сердцевидные, неравно и часто почти удвоенно-выемчато-зубчатые, на краю б. ч. плоскіе; кисти вытянутыя . . . . .

змѣиная головка—*V. latifolia* L.

10 (2). Листья городчато-пильчатые, къ верхушкѣ цѣльнокрайніе; верхніе острые; нижніе тупые и всѣ супротивныя, продолговато-овальныя или

<sup>1)</sup> Подъ Москвою—Симоновъ монастырь, Куково; по Окѣ—Лужки, Серпуховскаго уѣзда.

<sup>2)</sup> Въ прежнее время около Гореновъ.

ланцетные; стебель б. ч. только обь 1 верхушечной кисти, плотной, длинной, колосовидной; цветоножки много короче пушистой чашечки съ ланцетными долями; коробочка пушистая, немного короче чашечки; вѣничикъ съ продолговатыми долями; стебель и листья обыкновенно съ пушкомъ или войлокомъ . . . . . 11.

Листья до самой верхушки 2-ко-перавно и остро-пильчатые, тонко-заостренные, по 3 - 4 въ мутовкѣ, рѣже супротивные, продолговато или линейно-ланцетные; колосовидная верхушечная кисть, обыкновенно съ нѣсколькими боковыми, плотными кистями; коробочки голыя, превышаютъ чашечку . . . . . 12.

11. Стебель и листья обыкновенно покрыты тонкимъ сѣроватымъ пушкомъ; всѣ прицвѣтники линейно-шиловидные, доходятъ до верхушки чашечки . . . . . Андреевъ крестъ—*V. spicata* L. <sup>1)</sup>.

Стебель и листья обыкновенно покрыты бѣлымъ или сѣрымъ войлокомъ; нижніе прицвѣтники ланцетные, б. ч. заходятъ за верхушку чашечки; верхніе—линейно-шиловидные, почти доходятъ до нея . . . . .

сѣрая в.—*V. incana* L. <sup>2)</sup>.

12. Кисти со скученными цвѣтками, почти колосовидныя; прицвѣтники линейно-шиловидные, длиннѣе цветоножки, доходятъ до верхушки чашечки; цветоножки не длиннѣе чашечки, съ ланцетными острыми долями; вѣничикъ съ овальными долями . . . . . длиннолистная в.—*V. longifolia* L.

Кисти не густыя, съ цвѣтками раздвинутыми, метельчато-расположенныя; прицвѣтники линейно-ланцетные, не длиннѣе цветоножки, которая нѣсколько длиннѣе чашечки, съ линейно-продолговатыми долями; вѣничикъ съ округло-овальными долями . . . . . ненастоящая в.—*V. spuria* L. <sup>3)</sup>.

13 (1). Всѣ листья цѣльные—цѣльнокрайніе или зубчатые . . . . . 14.

Средніе листья перисто-раздѣльные, постепенно переходящіе въ верхніе 3-раздѣльные и самыя верхніе—цѣльнокрайніе; железисто-пушистыя, вѣтвистыя травки съ нижними листьями черешковыми, городковыми; коробочки съ тупою выемкою . . . . . 16.

14. Стебель съ лежачими вѣтвями; всѣ листья черешковые, продолговато-яйцевидные, городчато-пильчатые, желтовато-зеленые, пушистые; верхніе листья не отличаются отъ остальныхъ; цветоножки длиннѣе листьевъ; плодонѣжки дугою согнутыя; доли чашечки продолговато-яйцевидныя, тупыя, длиннѣе вѣничика; коробочки округлыя, вздутыя, остро-выемчатыя, со столбикомъ не выдающимся изъ выемки; сѣмена ладьевидныя, морщинистыя . . . . .

пахенная в.—*V. agréstis* L. <sup>4)</sup>

Стебель съ прямыми или снизу поднимающимися вѣтвями; только нижніе листья сужены въ короткій черешокъ; остальные — сидячіе; верхніе меньше и уже остальныхъ, продолговато-ланцетные, цѣльнокрайніе; сѣмена плоско-выпуклыя, гладкія . . . . . 15.

15. Вѣничикъ крупнѣе чашечки; стебель и листья почти голые или только вверху съ рѣдкими, короткими волосками; нижніе листья округлыя; средніе—яйцевидно-продолговатыя, тупыя; цветоножки нѣсколько длиннѣе

<sup>1)</sup> Въ Звенигородскомъ уездѣ: Звенигородъ, Денисьево, Архангельское, Луцкое, Барвиха.

<sup>2)</sup> По Окъ—Серпуховскаго уѣзда.

<sup>3)</sup> По Окъ—Лужки, Серпуховскаго уѣзда; Протопопово—Коломенскаго.

<sup>4)</sup> Разсыянно и рѣдко.

чашечки, съ яйцевидными тупыми долями; коробочки поперечно-овальные, шире своей длины, тупо-выемчатая, немного сплюснутая, съ железистыми рёсничками; столбикъ длиною почти съ коробочку . . . . .

тимьянолистная в.—*V. serpyllifolia* L.

Вѣнчикъ очень маленький, короче чашечки; стебель и листья пушистые; стебель съ прямыми вѣтвями, книзу 2-рядно-волосистый; листья сердцевидно-яйцевидные, тупые, городчато-пильчатые о 3 жилкахъ; цвѣтоножки слишкомъ вдвое короче чашечки, съ ланцетными тупыми долями; коробочки почти одинаковой длины и ширины, глубоко-остро-выемчатая, сплюснутая, рёсничная, короче чашечки; столбикъ нѣсколько выдается изъ выемки. . . . .

полевая в.—*V. arvensis* L. <sup>1)</sup>.


16 (13). Свѣтло-зеленая травка; нижніе листья обратно-яйцевидные; средніе у основанія клиновидные, о 5 - 7 линейно-продолговатыхъ доляхъ; верхушечные листья ланцетно-линейные; вѣнчикъ почти вдвое меньше чашечки; цвѣтоножки короче чашечки съ ланцетно-линейными долями; коробочка шире длины, у основанія клиновидная; столбикъ не длиннѣе выемки коробочки; сѣмена плоско-выпуклыя . . . . . весенняя в.—*V. verna* L.

Темно-зеленая травка; нижніе листья яйцевидно-округлые; средніе и верхніе сидячіе, пальчато 3 - 5 раздѣльные, съ продолговатыми или ланцетными долями; верхушечные листья глубоко-3-раздѣльные и только самые верхніе цѣльные; вѣнчикъ немного меньше чашечки; цвѣтоножки длиннѣе верхнихъ листьевъ и чашечки, съ продолговатыми пушистыми долями; коробочка округлая, у основанія вздутая, вверху сплюснутая; столбикъ немного выдается изъ выемки коробочки; сѣмена ладьевидныя . . . . .

трилистная в.—*V. triphyllos* L. <sup>2)</sup>.

#### 473. *Viburnum* L.—калина.

а. Вѣтви и листовые черешки голые; листья 3 - 5-лопастные, сверху почти голые, снизу пушистые, зеленые; лопасти заостренныя, крупнозубчатая; листовые черешки длинные, съ железистыми бородавками; прилистники въ видѣ щетинокъ; щитковидный полужонтикъ рѣдкій, голый; вѣнчикъ у срединныхъ цвѣтковъ колокольчатый, правильный (рис. 890, а); у наружныхъ—безполыхъ, колесовидный, лучистый (рис. 890); ягоды овальные, яркокрасныя . . . . .



(Рис. 890).

. . . . . калина—*V. Opulus* L.

б. Молодые вѣтви, листовые черешки, цвѣтоножки и исподъ листьевъ покрыты сѣровато-бѣлымъ звѣздчатымъ войлокомъ; листья овальные, острые, пильчато-закзубренныя, съ морщинистыми жилками; листовые черешки короткіе, безъ железокъ; прилистниковъ нѣтъ; щитковидный полужонтикъ частый; всѣ цвѣтки плодущіе, съ вѣнчикомъ правильнымъ, колокольчато-колесовиднымъ; ягоды яйцевидныя, сплюснутыя, ярко-красныя, потомъ черныя. . . . .

. . . . . гордовина—\* *V. Lantana* L.

#### 474. *Vicia* L.—горошки.


1. Цвѣтки по 2 - 5 въ очень короткихъ кистяхъ или по 1 - 2 въ пазухѣ листьевъ; столбикъ снаружи бородачатый (рис. 891, б) . . . . . 2.

1) Разсѣянно и рѣдко.


2) Отъ прежняго времени въ гербаріи Максимовича.

Цвѣтки въ густыхъ кистяхъ на длинныхъ цвѣтоносахъ; столбикъ кругомъ волосистый, безъ бородки (рис. 891, а); бобъ на ножкѣ, нерѣдко выдающейся изъ чашечки . . . . . 5.

2. Листовые черешки заканчиваются нитевиднымъ остріемъ; листья о 2 - 3 парахъ крупныхъ, голыхъ, эллиптическихъ, тупыхъ листочковъ; стебель ребристый, прямой, нѣсколько мясистый; лепестки бѣлые; крылья съ темнымъ пятномъ; зубцы чашечки неровные (рис. 892—f, а); нижніе равны трубкѣ чашечки, 2 верхнихъ много короче и сходятся верхушкою; бобъ торчащій, вздутый, почти цилиндрический, пушистый, съ толстыми и кожистыми стѣнками и губчатыми поперечными перегородками; сѣмена сплюснутыя, съ рубчикомъ на концѣ . . . . . русскіе бобы—\* *V. Faba* L.



(Рис. 891).



(Рис. 892).

Листья заканчиваются усикомъ, о 5 - 7 парахъ листочковъ, б. м. опушенныхъ; стебель слабый, цѣпкій; цвѣтки лиловые или малиновые; бобъ сплюснутый, безъ губчатыхъ перегородокъ; сѣмена округлая, почти шаровидныя, съ боковымъ рубчикомъ . . . . . 3.

3. Короткія кисти о 2 - 5 цвѣткахъ съ грязно-лиловымъ вѣнчикомъ; зубцы чашечки короче ея трубки, 3-угольные, тупо-заостренные, неравные; верхніе короче нижнихъ и сходятся верхушкою; листочки яйцевидно-продолговатые, тупые; бобъ продолговатый, — зрѣлый голый, черный . . . . . изгородный г.—*V. sepium* L.

Цвѣтки по 1 - 2 въ пазухѣ листьевъ; зубцы чашечки довольно ровные, длиною почти съ чашечную трубку, ланцетно-шпатовидные, прямые . . 4.

4. Листочки обратно-яйцевидные или продолговато-линейные, выемчатые на верхушкѣ или усѣченные; вѣнчикъ пестрый; флагъ голубой, крылья малиновые, лодочка бѣловатая; бобы косо-торчащіе, продолговатые, нѣсколько бугорчатые, пушистые; зрѣлые—буроватые . . . . . вика—*V. sativa* L.

Только листочки нижнихъ листьевъ обратно-яйцевидные, выемчатые; у верхнихъ листьевъ—линейно-продолговатые или линейные; вѣнчикъ малиновый, бобы отклонены отъ стебля, продолговато-линейные, или линейные, гладкіе, голые; зрѣлые—черные . . . узколистый г.—*V. angustifolia* Roth

5 (1). Листочки продолговато-линейные или ланцетные, прижато-пушистые; прилистники цѣльнокрайніе, полустрѣловидные; кисти длиннѣ листа; бобы продолговато-линейные; зрѣлые—бурые . . . . . 6.

Листочки округло или продолговато-яйцевидные . . . . . 7.

6. Отгиб паруса длиною съ ноготокъ; цвѣтки сине-лиловые въ частой кисти, немного длиннѣ листа; черешокъ боба короче чашечной трубки; рубчикъ огибаетъ  $\frac{1}{3}$  окружности сѣмени; листочковъ 18 - 20 въ листѣ, продолговато-ланцетныхъ или линейныхъ, съ боковыми жилками, отходящими подь очень острымъ угломъ; боковые края листьевъ выпуклые . . . . .

мышинный г.—*V. Cracca* L.

Отгибъ паруса вдвое длиннѣ ноготка; цвѣтки красно-лиловые, въ одной бокой кисти, много длиннѣ листа; черешокъ боба такой же длины, какъ чашечная трубка; рубчикъ огибаетъ  $\frac{1}{4}$  окружности сѣмени; листочковъ 20 - 24, линейно-ланцетныхъ, съ боковыми краями, почти параллельными.


. . . . . тонколиственный г.—*V. tenuifolia* Roth 1).

7. Нижняя пара листочковъ прижата къ стеблю, крупнѣ остальныхъ и накрываетъ прилистники полустрѣловидные и крупно-зубчатые; листья о 3 - 5 парахъ округло-яйцевидныхъ листочковъ; кисть немного короче листьевъ, съ цвѣтками свѣтло-желтыми; зрѣлые бобы бурые, продолговатые . . . . . гороховидный г.—*V. pisiformis* L. 2).

Нижняя пара листочковъ отодвинута отъ стебля; въ листьяхъ не менѣ 6 паръ листочковъ; цвѣтки лиловые . . . . . 8.

8. Стебель и листья голые; листья о 12 - 20 продолговато-яйцевидныхъ листочкахъ; прилистники полудлинные, надрѣзочно-остро-зубчатые, съ заостренными въ щитину зубцами; кисть длиннѣ листьевъ; вѣничикъ бѣловато-лиловый; зрѣлые бобы черные, продолговатые . . . лесной г.—*V. silvatica* L.

Стебель и листья пушистые; листья о 18 - 24 продолговатыхъ листочкахъ; прилистники полустрѣловидные, цѣльнокрайніе; кисть короче листьевъ; вѣничикъ красно-лиловый; зрѣлые бобы бурые, почти ромбическіе . . . кассубскій г.—*V. cassubica* L. 3).



(Рис. 893).



(Рис. 894).

475. † *Vinca* L.—барвинки. Стебель вѣтвистый, лежащій и укореняющійся; вѣтви, несущія цвѣтки, торчащія; листья эллиптическіе или ланцетные, острые, голые, сверху лоснящіеся; вверху короткаго листового черешка по железкѣ съ каждой стороны; доли чашечки ланцетныя, туповатая, голыя

1) 2) Бѣлые Колодези на Окъ—Коломенскаго уѣзда.

3) Между Быковымъ и Михневымъ, Бронницкаго уѣзда.



(рис. 893), въ нѣсколько разъ короче трубки вѣчника съ косо - усѣченными, тупыми долями его отгиба (а) . . . . .

(малый) барвинокъ —† *V. minor* L.

**476. Vincetòxicum** Moench — ласточкин. Корневище ползучее; стебель прямой, вверху часто изгибающийся, б. ч. простой; междоузлія его съ одной стороны пушистыя; листья коротко-черешковые, по жилкамъ и по краямъ пушистыя, цѣльнокрайніе, заостренные, съ округлымъ или почти сердцевиднымъ основаніемъ: нижніе—яйцевидные, средніе—яйцевидно-ланцетные, верхніе—ланцетные; полузонттики б. ч. короче листового черешка; мѣшечки продолговато-конические, заостренные, голые (рис. 894) . . . . .

(лѣчебный) ласточкинъ—*V. officinale* Moench

**477. Viola** L.—фіалки.

1. Всѣ листья корневыя, на длинныхъ черешкахъ; цвѣтки въ пазухъ корневыхъ листьевъ на длинныхъ цвѣтоножкахъ о 2 линейныхъ прицвѣтникахъ; чашелистики на верхушкѣ округленные . . . . . 2.

Цвѣтки въ пазухъ стеблевыхъ, иногда также и корневыхъ листьевъ; чашелистики острые или заостренные (рис. 895—а, с) . . . . . 7.

2. Листья безъ пушка; рыльце прилягнутое, косое; плодоножка торчащая, къ верхушкѣ согнутая крючкомъ; коробочка повислая, 3 - гранная, голая . . . . . 3.

Листья коротко-пушистыя; рыльце согнуто крючкомъ; плодоножка стелющаяся, на верхушкѣ не согнутая; коробочка шаровидная, пушистая; прилистники бахромчатые . . . . . 5.

3. Листья пальчато-городковые, на зубцахъ съ бурыми железками, сердце-яйцевидные, съ крылатыми черешками; прилистники яйцевидно-ланцетные, железисто-зубчатые, до половины приросшіе къ листовымъ черешкамъ; чашелистики нѣсколько острые, яйцевидные; лепестки продолговато-обратно-яйцевидные; средніе при основаніи мѣшеччатые; всѣ темно-лиловые, — нижній съ болѣе темными жилками . . . . .

болотистая ф. — *V. uliginosa* Schrad. <sup>1)</sup>.

Листья съ рѣдкими городками, по краямъ безъ железокъ, съ черешками не крылатыми; прилистники яйцевидные, свободные, заостренные, коротко-бахромчатые или цѣльнокрайніе; чашелистики тупые; средніе лепестки плоскіе . . . . . 4.

4. Листьевъ 2 - 4, всѣ голые, сердце-почковидные, тупые; прицвѣтники обыкновенно сидятъ въ срединѣ цвѣтоножки; шпорецъ прямой, немного длиннѣе округленныхъ придатковъ яйцевидныхъ чашелистиковъ; лепестки обратно - яйцевидные, блѣдно - лиловые . . . . .

болотная ф. — *V. palustris* L.

Листьевъ обыкновенно 2: нижній тупой, верхній заостренный, оба почко или овально-сердцевидные; молодые снизу съ рѣдкими волосками; прицвѣтники сидятъ выше средины цвѣтоножки; шпорецъ изогнутый, почти равенъ усѣченнымъ придаткамъ продолговатыхъ чашелистиковъ; лепестки продолговато-обратно-яйцевидные . . . . . : голая ф.—*V. epipsila* Led.

5 (2). Прилистники узко-ланцетные, длинно и тонко - заостренные, съ длинными и частыми бахромками, длина коихъ превышаетъ ширину прилистниковъ, усѣженныхъ, какъ и бахромки, волосками; листья свѣтло-

<sup>1)</sup> Бѣлопесочная слобода, на Окѣ—Серпуховскаго уѣзда, въ болотѣ.


зеленые, съ мягкимъ пушкомъ; цвѣтки блѣдно-лиловые, съ бѣловатымъ шпорцемъ, душистые. . . . . холмовая ф.—*V. collina* Bess. <sup>1)</sup>).

Прилистники яйцевидно-ланцетные, острые, по краямъ съ толстыми и короткими бахромками, длина коихъ менѣе половины ширины прилистниковъ, не покрытыхъ волосками. . . . . 6.

6. Листья сѣро-зеленые, съ оттопыренными, коротко-шершавыми волосками; корневище не ползучее, безъ надземныхъ побѣговъ; всѣ лепестки выемчатые; вѣничикъ блѣдно-лиловый, безъ запаха. . . . . опушенная ф.—*V. hirta* L.

Листья зеленые, коротко-пушистые; корневище ползучее, съ длинными, стелющимися надземными побѣгами; нижній лепестокъ на верхушкѣ выемчатый, 4 верхнихъ съ округлою верхушкою; вѣничикъ темно-лиловый, душистый. . . . . душистая ф.—†*V. odorata* L. <sup>2)</sup>).

7 (1). Прилистники лировидно-перисто-раздѣльные, большіе, съ болѣе крупною верхушечною долею, городковою; вѣничикъ 2-3 цвѣтный; шпорецъ вдвое длиннѣе придатковъ чашелистиковъ; 4 верхнихъ лепестка приподняты и черепичато перекрываютъ (рис. 895, а); нижній и боковые при основаніи бороздчатые; столбикъ утолщенъ булавовидно; рыльце почти шаровидное, покое, сбоку съ отверстіемъ (b), при основаніи съ 2 пучками волосковъ; листья городковые: нижніе сердце-яйцевидные; верхніе — продолговато-эллиптические или ланцетные. . . . . Анютины глазки—*V. tricolor* L.



(Рис. 895).



(Рис. 896).

Прилистники цѣльные; вѣничикъ одноцвѣтный; боковые лепестки растопыренные или наклоненные; нижній лепестокъ голый, боковые при основаніи бороздчатые; столбикъ вверху мало утолщенъ, книзу суженъ и перетянутъ; рыльце загнуто крючкомъ. . . . . 8.

8. Листовые черешки и стебель съ 1 рядомъ волосковъ; прилистники цѣльнокрайніе или слегка выемчато-зубчатые, только верхніе рѣсничные, — всѣ крупныя, яйцевидно-ланцетные; листья широко-сердцевидные, на верхушкѣ коротко-заостренные, снизу вдоль жилокъ съ рѣдкими волосками; корневище толстое, деревянистое, съ бурыми чешуйчатыми листьями; чашелистики крупныя, ланцетные (рис. 896, а); шпорецъ длиннѣе ихъ придатковъ; лепестки свѣтло-лиловые, душистые; цвѣтки въ пазухѣ корневыхъ

<sup>1)</sup> Подъ Москвою—Воробьевы горы, Кунцево.

<sup>2)</sup> Одичалое—въ Нескучномъ саду, Петровскомъ-Разумовскомъ.

листья безплодные, съ развитымъ вѣнчикомъ; въ пазухѣ стеблевыхъ— безлепестные, но плодучіе (рис. 896—а, b) . . . . .

удивительная ф.—*V. mirabilis* L.

Листовые черешки голые или пушистые, какъ и стебель; прилистники бахромчато-зубчатые; корневище безъ бурыхъ чешуйчатыхъ листьевъ; цвѣтки безъ запаха . . . . . 9.

9. Прилистники крупные, схожіе съ листьями: верхніе не короче крылатыхъ листовыхъ черешковъ; листья продолговато-ланцетные, съ боковыми краями, почти параллельными; коробочка острая . . . . . 10.

Прилистники мелкіе, не похожи на листья, и всѣ много короче не крылатыхъ черешковъ листа; листья въ срединѣ расширены . . . . . 11.

10. Стебель коротко-пушистый, какъ и листья,—при основаніи сердцевидные или усѣченные; средніе прилистники длиною съ черешкомъ листа; верхніе много длиннѣе; цвѣтки свѣтло-голубые, крупные . . . . .

высокая ф.—*V. elatior* Fr. <sup>1)</sup>.

Стебель голый, какъ и листья, — при основаніи клиновидно-суженные; средніе прилистники вдвое короче листового черешка; верхніе — столь же длинные или длиннѣе; цвѣтки молочно-бѣлые . . . . .

прудовая ф.—*V. stagnina* Kit. <sup>2)</sup>.

11. Стебель безъ розетки корневыхъ листьевъ; листья продолговато-яйцевидные,—верхніе островатые; чашелистики яйцевидно ланцетные; шпорецъ вдвое длиннѣе ихъ придатковъ, бѣловатый или желтоватый; коробочка тупая, голая, почти цилиндричная, съ острымъ носикомъ . . . . .

дикая ф.—*V. canina* L.

Стебель съ розеткою корневыхъ листьевъ, изъ пазухи коихъ выходятъ боковыя вѣтви; листья округлые или яйцевидные, при основаніи почко-сердцевидные; верхніе коротко-заостренные; чашелистики ланцетные; шпорецъ въ 3 - 4 раза длиннѣе ихъ придатковъ; коробочка острая . . . . . 12.

12. Стебель, листья и коробочки коротко-пушистые; стебли короткіе, лежачіе; прилистники овально-продолговатые, бахромчато-зубчатые . . . . .

песчаная ф.—*V. arenaria* DC.

Стебель, листья и коробочки голые; стебли восходящіе, рѣдко лежачіе; прилистники линейно-ланцетные, по краямъ бахромчатые; бахромки не короче ширины прилистниковъ . . . . .

лѣсная ф.—*V. silvestris* Lam.

**478. Viscaria** Roehl. — дремы. Стебель подъ верхними узлами липкій; листья голые, острые, при основаніи рѣсничные по краямъ: нижніе обратно-ланцетные,—верхніе ланцетные или линейные; цвѣтки мутноватые, по 5 - 7 въ супротивныхъ полузонтичныхъ метелкахъ, малиновые, рѣже розовые или бѣлые . . . . . (обыкновенная) дрема—*V. vulgaris* Roehl.

**479. Xanthium** L.—дурнишники.

а. Стебель безъ шиповъ; листья сѣровато-зеленые, коротко и шершаво-пушистые, вверху железистые, при основаніи сердцевидные, округло-3-лопастные, съ острыми, крупно и неравно-зубчатыми лопастями, снизу блѣднѣе; плодовая обертка яйцевидная, зеленая, съ желтыми крючковатыми иглами и съ короткими железистыми волосками (рис. 897—с, d). . . . .

зобастый д.—*X. strumarium* L.

<sup>1)</sup> По Окъ—Карапчеево, Бѣлые Колодези, Коломенского уѣзда; между Никитиновымъ и Прилуками—Серпуховскаго.


<sup>2)</sup> Подъ Москвою—между Иванковымъ и Тушинымъ, близъ Захаркова.

**в.** Стебель съ 3-раздѣльными, желтыми шипами, коротко-пушистый; листья яйцевидные, обыкновенно 3 - 5 лопастные, при основаніи почти клиновидные, сверху темнозеленые, снизу съ бѣлымъ войлокомъ; средняя лопасть листа вытянута, продолговато-ланцетная и заостренная; плодовая обертка продолговато-эллиптическая, желто-буроватая, съ крючковатыми иглами и съ короткими, простыми волосками . . . . .

колючій д.—† *X. spinosum* L. <sup>1)</sup>

**480.** *Zannichèllia* L.—занихелія. Стебель тонкій, нитевидный, съ узкими, линейными, прозрачными, 1-нервными листьями, при основаніи расширенными въ прозрачное влагалище; сѣмянки на очень короткой ножкѣ, слегка согнутыя, съ зубчатымъ килемъ на спинѣ, вдвое длиннѣе носика или столбика . . . . . (болотная) занихелія—*Z. palustris* L. <sup>2)</sup>

**481.** \* *Zea* L.—кукурузы. Стебель высокій, толстый, прямой; листья широко-ланцетные, плоскіе, свѣтло-зеленые, по краямъ рѣсничные; язычекъ короткий, съ длинными рѣсничками . . . . . кукуруза—\* *Z. Mays* L.



(Рис. 897).

<sup>1)</sup> Захарково—при мельничной плотинѣ; Архангельское, Звенигородскаго уѣзда.  
<sup>2)</sup> На Клязьмѣ, у Тарасовской плотины.



# Алфавитный перечень русских названій растений.

(Числа означаютъ страницы текста).

- Авраны. *Gratiola* 113.  
 А. (лѣчебный). *G. officinalis* 197.  
 Адокса. *Adoxa* 42.  
 А. (мускусная). *A. Moschatellina* 131.  
 Аиры. *Asorus* 37.  
 А. (тростяной). *A. Calamus* 131.  
 Аистники. *Erodium* 65.  
 А. (веховый). *E. cicutarium* 185.  
 Акалифовыя. *ASALURHACEAE* 10, 17.  
 Акаци. *Caragana* 93.  
 А. древовидная. *C. arborescens* 155.  
     карликовая. *C. pygmaea* 155.  
     кустарная. *C. frutescens* 155.  
 Амарантовыя. *AMARANTACEAE* 16.  
 Амарантъ. *Amarantus* 16.  
 Андреевъ крестъ. *Veronica spicata* 302.  
 Андромеда. *Andromeda* 36.  
 Анютины глазки. *Viola tricolor* 307.  
 Аржанцы. *Phleum* 69.  
 А. Бемеровъ. *Ph. Boehmeri* 239.  
 Аронииковыя. *ARACEAE* 5, 37.  
 Артишоки. *Cynara* 51.  
 Артишокъ. *C. Scolymus* 174.  
 Астрagalъ. *Astragalus* 95.  
 А. песчаный. *A. arenarius* 143.  
     подъязычный. *A. hypoglottis* 143.  
     солодковолистный. *A. glycyphyl-  
         lus* 143.  
 Астры. *Aster* 49.  
 А. (дикая). *A. Amellus* 143.  
 Вагульники. *Ledum* 19.  
 В. (болотный). *L. palustre* 210.  
 Баклажаны. *Lycopersicum* 117.  
 В. (съдобный). *L. esculentum* 218.  
 Балаболка. *Samolus Cervicaria* 153.  
 Бальзаминовыя. *BALSAMINEAE* 20.  
 Баранецъ. *Lycopodium Selago* 218.  
 Барбарисовыя. *BERBERIDEAE* 146.  
 Барбарисы. *Berberis* 18.  
 В. (обыкновенный). *B. vulgaris* 18.  
 Барвинки. *Vinca* 29.  
 В. (малый). *V. minor* 306.  
 Батлачики. *Alopecurus* 68.  
 В. колѣчатый. *A. geniculatus* 134.  
     луговой. *A. pratensis* 134.  
     оранжевый. *A. fulvus* 134.  
     пашенный. *A. agrestis* 134.  
     русскій. *A. ruthenicus* 134.  
 Башмачки. *Cypripedium* 89.  
 Башмачекъ. *C. Calceolus* 175.  
 Бедренцы. *Pimpinella* 127.  
 В. (обыкновенный). *P. Saxifraga* 240.  
 Безкильники. *Atropis* 75.  
 В. (раздвинутый). *A. distans* 144.  
 Белены. *Hyoscyamus* 30, 118.  
 В. (черная). *H. niger* 203.  
 Березовыя. *BETULACEAE* 3, 38.  
 Березы. *Betula* 38.  
 В. бѣлая. *B. alba* 147.  
     гибкая. *B. lenta* 147.  
     карликовая. *B. nana* 147.  
     приземистая. *B. humilis* 147.  
     пушистая. *B. pubescens* 147.  
     тополевая. *B. populifolia* 147.  
 Бересклетовыя. *CELASTRINEAE* 19.  
 Бересклеты. *Evonymus* 19.

- Б. бородавчатый. *E. verrucosus* 187.  
 европейскій. *E. europaeus* 187.  
 Близма. *Blysmus* 61.  
 Б. (сплюснутая). *B. compressus* 148.  
 Бобовникъ. *Amygdalus nana* 136.  
 Богородская трава. *Thymus Serpyllum* 291.  
 Божье-дерево. *Artemisia procera* 141.  
 Божье-дерево. *Thuja occidentalis* 290.  
 Болиголовы. *Conium* 122.  
 Б. (крапчатый). *C. maculatum* 170.  
 Болотниковыя. *Callitricheaceae* 4.  
 Болотники. *Callitriche* 4.  
 Б. осенній. *C. autumnalis* 153.  
 Болотницы. *Elodea* 76.  
 Б. (канадская). *E. canadensis* 182.  
 Болотный верескъ. *Cassandra calyculata* 163.  
 Борецъ (сѣверный). *Aconitum septentrionale* 130.  
 Боровинки. *Ramischia* 97.  
 Б. однобокая. *R. secunda* 254.  
 Бородавники. *Lampsana* 52.  
 Б. (повсемѣстный). *L. communis* 208.  
 Борцы. *Aconitum* 104.  
 Борщевики. *Heracleum* 123.  
 Б. (сибирскій). *H. sibiricum* 198.  
 Боры. *Milium* 71.  
 Б. (развѣсистый). *M. effusum* 224.  
 Боярышники. *Crataegus* 101.  
 Б. колючій. *C. oxyacantha* 172.  
 кровянокрасный. *C. sanguinea* 172.  
 однопестичный. *C. monogyna* 172.  
 шпористый. *C. Crus galli* 172.  
 яркокрасный. *C. coccinea* 172.  
 Бредина. *Salix caprea* 267.  
 Бровники. *Herminium* 91.  
 Б. (одноклубневый). *H. Monorchis* 199.  
 Брусничныя. *Vaccinieae* 31, 128.  
 Брусники. *Vaccinium* 128.  
 Брусника. *Vaccinium Vitis idaea* 298.  
 Брюква. *Brassica Napus* 149.  
 Будры. *Glechoma* 80.  
 Б. (плющевидная). *G. hederacea* 196.  
 Бузины. *Sambucus* 43.  
 Б. красная. *S. racemosa* 269.  
 черная. *S. nigra* 269.  
 Бузульники. *Ligularia* 48.  
 Б. (сибирскій). *L. sibirica* 213.  
 Букашники. *Jasione* 41.  
 Б. (горный). *J. montana* 204.  
 Буквицы. *Betonica* 82.  
 Б. (лѣчебная). *B. officinalis* 146.  
 Буковичники. *Phegopteris* 100.  
 Б. многожковый. *Ph. polypodioides* 238.  
 Буковыя. *Fagaceae* 15.  
 Булдырники. *Cnidium* 123.  
 Бурачки. *Alyssum* 56.  
 Б. горный. *A. montanum* 135.  
 мелкій. *A. minimum* 135.  
 Бурачниковыя. *Borragineae* 27, 39.  
 Бурачники. *Borrago* 40.  
 Бутени. *Chaerophyllum* 124.  
 Б. душистый. *Ch. aromaticum* 165.  
 клубненосный. *Ch. bulbosum* 165.  
 Бухарники. *Holcus* 72.  
 Б. (шерстистый). *H. lanatus* 202.  
 Бѣлоголовка. *Trifolium montanum* 293.  
 Бѣлозоровыя. *Parnassieae* 274.  
 Бѣлозоры. *Parnassia* 24.  
 Б. (болотный). *P. palustris* 235.  
 Бѣлокопытники. *Petasites* 48.  
 Б. лѣчебный. *P. officinalis* 237.  
 ненастоящій. *P. spurius* 237.  
 Бѣлокрыльники. *Calla* 37.  
 Б. (болотный). *C. palustris* 152.  
 Бѣлокудренники. *Ballota* 81.  
 Б. (черный). *B. nigra* 145.  
 Бѣлотаъ. *Salix triandra* 265.  
 Бѣлоусы. *Nardus* 66.  
 Б. (торчащій). *N. stricta* 226.  
 Бѣлоцвѣтъ. *Achillea nobilis* 130.  
 Василистники. *Thalictrum* 105.  
 В. водосборолистный. *Th. aquilegifolium* 289.  
 желтый. *Th. flavum* 290.  
 малый. *Th. minus* 290.  
 простой. *Th. simplex* 289.  
 узколиственный. *Th. angustifolium* 289.  
 Васильки. *Centaurea* 51.  
 В. Биберштейновъ. *C. Biebesteinii* 164.  
 голубой. *C. Cyanus* 164.  
 лиловый. *C. Jacea* 164.  
 фригійскій. *C. Phrygia* 164.  
 чесоточный. *C. Scabiosa* 164.  
 Вахты. *Menyanthes* 64.  
 Верба. *Salix pruinosa* 266.



Вербейники. *Lysimachia* 103.  
 В. (обыкновенный). *L. vulgaris* 219.  
 Вересковые. *Ericaceae* 26.  
 Верески. *Calluna* 26.  
 В. (обыкновенный). *Calluna vulgaris* 153.  
 Вероника. *Veronica* 111.  
 В. австрийская. *V. austriaca* 301.  
   весенняя. *V. verna* 303.  
   длиннолистная. *V. longifolia* 302.  
   ключевая. *V. Beccabunga* 301.  
   лѣчебная. *V. officinalis* 301.  
   ненастоящая. *V. spuria* 302.  
   пашенная. *V. agrestis* 302.  
   полевая. *V. arvensis* 303.  
   распростертая. *V. prostrata* 301.  
   сѣдая. *V. incana* 302.  
   тимьянолистная. *V. serpyllifolia* 303.  
   трилистная. *V. triphyllos* 303.  
   украшающая. *V. Anagallis* 301.  
   щитковая. *V. scutellata* 301.  
 Вертляницы. *Monotropeae* 24.  
 Ветла. *Salix alba* 265.  
 Вехи. *Cicuta* 124.  
 В. (ядовитый). *C. virosa* 167.  
 Вечерницы. *Hesperis* 59.  
 Вечерница. *H. matronalis* 199.  
 Вика. *Vicia sativa* 304.  
 Виноградные. *Ampelideae* 18.  
 Виноградъ дикій. *Ampelopsis quinquefolia* 135.  
 Вишня дикая. *Prunus Chamaecerasus* 252.  
 В. садовая. *P. Cerasus* 252.  
 Водокрасовыя. *Hydrocharideae* 10, 21, 75.  
 Водокрасы. *Hydrocharis* 76.  
 В. (лягушечный). *Hydrocharis Morus ranae* 203.  
 Водолюбы. *Heleocharis* 62.  
 В. болотный. *H. palustris* 198.  
   игольчатый. *H. acicularis* 197.  
   овальный. *H. ovata* 198.  
 Водосборы. *Aquilegia* 106.  
 В. (обыкновенный). *A. vulgaris* 139.  
 Водяная звѣздочка. *Callitriche palustris* 152.  
 Водяная сосенка. *Hippuris vulgaris* 201.

Водяная стрѣла. *Sagittaria sagittifolia* 264.  
 Водяной перецъ. *Elatine Hydropiper* 181.  
 Водяные орѣхи. *Trapa natans* 292.  
 Волдырники. *Cuscuta* 114.  
 В. (ягодный). *C. baccifer* 173.  
 Волкобойникъ. *Aconitum Anthora* 130.  
 Волчье лыко. *Daphne Mezereum* 176.  
 Волчьи ягоды. *Lonicera Xylosteum* 216.  
 Воробейники. *Lithospermum* 39.  
 В. лѣчебный. *L. officinale* 216.  
   полевой. *L. arvense* 216.  
 Воронецъ (колосистый). *Actaea spicata* 131.  
 Ворошій глазъ. *Paris quadrifolia* 234.  
 Воронцы. *Actaea* 104.  
 Ворсянковые. *Dipsaceae* 7, 62.  
 Выпадошная трава. *Senecio paluster* 276.  
 Вьюнки. *Convolvulaceae* 26, 54.  
 Вьюнки. *Convolvulus* 54.  
 В. (полевой). *C. arvensis* 170.  
 Вѣйники. *Сalamagrostis* 70.  
 В. ланцетный. *C. lanceolata* 152.  
   лѣсной. *C. silvatica* 152.  
   наземный. *C. Epigeios* 152.  
   невидный. *C. neglecta* 152.  
 Вѣтреницы. *Anemone* 106.  
 В. дубровная. *A. nemorosa* 137.  
   лѣсная. *A. silvestris* 137.  
   лютиковая. *A. ranunculoides* 137.  
 Вяжечки. *Turritis* 56.  
 В. (голая). *T. glabra* 296.  
 Вязели. *Coronilla* 95.  
 В. (пестрый). *C. varia* 171.  
 Вязовыя. *Ulmaceae* 15.  
 Вязы. *Ulmus* 15.  
 В. горный. *U. montana* 296.  
   черешчатый. *U. pedunculata* 296.  
 Гвоздики. *Dianthus* 115.  
 Г. бородастая. *D. barbatus* 178.  
   картезианская. *D. Carthusianorum* 178.  
   песчаная. *D. arenarius* 178.  
   пышная. *D. superbus* 178.  
   Сегьева. *D. Seguieri* 178.  
 Гераневыя. *Geraniaceae* 23.  
 Гирчи. *Selinum* 123.

- Г. (тмнполистная) *S. Carvifolia* 275.  
 Гирчовники. *Conioselinum* 126.  
 Г. (Фишерова). *C. Fischeri* 170.  
 Гладыши. *Laserpitium* 121.  
 Г. (прусская). *L. prutenicum* 209.  
 Глухая кропива. *Lamium album* 208.  
 Гнѣздовки. *Neottia* 90.  
 Гнѣздовка. *N. Nidus avis* 227.  
 Голопитники. *Psilonema* 56.  
 Г. (чашечный). *P. calycinum* 253.  
 Голубика. *Vaccinium uliginosum* 298.  
 Гордовина. *Viburnum Lantana* 303.  
 Горечь земноводный. *Polygonum amphibium* 246.  
 Г. мелкий. *P. minus* 247.  
     повиличный. *P. Convolvulus* 245.  
     прикустарный. *P. dumetorum* 245.  
     прѣсный. *P. mite* 246.  
     щавелелистный. *P. lapathifolium* 246.  
 Горечавковые. *GENTIANACEAE* 29, 64.  
 Горечавки. *Gentiana* 64.  
 Горицветы. *Lychnis* 114.  
 Горичники. *Peucedanum* 122.  
 Г. болотный. *P. palustre* 237.  
     олений. *P. Cervaria* 237.  
 Горляная трава. *Campanula Trachelium* 154.  
 Горохи. *Pisum* 96.  
 Г. (посѣвный). *P. sativum* 242.  
 Горошки. *Vicia* 96.  
 Г. гороховидный. *V. pisiformis* 305.  
     изгородный. *V. sepium* 304.  
     кассубский. *V. cassubica* 305.  
     лѣсной. *V. silvatica* 305.  
     мышинный. *V. Cracca* 305.  
     тонколиственный. *V. tenuifolia* 305.  
     узколиственный. *V. angustifolia* 304.  
 Горцы. *Polygonum* 98.  
 Горчаки. *Picris* 53.  
 Г. (ястребинковый). *P. hieracioides* 240.  
 Горчицы. *Sinapis* 59.  
 Г. бѣлая. *S. alba* 280.  
     полевая. *S. arvensis* 280.  
 Гравилаты. *Geum* 108.  
 Г. городской. *G. urbanum* 195.  
     ручейный. *G. rivale* 195.  
     средний. *G. intermedium* 195.  
 Г. торчащий. *G. strictum* 195.  
 Гребники. *Cynosurus* 68.  
 Гребникъ. *C. cristatus* 174.  
 Гречихи. *Fagopyrum* 98.  
 Г. (съѣдобная). *F. esculentum* 187.  
 Гречишныя. *POLYGONACEAE* 6, 97.  
 Гроздовики. *Botrychium* 89.  
 Г. виргинский. *B. virginianum* 48.  
     рутовый. *B. rutaefolium* 148.  
 Груши. *Pirus* 100.  
 Груша. *Pirus communis* 241.  
 Грушанковые. *PIROLACEAE* 25, 96.  
 Грушанки. *Pirola* 97.  
 Г. зеленоцвѣтная. *P. chlorantha* 241.  
     круглолистная. *P. rotundifolia* 241.  
     средняя. *P. media* 241.  
     малая. *P. minor*.  
 Грыжники. *Herniaria* 25, 199.  
 Г. (голый). *H. glabra* 199.  
 Губоцвѣтныя. *Labiatae* 27, 78.  
 Гудера. *Goodyera* 91.  
 Г. (ползучая). *G. repens* 196.  
 Гулявники. *Sisymbrium* 57.  
 Г. Лозеліевъ. *S. Loeselii* 281.  
     лѣчебный. *S. officinale* 281.  
     паннонскій. *S. panonicum* 281.  
     стручатый. *S. Sophia* 281.  
     Таліевъ. *S. Thalianum* 280.  
     чесночный. *S. Alliaria* 280.  
 Гусиная лапка. *Potentilla anserina* 249.  
 Гусятники. *Gagea* 84.  
 Г. желтый. *G. lutea* 190.  
     крохотный. *G. pusilla* 190.  
     мелкий. *G. minima* 190.  
 Двуклесточники. *Digraphis* 69.  
 Д. (тростниковый). *D. arundinacea* 179.  
 Девясилы. *Inula* 49.  
 Д. британскій. *I. britannica* 205.  
     иволистный. *I. salicina* 205.  
     опушенный. *I. hirta* 205.  
     подсолнечный. *I. Helenium* 204.  
 Дербенники. *Lythrum* 85.  
 Дербенниковыя. *LYTHRACEAE* 14, 84.  
 Деренныя. *Cornaceae* 19.  
 Дерны. *Cornus* 19.  
 Д. кровавокрасный. *C. sanguinea* 171.  
     поролистный. *C. stolonifera* 171.  
     сибирскій. *C. sibirica* 171.  
 Диваловыя. *SCLERANTHACEAE* 17.

Дивалы. *Scleranthus* 17.  
 Д. (однолѣтняя). *S. annuus* 272.  
 Дикій ленъ. *Linaria vulgaris* 214.  
 Донники. *Melilotus* 94.  
 Д. бѣлый. *M. albus* 223.  
 голубой. *M. coeruleus* 223.  
 лѣчебный. *M. officinaleus* 223.  
 Дремлики. *Epipactis* 90.  
 Д. болотный. *E. palustris* 183.  
 широколистный. *E. latifolia* 183.  
 Дремы. *Viscaria* 115.  
 Д. (обыкновенная). *V. vulgaris* 308.  
 Дроки. *Genista* 93.  
 Д. (красильный). *G. tinctoria* 192.  
 Дуболистникъ. *Phegopteris Dryopteris* 238.  
 Дубровка. *Veronica Chamaedrys* 301.  
 Дубы. *Quercus* 15.  
 Д. (черешчатый). *Q. pedunculata* 254.  
 Дудники. *Angelica* 125.  
 Д. (лѣсной). *A. silvestris* 137.  
 Дурманы. *Datura* 118.  
 Д. (воночій). *D. Stramonium* 176.  
 Дурнышники. *Xanthium* 45.  
 Д. зубастый. *X. strumarium* 308.  
 колючій. *X. spinosum* 309.  
 Душевики. *Calamintha* 80.  
 Душицы. *Origanum* 80.  
 Д. обыкновенная. *O. vulgare* 233.  
 Дымницы. *Fumaria* 64.  
 Д. (лѣчебная). *F. officinalis* 190.  
 Дымничья. *FUMARIACEAE* 13.  
 Дягели. *Archangelica* 125.  
 Д. (цѣлбный). *A. officinalis* 139.  
 Дятлина. *Trifolium pratense* 293.  
 Ежевика. *Rubus caesius* 262.  
 Ежеголовки. *Sparganium* 119.  
 Е. вѣтвистая. *S. ramosum* 283.  
 мелкая. *S. minimum* 283.  
 простая. *S. simplex* 283.  
 Ежи. *Dactylis* 69.  
 Е. (скупенная). *D. glomerata* 175.  
 Ели. *Picea* 33.  
 Е. бѣлая. *P. alba* 240.  
 обыкновенная. *P. vulgaris* 240.  
 Еловые. *AVETINEAE* 3, 33.  
 Жабники. *Filago* 49.  
 Ж. (полевой). *F. arvensis* 188.  
 Жабрей. *Galeopsis Ladanum* 191.

Жабрицы. *Seseli* 123.  
 Ж. (покрашенная). *S. coloratum* 277.  
 Жасминныя. *PHILADELPHACEAE* 9.  
 Жасмины. *Philadelphus* 9.  
 Ж. дикій. *Ph. coronarius* 238.  
 Жгунъ-корень. *Cnidium venosum* 169.  
 Жгучки. *Erucastrum* 59.  
 Ж. (Полихьева). *E. Pollichii* 185.  
 Желтозелье. *Senecio erucaefolius* 276.  
 Желтолозникъ. *Salix purpurea* 265.  
 Желтостебельники. *ANTHOXANTHUM* 69.  
 Желтуха. *Senecio Jacobaea* 276.  
 Желтушники. *Erysimum* 56.  
 Ж. левкойный. *E. cheiranthoides* 186.  
 торчащій. *E. strictum* 186.  
 Желудники. *Aesculus* 75.  
 Желудниковыя. *HIPPOCASTANEAE* 75.  
 Жерухи. *Lepidium* 57.  
 Жерухи. *Nasturtium* 58.  
 Ж. австрійская. *N. austriacum* 227.  
 болотная. *N. palustre* 226.  
 земноводная. *N. amphibium* 227.  
 крупчатая. *Lepidium Draba* 213.  
 лѣсная. *Nasturtium silvestre* 227.  
 посѣвная. *Lepidium sativum* 212.  
 равнинная. *L. campestre* 212.  
 сомнительная. *Nasturtium anceps* 227.  
 Жестерь. *Rhamnus cathartica* 258.  
 Живокости. *Delphinium* 104.  
 Ж. высокая. *D. elatum* 177.  
 затыжная. *D. Consolida* 177.  
 Живучки. *Ajaga* 79.  
 Ж. женеvская. *A. genevensis* 132.  
 ползучая. *A. reptans* 132.  
 Жимолостныя. *CAPRIFOLIACEAE* 31, 42.  
 Жимолости. *Lonicera* 43.  
 Ж. голубая. *L. coerulea* 216.  
 татарская. *L. tatarica* 216.  
 Жминды. *Blitum* 44.  
 Ж. головчатая. *B. capitatum* 148.  
 лозная. *B. virgatum* 148.  
 Журавельниковыя. *GERANIACEAE* 64.  
 Журавельники. *Geranium* 65.  
 Ж. богемскій. *G. bohemicum* 194.  
 болотный. *G. palustre* 194.  
 голубиный. *G. columbinum* 194.

- Ж. кровавокрасный. *G. sanguineum* 194.  
 круглолистный. *G. rotundifolium* 194.  
 луговой. *G. pratense* 194.  
 лѣсной. *G. silvaticum* 194.  
 мягкій. *G. molle* 194.  
 низкій. *G. pusillum* 194.  
 Робертовъ. *G. Robertianum* 193.  
 сибирскій. *G. sibiricum* 194.  
 Занихелія. *Zannichellia* 86.  
 З. (болотная). *Z. palustris* 309.  
 Заразихи. *Orobanchae* 92.  
 З. (порѣзниковая). *O. Libanotidis* 233.  
 ЗАРАЗИХОВЫЯ. *OROBANCHACEAE* 29, 92.  
 Заячья капуста. *Sedum maximum* 275.  
 Звѣздчатки. *Stellaria* 35.  
 З. болотистая. *st. uliginosa* 287.  
 длиннолистная. *St. longifolia* 286.  
 дубровная. *St. nemorum* 286.  
 жестколистная. *St. Holostea* 286.  
 злачная. *St. graminea* 286.  
 сизая. *St. glauca* 286.  
 толстолистная. *St. crassifolia* 287.  
 Звѣрбойныя. *HYPERICINEAE* 11.  
 Звѣрбои. *Hypericum* 11.  
 З. исколотый. *H. perforatum* 203.  
 четырехгранный. *H. quadrangulum* 203.  
 шершавый. *H. hirsutum* 203.  
 Зеленикъ. *Sambucus Ebulus* 269.  
 Зеленчуки. *Galeobdolon* 81.  
 З. (желтый). *G. luteum* 191.  
 Земляники. *Fragaria* 108.  
 Земляника. *F. vesca* 189.  
 Земляные орѣхи. *Filipendula hexapetala* 189.  
 Земляныя груши. *Helianthus tuberosus* 198.  
 Зерновикъ. *Calamintha Acinos* 152.  
 Зимолюбки. *Chimophila* 97.  
 З. (зонтичная). *C. umbellata* 167.  
 Злаки. *GRAMINEAE* 5, 65.  
 Змѣвикъ. *Polygonum Bistorta* 246.  
 Змѣеголовики. *Dracopcephalum* 81.  
 З. Руишневъ. *D. Ruyschiana* 180.  
 тимьяноцвѣтный. *D. thymiflorum* 180.  
 Змѣиная головка. *Veronica latifolia* 301.  
 Золотарники. *Solidago* 49.  
 З. канадскій. *S. canadensis* 282.  
 Золотая розга. *S. virga aurea* 282.  
 Золототысячники. *Erythraea* 64.  
 Золототысячникъ. *E. Centaurium* 186.  
 Зонтичныя. *UMBELLIFERAE* 7, 8, 119.  
 Зопники. *Phlomis* 81.  
 З. (клубненосный). *Ph. tuberosa* 239.  
 Зори. *Levisticum* 122.  
 З. (лѣбечная). *L. officinale* 213.  
 Зубровники. *Beckmannia* 70.  
 Зубровникъ. *B. eruciformis* 145.  
 Зубчатки. *Odontites* 112.  
 З. (красная). *O. rubra* 229.  
 Зюзники. *Lycopus* 78.  
 З. высокій. *L. exaltatus* 219.  
 европейскій. *L. europaeus* 219.  
 Зябра. *Galeopsis versicolor* 191.  
 Иванъ-да-Марья. *Melampyrum nemorosum* 222.  
 Иванъ - чай. *Epilobium angustifolium* 182.  
 Ивовыя. *SALICINEAE* 3, 109.  
 Ивы. *Salix* 110.  
 И. блѣдная. *S. livida* 266.  
 Вейгеліева. *S. Weigelia* 266.  
 длиннолистная. *S. longifolia* 268.  
 лапландская. *S. Lapponum* 266.  
 ломкая. *S. fragilis* 265.  
 пепельная. *S. cinerea* 267.  
 ползучая. *S. repens* 267.  
 ушастая. *S. aurita* 267.  
 черничная. *S. myrtilloides* 266.  
 черноватая. *S. nigricans* 267.  
 Иглицы. *Echinochloa* 70.  
 Иглаца. *E. Crus galli* 180.  
 Икотники. *Berteroa* 55.  
 И. (сѣдой). *B. incana* 146.  
 Инкарнатъ. *Trifolium incarnatum* 293.  
 Ирги. *Amelanchier* 100.  
 И. (обыкновенная). *A. vulgaris* 135.  
 Иссопъ. *Hyssopus* 80.  
 И. (лѣбечный). *H. officinalis* 204.  
 Истодовыя. *POLYGALAE* 13.  
 Истоды. *Polygala* 13.  
 И. горькій. *P. amara* 244.  
 обыкновенный. *P. vulgaris* 244.

И. хохлатый. *P. comosa* 244.  
 Калины. *Viburnum* 43.  
 Калина. *V. Opulus* 303.  
 Калистегія. *Calystegia* 54.  
 К. (заборная). *C. sepium* 153.  
 Калужницы. *Caltha* 106.  
 К. (болотная). *C. palustris* 153.  
 Камелина. *Camelina* 57.  
 К. (зубчатая). *C. dentata* 153.  
 Камнеломковые. *Saxifragaceae* 16,  
 26, 110.  
 Камнеломки. *Saxifraga* 26, 110.  
 Камыши. *Scirpus* 62.  
 К. лѣсной. *S. silvaticus* 272.  
 морской. *S. maritimus* 272.  
 озерный. *S. lacustris* 271.  
 укореняющийся. *S. radicans* 272.  
 Канареечники. *Phalaris* 68.  
 Канареечное сѣмя. *Ph. canariensis* 237.  
 Капусты. *Brassica* 59.  
 К. огородная. *B. oleracea* 149.  
 черная. *B. nigra* 149.  
 Кардонъ. *Cynara Cardunculus* 174.  
 Картофель. *Solanum tuberosum* 281.  
 Касатиковыя. *Iridae* 21, 76.  
 Касатики. *Iris* 77.  
 К. желтый. *I. Pseudacorus* 205.  
 сибирскій. *I. sibirica* 205.  
 Кассандра. *Cassandra* 36.  
 Катаброза. *Catabrosa* 73.  
 К. (водяная). *C. aquatica* 163.  
 Каулинія. *Caulinia* 86.  
 К. (ломкая). *C. fragilis* 163.  
 Качимы. *Gypsophila* 115.  
 К. стѣнной. *G. muralis* 197.  
 метельчатый. *G. paniculata* 197.  
 Каштанъ конскій. *Aesculus Hippocastanum* 131.  
 Кедръ сибирскій. *Pinus Cembra* 240.  
 Келерія. *Koeleria* 69.  
 К. (гребенчатая). *K. cristata* 207.  
 Кервель. *Anthriscus Cerefolium* 138.  
 Кизильники. *Cotoneaster* 100.  
 К. (обыкновенный). *C. vulgaris* 172.  
 Кизляки. *Naumburgia* 103.  
 К. (кистецвѣтный). *N. thyrsoflora* 227.  
 Кипарисовыя. *Cupressineae* 3, 60.  
 Кипрейниковыя. *Onagraceae* 22, 87.

Кипрей. *Epilobium* 88.  
 К. болотный. *E. palustre* 182.  
 горный. *E. montanum* 182.  
 мелкоцвѣтный. *E. parviflorum* 182.  
 мохнатый. *E. hirsutum* 182.  
 розовый. *E. roseum* 182.  
 Кирказоновыя. *Aristolochiaceae* 14,  
 17, 36.  
 Кирказоны. *Aristolochia* 37.  
 К. (ломоносный). *A. Clematidis* 140.  
 Кислицевыя. *Oxalideae* 23.  
 Кислицы. *Oxalis* 23.  
 К. заячья. *O. Acetosella* 234.  
 торчащая. *O. stricta* 234.  
 Кишпецы. *Coriandrum* 125.  
 К. (посѣвный). *C. sativum* 170.  
 Кленовыя. *Acerineae* 19.  
 Клены. *Acer* 19.  
 К. (чинаролистный). *A. platanoides* 129.  
 Клоповникъ. *Lepidium ruderalis* 212.  
 Клопосѣмянники. *Corispermum* 44.  
 К. иссополистный. *C. hyssopifolium* 171.  
 Маршаловъ. *C. Marshallii* 171.  
 Клубники. *Fragaria* 189.  
 К. ананасная. *F. grandiflora* 189.  
 виргинская. *F. virginiana* 189.  
 высокая. *F. elatior* 189.  
 холмовая. *F. collina* 189.  
 Клюквы. *Oxycoccus* 128.  
 К. (болотная). *O. palustris* 234.  
 Ключъ-трава. *Botrychium Lunaria* 148.  
 Ковыли. *Stipa* 71.  
 К. (перистый). *S. pennata* 287.  
 Козельцы. *Scorzonera* 54.  
 К. приземистый. *S. humilis* 273.  
 розовый. *S. purpurea* 272.  
 Козлобородники. *Tragopogon* 54.  
 К. луговой. *T. pratensis* 291.  
 Кокорыши. *Aethusa* 122.  
 Кокушники. *Gymnadenia* 92.  
 К. клубучковый. *G. cucullata* 197.  
 комаровый. *G. conopea* 197.  
 Колдуницы. *Circaea* 87.  
 К. горная. *C. alpina* 168.  
 Колдунъ-трава. *C. lutetiana* 168.

## Колокольчиковые. CAMPANULACEAE

7, 31, 41.

Колокольчики. Campanula 41.

К. болонский. *C. bononiensis* 154.боровой. • *C. rapunculoides* 154.круглолистный. *C. rotundifolia* 154.персиковолистный. *C. persicifolia* 154.раскрытый *C. patula* 155.сибирский. *C. sibirica* 154.широколиственный. *C. latifolia* 154.

Колуферъ. Tanacetum Balsamita 288.

Колчички. Carlina 51.

К. (обыкновенный). *C. vulgaris* 163.

Конопля. Cnababis 42.

К. (посевная). *C. sativa* 155.

Конопляные. CANNABINEAE 4, 17, 42.

К. опытные. Asarum 37.

К. (европейский). *A. europaeum* 141.

Коровяки. Verbascum 111.

К. восточный. *V. orientale* 299.зонниковый. *V. pilomoides* 299.свѣтлышечный. *V. Lychnitis* 300.холмовой. *V. collinum* 299.черный. *V. nigrum* 300.

Короставники. Knautia 63.

К. (полевой). *K. arvensis* 207.

Коротконожки. Brachypodium 68.

К. лѣсная. *B. silvaticum* 148.перистая. *B. pinnaum* 148.

Кортуза. Cortusa 102.

К. (Матіолева). *C. Matthioli* 171.

Костры. Bromus 74.

К. безостный. *B. inermis* 149.кровельный. *B. tectorum* 150.мягкій. *B. mollis* 150.поднятый. *B. erectus* 150.полевой. *B. arvensis* 150.раскрытый. *B. patulus* 150.ржаной. *B. secalinus* 149.шероховатый. *B. asper* 150.

Костяника. Rubus saxatilis 261.

Котовики. Nepeta 80.

К. голый. *N. nuda* 228.кошачій. *N. Cataria* 228.

Кочедыжники. Athyrium 99.

К. (женскій). *A. Filix femina* 143.

Кошачьи лапки. Antennaria 50.

К. (двудомная). *A. dioica* 137.

Крестовники. Senecio 48.

К. болотный. *S. paludosus* 276.клекий. *S. viscosus* 277.лѣсной. *S. silvaticus* 277.обыкновенный. *S. vulgaris* 277.сарацинский. *S. sarracenicus* 275.

Крестоцвѣтныя. CRUCIFERAE 17, 24 55.

Кривоцвѣты. Lycopsis 40.

К. (полевой). *L. arvensis* 219.

Кровохлебка. Sanguisorba 107.

К. (лѣбечная). *S. officinalis* 270.

Кропивыя. URTICACEAE 18.

Кропивы. Urtica 18.

К. двудомная. *U. dioica* 297.жгучая. *U. urens* 296.

Крупки. Draba 55.

К. весенняя. *D. verna* 179.дубровная. *D. nemorosa* 179.

Крушинныя. Rhamnaceae 20.

Крушины. Rhamnus 20.

К. ломкая. *R. Frangula* 258.

Крыжовникъ. Ribes Grossularia 259.

Кубышки. Nuphar 87.

К. желтая. *N. luteum* 229.карликовая. *N. pumilum* 229.

Кувшиковые. NYMPHAEACEAE 12, 86.

Кувшинки. Nymphaea 87.

К. (бѣлая). *N. alba* 229.

Куколи. Githago 114.

К. (нивяная). *G. segetum* 195.

Кукурузы. Zea 66.

Кукуруза. Z. Mays 309.

Кукушкинъ цвѣтъ. Lychnis flos  
cuculi 217.Кукушкины слезки. Orchis macu-  
lata 232.

Кульбабы. Leontodon 54.

К. копьелистная. *L. hastilis* 212.осенняя. *L. autumnalis* 212.

Куманика. Rubus fruticosus 262.

Купальницы. Trollius 106.

К. (европейская). *T. europaeus* 295.

Купены. Polygonatum 117.

К. лѣбечная. *P. officinale* 245.многоцвѣтковая. *P. multiflorum* 245.

Купыри. Anthriscus 125.

К. лѣсная. *A. silvestris* 138.

Куропатка. Cypripedium guttatum 175.

Кутровыя. AROSTACEAE 29.

Ладонниковыя. CISTINEAE 12.  
 Ладьяны. Corallorrhiza 91.  
 Л. (приросшій). C. innata 170.  
 Ландыши. Convallaria 117.  
 Л. (майскій). C. majalis 170.  
 Лапчатки. Potentilla 108.  
 Л. бѣлая. P. alba 251.  
     кустарная. P. fruticosa 249.  
     лежащая. P. supina 250.  
     норвежская. P. norvegica 250.  
     пенельная. P. cinerea 251.  
     ползучая. P. reptans 249.  
     прямая. P. recta 250.  
     семилисточковая. P. heptaphylla 250.  
     серебристая. P. argentea 251.  
     средняя. P. intermedia 250.  
     тусклая. P. opaca 251.  
     холмовая. P. collina 251.  
 Ластовниковыя. ASCLEPIADEAE 28.  
 Ласточки. Vincetoxicum 28.  
 Л. (лѣтебный). V. officinale 306.  
 Лебеды. Atriplex 44.  
 Л. копьелистная. A. hastatum 144.  
     лоснящаяся. A. nitens 144.  
     мелкая. Chenopodium polyspermum 166.  
     раскидистая. Atriplex patulum 144.  
     садовая. A. hortense 144.  
     свиная. Chenopodium hybridum 166.  
 Ленъ желтый. Linum flavum 215.  
 Л. слабительный. L. catharticum 214.  
     уотребительный. L. usitatissimum 215.  
 Лерсія. Leersia 71.  
 Лещины. Corylus 38.  
 Лилейныя. LILIACEAE 22, 83.  
 Лилии. Lilium 84.  
 Линнея. Linnaea 43.  
 Л. (сѣверная). L. borealis 214.  
 Липовыя. TILIACEAE 9.  
 Липы. Tilia 9.  
 Л. мелколистная. T. parvifolia 291.  
     широколистная. T. platyphylla 291.  
 Липучки. Echinosperrum 40.  
 Л. (репейная). E. Lappula 181.  
 Лиственницы. Larix 33.  
 Л. европейская. L. europaea 209.  
     сибирская. L. sibirica 209.  
 Лиція. Lycium 117.

Л. (дикая). L. barbarum 218.  
 Личиночники. Mimulus 113.  
 Л. (желтый). M. luteus 224.  
 Ложечники. Cochlearia 58.  
 Л. лѣтебный. C. officinalis 169.  
 Ложнокаштановыя. HIPPOCASTANEE 18.  
 Лозы. Ampelopsis 18, 135.  
 Лоза. Salix viminalis 268.  
 Ломоносы. Clematis 104.  
 Л. (прямой). C. recta 169.  
 Лопухи. Lappa 50.  
 Л. войлочный. L. tomentosa 209.  
     крупноголовый. L. major 209.  
     мелкоголовый. L. minor 209.  
 Лосняки. Liparis 90.  
 Л. (Лозелиевъ). L. Loeselii 215.  
 Лоховыя. ELAEAGNACEAE 14, 63.  
 Лохи. Elaeagnus 63.  
 Л. (серебристый). E. argenteus 181.  
 Луговики. Deschampsia 72.  
 Л. извилистый. D. flexuosa 177.  
 Луговой чай. Eysimachia Nummularia 219.  
 Лужники. Limosella 114.  
 Л. (водный). L. aquatica 213.  
 Лукъ песчаный. Allium fistulosum 133.  
 Л. рѣпчатый. A. Cera 133.  
 Лунники. Lunaria 58.  
 Л. (многолѣтний). L. rediviva 217.  
 Льны. Linum 23.  
 Льнянки. Linaria 111.  
 Л. малая. Linaria minor 214.  
 Льнянки. Thesium 17, 290.  
 Л. (безприцѣтная). T. ebracteatum 290.  
 Льняныя. LINEAE 23.  
 Любки. Platanthera 91.  
 Л. зеленоцвѣтная. P. chlorantha 243.  
 Лютиковыя. RANUNCULACEAE 12, 103.  
 Лютики. Ranunculus 106.  
 Л. дубровный. R. nemorosus 257.  
     золотистый. R. auricomus 256.  
     илирійскій. R. illyricus 256.  
     кассубскій. R. cassubicus 256.  
     луковичный. R. bulbosus 256.  
     многолистный. R. polyphyllus 255.  
     многоцвѣточный. R. polyanthemus 257.  
     мохнатый. R. lanuginosus 257.



- Л. обвислый. *R. flaccidus* 255.  
 ползучий. *R. repens* 257.  
 растопыренный. *R. divaricatus* 255.  
 ѣдкий. *R. acer* 257.  
 ядовитый. *R. sceleratus* 255.  
 язычковый. *R. Lingua* 255.  
 Лягушечники. *Silybum* 51.  
 Лядвенцы. *Lotus* 95.  
 Л. (рогатый). *L. corniculatus* 217.  
 Лядники. *Hierochloa* 72.  
 Л. (сѣверный). *H. borealis* 201.  
 Маіоранъ. *Origanum Majorana* 233.  
 Маковые. *PARAVERACEAE* 12, 92.  
 Маки. *Rapaver* 93.  
 М. спотворный. *P. somniferum* 235.  
 Малины. *Rubus* 108.  
 Малина. *R. idaeus* 262.  
 М. душистая. *R. odoratus* 261.  
 Маижетки. *Alchemilla* 25, 107.  
 М. (обыкновенная). *A. vulgaris* 132.  
 Маники. *Glyceria* 74.  
 М. плавающий. *G. fluitans* 196.  
 пышный. *G. spectabilis* 196.  
 Маргаритки. *Bellis* 45.  
 М. (многолѣтняя). *B. perennis* 146.  
 Маревыя. *CHENOPODIACEAE* 6, 16, 43.  
 Маренныя. *RUBIACEAE* 7, 30, 109.  
 Мари. *Chenopodium* 44.  
 М. бѣлая. *C. album* 166.  
 воночая. *C. Vulvaria* 166.  
 городская. *C. urbicum* 166.  
 красная. *C. rubrum* 167.  
 курчавая. *C. Botrys* 166.  
 сизая. *C. glaucum* 167.  
 Марьянники. *Melampyrum* 113.  
 М. луговой. *M. pratense* 222.  
 Маслинныя. *OLEACEAE* 2, 27, 87.  
 Маточники. *Cirsium* 52.  
 М. болотный. *C. palustre* 168.  
 ланцетолистный. *C. lanceolatum* 168.  
 огородный. *C. oleraceum* 168.  
 полевой. *C. arvense* 168.  
 разнолистный. *C. heterophyllum* 168.  
 рѣсичный. *C. ciliatum* 169.  
 шерстистый. *C. eriophorum* 169.  
 Маточники. *Ostericum* 124.  
 (болотный). *O. palustre* 234.  
 Мать и мачеха. *Tussilago Farfara* 296.  
 Мауновыя. *VALERIANEAE* 30.  
 Мауны. *Valeriana* 30.  
 М. (лѣчебный). *V. officinalis* 298.  
 Майники. *Majanthemum* 116.  
 М. (двулистный). *M. bifolium* 220.  
 Медвѣжье ухо. *Verbascum Thapsus* 299.  
 Медвѣжья ягода. *Arctostaphylos uva ursi* 139.  
 Медовникъ. *Galeopsis Tetrahit* 191.  
 Медоцвѣтныя. *MELANTHIACEAE* 11.  
 Медуницы. *Pulmonaria* 40.  
 М. лѣчебная. *P. officinalis* 253.  
 узколистная. *P. angustifolia* 253.  
 Медуники. *Medicago* 95.  
 М. серповидная. *M. falcata* 221.  
 хмѣлевая. *M. lupulina* 221.  
 Мелколенестники. *Erigeron* 49.  
 М. канадскій. *E. canadensis* 184.  
 острый. *E. acer* 184.  
 Мерингія. *Moehringia* 35.  
 М. бокоцвѣтная. *M. lateriflora* 225.  
 трехнервная. *M. trinervia* 225.  
 Метлицы. *Apera* 73.  
 Метла. *A. Spica venti* 138.  
 Миндальныя. *AMYGDALAE* 9, 36.  
 Миндали. *Amygdalus* 36.  
 Можжевельники. *Juniperus* 61.  
 М. казачій. *Sabina officinalis* 264.  
 М. (повсемѣстный) *I. communis* 207.  
 Можжуха болотная. *Lycopodium annotinum* 218.  
 Мокрица. *Stellaria media* 286.  
 Мокричники. *Alsine* 35.  
 М. узколистный. *A. tenuifolia* 134.  
 Мокричныя. *ALSINEAE* 23, 34.  
 Молинія. *Molinia* 72.  
 М. (синяя). *M. coerulea* 225.  
 Молодилы. *Sempervivum* 55.  
 М. (отраслистый). *S. soboliferum* 275.  
 Молочай. *Euphorbia* 5, 16.  
 М. болотный. *E. palustris* 187.  
 высокий. *E. procera* 186.  
 лозный. *E. virgata* 186.  
 отѣняющій. *E. Peplus* 187.  
 Молочайныя. *EUPHORBIAEAE* 5, 16.  
 Монція. *Montia* 29, 101.  
 М. (ручейная). *M. rivularis* 225.  
 Моралки. *Chenopodium Bonus Henricus* 166.

Мордовники. *Echinops* 31, 45.  
М. (круглоголовый). *E. sphaerosephalus* 180.

Моркови. *Daucus* 121.

Морковь. *D. Carota* 176.

Морошка. *Rubus Chamaemorus* 261.

Мотыльковые. РАПИОНАСЕАЕ 6, 13, 93.

Мшанки. *Sagina* 35.

М. лежащая. *S. procumbens* 264.

узловатая. *S. nodosa* 264.

Мыльнянки. *Saponaria* 116.

М. (лечебная). *S. officinalis* 270.

Мытники. *Pedicularis* 112.

М. болотный *P. palustris* 236.

хохлатый. *P. comosa* 236.

Мышехвостники. *Myosurus* 105.

М. (мелкий). *M. minimus* 226.

Мягковолосники. *Malachium* 35.

М. (водный). *M. aquaticum* 220.

Мятлики. *Poa* 73.

М. дубровный. *P. nemoralis* 244.

заурядный. *P. trivialis* 243.

луговой. *P. pratensis* 244.

луковичный. *P. bulbosa* 243.

однолѣтний. *P. annua* 243.

поздний. *P. serotina* 244.

сплюснутый. *P. compressa* 243.

судетский. *P. sudetica* 243.

Мята. *Mentha* 79.

М. водная. *M. aquatica* 224.

лѣсная. *M. silvestris* 223.

полевая. *M. arvensis* 223.

Наперстянки. *Digitalis* 113.

Н. (крупноцвѣтная). *D. grandiflora* 178.

Недотрога. *Cardamine impatiens* 155.

Недотроги. *Impatiens* 20.

Н. мелкоцвѣтная. *I. parviflora* 204.

Незабудки. *Myosotis* 41.

Н. болотная. *M. palustris* 225.

дернистая. *M. caespitosa* 226.

лѣсная. *M. silvatica* 226.

рѣдкоцвѣтная. *M. sparsiflora* 226.

средняя. *M. intermedia* 226.

торчащая. *M. stricta* 226.

Неслея. *Neslea* 57.

Н. (метельчатая). *N. paniculata* 228.

Нивяники. *Leucanthemum* 47.

Н. (обыкновенный). *L. vulgare* 213.

Низмянки. *Centunculus* 102.

Н. (мелкая). *C. minimus* 165.

Никандра. *Nicandra* 117.

Н. (можжуховидная). *N. physaloides* 228.

Ноннея. *Nonnea* 40.

Н. (темноцвѣтная). *N. pulla* 229.

Норичниковы. SCROPHULARIACEAE 30, 111.

Норичники. *Scrophularia* 113.

Н. весенний. *S. vernalis* 273.

крылатый. *S. alata* 273.

шишковатый. *S. nodosa* 274.

Облѣпихи. *Hippophaë* 63.

О. (крушинная). *H. rhamnoides* 201.

Овсы. *Avena* 72.

О. венгерский. *A. orientalis* 144.

дикий. *A. fatua* 145.

желтоватый. *A. flavescens* 145.

заячий. *A. pubescens* 145.

луговой. *A. pratensis* 145.

посѣвный. *A. sativa* 145.

Овсяницы. *Festuca* 75.

О. высокая. *F. elatior* 188.

красная. *F. rubra* 188.

лѣсная. *F. silvatica* 188.

овечья. *F. ovina* 188.

рослая. *F. gigantea* 188.

Овсяный корень. *Tragopogon porrifolius* 291.

Огуречная трава. *Borrago officinalis* 148.

Огурцы. *Cucumis* 60.

О. (посѣвный). *C. sativus* 173.

Одноцвѣтки. *Monesis* 97.

О. (крупноцвѣтная). *M. grandiflora* 225.

Одногодники. *Paris* 23, 116.

Одуванчики. *Taraxacum* 53.

О. (лечебный). *T. officinale* 289.

Ожики. *Luzula* 77.

О. волосистая. *L. pilosa* 217.

полевая. *L. campestris* 217.

Околостолбники. *Peristylus* 91.

О. (зеленый). *P. viridis* 236.

Окопники. *Symphytum* 40.

О. колючеострый. *S. asperrimum* 288.

лечебный. *S. officinale* 288.

Окучники. *Peplis* 85.  
 Окучникъ. *P. Portula* 236.  
 Ольх. *Alnus* 38.  
 О. липкая. *A. glutinosa* 134.  
 сѣрая. *A. incana* 133.  
 Омежник. *Oenanthë* 124.  
 Орляки. *Pteridium* 99.  
 Орлякъ. *P. aquilinum* 253.  
 Орѣшина. *uglans* 8.  
 О. сѣрая. *J. cinerea* 205.  
 черная. *J. nigra* 205. \*  
 Орѣшниковыя. *JUGLANDEAE* 8.  
 Орѣшникъ. *Corylus Avellana* 172.  
 Осина. *Populus tremula* 247.  
 Ослиники. *Oenothera* 88.  
 О. (двулѣтній). *O. biennis* 229.  
 Осоки. *SUPERACEAE* 5. 61.  
 Осоки. *Carex* 61.  
 О. береговая. *C. riparia* 163.  
 блѣдная. *C. pallescens* 160.  
 болотная. *C. paludosa* 163.  
 бутыльчатая. *C. ampullacea* 162.  
 бѣловатая. *C. canescens* 158.  
 влагалищная. *C. vaginata* 159.  
 волосистая. *C. pilosa* 159.  
 войлочная. *C. tomentosa* 161.  
 вытянутая. *C. elongata* 158.  
 горная. *C. montana* 160.  
 двудомная. *C. dioica* 156.  
 дернистая. *C. caespitosa* 162.  
 желтая. *C. flava* 161.  
 заячья. *C. leporina* 157.  
 звѣздчатая. *C. stellulata* 158.  
 илистая. *C. limosa* 160.  
 колючая. *C. maricata* 157.  
 круглостебельная. *C. teretiuscula* 157.  
 лисья. *C. vulpina* 157.  
 лѣсная. *C. silvatica* 162.  
 метельчатая. *C. paniculata* 157.  
 нитевидная. *C. filiformis* 161.  
 обыкновенная. *C. vulgaris* 162.  
 опушенная. *C. hirta* 161.  
 острая. *C. acuta* 162.  
 пальчатая. *C. digitata* 159.  
 пилюльная. *C. pilulifera* 160.  
 плевельная. *C. loliacea* 158.  
 просяная. *C. panicea* 159.  
 пузырчатая. *C. vesicaria* 162.

О. пустырная. *C. ericetorum* 160.  
 раздвинутая. *C. remota* 157.  
 ранняя. *C. praecox* 160.  
 спутанная. *C. vitilis* 158.  
 средняя. *C. intermedia* 156.  
 стоповидная. *C. pediformis* 159.  
 странная. *C. paradoxa* 157.  
 сытевидная. *C. Pseudocyperus* 162.  
 тонкокорневая. *C. chordorrhiza* 156.  
 торчащая. *C. stricta* 162.  
 тѣнистая. *C. umbrosa* 161.  
 Шреберова. *C. Schreberi* 157.  
 Эдерова. *C. Oederi* 161.  
 Осокорь. *Populus nigra* 247.  
 Осоты. *Sonchus* 53.  
 О. огородный. *S. oleraceus* 282.  
 полевой. *S. arvensis* 282.  
 шероховатый. *S. asper* 282.  
 Острицы. *Asperugo* 39.  
 О. (лежачая). *A. procumbens* 141.  
 Остро-пестро. *Silybum Marianum* 280.  
 Очанки. *Euphrasia* 112.  
 О. (лѣчебная). *E. officinalis* 187.  
 Очеретники. *Rhynchospora* 62.  
 О. (бѣлый). *R. alba* 259.  
 Очитки. *Sedum* 55.  
 О. бобовый. *S. Fabaria* 274.  
 малиновый. *S. purpureum* 275.  
 ѣдкій. *S. acre* 274.  
 Павія. *Pavia* 75.  
 П. желтая. *P. flava* 235.  
 красная. *P. rubra* 235.  
 Пазники. *Achyrophorus* 54.  
 П. (крапчатый). *A. maculatus* 130.  
 Пальчатка. *Digitaria* 70.  
 П. (голая). *D. glabra* 179.  
 Папоротники. *POLYPODIACEAE* 1, 98.  
 Папоротникъ женскій. *Aspidium Thelypteris* 143.  
 П. мужской. *A. Filix mas* 142.  
 черный. *Onoclea Struthiopteris* 230.  
 Пасленовыя. *SOLANACEAE* 28, 30, 117.  
 Паслены. *Solanum* 117.  
 П. сладкогорькій. *S. Dulcamara* 282.  
 черный. *S. nigrum* 282.  
 Пастернакъ. *Pastinaca* 127.  
 П. (посѣвнй). *P. sativa* 235.  
 Пахучки. *Clinopodium* 80.  
 Пахучка (обыкновенная). *C. vulgare* 169.

- Нахучій колосокъ. *Anthoxanthum odoratum* 138.  
 Нашенницы. *Eryum* 96.  
 П. четырехъсенная. *E. tetraspermum* 185.  
     шершавая. *E. hirsutum* 185.  
 Перелѣски. *Hepatica* 105.  
 П. (трехлопастная). *H. triloba* 198.  
 Переступни. *Bryonia* 60.  
 П. (бѣлый). *B. alba* 151.  
 Перловники. *Melica* 73.  
 П. поникшій. *M. nutans* 222.  
     рослый. *M. altissima* 223.  
 Песчанки. *Arenaria* 35.  
 П. тимьянолистная. *A. serpyllifolia* 139.  
     злаколистная. *A. graminifolia* 140.  
 Петровъ крестъ. *Lathraea Squamaria* 209.  
 Петрушки. *Petroselinum* 126.  
 П. горная. *Peucedanum Oreoselinum* 237.  
     (посѣвная). *Petroselinum sativum* 237.  
     собачья. *Aethusa Cynapium* 131.  
 Пижмы. *Tanacetum* 47.  
 Никульники. *Galeopsis* 82.  
 Пихты. *Abies* 33.  
 П. (сибирская). *A. sibirica* 129.  
 Плакунъ. *Lythrum Salicaria* 219.  
 Плауновыя. *Lycopodiaceae* 2.  
 Плауны. *Lycopodium* 2.  
 П. булабовидный. *L. clavatum* 218.  
     сплюснутый. *L. complanatum* 218.  
 Плевелы. *Lolium* 67.  
 П. опьяняющій. *L. temulentum* 216.  
 Плодокучники. *Symphoricarpos* 43.  
 Повиличныя. *Cuscutae* 26.  
 Повилики. *Cuscuta* 26.  
 П. европейская. *C. europaea* 174.  
     хмѣлевидная. *C. lupuliformis* 174.  
 Повойничковыя. *Elatineae* 25.  
 Повойнички. *Elatine* 25.  
 П. болотникоуый. *E. callitrichoides* 181.  
     мокрищный. *E. Alsinastrum* 181.  
     трехтычиночный. *E. triandra* 181.  
 Поремки. *Rhinanthus* 113.  
 Подбѣлы. *Tussilago* 48.  
 Подбѣлъ. *Andromeda Polifolia* 136.  
 Подѣсеники. *Sanicula* 120.  
 П. (европейскій). *S. europaea* 270.  
 Подмаренники. *Galium* 109.  
 П. болотистый. *G. uliginosum* 192.  
     болотный. *G. palustre* 192.  
     лѣсной. *G. silvaticum* 192.  
     мареповидный. *G. rubioides* 192.  
     мягкій. *G. Mollugo* 192.  
     настоящій. *G. verum* 192.  
     сѣверный. *G. boreale* 192.  
     трехнадрѣзный. *G. trifidum* 192.  
     трехцвѣтковый. *G. triflorum* 191.  
     цѣпкій. *G. Aparine* 191.  
 Подорожничковыя. *Plantagineae* 28.  
 Подорожники. *Plantago* 28, 242.  
 П. большой. *P. major* 242.  
     ланцетный. *P. lanceolata* 242.  
     средній. *P. media* 242.  
 Подсекольникъ. *Amarantus retroflexus* 135.  
 Подсѣжники. *Scilla cernua* 271.  
 Подсолнечники. *Helianthus* 46.  
 Подсолнечникъ. *H. annuus* 198.  
 Подъельпики. *Hypopitys* 24.  
 П. (многоцвѣтковый). *H. multiflora* 204.  
 Полевицы. *Agrostis* 71.  
 П. бѣлая. *A. alba* 132.  
     дикая. *A. canina* 131.  
     обыкновенная. *A. vulgaris* 131.  
 Полевички. *Chamagrostis* 66.  
 П. (мелкая). *Ch. minima* 166.  
 Полыни. *Artemisia* 46.  
 П. (горькая). *A. Absinthium* 140.  
     метельчатая. *A. scoparia* 141.  
     полевая. *A. campestris* 141.  
 Поповники. *Pyrethrum* 47.  
 П. щитковый. *P. corymbosum* 254.  
 Порей. *Allium Porrum* 133.  
 Портулаковыя. *Portulacaceae* 10, 29, 101.  
 Портулаки. *Portulaca* 10, 101.  
 П. (огородный). *P. oleracea* 247.  
 Поручейники. *Sium* 122.  
 П. (широколиственный). *S. latifolium* 281.  
 Порѣзники. *Libanotis* 121.

- П. горный. *L. montana* 213.  
     сибирскій. *L. sibirica* 213.  
 Посконники. *Eupatorium* 47.  
 П. (конопляный). *E. cannabinum* 186.  
 Почечуйная трава. *Polygonum Persicaria* 246.  
 Прикрытъ. *Aconitum Lycostonum* 130.  
 Приготовковыя. *PARONYCHIACEAE* 25.  
 Приточная трава. *Campanula glomerata* 153.  
 Проломники. *Androsace* 102.  
 П. вытянутый. *A. elongata* 136.  
     нитевидный. *A. filiformis* 136.  
     сѣверный. *A. septentrionalis* 136.  
 Пролѣски. *Mercurialis* 10, 17.  
 П. (многолѣтняя). *M. perennis* 224.  
 Пролѣски. *Scilla* 83.  
 Проса. *Panicum* 71.  
 Просвирияковыя *MALVACEAE* 11, 85.  
 Просвирияки. *Malva* 85.  
 П. алтейный. *M. Alcea* 220.  
     мавританскій. *M. mauritiana* 220.  
     невидный. *M. neglecta* 220.  
     сѣверный. *M. borealis* 221.  
 Просо. *Panicum miliaceum* 234.  
 Прострѣлы. *Pulsatilla* 105.  
 Прыгунъ. *Impatiens noli tangere* 204.  
 Прыщинецъ. *Ranunculus Flammula* 255.  
 Пузырники. *Cystopteris* 100.  
 П. (ломкій). *C. fragilis* 175.  
 Пузырчатковыя. *LENTIBULARIACEAE* 29.  
 Пузырчатки. *Utricularia* 29.  
 П. мелкая. *U. minor* 297.  
     обыкновенная. *U. vulgaris* 297.  
     средняя. *U. intermedia* 297.  
 Пузырчатники. *Physocarpus* 119.  
 П. (калинолистный). *P. opulifolius* 239.  
 Пупавки. *Anthemis* 46.  
 П. вонючая. *A. Cotula* 137.  
     красильная. *A. tinctoria* 137.  
     полевая. *A. arvensis* 137.  
 Пупочники. *Omphalodes* 40.  
 П. (завитой) *O. scorpioides* 230.  
 Пупырники. *Torilis* 121.  
 Пупырникъ. *T. Anthriscus* 291.  
 Пусторебрышники. *Cenolophium* 124.  
 П. (Фишеровъ). *C. Fischeri* 164.

- Пустырники. *Leonurus* 79.  
 Пушицы. *Eriophorum* 62.  
 П. влагалищная. *E. vaginatum* 184.  
     тонкая. *E. gracile* 184.  
     узколистная. *E. angustifolium* 184.  
     широколистная. *E. latifolium* 184.  
 Пшеницы. *Triticum* 67.  
 П. дикая. *T. caninum* 295.  
     жесткая. *T. rigidum* 295.  
     обыкновенная. *T. vulgare* 295.  
 Пырей. *Triticum repens* 295.  
 Пѣтушій гребень. *Rhinanthus Crista galli* 258.  
 Пѣтушій гребешокъ. *Melampyrum cristatum* 222.  
 Раздѣльносѣмянники. *Chorisporea* 59.  
 Р. (нѣжный). *C. tenella* 167.  
 Разнолистники. *Oncoclea* 99.  
 Райграссъ англійскій. *Lolium perenne* 216.  
 Р. французскій. *Arrhenatherum elatius* 140.  
 Ракитники. *Cytisus* 93.  
 Р. двучвѣтковый. *C. biflorus* 175.  
     чернѣющій. *C. nigricans* 175.  
 Рдесты. *Potamogeton* 6, 86.  
 Р. буроватый. *P. rufescens* 248.  
     гребенчатый. *P. pectinatus* 248.  
     длинный. *P. praelongus* 249.  
     злачный. *P. gramineus* 248.  
     крохотный. *P. pusillus* 248.  
     курчавый. *P. crispus* 249.  
     лоснящійся. *P. lucens* 248.  
     остроконечный. *P. mucronatus* 248.  
     плавающий. *P. natans* 248.  
     сквознолистный. *P. perfoliatus* 249.  
     сплюснутый. *P. compressus* 247.  
     туполистный. *P. obtusifolius* 248.  
 Ревени. *Rheum* 98.  
 Р. волнистый. *R. undulatum* 258.  
 Репейники. *Agrimonia* 107.  
 Р. волосистый. *A. pilosa* 131.  
     поскопный. *A. Eupatoria* 131.  
 Ржи. *Secale* 67.  
 Рись дикій. *Leersia oryzoides* 211.  
 Рогозовыя. *TYPHACEAE* 5, 119.  
 Рогозы. *Typha* 119.  
 Р. широколистный. *T. latifolia* 296.

Р. узколистный. *T. angustifolia* 296.  
 Роголистниковыя. CERATOPHYLLACEAE  
 4, 14.  
 Роголистники. *Ceratophyllum*  
 4, 14.  
 Р. подводный. *C. submersum* 165.  
 потопленный. *C. demersum* 165.  
 Рогульниковыя. TRAPACEAE 22.  
 Рогульники. *Trapa* 22.  
 Родоровыя. RHODORACEAE 19.  
 Рожь. *Secale cereale* 274.  
 Розанныя. ROSACEAE 9, 11, 15, 25,  
 106.  
 Розы. *Rosa* 108.  
 Р. бедренечная. *R. pimpinellifolia* 260.  
 дикая. *R. canina* 261.  
 желтая. *R. lutea* 260.  
 столстная. *R. centifolia* 261.  
 французская. *R. gallica* 260.  
 Ромашки. *Matricaria* 47.  
 Р. дикая. *M. Chamomilla* 221.  
 непахучая. *M. inodora* 221.  
 пахучая. *M. discoidea* 221.  
 Росяниковыя. DROSERACEAE 24.  
 Росянки. *Drosera* 24.  
 Р. английская. *D. anglica* 180.  
 круглолистная. *D. rotundifolia* 180.  
 Румянки. *Achusa* 40.  
 Р. (цѣлебная). *A. officinalis* 136.  
 Русскіе бобы. *Vicia Faba* 304.  
 Рыжикъ. *Samelina sativa* 153.  
 Рѣдечники. *Raphanistrum* 59.  
 Рѣдка дикая. *R. innocuum* 257.  
 Рѣдки. *Raphanus* 58.  
 Р. сѣянная. *R. sativus* 258.  
 Рѣзиковыя. NOLACEAE 4, 6, 85.  
 Рѣзухи. *Arabis* 56.  
 Р. повислая. *A. pendula* 139.  
 шершавая. *A. hirsuta* 139.  
 Рѣпа. *Brassica Rapa* 149.  
 Рябины. *Sorbus* 101.  
 Р. пенастоящая. *S. hybrida* 283.  
 простая. *S. aucuparia* 283.  
 шведская. *S. scandica* 283.  
 Рябинка дикая. *Tanacetum vulgare* 288.  
 Рябинники. *Sorbaria* 119.  
 Рябинникъ. *S. sorbifolia* 283.  
 Рябчики. *Fritillaria* 84.  
 Р. (русскій) *F. ruthenica* 190.

Рясковыя. LEMNACEAE 1.  
 Ряски. *Lemna* 1.  
 Р. мелкая. *L. minor* 211.  
 многокорешковыя. *L. polyrrhiza*  
 211.  
 трехдольная. *L. trisulca* 211.  
 Сабельники. *Comarum* 108.  
 С. (болотный). *C. palustre* 169.  
 Сабина. *Sabina* 61.  
 Салаты. *Lactuca* 52.  
 С. дикій. *L. Scariola* 207.  
 посѣвнѣй. *L. sativa* 207.  
 стѣнной. *L. muralis* 207.  
 Самосѣйка. *Papaver Rhoeas* 235.  
 Санталовыя. SANTALACEAE 17.  
 Сассапарильныя. SMILACEAE 16, 23,  
 116.  
 Свеклы. *Beta* 44.  
 С. (обыкновенная). *B. vulgaris* 146.  
 Свербиги. *Bunias* 56.  
 С. (восточная). *B. orientalis* 151.  
 Седмичники. *Trientalis* 103.  
 С. (европейскій). *T. europaea* 292.  
 Селезеночники. *Chrysosplenium* 16, 111.  
 С. (очереднолистный). *C. alternifolium* 167.  
 Сельдереи. *Apium* 127.  
 С. (вонючій). *A. graveolens* 138.  
 Сердечники. *Cardamine* 58.  
 Сердечникъ. *Leonurus Cardiac* 212.  
 С. горькій. *Cardamine amara* 156.  
 луговой. *C. pratensis* 156.  
 Серпухи. *Serratula* 51.  
 С. вѣшценосная. *S. coronata* 277.  
 красильная. *S. tinctoria* 277.  
 Сивцы. *Succisa* 63.  
 С. (луговой). *S. pratensis* 287.  
 Синеголовники. *Eryngium* 120.  
 С. плосколистный. *E. planum* 185.  
 равнинный. *E. campestre* 185.  
 Синіе колокольчики. *Gentiana Pneumonanthe* 193.  
 Синюховыя. POLEMONIACEAE 29.  
 Синюхи. *Polemonium* 29.  
 Синюха. *P. coeruleum* 244.  
 Синяки. *Echium* 39.  
 С. (обыкновенный). *E. vulgare* 181.  
 Сирени. *Syringa* 27, 87.

- С. венгерская. *S. Josikaea* 288.  
 обыкновенная. *S. vulgaris* 288.  
 Ситниговидная. *Juncagineae* 10, 22, 77.  
 Ситниковые. *Juncaceae* 22, 77.  
 Ситники. *Juncus* 77.  
 С. альпийский. *J. alpinus* 206.  
 жабный. *J. bufonius* 206.  
 лесной. *J. silvaticus* 206.  
 нитевидный. *J. filiformis* 205.  
 разветвистый. *J. effusus* 206.  
 сизый. *J. glaucus* 206.  
 скученный. *J. conglomeratus* 206.  
 сплюснутый. *J. compressus* 206.  
 членистый. *J. articulatus* 206.  
 Ситницы. *Scheuchzeria* 10.  
 Сифоники. *Siphisia* 14, 37.  
 С. (крупнолистный). *S. macrophylla* 280.  
 Скабиоза. *Scabiosa* 63.  
 С. (желтоватая). *S. ochroleuca* 271.  
 Скерды. *Sterpis* 53.  
 С. болотная. *S. paludosa* 173.  
 двулетняя. *S. biennis* 173.  
 кровельная. *S. tectorum* 173.  
 сибирская. *S. sibirica* 173.  
 усеченная. *S. praemorsa* 173.  
 Скороспелковые. *Primulaceae* 28, 101.  
 Скороспелки. *Primula* 102.  
 С. (лечебная). *P. officinalis* 251.  
 Сладкий корень. *Scorzonera hispanica* 273.  
 Сланогодниковые. *Haloragaceae* 21.  
 Сливы. *Prunus* 36.  
 Слива. *P. domestica* 252.  
 Сложноцветные. *Compositae* 7, 31, 44.  
 Смолевковые. *Sileneae* 25, 114.  
 Смолевки. *Silene* 114.  
 С. клейкая. *S. viscosa* 279.  
 лежащая. *S. procumbens* 278.  
 ночевцветная. *S. noctiflora* 279.  
 поникшая. *S. nutans* 279.  
 татарская. *S. tatarica* 279.  
 ушковая. *S. Otites* 279.  
 Смородинные. *Grossulariaceae* 19.  
 Смородины. *Ribes* 19.  
 С. глухая. *R. alpinum* 260.  
 золотистая. *R. aureum* 260.  
 С. красная. *R. rubrum* 259.  
 черная. *R. nigrum* 259.  
 Сныти. *Aegoropodium* 127.  
 С. (подагровая). *A. Podagraria* 131.  
 Спѣжная ягода. *Symphoricarpos racemosus* 287.  
 Собачий перец. *Polygonum Hydropiper* 246.  
 Соколий перелетъ. *Gentiana Crucifera* 193.  
 Солнцеглядъ. *Euphorbia helioscopia* 187.  
 Солнцецвѣты. *Helianthemum* 12.  
 С. (обыкновенный). *H. vulgare* 198.  
 Солонечники. *Galatella* 49.  
 С. (точечный). *G. punctata* 191.  
 Сонъ-трава. *Pulsatilla patens* 254.  
 Сосны. *Pinus* 33.  
 С. Веймутова. *P. Strobus* 241.  
 лесная. *P. silvestris* 240.  
 Сочевичники. *Orobis* 96.  
 С. весенний. *O. vernus* 233.  
 черный. *O. niger* 233.  
 Спаржи. *Asparagus* 117.  
 С. (цѣлебная). *A. officinalis* 141.  
 Спирейные. *Spiraeaceae* 9, 118.  
 Спирея. *Spiraea* 119.  
 С. городковая. *S. crenifolia* 285.  
 дуброволистная. *S. chamaedrifolia* 285.  
 звѣробоелистная. *S. hypericifolia* 285.  
 иволистная. *S. salicifolia* 284.  
 Спорышъ. *Polygonum aviculare* 245.  
 Стагачки. *Microstylis* 90.  
 С. (однолистная). *M. monophylla* 224.  
 Стальники. *Ononis* 94.  
 С. (вонючій). *O. hircina* 230.  
 Стародубка. *Gentiana Amarella* 192.  
 Стрѣлолисты. *Sagittaria* 34.  
 Сумочники. *Capsella* 57.  
 С. (пастушій). *C. Bursa pastoris* 155.  
 Сурѣпицы. *Barbarea* 56.  
 С. обыкновенная. *B. vulgaris* 145.  
 торчащая. *B. stricta* 145.  
 Сусяковые. *Butomaceae* 10.  
 Сусяки. *Butomus* 10.  
 С. (зонтичный). *B. umbellatus* 151.  
 Сушеницы. *Gnaphalium* 50.




С. болотистая. *G. uliginosum* 196.  
 лѣсная. *G. silvaticum* 196.  
 Сыти. *Superus* 61.  
 С. (бурая). *S. fuscus* 174.  
 Таволги. *Filipendula* 107.  
 Т. вязолистная. *F. Ulmaria* 188.  
 Тайники. *Listera* 90.  
 Т. овальный. *L. ovata* 215.  
 сердцевидный. *L. cordata* 215.  
 Татарники. *Onopordon* 50.  
 Т. (колючий). *O. Acanthium* 231.  
 Телекия. *Telekia* 46.  
 Т. (красивая). *T. speciosa* 289.  
 Терпъ. *Rgnus spinosa* 252.  
 Тимофеевка. *Phleum pratense* 239.  
 Тимьяны. *Thymus* 80.  
 Т. обыкновенный. *T. vulgaris* 291.  
 Тмины. *Carum* 126.  
 Тминъ. *C. Carvi* 163.  
 Толокнянки. *Arctostaphylos* 36.  
 Толокнянковые. *ARBUTEAE* 26, 36.  
 Толстянковые. *CRASSULACEAE* 9, 54.  
 Тополя. *Populus* 110.  
 Т. бальзамическій. *P. balsamifera* 247.  
 канадскій. *P. canadensis* 247.  
 серебрянстый. *P. alba* 247.  
 Торицы. *Spergula* 34.  
 Т. (полевая). *S. arvensis* 284.  
 Торичники. *Spergularia* 34.  
 Т. (красный). *S. rubra* 284.  
 Травянка. *Dianthus deltoides* 177.  
 Трезубки. *Scolochloa* 75.  
 Т. (овсяничная). *S. festucacea* 272.  
 Тривостренники. *Triglochin*  
 22, 78.  
 Т. болотный. *T. palustris* 294.  
 морской. *T. maritima* 294.  
 Трилистники. *Trifolium* 94.  
 Трилистникъ. *Menyanthes trifoliata*  
 224.  
 Т. альпійскій. *Trifolium alpestre* 293.  
 каштановый. *T. spadiceum* 294.  
 лежачій. *T. procumbens* 294.  
 ненастоящій. *T. hybridum* 294.  
 пашенный. *T. agrarium* 294.  
 полевой. *T. arvense* 292.  
 ползучій. *T. repens* 294.  
 средній. *T. medium* 293.  
 Тростники. *Phragmites* 70.

Т. (повсемѣстный). *P. communis* 239.  
 Трясушки. *Briza* 74.  
 Т. (средняя). *B. media* 149.  
 Турчи. *Hottonia* 103.  
 Т. (болотная). *H. palustris* 202.  
 Туя. *Thuja*. 60.  
 Тыквенныя. *CUCURBITACEAE* 13, 31,  
 59.  
 Тыквы. *Cucurbita* 59.  
 Тыква. *C. Pepo* 173.  
 Тысячеголовы. *Vaccaria* 115.  
 Т. (обыкновенный). *V. vulgaris* 298.  
 Тысячелистники. *Achillea* 46.  
 Тысячелистникъ. *A. Millefolium* 130.  
 Тѣлорѣзы. *Stratiotes* 76.  
 Т. сабуровидный. *S. Aloides* 287.  
 Тюльпаны. *Tulipa* 84.  
 Т. (лѣсной). *T. silvestris* 295.  
 Ужовниковыя. *OPHIOGLOSSACEAE* 2, 88.  
 Ужовники. *Ophioglossum* 88.  
 У. (обыкновенный). *O. vulgatum* 231.  
 Узикъ. *Potentilla Tormentilla* 249.  
 Укропы. *Anethum* 126.  
 У. (вонючій). *A. graveolens* 137.  
 конскій. *Oenanthe Phellandrium* 229.  
 Урути. *Muriophyllum* 21, 226.  
 У. колосистый. *M. spicatum* 226.  
 мутовчатый. *M. verticillatum* 226.  
 Фасоли. *Phaseolus* 94.  
 Ф. многоцвѣтковая. *P. multiflorus* 238.  
 обыкновенная. *P. vulgaris* 238.  
 Фенхель. *Foeniculum* 126.  
 Ф. (лѣчебный). *F. officinale* 189.  
 Фитейма. *Phyteuma* 41.  
 Ф. (колосистая). *Ph. spicatum* 239.  
 Фиалковыя. *VIOLARIEAE* 15, 20.  
 Фиалки. *Viola* 15, 20.  
 Ф. болотистая. *V. uliginosa* 306.  
 болотная. *V. palustris* 306.  
 высокая. *V. elatior* 306.  
 голая. *V. epipsila* 306.  
 дикая. *V. canina* 306.  
 душистая. *V. odorata* 307.  
 лѣсная. *V. silvestris* 307.  
 почная. *Platanthera bifolia* 242.  
 опушенная. *Viola hirta* 307.  
 песчаная. *V. arenaria* 308.  
 прудовая. *V. stagnina* 308.  
 удивительная. *V. mirabilis* 308.

- Ф. холмовая. *V. collina* 307.  
 Хатьмы. *Lavatera* 85.  
 Х. (тюрингенская). *L. thuringiaca* 210.  
 Хвостниковыя. *Hippuridae* 4.  
 Хвостники. *Hippuris* 4, 201.  
 Хвощи. *Equisetaceae* 2.  
 Хвощи. *Equisetum* 2.  
 Х. болотный. *E. palustre* 184.  
     зимующий. *E. hiemale* 183.  
     иловатый. *E. limosum* 183.  
     луговой. *E. pratense* 184.  
     лѣсной. *E. silvaticum* 183.  
     полевой. *E. arvense* 184.  
 Хлопунецъ. *Astragalus Cicer* 143.  
 Хлопушки. *Silene inflata* 278.  
 Хмѣли. *Humulus* 42.  
 Хмѣль. *H. Lupulus* 203.  
 Хохлатки. *Corydalis* 64.  
 Х. плотная. *C. solida* 171.  
     полая. *C. cava* 171.  
 Хрѣнь. *Cochlearia Armoracia* 169.  
 Царскій скипетръ. *Pedicularis Sceptum Carolinum* 236.  
 Царскій скипетръ. *Verbascum thapsiforme* 299.  
 Царскія кудри. *Lilium Martagon* 213.  
 Царскія очи. *Saxifraga Hirculus* 270.  
 Цибуль. *Allium Schoenoprasum* 133.  
 Цикорин. *Cichorium* 52.  
 Цикорій. *C. Intybus* 167.  
 Цмины. *Helichrysum* 50.  
 Ц. (песчаный). *H. arenarium* 198.  
 Чабры. *Satureja* 80.  
 Ч. (садовый). *S. hortensis* 270.  
 Частуховыя. *Alismaceae* 11, 34.  
 Частухи. *Alisma* 34.  
 Ч. (подорожниковая). *A. Plantago* 132.  
 Чемерицы. *Veratrum* 11.  
 Ч. бѣлая. *V. album* 299.  
     черная. *V. nigrum* 299.  
 Череды. *Bidens* 46.  
 Ч. поникшая. *B. cernuus* 147.  
     трехраздѣльная. *B. tripartitus* 147.  
 Черемуха. *Prunus Padus* 252.  
 Ч. виргинская. *P. virginiana* 252.  
 Черника. *Vaccinium Myrtillus* 298.  
 Чернобыльникъ. *Artemisia vulgaris* 140.  
 Черноголовки. *Brunella* 83.  
 Ч. крупноцвѣтная. *B. grandiflora* 150.  
     обыкновенная. *B. vulgaris* 150.  
 Черноголовки. *Poterium* 108.  
 Ч. (кровохлебковая). *P. Sanguisorba* 251.  
 Черноклець. *A. tataricum* 129.  
 Чернокорни. *Cynoglossum* 40.  
 Ч. (лѣтебный). *C. officinale* 174.  
 Черноталь. *Salix pentandra* 265.  
 Чертополохи. *Carduus* 50.  
 Ч. курчавый. *C. crispus* 156.  
     поникший. *C. nutans* 156.  
 Чесноки. *Allium* 83.  
 Ч. круглый. *A. rotundum* 133.  
     огородный. *A. oleraceum* 133.  
     посѣвный. *A. sativum* 133.  
     ребристый. *A. angulosum* 133.  
 Чечевицы. *Lens* 96.  
 Ч. (съѣдобная). *L. esculenta* 211.  
 Чешуйники. *Lathraea* 92.  
 Чины. *Lathyrus* 96.  
 Ч. болотная. *L. paluster* 210.  
     гороховидная. *L. pisiformis* 210.  
     клубненосная. *L. tuberosus* 210.  
     луговая. *L. pratensis* 210.  
     лѣсная. *L. silvester* 210.  
 Чистецы. *Stachys* 82.  
 Ч. болотный. *S. palustris* 285.  
     лѣсной. *S. silvatica* 285.  
     однолѣтний. *S. annua* 286.  
     прямой. *S. recta* 286.  
 Чистотѣлы. *Chelidonium* 93.  
 Ч. (большой). *C. majus* 166.  
 Чистякъ. *Ranunculus Ficaria* 255.  
 Чихотная трава. *Achillea Ptarmica* 130.  
 Чубушники. *Philadelphus* 238.  
 Шалоть. *Allium ascalonicum* 133.  
 Шалфеи. *Salvia* 83.  
 Ш. клейкий. *S. glutinosa* 269.  
     луговой. *S. pratensis* 269.  
     лѣсной. *S. silvestris* 269.  
     лѣтебный. *S. officinalis* 269.  
     мутовчатый. *S. verticillata* 268.  
 Шандры. *Elssholzia* 79.  
 Ш. (гребенчатая). *E. cristata* 182.  
 Шейхцерія. *Scheuchzeria* 78.  
 Ш. (болотная). *S. palustris* 271.  
 Шерардія. *Sherardia* 7, 109.

- Ш. (полевая). *S. arvensis* 278.  
 Шиповникъ. *Rosa cinnamomea* 261.  
 Шишечники. *Arrhenatherum* 72.  
 Шлемники. *Scutellaria* 82.  
 Ш. копьевидный. *S. hastifolia* 274.  
 Шпажники. *Gladiolus* 77.  
 Ш. (черепачатый). *G. imbricatus* 195.  
 Шпинаты. *Spinacia* 44.  
 Ш. гладкий. *S. inermis* 284.  
 колючий. *S. spinosa* 284.  
 Щавели. *Rumex* 98.  
 Щ. водяной. *R. aquaticus* 263.  
 домашний. *R. domesticus* 264.  
 кисловатый. *R. Acetosella* 262.  
 кислый. *R. Acetosa* 262.  
 конский. *R. confertus* 263.  
 курчавый. *R. crispus* 263.  
 морской. *R. maritimus* 263.  
 огромный. *R. maximus* 263.  
 туполистный. *R. obtusifolius* 263.  
 Щелкунцы. *Melandryum* 115.  
 Щ. луговой. *M. pratense* 222.  
 лѣсной. *M. silvestre* 222.  
 Щетинники. *Setaria* 68.  
 Щ. зеленый. *S. viridis* 278.  
 сизый. *S. glauca* 278.  
 Щирица. *Amarantus Blitum* 135.  
 Щитники. *Aspidium* 100.  
 Щ. гребенчатый. *A. cristatum* 142.  
 шиповатый. *A. spinulosum* 142.  
 Щитовка. *Scutellaria galericulata* 274.  
 Щучка. *Deschampsia caespitosa* 177.  
 Эндивий. *Cichorium Endivia* 167.  
 Эспарсетъ. *Onobrychis* 95.  
 Э. (посѣвный). *O. sativa* 230.  
 Эстрагонъ. *Artemisia Dracunculus* 140.  
 Яблонныя. РОМАСЕАЕ 9, 100.  
 Яблоня. *Pirus Malus* 242.  
 Я. китайская. *P. prunifolia* 242.  
 сибирская. *P. baccata* 242.  
 Ягодковыя. ТУМЕЛЕАСЕАЕ 15.  
 Ягодки. *Daphne* 15, 176.  
 Язвенники. *Anthyllis* 95.  
 Язвенникъ. *A. Vulneraria* 138.  
 Ярутки. *Thlaspi* 57.  
 Я. (полевая). *T. arvense* 290.  
 Ясени. *Fraxinus* 2, 87.  
 Я. американскій. *F. americana* 190.  
 высокий. *F. excelsior* 189.  
 Ясколки. *Cerastium* 35.  
 Я. заурядная. *C. triviale* 165.  
 полевая. *C. arvense* 165.  
 Ясменники. *Asperula* 109.  
 Я. душистый. *A. odorata* 142.  
 красильный. *A. tinctoria* 142.  
 подмаренниковый. *A. galioides* 142.  
 цѣпкій. *A. Aparine* 142.  
 Яснотки. *Lamium* 81.  
 Я. крапчатая. *L. maculatum* 208.  
 малиновая. *L. purpureum* 208.  
 стеблеобъемлющая. *L. amplexi-caule* 208.  
 Ястребинки. *Hieracium* 53.  
 Я. волосистая. *H. Pilosella* 201.  
 зонтичная. *H. umbellatum* 199.  
 мадырская. *H. magyaricum* 200.  
 обыкновенная. *H. vulgatum* 200.  
 полузонтичная. *H. cymosum* 201.  
 стѣнная. *H. mugorum* 200.  
 ушковатая. *H. Auricula* 201.  
 ушковидная. *H. auriculiforme* 201.  
 флорентійская. *H. florentinum* 200.  
 холмовая. *H. collinum* 200.  
 щетинистая. *H. echioides* 199.  
 Ятрышниковыя. ОРЧИДЕАЕ 20, 89.  
 Ятрышники. *Orchis* 92.  
 Я. вонючій. *O. coriophora* 232.  
 обожженный. *O. ustulata* 232.  
 пестрый. *O. variegata* 232.  
 темнокрасный. *O. incarnata* 231.  
 широколистный. *O. latifolia* 232.  
 шлемовидный. *O. militaris* 232.  
 Ячмени. *Hordeum* 67.  
 Я. двурядный. *H. distichum* 202.  
 обыкновенный. *H. vulgare* 202.  
 шестирядный. *H. hexastichon* 202.



# Систематическій обзоръ растений Московской губерніи.

---

## Отдѣлъ I. *Cryptogamae* — Тайнобрачныя.

Подотдѣлъ: *C. vasculares* — Т. сосудистыя.

Классъ I. *Filicineae* — Папоротниковыя.

Сем. 1. *Polypodiaceae* R. Br. — папоротники.

*Pteridium* Gleditsch — *P. aquilinum* Kuhn.

*Athyrium* Roth. — *A. Filix femina* Roth.

*Phegopteris* Fée — *Ph. polypodioides* Fée, *P. Dryopteris* Fée.

*Aspidium* Sw. — *A. Filix mas* Sw., *A. spinulosum* Sw., *A. cristatum* Sw.,

*A. Thelypteris* Sw.

*Cystopteris* Bernh. — *C. fragilis* Bernh.

*Onoclea* Sw. O. — *Struthiopteris* Hoffm.

Сем. 2. *Ophioglossaceae* R. Br. — уховниковыя.

*Ophioglossum* L. — *O. vulgatum* L.

*Botrychium* Sw. — *B. Lunaria* Sw., *B. rutaefolium* A. Br., *B. virginianum* Sw.

Классъ II. *Equisetineae* — хвощевыя.

Сем. 3. *Equisetaceae* DC. — хвощи.

*Equisetum* L. — *E. arvense* L., *E. pratense* Ehrh., *E. silvaticum* L., *E. palustre* L., *E. limosum* L., *E. hiemale* L.

Классъ III. *Lycopodineae* — Плауновыя.

Сем. 4. *Lycopodiaceae* DC. — плауны.

*Lycopodium* L. — *L. Selago* L., *L. annatinum* L., *L. clavatum* L., *L. complanatum* L.

## Отдѣлъ II. Phanerògamae—Явнобрачныя.

## Подотдѣлъ А. Gymnospermae—Голосѣменные.

## Классъ IV. Coniferae—Хвойныя.

## Сем. 5. Cupressineae Rich.—кипарисовыя.

*Juniperus* L.—*J. communis* L.

\**Sabina* Spach—\**S. officinalis* Grek.

\**Thuja* Tourn.—\**T. occidentalis* L.

## Сем. 6. Abietineae Rich.—еловыя.

*Pinus* L.—*P. silvestris* L., \**P. Strobus* L., \**P. Cembra* L.

\**Larix* Tourn. L. *europaea* DC., L. *sibirica* Led.

*Picea* Lk.—*P. vulgaris* Lk., \**P. alba* Lk.

\**Abies* DC.—\**A. sibirica* Led.

## Подотдѣлъ В. Angiospermae—Покрытосѣменные.

## Классъ V. Monocotylédones—Односѣменодольныя.

## Сем. 7. Lemnaceae Lk.—ряски.

*Lemna* L.—*L. trisulca* L., L. *minor* L., L. *polyrrhiza* L.

## Сем. 8. Najadeae Endl.—рѣзиковыя.

*Caulinia* Willd.—*C. fragilis* Willd.

*Zannichellia* L.—*Z. palustris* L.

*Potamogeton* L.—*P. natans* L., *P. rufescens* Schrad., *P. gramineus* L.,  
*P. lucens* L., *P. praelongus* Wulf., *P. perfoliatus* L., *P. crispus* L.,  
*P. compressus* L., *P. obtusifolius* M. & K., *P. mucronatus* Schrad., *P. pusillus* L., *P. pectinatus* L.

## Сем. 9. Gramineae Juss.—злаки.

*Digitaria* Scop.—*D. glabra* Röm. & Schult.

*Echinochloa* P.B.—*E. Crus galli* P.B.

\**Panicum* L.—\**P. miliaceum* L.

*Setaria* P.B.—*S. viridis* P.B., *S. glauca* P.B.

†*Phalaris* L.—†*P. canariensis* L.

*Digraphis* Trin.—*D. arundinacea* Trin.

*Hierochloa* Gmel.—*H. borealis* Röm. & Schult.

*Anthoxanthum* L.—*A. odoratum* L.

*Alopecurus* L.—*A. pratensis* L., *A. ruthenicus* Weinm., *A. agræstis* L.,  
*A. geniculatus* L., *A. fulvus* Sm.

*Phleum* L.—*Ph. pratense* L., *Ph. Boehmeri* Wib.

†*Chamagrøstis* Borkh.—†*C. minima* Borkh.

*Beckmannia* Host.—*B. eruciformis* Host.

*Leersia* Sol.—*L. oryzoides* Sol.

*Agrøstis* L.—*A. alba* L., *A. vulgaris* With., *A. canina* L.

*Apæra* Adans.—*A. Spica venti* P.B.

*Calamagrøstis* Roth.—*C. silvatica* DC., *C. neglecta* Fr., *C. lanceolata* Roth., *C. Epigæos* Roth.

- Milium* L.—*M. effusum* L.  
*Stipa* L.—*S. pennata* L.  
*Phragmites* Trin.—*P. communis* Trin.  
*Koeleria* Pers.—*K. cristata* Pers.  
*Deschampsia* P.B.—*D. caespitosa* P.B., *D. flexuosa* Trin.  
*Holcus* L.—*H. lanatus* L.  
*Arrhenatherum* P.B.—*A. elatius* Mert. & Koch.  
*Avena* L.—†*A. fatua* L., \**A. sativa* L., \**A. orientalis* Schreb., *A. pubescens* L., *A. pratensis* L., *A. flavescens* L.  
*Melica* L.—*M. altissima* L., *M. nutans* L.  
*Scolochloa* Lk.—*S. festuacea* Lk.  
*Briza* L.—*B. media* L.  
*Poa* L.—*P. annua* L., *P. bulbosa* L., *P. compressa* L., *P. nemoralis* L.,  
*P. serotina* Ehrh., *P. sudetica* Haencke, *P. trivialis* L., *P. pratensis* L.  
*Glyceria* R. Br.—*G. spectabilis* Mert. & Koch, *G. fluitans* R. Br.  
*Atriplex* Rupr.—*A. distans* Grisb.  
*Catabrosa* P.B.—*C. aquatica* P.B.  
*Molinia* Schrk. *M. coerulea* Mch.  
*Dactylis* L.—*D. glomerata* L.  
*Cynosurus* L.—*C. cristatus* L.  
*Festuca* L.—*F. ovina* L., *F. rubra* L., *F. elatior* L., *F. gigantea* Vill.,  
*F. silvatica* Vill.  
*Bromus* L.—*B. asper* Murr., *B. erectus* Huds., *B. inermis* Leyss., †*B. tectorum* L., *B. mollis* L., *B. arvensis* L., *B. patulus* Mert. & Koch.,  
*B. secalinus* L.  
*Brachypodium* P.B.—*B. pinnatum* P.B., *B. sylvaticum* Röm. & Schult.  
*Triticum* L.—*T. caninum* Schreb., *T. repens* L., *T. rigidum* Schrad., \**T. vulgare* Vill.  
\**Secale* L.—\**S. cereale* L.  
\**Hordeum* L.—\**H. hexastichon* L., \**H. vulgare* L., \**H. distichum* L.  
*Lolium* L.—*L. perenne* L., *L. temulentum* L.  
\**Zea* L.—\**Z. Mays* L.  
*Nardus* L.—*N. stricta* L.
- Сем. 10. **Cyperaceae** Juss.—осоки.
- Cyperus* L.—*C. fuscus* L.  
*Rhynchospora* Vahl.—*R. alba* Vahl.  
*Heleocharis* R.Br.—*H. palustris* R.Br., *H. ovata* R.Br., *H. acicularis* R.Br.  
*Scirpus* L.—*S. lacustris* L., *S. maritimus* L., *S. silvaticus* L., *S. radicans* Schk.  
*Blasmus* Panz.—*B. compressus* Panz.  
*Eriophorum* L.—*E. vaginatum* L., *E. latifolium* Hoppe, *E. angustifolium* Roth, *E. gracile* Koch.  
*Carex* L.—*C. dioica* L., *C. chordorrhiza* Ehrh., *C. intermedia* Good.,  
*C. vulpina* L., *C. muricata* L., *C. teretiuscula* Good., *C. paniculata* L.,  
*C. paradoxa* Willd., *C. Schreberi* Schrk., *C. remota* L., *C. stellulata* Good.,  
*C. leporina* L., *C. elongata* L., *C. canescens* L. *C. vtilis* Fr.,  
*C. loliacea* L., *C. stricta* Good., *C. caespitosa* L., *C. vulgaris* Fr., *C. acuta* L.,  
*C. limosa* L., *C. tomentosa* L., *C. montana* L., *C. umbrosa*



Hoppe, *C. pilulifera* L., *C. ericetorum* Poll., *C. praecox* Jacq., *C. pediformis* C. A. Mey., *C. digitata* L., *C. pilosa* Scop., *C. panicea* L., *C. vaginata* Tausch., *C. pallescens* L., *C. flava* L., *C. Oederi* Ehrh., *C. silvatica* Huds., *C. Pseudocyperus* L., *C. ampullacea* Good., *C. vesicaria* L., *C. riparia* Curt., *C. paludosa* Good., *C. filiformis* L., *C. hirta* L.

Сем. 11. **Hydrocharideae** DC.—водокрасовыя.

*Elodea* Rich. & Michx.—*E. canadensis* Rich. & Michx.

*Stratiotes* L.—*S. Aloides* L.

*Hydrocharis* L.—*H. Morsus ranae* L.

Сем. 12. **Juncagineae** Rich.—ситниковидныя.

*Scheuchzeria* L.—*S. palustris* L.

*Triglochin* L.—*T. maritima* L., *T. palustris* L.

Сем. 13. **Alismaceae** Rich.—частуховыя.

*Alisma* L.—*A. Plantago* L.

*Sagittaria* L.—*S. sagittifolia* L.

Сем. 14. **Butomaceae** Rich.—сусяковыя.

*Butomus* L.—*B. umbellatus* L.

Сем. 15. **Melanthiaceae** R. Br.—медоцвѣтныя.

*Veratrum* L.—*V. nigrum* L., *V. album* L.

Сем. 16. **Juncaceae** DC.—ситниковыя.

*Juncus* L.—*J. conglomeratus* L., *J. effusus* L., *J. glaucus* Ehrh., *J. filiformis* L., *J. compressus* Jacq., *J. bufonius* L., *J. alpinus* Vill., *J. articulatus* L., *J. silvaticus* Reich.

*Luzula* DC.—*L. pilosa* Willd., *L. campestris* DC.

Сем. 17. **Smilaceae** R. Br.—сассанарильныя.

*Paris* L.—*P. quadrifolia* L.

*Polygonatum* Tourn.—*P. officinale* All., *P. multiflorum* All.

*Convallaria* L.—*C. majalis* L.

*Majanthemum* Web.—*M. bifolium* DC.

*Asparagus* L.—*A. officinalis* L.

Сем. 18. **Liliaceae** DC.—лилейныя.

*Tulipa* L.—*T. silvestris* L.

*Gagea* Salisb.—*G. minima* Schult., *G. lutea* Schult., *G. pusilla* Schult.

*Fritillaria* L.—*F. ruthenica* Wickström.

† *Lilium* L.—† *L. Martagon* L.

† *Scilla* L.—† *S. cernua* Red.

*Allium* L.—† *A. Schoenoprasum* L., \**A. ascalonicum* L., \**A. Cæpa* L.,

\**A. fistulosum* L., *A. angulosum* L., \**A. sativum* L., *A. rotundum* L.,

\**A. Porrum* L., *A. oleraceum* L.

Сем. 19. **Irideae** Juss.—касатиковыя.

*Gladiolus* L.—*G. imbricatus* L.

*Iris* L.—*I. Pseudacorus* L., *I. sibirica* L.

Сем. 20. **Orchideae** Juss.—ятрышниковыя.

*Orchis* L.—*O. militaris* L., *O. variegata* All., *O. coriophora* L., *O. ustulata* L., *O. latifolia* L., *O. incarnata* L., *O. maculata* L.

*Gymnadenia* R.Br.—*G. conopsea* R.Br., *G. cucullata* Rich.

*Platanthera* Rich.—*P. bifolia* Rehb., *P. chlorantha* Cust.

*Peristylus* Blume—*P. viridis* Lindl.

- Hermínium* R.Br.—*H. Monòrchis* R.Br.  
*Epipàctis* Rich.—*E. latifolia* All. *E. palústris* Crtz.  
*Neòttia* L.—*N. Nidus ávis* Rich.  
*Listéra* R.Br.—*L. ováta* R.Br., *L. cordáta* R.Br.  
*Goodyéra* R.Br.—*G. répens* R.Br.  
*Corallorrhíza* Hall.—*C. innáta* R.Br.  
*Liparis* Rich.—*L. Loeséllii* Rich.  
*Microstýlis* Lindl.—*M. monophýlla* Lindl.  
*Cypripédium* L.—*C. Caleéolus* L., *C. guttátum* Sw.  
 Сем. 21. **Aràceae** Juss.—аронниковыя.  
*Cállia* L.—*C. palústris* L.  
*Acòrus* L.—*A. Cálamus* L.  
 Сем. 22. **Typhàceae** Juss.—рогозовыя.  
*Týpha* L.—*T. latifolia* L., *T. angustifolia* L.  
*Spargánium* L.—*S. ramòsum* Huds., *S. simplex* Huds. *S. minimum* Fr.

Классъ VI. *Dicotylédones* — Двусѣменообразныя.

Подклассъ а. *Apétalae* — Безлестныя.

- Сем. 23. **Ceratophyllàceae** Gray—роголистниковыя.  
*Ceratophýllum* L.—*C. demérsum* L., *C. submérsum* L.  
 Сем. 24. **Hippurideae** Lk.—хвостниковыя.  
*Hippúris* L.—*H. vulgáris* L.  
 Сем. 25. **Haloràgeae** R.Br.—сланоягодниковыя.  
*Myriophýllum* L.—*M. verticillátum* L., *M. spicátum* L.  
 Сем. 26. **Callitrichàceae** Lk.—болотниковыя.  
*Callitriche* L.—*C. palústris* L., *C. autumnális* L.  
 Сем. 27. **Trapàceae** Griseb.—рогульниковыя.  
*Trápa* L.—*T. nátans* L.  
 Сем. 28. **Elatineae** Cambes.—повойничковыя.  
*Elátine* L.—*E. triandra* Schk., *E. callitrichoides* Rupr., *E. Hydròpiper* L.,  
*E. Alsinàstrum* L.  
 Сем. 29. \* **Juglànèae** DC.—орѣшниковыя.  
 \* *Jùglans* L.—\* *J. nigra* L., \* *J. cinérea* L.  
 Сем. 30. **Betulàceae** A.Br.—березовыя.  
*Bètula* L.—*B. álba* L., *B. pubéscens* Ehrh., \* *B. lenta* L., \* *B. populi-*  
*fòlia* Ait., *B. hùmilis* Schrk., *B. nana* L.  
*Alnus* L.—*A. glutinòsa* Gaert., *A. incàna* DC.  
*Còrylus* L.—*C. Avellána* L.  
 Сем. 31. **Fagàceae** A.Br.—буквыя.  
*Quéreus* L.—*Q. pedunculáta* Ehrh.  
 Сем. 32. **Salicìneae** Rich.—ивовыя.  
*Sáliz* L.—*S. pruinòsa* Wendland, *S. triándra* L., *S. álba* L., *S. frágilis* L.,  
*S. pentándra* L., *S. purpúrea* L., *S. Lappònum* L., *S. longifòlia* Host.,  
*S. viminális* L., *S. cinérea* L., *S. aurita* L., *S. cápraea* L., *S. nigri-*  
*cans* Smith., *S. Weigeliana* Willd., *S. livida* Wahlenb., *S. myrtilloides* L.,  
*S. rèpens* L.

- Populus* L.—\* *P. alba* L., *P. tremula* L., † \* *P. nigra* L., \* *P. canadensis* Desf. \* *P. balsamifera* L.
- Сем. 33. *Urticaceae* Endl.—кропивные.  
*Urtica* L.—*U. urens* L., *U. dioica* L.
- Сем. 34. *Cannabineae* Blume—конопляные.  
\* *Cannabis* L.—\* *C. sativa* L.  
*Humulus* L.—*H. lupulus* L.
- Сем. 35. *Ulmaceae* Mirb.—вязовые.  
*Ulmus* L.—† \* *U. montana* With., *U. pedunculata* Foug.
- Сем. 36. *Polygonaceae* Juss.—гречишные.  
\* *Rheum* L.—\* *R. undulatum* L.  
*Rumex* L.—*R. maritimus* L., *R. obtusifolius* L., *R. crispus* L., *R. domesticus* Hartm., *R. maximus* Schreb., *R. aquaticus* L., *R. confertus* Willd., *R. acetosa* L., *R. acetosella* L.  
*Polygonum* L.—*P. bistorta* L., *P. amphibium* L., *P. lapathifolium* L., *P. persicaria* L., *P. hydropiper* L., *P. mitre* Schrk., *P. minus* Huds., *P. aviculare* L., *P. convolvulus* L., *P. dumetorum* L.  
\* *Fagopyrum* L.—\* *F. esculentum* Mch.
- Сем. 37. *Amarantaceae* Juss.—амарантовые.  
*Amarantus* L.—*A. retroflexus* L., *A. blitum* L.
- Сем. 38. *Chenopodiaceae* Vent.—маревые.  
*Corispermum* L.—*C. hyssopifolium* Juss., *C. Marschallii* Stev.  
*Chenopodium* L.—† *C. botrys* L., *C. polyspermum* L., *C. vulvaria* L., *C. hybridum* L., *C. urbicum* L., *C. album* L., *C. glaucum* L., *C. rubrum* L., *C. bonus-henricus* L.,  
*Blitum* L.—*B. virgatum* L., *B. capitatum* L.  
\* *Beta* L.—\* *B. vulgaris* L.  
\* *Spinacia* L.—\* *S. inermis* Mch., \* *S. spinosa* Mch.  
*Atriplex* L.—† *A. hortense* L., *A. nitens* Rebert., *A. patulum* L., *A. hastatum* L.
- Сем. 39. *Paronychiaceae* St. Hil.—приноготковые.  
*Herniaria* L.—*H. glabra* L.
- Сем. 40. *Scleranthaceae* Lk.—диваловые.  
*Scleranthus* L.—*S. annuus* L.
- Сем. 41. *Euphorbiaceae* Kl. & Grck.—молочайные.  
*Euphorbia* L.—*E. palustris* L., *E. procera* M. B., *E. virgata* W. & K., *E. helioscopia* L., † *E. peplus* L.
- Сем. 42. *Acalyphaceae* Kl. & Grck.—акалифовые.  
*Mercurialis* L.—*M. perennis* L.

Подкласс b. *Petalanthae*—Лепестковые.

Группа α. *Calyciflorae*—Чашецветные.

- Сем. 43. \* *Elaeagnaceae* R.Br. лоховые.  
\* *Hippophae* L.—\* *H. rhamnoides* L.  
\* *Elaeagnus* E.—\* *E. argenteus* Pursh.
- Сем. 44. *Thymeleaceae* Juss.—ягодковые.  
*Daphne* L.—*D. mezereum* L.



*Oenothera* L.—*O. biennis* L.

*Circaea* L.—*C. lutetiana* L., *C. alpina* L.

Сем. 52. **Lythraceae** Juss.—дербенниковыя.

*Lythrum* L.—*L. Salicaria* L.

*Portula* L.—*P. Portula* L.

Сем. 53. **Pomaceae** Lindl.—яблонныя.

† \* *Crataegus* L.—\* *C. Crus galli* L., † \* *C. sanguinea* Pall., \* *C. coccinea* L., \* *C. Oxyacantha* L., \* *C. monogyna* Jacq.

† \* *Cotoneaster* Med.—† \* *C. vulgaris* Lindl.

*Pirus* L.—*P. communis* L., *P. Malus* L., \* *P. prunifolia* Willd., \* *P. baccata* L.

*Sorbus* L.—\* *S. scandica* Fr., \* *S. hybrida* L., *S. aucuparia* L.

\* *Amelanchier* Med.—\* *A. vulgaris* Mch.

Сем. 54. **Rosaceae** Juss.—розанныя.

1. Подсем. **ROSEAE** DC.

*Rosa* L.—\* *R. lutea* Mill., \* *R. pimpinellifolia* L., *R. cinnamomea* L., \* *R. canina* L., \* *R. gallica* L., \* *R. centifolia* L.

2. Подсем. **SANGUISORBIAE** Lindl.

*Agrimonia* L.—*A. Eupatoria* L., *A. pilosa* Led.

*Poterium* L.—*P. Sanguisorba* L.

*Sanguisorba* L.—*S. officinalis* L.

*Alchemilla* L.—*A. vulgaris* L.,

3. Подсем. **DRYADEAE** Vent.

*Potentilla* L.—\* *P. fruticosa* L., *P. supina* L., *P. norvegica* L., *P. recta* L., *P. intermedia* L., *P. heptaphylla* Mill., *P. argentea* L., *P. collina* Wib., *P. anserina* L., *P. reptans* L., *P. Tormentilla* Schrk., *P. cinerea* Chaix, *P. opaca* L., *P. alba* L.

*Comarum* L.—*C. palustre* L.

*Fragaria* L.—*F. vesca* L., *F. elatior* Ehrh., *F. collina* Ehrh., \* *F. grandiflora* Ehrh., \* *F. virginiana* Mill.

*Rubus* L.—*R. fruticosus* L., *R. caesius* L., *R. idaeus* L., \* *R. odoratus* L., *R. saxatilis* L., *R. Chamaemorus* L.

*Geum* L.—*G. urbanum* L., *G. strictum* Ait., *G. rivale* L., *G. intermedium* Ehrh.

4. Подсем. **SPIRAEAE** DC.

*Filipendula* L.—*F. Ulmaria* Maxim., *F. hexapetala* Gilib.

Сем. 55. \* **Spiraeaceae** Maxim.—спирейныя.

\* *Physocarpus* Camb.—\* *P. opulifolius* Maxim.

\* *Spiraea* L.—\* *S. chamaedryfolia* L., \* *S. hypericifolia* Lam., \* *S. crenifolia* C. A. M. \* *S. salicifolia* L., \* *S. media* L.

\* *Sorbaria* A. Br.—\* *S. sorbifolia* A. Br.

Сем. 56. **Amygdaleae** A. Juss.—миндальныя.

\* *Amygdalus* L.—\* *A. nana* L.

*Prunus* L.—*P. spinosa* L., \* *P. domestica* L., \* *P. Cerasus* L., *P. Chamaecerasus* Jacq., *P. Padus* L., \* *P. virginiana* L.

Сем. 57. **Papilionaceae** L.—мотыльковыя.

1. Подсем. **LOTEAE** DC.

*Genista* L.—*G. tinctoria* L.

*Cytisus* L. \* *C. nigricans* L., *C. biflorus* L'Hér.

*Ononis* L.—*O. hircina* Jacq.

- Anthyllis* L.—*A. Vulneraria* L.  
*Medicago* L.—*M. falcata* L., *M. lupulina* L.  
*Melilotus* Tourn.—*M. officinalis* Desr., *M. albus* Desr., \**M. coeruleus* Desr.  
*Trifolium* L.—*T. pratense* L., *T. alpestre* L., *T. medium* L., \**T. incarnatum* L., *T. arvense* L., *T. montanum* L., *T. repens* L., *T. hybridum* L.,  
*T. agrarium* L., *T. spadicum* L., *T. procumbens* L.  
*Lotus* L.—*L. corniculatus* L.  
\**Caragana* Lam.—\**C. arborescens* Lam., \**C. frutescens* DC., \**C. pygmaea* DC.  
*Astragalus* L.—*A. Cicer* L., *A. glycyphyllos* L., *A. hypoglottis* L., *A. arenarius* L.  
2. Подсем. HEDYSAREAE DC.  
*Coronilla* L.—*C. varia* L.  
*Onobrychis* Tourn.—*O. sativa* Lam.  
3. Подсем. VICIEAE BRONN.  
\**Lens* Tourn.—\**L. esculenta* Moench.  
*Ervum* L.—*E. hirsutum* L., *E. tetraspermum* L.  
*Vicia* L.—*V. pisiformis* L., *V. silvatica* L., *V. cassubica* L., *V. Cracca* L.,  
*V. tenuifolia* Roth., *V. sepium* L., *V. sativa* L., *V. angustifolia* Roth.,  
\**V. Faba* L.  
\**Pisum* L.—\**P. sativum* L.  
*Lathyrus* L.—*L. silvester* L., *L. pratensis* L., *L. pisiformis* L., *L. paluster* L., *L. tuberosus* L.  
*Orobus* L.—*O. vernus* L., *O. niger* L.  
4. Подсем. PHASEOLEAE BRONN.  
\**Phaseolus* L.—\**P. vulgaris* L., \**P. multiflorus* Lam.

## ГРУППА 3. THALAMIFLORAE—ЛОЖЕЦВЕТНЫЕ.

Сем. 58. *Nymphaeaceae* DC.—КУВШИНКОВЫЕ.

- Nymphaea* L.—*N. alba* L.  
*Nuphar* Sm.—*N. luteum* Sm., *N. pumilum* Sm.

Сем. 59. *Portulacaceae* JUSS.—ПОРТУЛАКОВЫЕ.

- \**Portulaca* L.—\**P. oleracea* L.  
*Montia* L.—*M. rivularis* Gmel.

Сем. 60. *Crassulaceae* DC.—ТОЛСТЯНКОВЫЕ.

- Sedum* L.—*S. maximum* Suter, *S. purpureum* Link, *S. Fabaria* Koch,  
*S. acre* L.

- Sempervivum* L.—*S. soboliferum* Sims.

Сем. 61. *Ranunculaceae* JUSS.—ЛЮТИКОВЫЕ.

- Clematis* L.—*C. recta* L.  
*Thalictrum* L.—*T. aquilegifolium* L., *T. minus* L., *T. simplex* L., *T. angustifolium* Jacq., *T. flavum* L.  
*Hepatica* Dill.—*H. triloba* Chaix.  
*Pulsatilla* Tourn.—*P. patens* Mill.  
*Anemone* L.—*A. silvestris* L., *A. nemorosa* L., *A. ranunculoides* L.  
*Myosurus* L.—*M. minimus* L.  
*Ranunculus* L.—*R. flaccidus* Pers., *R. divaricatus* Schrk., *R. Flammula* L.,  
*R. lingua* L., *R. polyphyllus* Kit., *R. auricomus* L., *R. cassubicus* L.,

*R. acer* L., *R. lanuginosus* L., *R. polyanthemos* L., *R. nemorosus* DC.,  
*R. repens* L., *R. illiricus* L., *R. bulbosus* L., *R. scleratus* L., *R. Ficaria* L.

*Caltha* L.—*C. palustris* L.

*Trillium* L.—*T. europaeus* L.

†*Aquilegia* L.—†*A. vulgaris* L.

*Delphinium* L.—*D. Consolida* L., *D. elatum* L.

*Aconitum* L.—*A. Anthora* L., *A. septentrionale* Kölle, *A. Lycotetonum* L.

*Actaea* L.—*A. spicata* L.

Сем. 62. *Berberideae* Vent.—барбарисовыя.

†\**Berberis* L.—†\**B. vulgaris* L.

Сем. 63. *Papaveraceae* DC.—маковыя.

†\**Papaver* L.—†*P. Rhoeas* L., \**P. somniferum* L.

*Chelidonium* L.—*C. majus* L.

Сем. 64. *Fumariaceae* DC.—дымничныя.

*Corrydalis* DC.—*C. cava* Schweig. & Koerte, *C. solida* Sm.

*Fumaria* L.—*F. officinalis* L.

Сем. 65. *Cruciferae* Juss.—крестоцвѣтныя.

1. Подсем. *Siliculosae* L.—стручковыя.

*Nasturtium* R. Br.—*N. austriacum* Crtz., *N. amphibium* R. Br., *N. silvestre* R. Br., *N. palustre* DC., *N. anceps* Rehb.

*Barbarea* R. Br.—*B. vulgaris* R. Br., *B. stricta* Andrz.

*Turritis* L.—*T. glabra* L.

*Arabis* L.—*A. hirsuta* Scop., *A. pendula* L.

*Cardamine* L.—*C. impatiens* L., *C. pratensis* L., *C. amara* L.

*Hesperis* L.—*H. matronalis* L.

*Sisymbrium* L.—*S. officinale* Scop., *S. pannonicum* Jacq., *S. Loeselii* L.,

*S. Sophia* L., *S. Thalianum* Gay & Mon., *S. Alliaria* Scop.

*Erysimum* L.—*E. cheiranthoides* L., *E. strictum* Gaertn.

*Brassica* L.—\**B. oleracea* L., *B. Rapa* L., †\**B. Napus* L., †\**B. nigra* Koch.

*Sinapis* L.—*S. arvensis* L., †\**S. alba* L.

†*Erucastrum* Presl.—†*E. Pollichii* Sch. & Sp.

2. Подсем. *Siliculosae* L.—стручечковыя.

*Alýssum* L.—*A. montanum* L., *A. minimum* Willd.

*Psiloneuma* C. A. Mey.—*P. calycinum* C. A. Mey.

*Bertèroa* DC.—*B. incana* DC.

*Lunaria* L.—*L. rediviva* L.

*Draba* L.—*D. nemorosa* L., *D. verna* L.

†\**Cochlearia* L.—†\**C. officinalis* L., \**C. Armoracia* L.

*Camelina* Crtz.—*C. sativa* Crtz., *C. dentata* Pers.

*Thlaspi* L.—*T. arvense* L.

*Lepidium* L.—†*L. Draba* L., †\**L. sativum* L., *L. campèstre* R.Br.,

*L. ruderales* L.

*Capsella* Med.—*C. Bursa pastoris* Mueh.

3. Подсем. *Nucamentaceae* DC.—орѣшковые.

*Neslea* Desv.—*N. paniculata* Desv.

*Bunias* L.—*B. orientalis* L.

4. Подсем. *Lomentaceae* DC.—колѣнчатыя.

*Chorispòra* DC.—*C. tenella* DC.



- Raphanistrum Tourn.—*R. innocuum* Med.  
 \*Raphanus L.—\**R. sativus* L.
- Сем. 66 *Violariæae* DC.—фиалковые.  
*Viola* L.—*V. palustris* L., *V. epipsila* Led., *V. uliginosa* Schrad., *V. hirta* L.,  
*V. collina* Bess., †*V. odorata* L., *V. canina* L., *V. elatior* Fr., *V. stagnina* Kit., *V. mirabilis* L., *V. silvestris* Lam., *V. arenaria* DC., *V. tricolor* L.
- Сем. 67. *Droseræae* DC.—росянковые.  
*Drosera* L.—*D. rotundifolia* L., *D. anglica* Huds.
- Сем. 68. *Parnassieae* Rehb.—бѣлозоровыя.  
*Parnassia* L.—*P. palustris* L.
- Сем. 69. *Aristolochiæae* Juss.—кирказоновыя.  
*Aristolochia* L.—*A. Clematitis* L.  
 \**Siphisia* Rafn.—\**S. macrophylla* Aschs.  
*Asarum* L.—*A. europæum* L.
- Сем. 70. \**Cucurbitæae* Juss.—тыквенныя.  
 \**Cucurbita* L.—\**C. Pepo* L.  
 \**Cucumis* L.—\**C. sativus* L.  
 †\**Bryonia* L.—†\**B. alba* L.
- Сем. 71. *Rhamnæae* R.Br.—крушинныя.  
*Rhamnus* L.—*R. cathartica* L., *R. Frangula* L.
- Сем. 72. *Celastrineae* R.Br.—бересклетовыя.  
*Evyonymus* L.—\**E. europæus* L., *E. verrucosus* Scop.
- Сем. 73. \**Ampelideae* H. B. K.—виноградныя.  
 \**Ampelopsis* Michaux.—\**A. quinquefolia* R. & Sch.
- Сем. 74. *Polygalæae* Juss.—пастушьякы.  
*Polygala* L.—*P. vulgaris* L., *P. comosa* Schk., *P. amara* L.
- Сем. 75. *Acerineae* DC.—кленовыя.  
*Acer* L.—\**A. tataricum* L., *A. platanoides* L.
- Сем. 76. \**Hippocastanæae* DC.—желудниковыя.  
 \**Aesculus* L.—\**A. Hippocastanum* L.  
 \**Pavia* Boerh.—\**P. rubra* Lam., \**P. flava* DC.
- Сем. 77. *Cistineae* DC.—ладонниковыя.  
*Helianthemum* Tourn.—*H. vulgare* Gaertn.
- Сем. 78. *Hypericineae* DC.—зверобойныя.  
*Hypericum* L.—*H. perforatum* L., *H. quadrangulum* L., *H. hirsutum* L.
- Сем. 79. *Malvæae* R.Br.—просвирияковыя.  
*Malva* L.—†*M. Alcea* L., †*M. mauritiana* L., *M. neglecta* Wallr., *M. borealis* Wallm.  
*Lavatera* L.—*L. thuringiaca* L.
- Сем. 80. *Tiliæae* Juss.—липовыя.  
*Tilia* L.—*T. parvifolia* Ehrh., \**T. platyphylla* Scop.
- Сем. 81. *Vacciniæae* DC.—брусничныя.  
*Vaccinium* L.—*V. Myrtillus* L., *V. uliginosum* L., *V. Vitis idaea* L.  
*Oxycoccus* Tourn.—*O. palustris* Pers.
- Сем. 82. *Arbuteae* DC.—толокнянковыя.  
*Arctostaphylos* Adans.—*A. Uva ursi* Spr.  
*Andromeda* L.—*A. Polifolia* L.  
*Cassandra* Don.—*C. calyculata* Don.

- Сем. 83. *Ericaceae* Kl.—вересковые.  
*Calluna* Salisb.—*C. vulgaris* Salisb.
- Сем. 84. *Rhodoraceae* Kl.—родоровые.  
*Ledum* L.—*L. palustre* L.
- Сем. 85. *Pirolaceae* Lindl.—грушанковые.  
*Pirola* L.—*P. rotundifolia* L., *P. chlorantha* Sw., *P. media* Sw., *P. minor* L.  
*Monesis* Salisb.—*M. grandiflora* Salisb.  
*Chimophila* Pursh—*C. umbellata* Nutt.  
*Ramischia* Opiz—*R. secunda* Grck.
- Сем. 86. *Monotropeae* Nutt.—вертляницевыя.  
*Hipopitys* Scop.—*H. multiflora* Scop.
- Сем. 87. *Geraniaceae* DC.—журавельниковыя.  
*Geranium* L.—*G. pratense* L., *G. silvaticum* L., *G. palustre* L., *G. sanguineum* L., *G. sibiricum* L., *G. pusillum* L., *G. bohemicum* L., *G. columbinum* L., *G. rotundifolium* L., *G. molle* L., *G. Robertianum* L.  
*Erodium* L'Herit.—*E. cicutarium* L'Herit.
- Сем. 88. *Oxalideae* DC.—кислицевыя:  
*Oxalis* L.—*O. Acetosella* L., † *O. stricta* L.
- Сем. 89. *Lineae* DC.—льняныя.  
*Linum* L.—\* *L. usitatissimum* L., *L. flavum* L., *L. catharticum* L.
- Сем. 90. *Balsamineae* A. Rich.—бальзаминовыя.  
*Impatiens* L.—*I. Noli tangere* L., † *I. parviflora* DC.
- Сем. 91. *Alsineae* DC.—мокричныя.  
*Spergula* L.—*S. arvensis* L.  
*Spergularia* Pers.—*S. rubra* Pers.  
*Alsine* Wahlenb.—*A. tenuifolia* Wahlenb.  
*Sagina* L.—*S. procumbens* L., *S. nodosa* Fenzl.  
*Moehringia* L.—*M. trinervia* Clairv., *M. lateriflora* Fenzl.  
*Arenaria* L.—*A. serpyllifolia* L., *A. graminifolia* Schrad.  
*Stellaria* L.—*S. nemorum* L., *S. media* Vill., *S. Holostea* L., *S. glauca* With., *S. graminea* L., *S. longifolia* Mühlb., *S. uliginosa* Murr., *S. crassifolia* Ehrh.  
*Cerastium* L.—*C. triviale* Lk., *C. arvense* L.  
*Malachium* Fr.—*M. aquaticum* Fr.
- Сем. 92. *Sileneae* DC.—смолевковыя.  
*Gypsophila* L.—*G. paniculata* L., *G. muralis* L.  
*Dianthus* L.—† *D. barbatus* L., *D. Seguieri* Vill., *D. Carthusianorum* L.,  
*D. deltoides* L., *D. arenarius* L., *D. superbus* L.  
*Saponaria* L.—*S. officinalis* L.  
*Vaccaria* Med.—*V. vulgaris* Host.  
*Cucubalus* Tourn.—*C. baccifer* L.  
*Viscaria* Röhl.—*V. vulgaris* Röhl.  
*Silene* L.—*S. inflata* Sm., *S. procumbens* Murr., *S. Otites* Sm., *S. nutans* L., *S. tatrica* Pers., *S. viscosa* Pers., *S. noctiflora* L.  
*Melandryum* Röhl.—*M. pratense* Röhl., *M. silvestre* Röhl.  
*Lychnis* Tourn.—*L. Flos cuculi* L.  
*Githago* Desf.—*G. segetum* Desf.

## Группа γ. COROLLIFLORAE—Вѣнчикоцвѣтныя.

Сем. 93. *Primulaceae* Vent.—скоропѣлковые.

- Centunculus* L.—*C. minimus* L.  
*Trientalis* L.—*T. europaea* L.  
*Naumburgia* Moench.—*N. thyrsiflora* Rehb.  
*Lysimachia* L.—*L. vulgaris* L., *L. Nummularia* L.  
*Androsace* L.—*A. elongata* L., *A. septentrionalis* L., *A. filiformis* Retz.  
*Cortusa* L.—*C. Matthioli* L.  
*Primula* L.—*P. officinalis* Jacq.  
*Hottonia* L.—*H. palustris* L.

Сем. 94. *Lentibulariaceae* Rich.—пузырчатковые.

- Utricularia* L.—*U. vulgaris* L., *U. intermedia* Hayne, *U. minor* L.

Сем. 95. *Cuscutaeae* Link.—повиличные.

- Cuscuta* L.—*C. europaea* L., *C. lupuliformis* Krock.

Сем. 96. *Convolvulaceae* Vent.—вьюнковые.

- Calystegia* R.Br.—*C. sepium* R.Br.  
*Convolvulus* L.—*C. arvensis* L.

Сем. 97. *Borragineae* L.—бурачниковые.

- Asperugo* L.—*A. procumbens* L.  
*Echinopspermum* Sw.—*E. lappula* Lehm.  
*Cynoglossum* L.—*C. officinale* L.  
*Omphalodes* Moench.—*O. scorpioides* Schrk.  
†\* *Borrage* L.—†\* *B. officinalis* L.  
*Lycopsis* L.—*L. arvensis* L.  
*Nonnea* Med.—*N. pulilla* DC.  
*Symphytum* L.—*S. officinale* L., *S. asperum* Sims.  
*Echium* L.—*E. vulgare* L.  
*Pulmonaria* L.—*P. officinalis* L., *P. angustifolia* L.  
*Lithospermum* L.—*L. officinale* L., *L. arvense* L.  
*Achusa* L.—*A. officinalis* L.  
*Myosotis* L.—*M. palustris* With., *M. caespitosa* Schultz, *M. stricta* Lk.,  
*M. silvatica* Hoffm., *M. intermedia* Lk., *M. sparsiflora* Mican.

Сем. 98. *Polemoniaceae* Vent.—синухи.

- Polemonium* L.—*P. coeruleum* L.

Сем. 99. *Solanaceae* Juss.—пасленовые.

- \* *Lycium* L.—† *L. barbarum* L.  
\* *Lycopersicum* Mill.—\* *L. esculentum* Mill.  
*Solanum* L.—\* *S. tuberosum* L., *S. nigrum* L., *S. Dulcamara* L.  
† *Nicandra* Adans.—† *N. physaloides* Gaertn.  
† *Hyoscyamus* L.—† *H. niger* L.  
† *Datura* L.—† *D. Stramonium* L.

Сем. 100. *Scrophulariaceae* R.Br.—норичниковые.

- Verbascum* L.—*V. Thapsus* L., *V. thapsiforme* Schrad., *V. phlomoides* L.,  
*V. Lychnitis* L., *V. nigrum* L., *V. orientale* M.B., *V. collinum* Schrad.  
*Scrophularia* L.—*S. nodosa* L., *S. alata* Gilib., † *S. vernalis* L.  
*Linaria* Juss.—*L. vulgaris* Mill., *L. minor* Desf.  
† *Mimulus* L.—† *M. luteus* L.  
*Gratiola* L.—*G. officinalis* L.

- Limosella* L.—*L. aquatica* L.  
 †*Digitalis* L.—†*D. grandiflora* Lam.  
*Veronica* L.—*V. scutellata* L., *V. Anagallis* L., *V. Beccabunga* L., *V. Chamaedrys* L., *V. officinalis* L., *V. prostrata* L., *V. austriaca* L., *V. latifolia* L., *V. longifolia* L., *V. spuria* L., *V. spicata* L., *V. incana* L., *V. serpyllifolia* L., *V. arvensis* L., *V. verna* L., *V. triphyllus* L., *V. agrestis* L.  
*Odontites* Hall.—*O. rubra* Pers.  
*Euphrasia* L.—*E. officinalis* L.  
*Rhinanthus* L.—*R. Crista galli* L.  
*Pedicularis* L.—*P. palustris* L., *P. comosa* L. *P. Scéptrum Carolinum* L.  
*Melampyrum* L.—*M. cristatum* L., *M. nemorosum* L., *M. pratense* L.  
 Сем. 101. **Labiatae** Juss.—губоцвѣтныя.  
 †*Elsholtzia* Willd.—†*E. cristata* Willd.  
*Mentha* L.—*M. silvestris* L., *M. aquatica* L., *M. arvensis* L.  
*Lycopus* L.—*L. europaeus* L., *L. exaltatus* L. fil.  
*Origanum* L.—*O. vulgare* L., \**O. Majorana* L.  
*Thymus* L.—\**T. vulgaris* L., *T. Serpyllum* L.  
 \**Hyssopus* L.—\**H. officinalis* L.  
 \**Satureja* L.—\**S. hortensis* L.  
*Calamintha* Munch.—*C. Acinos* Clairv.  
*Clinopodium* L.—*C. vulgare* L.  
*Salvia* L.—\**S. officinalis* L., *S. glutinosa* L., *S. pratensis* L., *S. silvestris* L., *S. verticillata* L.  
*Nepeta* L.—*N. Cataria* L., *N. nuda* L.  
*Glechoma* L.—*G. hederacea* L.  
*Dracopcephalum* L.—*D. Ruyschiana* L., *D. thymiflorum* L.  
*Lamium* L.—*L. amplexicaule* L., *L. purpureum* L., *L. maculatum* L., *L. album* L.  
*Galeobdolon* Huds.—*G. luteum* Huds.  
*Galeopsis* L.—*G. Ladanum* L., *G. Tétrahit* L., *G. versicolor* Curt.  
*Stachys* L.—*S. silvatica* L., *S. palustris* L., *S. annua* L., *S. recta* L.  
*Betonica* L.—*B. officinalis* L.  
*Ballota* L.—*B. nigra* L.  
*Leonurus* L.—*L. Cardiacus* L.  
*Phlomis* L.—*P. tuberosa* L.  
*Scutellaria* L.—*S. galericulata* L., *S. hastifolia* L.  
*Brunella* L.—*B. vulgaris* L., *B. grandiflora* Jacq.  
*Ajuga* L.—*A. reptans* L., *A. genevensis* L.  
 Сем. 102. **Plantagineae** Juss.—подорожниковыя.  
*Plantago* L.—*P. major* L., *P. media* L., *P. lanceolata* L.  
 Сем. 103. **Orobanchaceae** Lindl.—заразиковыя.  
*Orobanche* L.—*O. Libanotidis* Rupr.  
*Lathraea* L.—*L. Squamaria* L.  
 Сем. 104. **Oleaceae** Lindl.—маслинные.  
 \**Syringa* L.—\**S. vulgaris* L., \**S. Josikaea* Jacq.  
*Fraxinus* L.—*F. excelsior* L., \**F. americana* L.  
 Сем. 105. **Gentianeae** Juss.—горечавковыя.  
*Menyanthes* L.—*M. trifoliata* L.

- Gentiàna* L.—*G. Cruciàta* L., *G. Pneumonàthe* L., *G. Amarèlla* L.  
*Erythraea* Rich.—*E. Centàurium* Pers.  
Сем. 106. *Apocýneae* R.Br.—кутровыя.  
† *Vinca* L.—† *V. minor* L.  
Сем. 107. *Asclepiàdeae* R.Br.—ластовниковыя.  
*Vincetòxicum* Moench.—*V. officinàle* Moench.  
Сем. 108. *Caprifoliàceae* Juss.—жимолостныя.  
*Addòxa* L.—*A. Moschatellina* L.  
*Sambucus* L.—† *S. Ebulus* L., †\* *S. nigra* L., *S. racemòsa* L.  
*Viburnum* L.—\* *V. Lantàna* L., *V. Opulus* L.  
*Lonicèra* L.—*L. Xylòsteum* L., \* *L. tatàrica* L., \* *L. coerùlea* L.  
\* *Symphoricàrpus* Dillen.—\* *S. racemòsus* Michx.  
*Linnaea* Gronovius—*L. boreàlis* L.  
Сем. 109. *Rubiàceae* Juss.—маренныя.  
† *Sheràrdia* L.—† *S. arvensis* L.  
*Aspèrula* L.—*A. galioides* M. B., *A. tinctòria* L., *A. Aparine* Schott.,  
*A. odoràta* L.  
*Gálium* L.—*G. triflòrum* Michx., *G. Aparine* L., *G. uliginòsum* L., *G. palustre* L.,  
*G. trifidum* L., *G. boreàle* L., *G. rubioides* L., *G. verum* L.,  
*G. Mollugo* L., *G. silvaticum* L.  
Сем. 110. *Dipsàceae* DC.—ворсянковыя.  
*Knautia* Coulter.—*K. arvensis* Coulter.  
*Succisa* Vaill.—*S. pratensis* Moench.  
*Scabiòsa* L.—*S. ochroleuca* L.  
Сем. 111. *Valeriàneae* DC.—мауновыя.  
*Valeriàna* L.—*V. officinàlis* L.  
Сем. 112. *Campanulàceae* Juss.—колокольчиковыя.  
*Jasione* L.—*J. montàna* L.  
† *Phyteuma* L.—† *Ph. spicatum* L.  
*Campanula* L.—*C. rotundifolia* L., *C. bononiensis* L., *C. rapunculoides* L.,  
*C. Trachelium* L., *C. latifolia* L., *C. patula* L., *C. persicifolia* L., *C. Cervicària* L.,  
*C. glomerata* L., *C. sibirica* L.  
Сем. 113. *Compòsitae* Adans.—сложноцвѣтныя.  
I. Подсем. *Corymbiferae* Vaill.—щитконосныя.  
*Eupatorium* L.—*E. cannabinum* L.  
*Tussilago* L.—*T. Fàrfara* L.  
*Petasites* Gaertn.—† *P. officinàlis* Moench., *P. spurius* Rehb.  
*Galatella* Cass.—*G. punctata* Lindl.  
*Aster* L.—*A. Amellus* L.  
*Erigeron* L.—*E. canadensis* L., *E. acer* L.  
†\* *Bellis* L.—†\* *B. perennis* L.  
*Solidago* L.—*S. virga aurea* L., † *S. canadensis* L.  
† *Telèkia* Baumg.—† *T. speciosa* Baumg.  
*Inula* L.—† *I. Helénium* L., *I. salicina* L., *I. hirta* L., *I. britànnica* L.  
*Xanthium* L.—*X. strumarium* L., † *X. spinosum* L.  
\* *Heliànthus* L., \* *H. annuus* L., \* *H. tuberosus* L.  
*Bidens* L.—*B. tripartitus* L., *B. cernuus* L.  
*Filago* L.—*F. arvensis* L.  
*Gnaphàlium* L.—*G. silvaticum* L., *G. uliginosum* L.

- Antennària* Gaertn.—*A. dioica* Gaertn.  
*Helichrysum* DC.—*H. arenarium* DC.  
*Artemisia* L.—*A. Absinthium* L., *A. procera* Willd., *A. campestris* L.,  
*A. scoparia* W. & K., \**A. Dracunculus* L., *A. vulgaris* L.  
*Achillea* L.—*A. Ptarmica* L., *A. Millefolium* L., †*A. nobilis* L.  
*Anthemis* L.—*A. tinctoria* L., *A. arvensis* L., *A. Còtula* L.  
*Leucanthemum* Tourn.—*L. vulgare* Lam.  
†*Pyrèthrum* Gaertn.—†*P. corymbosum* Willd.  
*Matricaria* L.—*M. Chamomilla* L., *M. discoidèa* DC., *M. inodora* L.  
*Tanacetum* L.—\**T. Balsamita* L., *T. vulgare* L.  
*Ligularia* Cass.—*L. sibirica* Cass.  
*Senécio* L.—*S. paluster* DC., *S. vulgaris* L., *S. viscosus* L., *S. silvaticus* L., *S. erucaefolius* L., *S. Jacobaea* L., *S. sarracenicus* L., *S. paludosus* L.  
2. Подсем. *Flosculosae* Tourn.—трубчатые.  
*Echinops* L.—*E. sphaerocéphalus* L.  
*Carlina* L.—*C. vulgaris* L.  
*Centaurea* L.—*C. Jacèa* L., *C. Phrygia* L., *C. Cyanus* L., *C. Scabiòsa* L.,  
*C. Biebersteinii* DC.  
*Serratula* L.—*S. tinctoria* L. *S. coronata* L.  
*Lappa* Tourn.—*L. major* Gaertn., *L. minor* DC., *L. tomentosa* Lam.  
*Onopordon* L.—*O. Acanthium* L.  
*Carduus* L.—*C. crispus* L., *C. nutans* L.  
*Cirsium* Tourn.—*C. lanceolatum* Scop., *C. eriophorum* Scop., †*C. ciliatum* M. B., *C. oleraceum* Scop., *C. heterophyllum* All., *C. palustre* Scop.,  
*C. arvense* Scop.  
\**Cynara* L.—\**C. Cardunculus* L., \**C. Scolymus* L.  
†*Silybum* Vaill.—†*S. Marianum* Gaertn.  
3. Подсем. *Semiflosculosae* Tourn.—язычковые.  
*Lampsana* L.—*L. communis* L.  
*Cichorium* L.—*C. Intybus* L., \**C. Endivia* L.  
*Leontodon* L.—*L. autumnalis* L., *L. hastilis* L.  
*Picris* L.—*P. hieracioides* L.  
*Trogopogon* L.—\**T. porrifolius* L., *T. pratensis* L.  
*Scorzonera* L.—*S. humilis* L., \**S. hispànica* L., *S. purpurea* L.  
*Achyrophorus* Scop.—*A. maculatus* Scop.  
*Taraxacum* Juss.—*T. officinale* Wigg.  
*Lactuca* L.—\**L. sativa* L., *L. Scariola* L., *L. muralis* Less.  
*Sonchus* L.—*S. oleraceus* L., *S. asper* Vill., *S. arvensis* L.  
*Crépis* L.—*C. praemorsa* Tausch., *C. biennis* L., *C. tectorum* L., *C. paludosa* Moench., *C. sibirica* L.  
*Hieracium* L.—*H. Pilosella* L., *H. auriculiforme* Fr., *H. Auricula* Lam. & DC., *H. collinum* Gochn., *H. cymosum* L., *H. echinoides* Lumn., *H. florentinum* All., *H. magyàricum* N. & P., *H. murorum* L., *H. vulgatum* Fr., *H. umbellatum* L.

## Алфавитный списокъ сокращенныхъ именъ авторовъ.

- Adans.**—**Adanson**, французскій ботаникъ и путешественникъ, ум. въ 1806 г., авторъ Исторіи ботаники и плана естественныхъ семействъ растений, и др.
- Ait.**—**Aiton**, завѣдующій садомъ Кью—близъ Лондона, ум. въ 1793 г., авторъ *Hortus Kewensis*, 1789.
- All.**—**Allioni**, профессоръ въ Туринѣ, ум. въ 1804 г., описалъ виды рѣдкихъ растений Пьемонта, 1755, составилъ *Flora Pedemontana*, 1785, и др.
- Andrz.**—**Andrzejowski**, профессоръ въ Вильнѣ, ум. въ 1868 г., изслѣдователь Украйны и въ особенности Подольской губерніи, составилъ ботаническій словарь, 1827.
- Aschs.**—**Ascherson**, хранитель гербарія въ Берлинѣ, авторъ флоры Бранденбургской провинціи, 1866.
- Baumg.**—**Baumgarten**, врачъ и путешественникъ, ум. въ 1843 г., авторъ флоры Лейпцига, 1790, и перечня туземныхъ растений Трансильваніи, 1816—46.
- Bernh.**—**Bernhardi**, профессоръ въ Эрфуртѣ, ум. въ 1850 г., составилъ каталогъ растений Эрфуртскаго сада, 1799, списокъ Эрфуртскихъ растений, 1800, руководство къ ботаникѣ, 1804, и др.
- Bess.**—**Besser**, директоръ кievскаго ботаническаго сада, ум. въ 1842 г., авторъ флоры Галиціи, 1809, перечня растений юго-западной Россіи, 1822, нѣсколькихъ монографій о полыни, и мн. др.
- Blume**, директоръ гербарія въ Лейденѣ, ум. въ 1862, авторъ многихъ сочиненій о флорѣ Явы и Остѣ-Индіи.
- Boerh.**—**Boerhave**, профессоръ въ Лейденѣ, ум. въ 1738 г., составилъ списокъ растений Лейденскаго сада, 1710, и другой списокъ, 1720.
- Borkh.**—**Borkhausen**, авторъ описанія древесныхъ породъ Гессенъ - Дармштата, 1790, ботаническаго словаря, 1797, и др.
- A. Br.**—**Braun**, Alexander директоръ ботаническаго сада и профессоръ въ Берлинѣ, ум. въ 1877 г., оставилъ много сочиненій о тайнобрачныхъ и по физиологій растений.
- R. Br.**—**Brown**, Robert, бібліотекарь Британскаго музея, знаменитый англійскій ботаникъ, авторъ Ново-Голландской флоры, 1810, и многихъ другихъ сочиненій, ум. въ 1858 г.



- Cambes.**—**Cambessèdes**, ботаникъ въ Монпелье, ум. въ 1863 г., составилъ перечень растений Балеарскихъ острововъ, 1827, и пр.
- Cass.**—**Cassini**, французскій ботаникъ, писавшій о сложноцвѣт., 1826—34.
- Chaix**, аббатъ въ Дофинѣ, ум. въ 1800 г., писалъ о растеніяхъ Дофинѣ.
- Clairv.**—**Clairville**, швейцарскій ботаникъ, ум. въ 1830 г., авторъ Руководства къ герборизаціи по Швейцаріи, 1811.
- Coulter**, ирландскій врачъ и путешественникъ по Мексикѣ, ум. въ 1843 г. въ Дублинѣ, авторъ мемуара о ворсянковыхъ, 1823.
- Crtz.**—**Crantz**, профессоръ ботаники въ Вѣнѣ, ум. въ 1799 г., писалъ о растеніяхъ Австріи, 1762—67, о зонтичныхъ, 1767, крестоцвѣтныхъ, 1769.
- Curt.**—**Curtis**, аптекарь въ Лондонѣ, ум. въ 1799 г., написалъ флору Лондона, 1777—87, описалъ британскіе злаки, 1787, и выпускалъ ботаническій журналъ: *The Botanical Magazine*, съ 1787 г.
- Cuss.**—**Cusson**, профессоръ въ Монпелье, ум. въ 1783 г., писалъ о зонтичныхъ.
- Cust.**—**Custor**.
- DC.**—**de Candolle**, Augustin Pyramus, профессоръ въ Женевѣ, ум. въ 1841 г., творецъ новой системы растений, по которой расположены все виды растительнаго царства, описанные въ началомъ имъ сочиненіи: *Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis*.
- Desf.**—**Desfontaines**, французскій ботаникъ и путешественникъ по Алжиру, ум. въ 1833 г., написалъ Исторію деревьевъ и кустарниковъ, 1809, *Flora atlantica* и пр.
- Desr.**—**Desrousseaux**.
- Desv.**—**Desvaux**, профессоръ въ Анжерѣ, ум. въ 1856 г., авторъ флоры Анжу, редакторъ журнала прикладной ботаники: *Journal de Botanique appliquée à l'agriculture, pharmacie etc.*, 1813—14.
- Dill.**—**Dillenius**, нѣмецкій ботаникъ, жившій въ Англіи, ум. въ 1747 г., авторъ сочиненія *Hortus Elthamensis*, 1732, и др.
- Don, D.** библіотекарь Линнеевскаго Общества въ Лондонѣ, ум. въ 1841 г., написалъ флору Непала: *Prodromus Florae Nepalensis*, 1802—3.
- Don, G.**—англійскій ботаникъ и путешественникъ, ум. въ 1856 г., писалъ о двупокровныхъ растеніяхъ, 1831—38.
- Ehrh.**—**Ehrhart**, ученикъ Линнея, аптекарь въ Ганноверѣ и Стокгольмѣ, ум. въ 1795 г., написалъ: *Добавленія къ изученію природы*, 1787—92.
- Endl.**—**Endlicher**, профессоръ въ Вѣнѣ, авторъ естественной системы, ум. въ 1849 г.
- Fée**, профессоръ въ Страсбургѣ, ум. въ 1874 г., извѣстный криптогамистъ, написавшій между прочимъ мемуаръ о лишаяхъ, 1838, и изслѣдованіе о папоротникахъ, 1844—66.
- Fenzl**, профессоръ въ Вѣнѣ, описавшій новыя растенія Сиріи, 1842, и выпустившій «иллюстрированную ботанику», 1857.
- Fisch.**—**Fischer**, F. E. L., ум. въ Петербургѣ въ 1854 г., авторъ многихъ отдѣльныхъ монографій: о *Zygophyllaceae*, 1833, о родѣ *Geum* 1809, о разводимыхъ тополяхъ. 1842, объ астрагалахъ, 1853, и пр.
- Foug.**—**Fougeroux**, французскій ботаникъ, ум. въ 1789 г., авторъ *Commentationes botanicae*.
- Fr.**—**Fries**, профессоръ въ Упсалѣ, знаменитый лихенологъ, микологъ и из-

- слѣдователь флоры Скандинавіи; написалъ между многими другими сочиненіями *Summa vegetabilium Scandinaviae*, 1846—49.
- Gaertn.**—**Gärtner**, профессоръ петербургской академіи наукъ (1768—73), затѣмъ врачъ въ Вюртембергѣ, умъ въ 1791 г., написалъ извѣстное сочиненіе о плодахъ и сѣменахъ, 1788—1807.
- Grck.**—**Garcke**, профессоръ и хранитель гербарія въ Берлинѣ, написалъ флору Галле, 1848, флору сѣверной и средней Германіи.
- Gay & Mon.**—**Gay & Monnard** — французскіе ботаники, писавшіе о крестоцвѣтныхъ.
- Gilib.**—**Gilibert**, профессоръ въ Вильнѣ, затѣмъ въ Ліонѣ, гдѣ и умеръ въ 1814 г., авторъ литовской флоры, 1781.
- Gleditsch**, профессоръ въ Берлинѣ, умъ въ 1786 г., авторъ медицинской ботаники, 1788—89, *Methodus fungorum*, 1753, и пр.
- Gmel.**—**Gmelin**, J. G., профессоръ петербургской академіи наукъ (1731—49) и путешественникъ по Сибири, умъ въ 1755 г. въ Тюбингенѣ; написалъ Сибирскую флору, 1747—69, путешествіе по Сибири, 1733—43, и пр.
- Gochn.**—**Gochnat**, писалъ о сложноцвѣтныхъ: *Tentamen medico-botanicum de Cichoriaceis*, 1808.
- Good.**—**Goodenough**, англійскій ботаникъ, умъ въ 1827 г., писалъ о морскихъ водоросляхъ, 1795.
- Grab.**—**Grabowski**, аптекарь въ Силезіи, умъ въ 1842 г., написалъ вмѣстѣ съ Виммеромъ, Силезскую флору, 1827—29; см. **Wim. & Grab**.
- Gray**, Asa, профессоръ въ Кембриджѣ, авторъ извѣстнаго учебника ботаники: *Elements of botany*, 1836, и флоры Соединенныхъ Штатовъ, 1845.
- Grisb.**—**Grisebach**, профессоръ въ Геттингенѣ, написалъ монографію о горечавковыхъ, 1839; основы систематической ботаники, 1854, и пр.
- Gronovius**, сенаторъ въ Лейденѣ, умъ въ 1762 г., авторъ флоры Виргиніи, 1739—43, и флоры Востока, 1755 г.
- Haencke**, путешественникъ по южной Америкѣ, Мексикѣ, Филиппинскимъ островамъ и пр., умъ въ 1817 г., въ Бولیвіи.
- Hall.**—**Haller**, профессоръ въ Геттингенѣ, впоследствии лейбъ-медикъ при англійскомъ дворѣ, умъ въ 1777 г., въ Бернѣ, составилъ списокъ растений Геттингенскаго сада, 1753, перечень рѣдкихъ швейцарскихъ растений, 1760, *Bibliotheca botanica*, 1771—72, и пр.
- Hartm.**—**Hartman**, шведскій ботаникъ и врачъ, умъ въ 1849 г., авторъ руководства къ скандинавской флорѣ, 1820, шведской и норвежской флоры, 1846.
- Hayne**, профессоръ ботаники въ Берлинѣ, умъ въ 1832 г., написалъ дендрологическую флору окрестностей и берлинскихъ садовъ, 1822; сочиненіе о медицинскихъ растенияхъ, 1805—46, и пр.
- L'Hérit.**—**L'Héritier**, членъ института въ Парижѣ, умъ въ 1800 г., авторъ *Geraniologia*, 1787—88, *Sertum anglicum*, 1788, и пр.
- St. Hil.**—**Saint-Hilaire**, французскій ботаникъ и путешественникъ по Бразиліи, написалъ путешествіе по Бразиліи, 1825—33, и др.
- Hoffm.**—**Hoffmann**, G. F., профессоръ московскаго университета, умъ въ 1826 г., авторъ монографіи зонтичныхъ 1814 и 1816, каталога университетскаго гербарія, 1824—26, и мн. др.
- Hoppe**, профессоръ въ Регенсбургѣ, умъ въ 1846 г., редакторъ журнала: «Регенсбургская флора», авторъ *Caricologia germanica*, 1826.

- Host**, лейбъ-медикъ въ Вѣнѣ, ум. въ 1834 г., авторъ австрійской флоры, изображеній австрійскихъ злаковъ, и пр.
- Huds.**—**Hudson**, аптекарь въ Лондонѣ, ум. въ 1793 г., написалъ флору Англии.
- H. B. K.**—**Humboldt, Bonpland & Kunth**, авторы роскошѣйшаго сочиненія, изданнаго Гумбольтомъ въ 1822 г., о растеніяхъ, собранныхъ подъ тропиками во время путешествія Гумбольта съ Бопланомъ, французскимъ ботаникомъ, ум. въ 1858, и обработанныхъ послѣднимъ вмѣстѣ съ Кунтомъ, берлинскимъ профессоромъ, ум. въ 1850 г.
- Jacq.**—**Jacquin**, австрійскій врачъ, ботаникъ и путешественникъ по Вост. Индіи, ум. въ 1817 г., написалъ: Ботаническія наблюденія, 1764, Австрійскую флору, Изображенія рѣдкихъ растеній и пр.
- Juss.**—**Jussieu, Antoine Laurent de**, съ 1778 г. профессоръ при парижскомъ ботаническомъ садѣ, знаменитый ботаникъ и творецъ естественной системы растеній, ум. въ 1836 г., оставилъ извѣстные сочиненія: *Genera plantarum secundum ordines naturales disposita*, 1789 г., основанія естественной системы растеній, 1824, и множество монографій.
- A. Juss.**—**Jussieu, Adrien de**, братъ Антона Жюсье, ум. въ 1853 г., авторъ монографій молочайныхъ, 1824, рутовыхъ, 1825, и мн. др. и извѣстнаго курса ботаники, 1843.
- Kit.**—**Kitaibel**, профессоръ въ Пестѣ, ум., въ 1817 г., описалъ и изобразилъ рѣдкія растенія Венгріи, 1803—12, см. **W. & K.** или **Wald. & Kit.**
- Kl.**—**Klotzsch**, аптекарь и хранитель берлинскаго гербарія, ум. въ 1860 г., писалъ о Бегоніяхъ, 1854, молочайныхъ, 1859, и др. началъ издавать микологическій гербарій, 1855—59.
- Kl. & Grck.**—**Klotzsch & Garcke** обработали ботаническій матеріалъ, собранный во время путешествія принца Вальдемара, 1862.
- Koch, W. D. J.**, профессоръ въ Эрлангенѣ, ум. въ 1849 г., авторъ образцоваго описанія растеній Германіи и Швейцаріи въ сочиненіи: *Synopsis Florae germanicae et helveticae*, 1837.
- Kölle**, докторъ въ Байрейтѣ, ум. въ 1797 г., составилъ флору княжества Байрейтъ, 1798, писалъ также объ аконитѣ, 1786.
- Krockner**, врачъ въ Бреславлѣ, ум. въ 1823 г., написалъ флору Силезіи, 1787—1823.
- Kuhn, Max.**, ботаникъ въ Берлигѣ, писалъ объ африканскихъ и мексиканскихъ папоротникахъ, 1868—69.
- Lam.**—**Lmk.**—**La Marck**, французскій естествоиспытатель, ум. въ 1829 г. въ Парижѣ, авторъ французской флоры, 1778, естественной исторіи растеній, 1802, ботанической энциклопедіи, 1783—1817.
- Led.**—**Ledb.**—**Ledebour**, профессоръ въ Дерптѣ, ум. въ 1851 г. въ Мюнхенѣ, авторъ путешествія по Алтаю, 1829—34, изображенія русскихъ растеній, 1829—34, и русской флоры, 1842—53.
- Lehm.**—**Lehmann**, директоръ ботаническаго сада въ Гамбургѣ, ум. въ 1860 г., написалъ монографіи: примуль, 1817, лапчатокъ, 1820, и описалъ много новыхъ растеній Гамбургскаго сада, 1828—57.
- Less.**—**Lessing**, авторъ многихъ сочиненій о сложноцвѣтныхъ: *Synopsis generum Compositarum*, 1832, *De generibus Synagoccephalarum*, 1832, сложноцвѣтныя берлинскаго гербарія и пр.
- Leyss.**—**Leysser**, авторъ флоры Галле, 1761, ум. въ 1815 г.

- Lindl.**—**Ldl.**—**Lindley**, John, профессоръ въ Лондонѣ, ум. въ 1865 г., авторъ британской флоры, 1829, ископаемой флоры Великобританіи, 1831—37; *Sertum orchidaceum*, 1838, и пр.
- Lk.**—**Link**, профессоръ въ Берлинѣ, ум. въ 1851 г., авторъ руководства полезныхъ растений, 1829—33, изображеній избранныхъ растений берлинскаго сада, 1820—28, и пр.
- L.**—**Linné**, Карлъ, профессоръ естественной исторіи въ Упсалѣ и творецъ половой системы растений, ум. въ 1778 г., авторъ *Systema naturae*, 1735; *Genera plantarum*, 1737, *Species plantarum*, 1753, *Systema vegetabilium*, 1774, *Philosophia botanica*, 1751, и мн. др.
- L. f.**—**Linné filius**, издалъ двѣ декады рѣдкихъ растений Упсальскаго сада, 1762—66, описалъ новые роды злаковъ, 1779, и пр., ум. въ 1783 г.
- Lodd.**—**Loddiges**, знаменитый лондонскій садоводъ, ум. въ 1820 г., издатель журнала *Botanical Cabinet*, 1818—24.
- Lumn.**—**Lumnitzer**, написалъ *Flora Posoniensis*, 1791, ум. въ 1806 г. въ Пресбургѣ.
- M. B.**—**Marschall von Bieberstein**, русскій ботаникъ, ум. въ 1826 г., авторъ флоры Крыма и Кавказа, 1808—19 и др.
- Maxim.**—**Maximowicz**, С. J., академикъ въ Петербургѣ, написалъ: признаки новыхъ растений Японіи и Манджуріи, 1866—71, и азиатскихъ растений, 1877, *Primitiae Florae Amurensis*, 1859 г., монографію спирейныхъ, и мн. др.
- Med.**—**Medikus**, ум. въ 1808 г., написалъ философскую ботанику, 1789—91, о физиологій и анатоміи растений, 1803, о сѣверо-американскихъ деревьяхъ, 1792, и пр.
- M. & K.**—**Mertens & Koch**, первый—профессоръ въ Бременѣ, ум. въ 1831 г., сотрудникъ Коха, профессора въ Эрлангенѣ, по обработкѣ флоры Германіи *Röhling*, 1823—39.
- C. A. M.**—**Mey.**—**Meyer**, Carl Ant., академикъ въ Петербургѣ (1839—55) и путешественникъ по Сибири, ум. въ 1855 г., авторъ флоры Тамбовской губерніи и Вятской и очень многихъ монографій; положилъ основаніе сборнику, подъ названіемъ: «Матеріалы къ ближайшему познанію произрастаемости Россійской имперіи».
- Michx.**—**Michaux**, французскій ученый, ум. въ 1855 г.; авторъ исторіи сѣвероамериканскихъ лѣсныхъ деревьевъ, 1810—13, и нѣсколькихъ мемуаровъ.
- Mikan**, профессоръ въ Прагѣ, ум. въ 1814 г., составилъ каталогъ растений Пражскаго ботаническаго сада, 1776.
- Mill.**—**Miller**, англійскій садоводъ, ум. въ 1771 г.; писалъ о системѣ Линнея и составилъ садовый лексиконъ: *the Gardeners Dictionary*.
- Mirb.**—**Mirbel**, французскій физиологъ растений, ум. въ 1854 г., сотрудникъ Ламарка по Естественной исторіи растений.
- Mnch.**—**Mönch** (Moench), профессоръ въ Марбургѣ, ум. въ 1805 г., авторъ *Enumeratio plantarum indigenarum Hassiae*, 1777.
- Mühlb.**—**Mühlenberg**, пасторъ въ Пенсильваніи, ум. въ 1817 г., авторъ Каталога растений Сѣверной Америки.
- Murr.**—**Murray**, ученикъ Линнея, профессоръ въ Геттингенѣ, ум. въ 1791 г., писалъ о растеніяхъ Геттингена, 1770 и др.
- N. & P.**—**Nägeli & Peter**, первый—выдающійся ботаникъ, профессоръ, прежде


- въ Цюрихѣ, а съ 1857 г.—въ Мюнхенѣ, написалъ вмѣстѣ съ Петеръ, профессоромъ въ Геттингенѣ, обширную монографію о ястребинкахъ: *Die Hieracien Mittel-Europas*, 1885.
- Nutt**—**Nuttall**, профессоръ въ Филадельфій и путешественникъ по сѣверо-западной Африкѣ, ум. въ 1859 г., авторъ сочиненій: *Роды растений Сѣверной Америки*, 1818, *Сѣверо-Американскій лѣсъ*, 1842—54.
- Opiz**, въ Прагѣ, ум. въ 1858 г., писалъ о тайнобрачныхъ Германіи, 1816, о растеніяхъ Богеміи, 1823, и др.
- P. B.**—**Palisot de Beauvois**, французскій академикъ, путешественникъ по Африкѣ и Сѣверной Америкѣ, ум. въ 1820 г., писалъ о злакахъ: *Essay d'une nouvelle Agrostographie*, 1812, о флорѣ Африки, 1804—7, о мхахъ—*Muscologie*, 1822.
- Pall.**—**Pallas**, академикъ и профессоръ естественныхъ наукъ въ Петербургѣ, выдающійся путешественникъ и естествоиспытатель, ум. въ 1811 г. въ Берлинѣ, авторъ Путешествія по Россійскому Царству, 1771—76, Русской флоры—*Flora rossica*, 1784—88, Монографіи астрагаловъ, 1800, и пр.
- Panz.**—**Panzer**, нѣмецкій врачъ, ум. въ 1829 г., писалъ о злакахъ, 1813, объ остъ-инскомъ хлѣбномъ деревѣ, 1783.
- Pers.**—**Persoon**, врачъ и ботаникъ, ум. въ 1837 г. въ Парижѣ, писалъ о системѣ растений Линнея, о грибахъ: *Synopsis methodica fungorum*, 1801.
- Poll**—**Pollich**, врачъ и ботаникъ, ум. 1870 г., авторъ *Historia plantarum in Palatinatu*, 1776—77.
- Presl**, профессоръ въ Прагѣ, ум. въ 1852 г., авторъ *Reliquiae Haenkeanae*, 1830—36, флоры Сициліи, 1826, *Tentamen Pteridographiae*, 1836, *Numenophyllaceae*, 1843, и пр.
- Pursh**, англійскій ботаникъ и путешественникъ, ум. въ 1820 г., въ Канадѣ, составилъ флору Сѣверной Америки, 1816.
- Raf.**—**Rafin.**—**Rafinesque**, профессоръ въ Сѣверной Америкѣ и путешественникъ, ум. въ 1840 г., авторъ медицинской флоры Соединенныхъ штатовъ, 1828—30, новой флоры и ботаники Сѣверной Америки, 1836.
- Rebent.**—**Rebentisch**, нѣмецкій врачъ, ум. въ 1810 г., авторъ сочиненій по флорѣ Пруссіи: *Prodromus florae neomarchicae*, 1804, *Index plantarum circa Berolinum nascentium*, 1805.
- Red.**—**Redouté**, придворный живописецъ Людовика XVI, ум. въ 1840 г., рисовалъ таблицы къ ботаникѣ Ж. Ж. Руссо, 1805, къ монографіи Лилейныхъ, 1802—16, и др.
- Reich.**—**Reichard**, врачъ и ботаникъ во Франкфуртѣ на Майнѣ, ум. въ 1782 г., написалъ флору Франкфурта, 1772—8; перечень растений Зенкенбергенскаго ботаническаго сада, 1782.
- Rchb.**—**Reichenbach**, G. Ludw., профессоръ въ Дрезденѣ, авторъ иллюстрированной флоры Германіи, Критическихъ растений Европы, и мн. др.
- Retz.**—**Retzius**, профессоръ въ Лундѣ, ум., въ 1821 г., авторъ Скандинавской флоры, 1779.
- Rich.**—**Richard**, L. Cl. Mar., профессоръ ботаники въ Парижѣ, путешественникъ по Гвіанѣ, ум. въ 1821 г., авторъ сочиненій: объ анализѣ плода, 1808, о хвойныхъ и цикадовыхъ, 1826, о музахъ, 1831, о сѣверо-американской флорѣ, 1803, и пр.
- A. Rich.**—**Richard**, Achille, сынъ перваго, профессоръ въ Парижѣ, ум. въ 1852


- году, авторъ учебника ботаники и физиологии растений, 1819; медицинской ботаники, 1823, и монографіи орхидей.
- Röhl.**—**Röhling**, пасторъ въ Нассау, ум. въ 1813 г., авторъ флоры Германіи, 1796, написалъ Мхн Германіи, 1800.
- R. & S.**—**Röm. & Schult.**—**Römer & Schultes**, первый—профессоръ въ Цюрихѣ, ум. въ 1819 г., второй—въ Ландсгутѣ, ум. въ 1831 г., редактировали 16-е изданіе Системы растений Линнея.
- Roth**, врачъ, ум. въ 1834 г., написалъ: Ботаническія коллекціи, 1797—1806, Опытъ флоры Германіи, 1788—1800, Ботаническій сборникъ, 1830, и пр.
- Rupr.**—**Ruprecht**, родомъ изъ Праги, петербургскій академикъ, ум. въ 1870 г., путешественникъ по Кавказу, написалъ флору земли Самоѣдовъ, 1845, Распределение тайнобрачныхъ по Россійской имперіи, 1845, Водоросли Охотскаго моря, 1850, флору Петербургской губерніи, 1860, и др.
- Salisb.**—**Salisbury**, садоводъ и членъ Линнеевскаго Общества въ Лондонѣ, ум. въ 1829 г., написалъ Изображенія рѣдкихъ растений, 1791, *Paradisus Londinensis* 1806—7, Спутникъ ботаника, 1816, и пр.
- Sch. & Sp.**—**Schimper & Spenner**, первый—ботаникъ въ Мангеймѣ, ум. въ 1867 г., писалъ о пѣмекскихъ видахъ *Symphytum*, 1835; второй—профессоръ въ Фрейбургѣ, авторъ Фрейбургской флоры, 1825—1829, руководства къ прикладной ботаникѣ, 1834—36 г.
- Schk.**—**Schkuhr**, механикъ въ Виттенбергѣ, ум. въ 1811 г., написалъ *Enchiridion botanicum*, 1805, Тайнобрачныя растенія, 1809, Тайнобрачныя Германіи, 1810, и пр.
- Schott**, директоръ ботаническаго сада въ Шенбруннѣ, ум. въ 1865 г., писалъ объ аронниковыхъ, рутовыхъ и о папоротникахъ, а съ Эндлихеромъ: *Meletemata botanica*, 1832.
- Schrad.**—**Schrader**, профессоръ въ Гёттингенѣ, ум. въ 1836 г., писалъ о ганноверскихъ растеніяхъ, 1795—98, издавалъ ботаническій журналъ, 1799—1810, авторъ Германской флоры, 1806, Сборника Германской флоры, и пр.
- Schrk.**—**Schrank**, иезуитъ и профессоръ въ Мюнхенѣ, ум. въ 1835 году, авторъ Баварской флоры, 1789, очерка Зальцбургской флоры, 1792, Мюнхенской флоры, 1811—18, и пр.
- Schreb.**—**Schreber**, профессоръ въ Эрлангенѣ, ум. въ 1810 г., авторъ Описанія злаковъ въ рисункахъ, 1769—1810, очерка флоры Лейпцига, 1771, и пр.
- Schult.**—**Schultes**, авторъ флоры Австріи, 1794, флоры Баваріи, 1811, см. **Röm. & Schult.**
- Schultz**, К. Fr., врачъ, ум. въ 1837 г., авторъ *Prodromus Florae Sargardiensis*, 1806.
- Schweig. & Koerte**—**Schweigger & Koerte**, первый—профессоръ въ Кенигсбергѣ, ум. въ Сициліи въ 1821 г., авторъ флоры Эрлангена, вторая часть которой составлена въ сотрудничествѣ **Koerte**.
- Scop.**—**Scopoli**, профессоръ въ Павіи, ум. въ 1788 г., написалъ: *Flora carniolica*, 1772, Основы ботаники, 1783, *Deliciae Florae & Faunae Insubricae*, 1786—88.
- Sims**, англійскій ботаникъ, ум. въ 1838, продолжалъ журналъ Куртиса: *the Botanical Magazine* до 1826.
- Sm.**—**Smith**, президентъ Линнеевскаго общества въ Лондонѣ, ум. въ 1828

- году, написалъ: Неизданныя доселѣ изображенія растений, 1789—91, Англійскую флору, 1824—1836, Британскую флору, Экзотическую ботанику и пр.
- Sol.**—**Solander**, библіотекарь Британскаго музея въ Лондонѣ, ум. въ 1782 году, писалъ о кораллахъ.
- Spach**, написалъ вмѣстѣ съ гр. Жоберомъ: Изображенія восточныхъ растений; Обзоръ тополей, смородинъ, кленовъ и желудниковыхъ, 1834.
- Spr.**—**Sprengel**, профессоръ въ Галле, ум. въ 1833 г., написалъ Руководство къ изученію растений, 1802—4, Исторію ботаники, 1807—8, монографію зонтичныхъ, 1813, Ботаническій ежегодникъ 1818—20, флору Галле, 1806, и мн. др.
- Stev.**—**Steven**, ум. въ 1863 г., много писалъ о растеніяхъ Крыма и Кавказа, составилъ монографію рода *Pedicularis* и пр.
- Suter**, профессоръ въ Бернѣ, ум. въ 1827 г., авторъ Швейцарской флоры, 1802.
- Sw.**—**Swartz**, шведскій ботаникъ и путешественникъ по Вестъ-Индіи, ум. въ 1818 г., описалъ новые роды и виды растений, 1783—7, издалъ изображенія прежде неизвѣстныхъ растений Вестъ-Индіи, 1794, *Summa vegetabilium Scandinaviae*, 1814, и др.
- Tausch**, профессоръ въ Прагѣ, ум. въ 1848 г., писалъ о богемской флорѣ: *Herbarium Florae Bohemicae*, *Plantae selectae Florae Bohemicae*, 1837, и др.
- Tourn.**—**Tournefort**, французскій ботаникъ и путешественникъ, 1656—1708, предшественникъ Линнея, авторъ *Institutiones rei herbariae*, Исторіи парижскихъ растений; Основы ботаники, 1694, Путешествія на Востокъ, 1717, и пр.
- Trin.**—**Trinius**, петербургскій академикъ, извѣстный изслѣдователь злаковъ, ум. въ Петербургѣ въ 1844 г., написалъ *Fundamenta Agrostographiae*, 1820, *Species graminum*, 1828—36, и пр.
- Vahl**, ученикъ Линнея, профессоръ въ Копенгагенѣ, ум. въ 1804 г., авторъ *Symbolae botanicae*, 1790—94, *Eclogae americanae*, 1796—1807, *Enumeratio plantarum*, 1804—6.
- Vaill.**—**Vaillant**, французскій ботаникъ и путешественникъ, профессоръ въ Парижѣ, ум. въ 1722 г., авторъ Парижской ботаники, 1723.
- Vent.**—**Ventenat**, библіотекарь въ Парижѣ, ум. въ 1808 году, написалъ Основы ботаники, 1795, Сборникъ растений, 1803, *Jardin de Malmaison*, 1803—4, и пр.
- Vill.**—**Villars**, врачъ и профессоръ въ Страсбургѣ, ум. въ 1814 г., авторъ Исторіи растений Дофинэ, 1786—9, каталога растений Страсбурга, 1807, и др.
- Wahlenb.**—**Wahlenberg**, профессоръ въ Упсалѣ, ум. въ 1851 г., сочиненія его: лапландская флора, 1812, флора главныхъ Карпатъ, 1814, шведская флора, 1824—26, и др.
- W. & K.**—**Wald. & Kit.**—**Waldstein & Kitaibel**, первый—издатель сочиненія втораго: Описанія и изображенія рѣдкихъ растений Венгріи, 1802—12.
- Wallm.**—**Wallmann**.
- Wallr.**—**Wallroth**, докторъ въ Нордгаузенѣ, ум. въ 1857 году, сочиненія его: Краткая исторія рода розъ, 1828, Флора тайнобрачныхъ Германіи, 1831—33, Добавленія къ ботаникѣ, 1842—44, и др.



- Web.**—**Weber**, профессоръ въ Килѣ, ум. въ 1828 г., составилъ флору Геттингена, 1778, и др.
- Weinm.**—**Weinmann**, инспекторъ царскаго сада въ Павловскѣ, ум. въ 1858 г., составилъ каталогъ растений Павловскаго сада и Петербурга, 1824, писалъ о грибахъ: *Hymeno-et Gasteromycetes*, 1836 и пр.
- Wendland**, инспекторъ сада въ Геренгаузенѣ подъ Ганноверомъ, ум. въ 1828 году, писалъ о растеніяхъ этого сада и Ганновера, 1788—1801, издалъ монографію вересковыхъ: *Ericarum icones et descriptiones*, 1798—1823, и др.
- Wib.**—**Wibel**, врачъ въ Вертгеймѣ, во Франконіи, ум. въ 1814 г., написалъ мѣстную флору, 1797 г.
- Wikström**, шведскій ботаникъ, профессоръ въ Стокгольмѣ, ум. въ 1856 г., издавалъ годовые отчеты объ успѣхахъ ботаники, 1820—42.
- Wigg.**—**Wiggers**, F. H., авторъ *Primitiae Florae holsaticae*, 1780 г.
- Willd.**—**Willdenow**, профессоръ въ Берлинѣ, ум. въ 1812 г., выдающійся ботаникъ, авторъ руководства къ самообученію ботаники, берлинской флоры, 1787, берлинскаго сада, 1816, монографіи осокъ—*Caricologia*, 1805, берлинскаго древоводства, 1796, и др.
- Wimm. & Grab.**—**Wimmer & Grabowski**, первый—директоръ гимназіи въ Бреславлѣ, ум. въ 1868 г., извѣстный изслѣдователь ивъ: *Salices europaeeae*, 1866, написалъ вмѣстѣ съ Грабовскимъ флору Силезіи, 1827—9.
- With.**—**Withering**, врачъ въ Бермингамѣ, ум. въ 1799 г., писалъ о распредѣленіи растительности въ Великобританіи, 1776 г.
- Wulf.**—**Wulfen**, іезуитъ и профессоръ въ Клагенфуртѣ, ум. въ 1805 г., сочиненія его: о водныхъ тайнобрачныхъ, 1803, описаніе рѣдкихъ растеній, 1805.






# ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ:


Стр.	Строка.	Напечатано:	Должно быть напечатано:
6	8 снизу	..... 29.	..... 30.
9	8 сверху	жасминъ.	чубушники—
—	8 снизу	<i>Spiraeaceae</i>	<i>Spiraeaceae</i>
16	12 снизу	Kl. et. Gke	Kl. & Grck.
17	10 снизу	»	»
18	14 снизу	ложнокаштановыя — * <i>Hippocastaneae</i>	желудниковыя — * <i>Hippocastaneae</i>
22	5 снизу	остренники	востренники
23	19 снизу	гераневыя	журавельниковыя
29	7 сверху	сем. синюхи	сем. синюховыхъ
—	4 снизу	пузырьчатокъ	пузырчатковыхъ
—	3 снизу	пузырьчатки	пузырчатки
43	6 сверху	* <i>Sambucus</i> L	<i>Sambucus</i> L.
44	9 снизу	<i>Atriplex</i> L.	<i>Atriplex</i> L.
49	9 сверху	<i>Aster</i> L	<i>Aster</i> L.
59	11 снизу	рѣдешники— <i>Raphanis trum</i>	рѣдешники— <i>Raphanistrum</i>
63(36)	6 снизу	облепихи	облепихи
—	5 снизу	дымнищевыя	дымничныя
65	13 сверху	<i>Gramineae</i>	XXVI. <i>Gramineae</i>
67	въ срединѣ	(Рис. 303)	(Рис. 305)
—	»	» (Рис. 305)	(Рис. 303)
67	4 снизу	* <i>Triticum</i>	<i>Triticum</i>
75	12 сверху	овсяницы	овсяницы
—	15 сверху	<i>Atröpis</i>	<i>Atröpis</i>
78	8 сверху	триостренники	тривостренники
—	5 снизу	<i>Lycopus</i> L.	<i>Lycopus</i> L.
86	12 сверху	<i>Zanichëllia</i> L	<i>Zannichëllia</i> L.
108	13 снизу	земляники	клубники
—	4 снизу	<i>Rubus</i> L	<i>Rubus</i> L.
113	7 сверху	<i>Melampyrum</i> L	<i>Melampyrum</i> L.
117	13 сверху	<i>Polygonatum</i>	<i>Polygonatum</i>
119	10 сверху	пузырьчатники	пузырчатники
123	(рис. 550)		долженъ быть перевернутъ.

Стр.	Строка.	Напечатано:	Должно быть напечатано:
140	16	сверху рейграсъ	райграсъ
144	14	сверху <i>hastatum</i>	<i>hastatum</i>
148	9	снизу <i>Brachipòdium</i>	<i>Brachypòdium</i>
158	14	сверху <i>stellulàta</i>	<i>stellulata</i>
170	3	сверху гирчевникъ	гирчовникъ
—	4	сверху <i>Conium</i>	<i>Còdium</i>
175	12	сверху <i>Sm</i>	<i>Sw.</i>
182	1	сверху <i>Rich.</i>	<i>Rich &amp; Michx.</i>
197	11	сверху <i>conòpea</i>	<i>conopéa</i>
—	14	снизу <i>paniculàta</i> L.	<i>paniculata</i> L. <sup>1)</sup>
—	подъ строкою	<sup>1)</sup> Подъ Симоновымъ монастыремъ.	
203	20	снизу звѣробой	звѣробой
206	12	снизу <i>Vilb.</i>	<i>Vill.</i>
214	1	сверху <i>Linària</i>	<i>Linària</i> Juss.
218	10	сверху <i>Lycòpodium</i>	<i>Lycopodium</i>
248	12	сверху <i>P. obtusifolius</i> M. & K.	<i>P. obtusifolius</i> M. & K. <sup>1)</sup>
—	15	сверху <i>P. mucronàtus</i> Schrad.	<i>P. mucronatus</i> Schrad. <sup>2)</sup>
—	подъ строкою	<sup>1)</sup> Заливной лугъ Клязьмы подъ Черкизовымъ, въ озерѣ; Петровское Разумовское.	
—	»	<sup>2)</sup> Тулуговская мельница близъ Покровскаго; прежде подъ Симоновымъ монастыремъ.	
253	5	сверху <i>Gleditch</i>	<i>Gleditsch</i>
254	5	сверху <i>Pyréthrum</i>	† <i>Pyréthrum</i>
—	10	» <i>P. corymbòsum</i>	† <i>P. corymbosum</i>
255	3	сверху <i>Schrad</i>	<i>Schrk.</i>
256	6	сверху <i>P. bulbòsus</i> L.	<i>R. bulbosus</i> L.
272	19	сверху <i>S. ànnuus</i> S.	<i>S. annuus</i> L.
277	10	снизу <i>Seséli</i> L.	<i>Séseli</i> L.
279	12	сверху <i>S. Otites</i> L.	<i>S. Otites</i> Sm.
283	6	сверху * <i>Sorbifolia</i>	* <i>S. sorbifolia</i>
289	7	снизу <i>T. angustifolium</i> L.	<i>T. angustifolium</i> Jacq.

Сверхъ того, надлежитъ исправить опечатки въ пагинаціи, именно: въ листѣ 4-мъ послѣ 62 страницы, поставить 63, вм. 36; въ листѣ 8-мъ послѣ 123 страницы поставить 124, вмѣсто 142, и, наконецъ, въ листѣ 19-мъ, послѣ страницы 291 поставить 292, вмѣсто 922.

Наконецъ, въ первомъ листѣ Определителя семействъ слѣдуетъ поставить встрѣчающіяся русскія родовыя названія во множественномъ числѣ, вмѣсто единственнаго; такъ, на стр. 2, хвощи—вм. хвощъ; плауны—вм. плаунъ и т. д.







[76]

Библиотека Н. Н. Миханловскаго  
№ \_\_\_\_\_ полка \_\_\_\_\_  
Штаб



